







Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.  
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.  
1789/A









Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.  
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.  
1789/A





Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.  
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.  
1789/A






Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.  
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.  
1789/A

1789 (2)  
A/2

pp 777-790  
wanting

1550







95300




PEDANI DIOSCO-

RIDIS ANAZARBEO

de Medicinali materia, Librer  
sex, Ioanne Ruellio Suefs-  
sionensi interprete.

*Cuilbet capiti additæ Annotationes, i  
ditæ & compendiaria, è selectioni Me-  
corum promptuario.*



LVGDVNI  
Apud Balthazarem Arnolletum.  
M. D. XXX.

*Cum Privilegio Regis quinquennium.*



Permis à Balthazar Arn  
Imprimeur de la  
ner ou faire imprimer, exposé  
Dioscoride trāslate de grec en l  
pays, avec les Annotatiōs adio  
ce en vertu du Priuilege obt  
tant pour ledit Dioscoride q  
es liures mētionnez en icelluy  
deffences à tous autres Libra  
de n'imprimer ou faire imprimer, & expo  
te ledit Liure cy dessus mentionné, Jus  
q ans prochainement venans, à compter  
datte de l'impression dudit Liure. Et ce  
amende arbitraire, de confiscation des  
s, & des dommages & interests dudit  
Et autrement: comme plus amplemēt est  
dict Priuilege, Donné à Fontainebleau  
e iour de Feburier. Lan mil cinq cens  
euf. Par le Roy,

uesque de Bayonne Maistre des Requestes ordi  
de son hostel present.

*Hurau*

*Comble auueu*



PRAESTANTISSIMO ET  
peræque eruditissimo uiro,  
D. Francisco Sangelasio,  
Engolismæ eccle-  
siæ Decano.

H. B. P. Medicus. S. D.



VANDO QUIDEM Id ælutum a  
me statuerim, uir ornatissime, præ omnibus ex-  
tendum, ut ablegata protensis machinis ignauia,  
eo memet industria dedere, quatenus & genius  
& temporum ratio præbuerint, futurum ut admouenti ma-  
num, nonnusquam deop illud in subsidium accurrat: & per-  
inde id iamdiu non uulgaribus indicijs conceperim ad iatricen  
probe natum & efficiendum, nec secus decreui, uni me studio &  
opera permittere, quo & natura propellerer, & diutius inge-  
nium exercuissem. Atenim quo mei amicissimis, huius rei nihil  
arte dissimulans, quin & exerta & breui manu argumentum  
præberem, uisum est rudiori initio in auras prorūpere, quo pau-  
latim ad editiora subueherer. Nec ignoras quantum id ego ho-  
minū genus pro nihilo ducam, qui sublata lampade, necdum  
permeante prætoria buccinæ sonitu, uires suas omnes in arenam  
ipsumque discrimen proijciunt, cunque sufferendo æstui impares  
sint, aut nondum præbito de se specimine, aut non expectata præ-  
conia uoce, sese è carceribus ingenti suo dedecore subducunt, ac-  
tum desperabundi doctorum diligentia nullo delectu persequū-  
tur, & quod aperto Marte non audent, id occulta obirectatio-  
ne & subdolis machinamētis qua possunt, subruunt, nō robusto-  
quosque, at delicatulos quosque impetentes, donec per tēpus pere-  
uersitate propalata, una & à proposito & ab existimatione  
... a a 2 concid



concidunt. Et sane ea mihi causa fuit sustinenda aditionis scho-  
liorum, quæ Angulosissima in adibus tuis in syluam congefferã.  
Ea lugduni scholiasten in Dioscoridem agens, in cõpendiũ redi-  
gi, depresso ex industria stylo, quo imperitiores, quibus hæc scri-  
am, & medicinam faciunt, ad studiose legendum Diosco-  
ccendere, quo ab indiligentia quo summe premuntur ueter-  
citati, sciant dum hæc rudiora legunt, quæ simplicia cuius  
mpta, quæ ignota, aut alia quauis ratione non satis perspe-  
ueque, & quo loci perquirẽda. Porro hoc in negotio non  
orariũ dicastẽ egi, uerũ in exprimẽdis simpliciuũ facultati-  
& forma, Galenũ secutus sum: in priuata uerò simpliciuũ cẽ-  
ximiũ illũ & eruditione & perspecta diligẽtia Matthio-  
lũ reddidi, præcipuẽ cũ in cẽsendo Dioscoride hic & operã naua-  
rit singularem, atque adeo Colophonẽ addiderit. Verũ enim uero,  
uir dotibus ingenij omnibus præcellẽtissime, cũ te ut totius philo-  
sophiæ, ita Medicinæ studiosum penitus persenserim, ac can-  
doris tui memor, quo me, *ἡμεῖς ἡσυχῆς ἐν ἀπορίᾳ*, exceperis, id o-  
mnino committẽdũ duxi, ut hæc industriæ initia tibi dedicarem,  
quo te mihi manũ porrigẽte, chordæ uice, uel sine cortice, in am-  
plissimo hoc iatrices sinu, pernatem *ἄνδρ' ὕψ' ἔχοντι*, ad ipsius por-  
tus angustias. Iam iam enim Deo duce ad reddendos Latinitate  
Arabes accingor, quos à barbarie & mendis queis scatent as-  
sertos, id appungam discerniculi quã cum Græcis uaria aut di-  
uersa scripsere, totisque & uelis & remis enitar, ut doctis illo-  
rum Lectio à Galenica & Hippocratica minimũ dissideat. Tu  
interim præcellentis. V. Hæc initia boni consule, ab eo nimirum  
profecta, qui in literis per te supramodum promouisse testatur,  
quãtum quantunque est hoc Dioscoridis scholion & tuere, &  
lege. Vale Lugduni, sexto à Liberalibus die. 1550.

Et Horæ & genio.

Index



INDEX OMNIVM QVAE  
in Dioscoride continentur. Prior  
numeri librum, Posterior  
caput indicat.

<b>A</b> Brotonum	3.25.	Aeris flos	5.43.
Abfinthium	3.23.	Aerugo rasa.	5.45.
Abfinthium marinū	3.24.	Aerugo scolecia	5.45.
Abfinthium sātonicū	3.24.	Aes ustum	5.42.
Acacalis	1.100.	Aethiopis	4.90.
Acacia	1.114.	Aëtites lapis	5.93.
Acanthus	3.17.	Agallochon	1.21.
Acanthus sylvestris	3.17.	Agaricum	3.1.
Acanthium	3.16.	Ageraton	4.49.
Acetum	5.11.	Agnus	1.115.
Acetum Mulsum	5.12.	Anga	3.150.
Acetum Scilinum	5.15.	Alabastites.	5.93.
Acetum e Stæchade.	5.36.	Alcea	3.140.
Achillea.	4.28.	Alcibiadion	4.21.
Achras	1.131.	Aleyonium	5.83.
Acidamuria	5.13.	Alyssa	3.144.
Acinos	3.41.	Allium	2.145.
Acorum	1.2.	Aloe	3.22.
Acontium	4.66.77.	Alfina	4.75.
Adarces	5.84.	Althæa	3.139.
Adeps omnis	268.	Alumen	5.72.
Adeps Sampsuchi	2.68.	Alumen scissile	5.72.
Adianton	4.120.	Alysson	3.87.
Agilops	4.123.	Amaracum	3.38.
Aeris squamma	5.44.	Ambrosia	3.109.
		aa 3	Amian



# INDEX

<i>Amiantus lapis</i>	15.93.	<i>Apium</i>	3.62.
<i>Ammi</i>	3.59.	<i>Apocynon</i>	4.69.
<i>Ammoniacum</i>	3.80.	<i>Apollinaris</i>	4.59.
<i>Amomum</i>	1.14.	<i>Apriecur</i>	2.39.
<i>Ampelitis terra</i>	5.94.	<i>Apum ictus curatio</i>	6.40.
<i>Ampeloprason</i>	2.143.	<i>Aqua</i>	5.9.
<i>Amphisbana ictus, nota, cura</i>		<i>Aqua frigida</i>	6.33.
<i>tio</i>	6.38.40.	<i>Aqua marina</i>	5.9.
<i>Amurca</i>	1.119.	<i>Aqua mulsa</i>	5.8.
<i>Amygdala amara</i>	1.138.	<i>Arabicus lapis</i>	5.93.
<i>Anilum</i>	2.93.	<i>Aranus</i>	2.55.
<i>Anagallis</i>	2.171.	<i>Arbutus</i>	1.137.
<i>Anayrus</i>	3.142.	<i>Arction</i>	4.91.
<i>Anchusa</i>	4.21.	<i>Arction</i>	4.92.
<i>Androsaces</i>	3.127.	<i>Arcturon</i>	4.91.
<i>Androsemon</i>	3.148.	<i>Arena</i>	5.93.
<i>Anemone</i>	2.169.	<i>Argemone</i>	2.170.
<i>Anethum</i>	3.56.	<i>Argenti recrementum</i>	5.51.
<i>Anguim seneclus</i>	2.16.	<i>Argenti scoria</i>	5.51.
<i>Anisum</i>	3.54.	<i>Argenti spuma</i>	5.52.
<i>Anonis</i>	3.18.	<i>Argentum uiuū</i>	5.60.6.28.
<i>Anserinus adeps</i>	2.68.	<i>Arisarum</i>	2.160.
<i>Anthemis</i>	3.131.	<i>Aristolochia</i>	3.4.
<i>Anthyllis</i>	3.130.	<i>Armeniaca mala</i>	1.130.
<i>Antipathes</i>	5.86.	<i>Armenius lapis</i>	5.55.
<i>Antirrhinon</i>	4.117.	<i>Aron</i>	2.159.
<i>Antispoda</i>	5.41.	<i>Arrhenogonon</i>	3.120.
<i>Aparine</i>	3.86.	<i>Artemisia</i>	3.108.
<i>Aphaca</i>	2.142.	<i>Arundo</i>	1.96.
<i>Apiastrum</i>	3.99.	<i>Asarum</i>	1.9.
<i>Apios</i>	4.157.	<i>Asclepias</i>	3.88.
		<i>Ascyron</i>	



# INDEX

<i>Ascyron</i>	3.147.	<i>Blatta pristimaria</i>	2.34.
<i>Asius lapis</i>	5.88.	<i>Bliton</i>	2.110.
<i>Aspalathus</i>	1.19.	<i>Botrys</i>	3.110.
<i>Asparagus</i>	2.118.	<i>Brassica</i>	2.113.
<i>Asplenon</i>	3.128.	<i>Brassica marina</i>	2.115.
<i>Aspidis ictus nota &amp; cura-</i>		<i>Brassica sylvestris</i>	2.114.
<i>tio</i>	6.38.48.	<i>Britanica</i>	4.2.
<i>Aster Atticus</i>	4.105.	<i>Bromus</i>	4.123.
<i>Astragalus</i>	4.52.	<i>Bryon</i>	1.20.
<i>Athamanticum</i>	1.3.	<i>Buccina</i>	2.3.
<i>Athera</i>	2.84.	<i>Buglossum</i>	4.112.
<i>Atractylis</i>	3.89.	<i>Bulbus esculentus</i>	2.162.
<i>Atramentum librarii</i>	5.96.	<i>Bulbus uomitorius.</i>	2.163.
<i>Atramentum sutorii</i>	5.64.	<i>Bunion</i>	2.109.4.111.
<i>Atriplex</i>	2.112.	<i>Buprestis</i>	2.53.6.3.
<i>Auellana nux</i>	1.141.	<i>Buphthalmos</i>	3.133.
<i>Auena</i>	2.86.	<i>Butyrum</i>	2.64.
<i>Auricula muris</i>	2.176.	<i>Butiri fuligo</i>	2.64.
<i>Auripigmentum siue Ar-</i>		<i>Cacalia</i>	4.108.
<i>nicon</i>	5.70.6.29.	<i>Cadmia</i>	5.40.
<b>B</b> <i>Accæ Lauri</i>	1.89.	<i>Cacilia ictus, nota, curatio</i>	
<i>Baccharis</i>	3.42.		6.38.40.
<i>Balaustium</i>	1.126.	<i>Calamus odoratus</i>	1.17.
<i>Ballote</i>	3.98.	<i>Calamintha</i>	3.34.
<i>Balsamum</i>	1.18.	<i>Calceifraga</i>	4.161.
<i>Barbula hyrci</i>	2.137.	<i>Calx uina</i>	5.80.6.29.
<i>Basilisci ictus, nota, &amp; cura-</i>		<i>Cancanum</i>	1.23.
<i>tio</i>	6.38.48.	<i>Cancer</i>	2.9.
<i>Bdellium</i>	1.68.	<i>Canis rabiosi nota</i>	6.35.
<i>Beta</i>	2.116.	<i>Canis rabiosi morsus curatio</i>	
<i>Betonica</i>	4.1.		6.36.
<i>Bitumen</i>	1.82.	<i>aa</i>	4
		<i>Cane</i>	



# INDEX

Cane demor. uict. ratio. 6. 37	Ceruinum seuum.	2.68	
Cannabis.	3.141	Cerussa.	5.53.6.22
Cantharides.	2.52.6.1	Cestron.	4.1
Capnos.	4.95	Chalcitis.	5.65
Capparis.	2.166	Chamae.	2.6
Cardamomum.	1.5	Chamaeacle.	4.155
Cardamina.	2.121	Chamaecissos.	4.110
Carduus.	3.14	Chamaedaphne.	4.132
Carpasi succus.	6.13	Chamaedrys.	3.94
Cariota.	1.124	Chamaeleo albus.	3.8
Carum.	3.55	Chamaeleo niger.	3.9
Casus recens.	2.63	Chamaepeuce.	4.111
Casus equinus.	2.63	Chamaepitys.	3.150
Cassia.	1.12	Chamaefyce.	4.151
Castanea.	1.121	Chamaelea.	4.153
Castorium.	2.22	Chelidonium maius.	2.173
Catanance.	4.118	Chelidonium minus.	2.174
Caucalis.	2.133	Chia terra.	5.94
Cedrus.	1.88	Chrysanthemon.	4.48
Celticum Nardum.	1.7	Chrysocolla.	5.54
Cēchri ict. not. rem. 6. 38. 40		Chrysocome.	4.45
Cētauriū magnū.	3.6	Chrysogonon.	4.46
Centaurium minus.	3.7	Cicada.	2.43
Cepa.	2.144	Cicer satium.	2.96
Cepæa.	3.143	Cicer Arietinum.	2.96
Cera.	2.75	Cicer sylvestre.	2.96
Cerasia.	1.128	Cichorion.	2.126
Cerastæ ictus, nota, curatio. 6.		Cici.	4.145
38.40		Cicuta.	4.67, 6.11
Cerui genitale.	2.36	Cimices	2.32
Ceruinum cornu.	2.50	Cimolia.	5.94

Cypa



# INDEX

Cyparissias.	4.146	Cos Noxia.	5.93
Cinis sarmentitius.	5.82	Costus.	1.15
Cinnabaris.	5.59	Cotonea mala.	1.130
Cinnamomum.	1.13	Crateogonum.	3.119
Cionia.	2.3	Crithmum	2.122
Circea.	3.114	Crocodilion.	3.10
Cirsium.	4.104	Crocomagma.	1.25
Cistus.	1.108	Crocum.	1.25
Citria mala.	1.130	Croton.	4.145
Clematis.	4.6	Cucurbita.	2.127
Clinopodium.	3.91	Cucumis sativus.	2.128
Clymenon.	4.11	Cucumis sylvestris.	4.136
Cnicus.	4.168	Cuminum sativum.	3.57
Coagulum.	2.67	Cuminum sylvestre.	3.58
Coccum Guidium.	4.154	Cunila.	3.28
Coccum infectorium.	4.39	Cupressus.	1.85
Cochlea.	2.8	Curmi.	2.80
Cæruleus.	5.56	Cyclaminus una.	2.156
Colchicon.	4.72	Cyclaminus altera.	2.157
Colocasia.	2.98	Cydonomeli.	5.18
Colocynthis.	4.158	Cynia.	4.170
Colymbades oleæ.	1.100	Cynocrambe.	4.170
Conyza.	3.116	Cynoglosson.	4.113
Corallium.	5.86	Cynoforchis.	3.121
Coriandrum.	3.60.6.9	Cyparissias Tithym.	4.146
Coria ueramentaria.	2.116	Cyphi.	1.24
Coriarius frutex.	1.123	Cypirus.	1.4
Coris.	3.149	Cytinus.	1.126
Coronopus.	2.123	Cytisus.	4.98
Cornus.	1.133	<b>D</b> Amescena.	1.136
Corruda.	2.118	<b>D</b> Damasonium.	3.144
		aa 5	Daph



# INDEX

<i>Daphnoides</i>	4.131.	<i>Eleoselinon</i>	3.62.
<i>Daucus</i>	3.67.	<i>Elichryson</i>	4.47.
<i>Delphinium</i>	3.68.	<i>Empetron</i>	4.161.
<i>Dedroides Tithyma.</i>	4.146.	<i>Ephemeron</i>	4.73. 6.5.
<i>Deuteria</i>	5.5.	<i>Epimedium</i>	4.7.
<i>Dictamnium</i>	3.31.	<i>Epimelis</i>	1.13.
<i>Dictamnū Cretense</i>	3.31.	<i>Epipactis</i>	4.94.
<i>Diphryges</i>	5.69.	<i>Epirotica mala</i>	1.130.
<i>Dipsacum</i>	3.11.	<i>Equisetum</i>	4.38.
<i>Dipsadis morsus, notæ, curatio.</i>		<i>Eretria terra</i>	5.94.
	6.38. 40.	<i>Erica</i>	1.99.
<i>Dorycnion</i>	4.64. 6.6.	<i>Erinaceus</i>	2.1.
<i>Draba</i>	2.149.	<i>Erinei</i>	1.145.
<i>Draco marinus</i>	2.12.	<i>Erinus</i>	4.25.
<i>Draconis marini, ictus, remedia</i>	6.40.	<i>Eruca</i>	2.134.
<i>Dracunculus</i>	2.158.	<i>Eruca olerum</i>	2.51.
<i>Dryini ictus, notæ</i>	6.38. 40.	<i>Eruca Pinorum</i>	6.53.
<i>Dryopteris</i>	4.167.	<i>Eruum</i>	2.101.
<i>Dulcis radix</i>	3.5.	<i>Eryngium</i>	3.21.
<b>E</b> <i>Benus</i>	1.110.	<i>Erysimon</i>	2.150.
<b>E</b> <i>Ebulum</i>	4.155.	<i>Eupatorium</i>	4.33.
<i>Ebur</i>	2.48.	<i>Euphorbium</i>	3.78.
<i>Echinus</i>	2.1.	<b>F</b> <i>Aba</i>	2.97.
<i>Echinus terrestris</i>	2.1.	<b>F</b> <i>Faba Aegyptia</i>	2.98.
<i>Echium</i>	4.23.	<i>Fax</i>	5.79.
<i>Elaphoboscon</i>	3.64.	<i>Fagus</i>	1.120.
<i>Elaterion</i>	4.136.	<i>Farina crassior</i>	2.82.
<i>Elatine</i>	4.32.	<i>Fel</i>	2.70.
<i>Electrum</i>	1.92.	<i>Ferrirubigo</i>	5.46.
<i>Eleomeli</i>	1.31.	<i>Ferula</i>	3.73.
		<i>Festuca</i>	4.123.

Fibri



# INDEX

<i>Fibrini testes</i>	2.22.	<i>Galien</i>	4.81.
<i>Ficus</i>	1.144.	<i>Galiopsis</i>	4.80.
<i>Ficus sylvestris</i>	1.144.	<i>Garum</i>	2.300.
<i>Ficus Lixivium</i>	1.145.	<i>Genitale Cerni</i>	2.36.
<i>Filicula</i>	4.166.	<i>Gentiana</i>	3.3.
<i>Filix mas</i>	4.165.	<i>Geranion</i>	3.111.
<i>Filix fœmina</i>	4.165.	<i>Geodes Lapis</i>	5.93.
<i>Fimum</i>	2.72.	<i>Gingiberis</i>	2.152.
<i>Flos Aceris</i>	5.43.	<i>Gingidion</i>	2.131.
<i>Flos salis</i>	5.77.	<i>Gith</i>	3.75.
<i>Flos Punica.</i>	1.126.	<i>Gladiolus</i>	4.18.
<i>Flos sylvestris Punici</i>	1.126.	<i>Glans</i>	1.120.
<i>Fœniculum</i>	3.65.	<i>Glans Ioni</i>	1.121.
<i>Fœniculum erraticum</i>	3.66.	<i>Glans Sardiana</i>	1.121.
<i>Fœnum gracum</i>	2.94.	<i>Glans unguentaria</i>	4.141.
<i>Fraxinus</i>	1.91.	<i>Glastrum sativum</i>	2.177.
<i>Fuligo è Myrrha, Resina, Sty-</i>		<i>Glastrum sylvestre</i>	2.177.
<i>race</i>	1.72.	<i>Glaucium</i>	3.82.
<i>Fuligo liquida picis</i>	1.79.	<i>Glaux</i>	4.124.
<i>Fuligo pictoria</i>	5.95.	<i>Gluten piscium</i>	3.84.
<i>Fuligo resina</i>	1.76.	<i>Glutinum</i>	3.83.
<i>Fuligo Thuris</i>	1.72.	<i>Gnaphalion</i>	3.112.
<i>Fumaria</i>	4.95.	<i>Gobius</i>	2.28.
<i>Fungi</i>	4.71.	<i>Gramen</i>	4.26.
<b>G</b> <i>Agates Lapis</i>	5.92.	<i>Gramen arundinaceu</i>	4.26.
<i>Galaclites lapis</i>	5.93.	<i>Gramen Parnasi</i>	4.26.
<i>Galbanum</i>	3.79.	<i>Grossi</i>	1.145.
<i>Galerita</i>	2.46.	<i>Gypsum</i>	5.81.6.24.
<i>Galla</i>	1.122.	<i>Hematites</i>	5.90.
<i>Gallina</i>	2.41.	<i>Hemorrhoi, nota,</i>	6.38.40.
<i>Gallina cerebellum</i>	2.41.	<i>Halica</i>	2.88.
		<i>Hali</i>	



# INDEX

<i>Halicacabū Solanū</i>	4.61.	<i>Hirundines</i>	2.47.
<i>Halimus</i>	1.102.	<i>Hirudo</i>	6.32.
<i>Harundo</i>	1.96.	<i>Hordeum</i>	2.78.
<i>Harundo Cypria</i>	1.96.	<i>Horminum</i>	3.123.
<i>Harundo uallatoria</i>	1.96.	<i>Hyacinthus</i>	4.53.
<i>Hastula regia</i>	2.161.	<i>Hydromeli</i>	5.8.
<i>Hedera</i>	2.172.	<i>Hydromelon</i>	5.19.
<i>Helenium 1.</i>	1.26.	<i>Hydropiper</i>	2.153.
<i>Helenium alterum</i>	1.26.	<i>Hyoscyamus</i>	4.59. 6.15.
<i>Helioscopius</i>	4.146.	<i>Hypecoon</i>	4.58.
<i>Heliotropiū magnum</i>	4.171.	<i>Hypericum</i>	3.146.
<i>Heliotropium parū</i>	4.171.	<i>Hypocistis</i>	1.108.
<i>Helleborum album</i>	4.133.	<i>Hyssopum</i>	3.26.
<i>Helleborum nigrū</i>	4.134.	<b>I</b> <i>Assis</i>	5.93.
<i>Helxine</i>	4.31. 74.	<i>Iberis</i>	1.147.
<i>Hemerocallis</i>	3.117.	<i>Idea radix</i>	4.36.
<i>Hemionitis</i>	3.129.	<i>Ilex</i>	1.120.
<i>Herba Sabina</i>	1.87.	<i>Indicum</i>	5.57.
<i>Hieracium magnum</i>	3.61.	<i>Inguinalis</i>	4.105.
<i>Hieracium paruum</i>	3.61.	<i>Intybus</i>	2.125.
<i>Hippace</i>	2.63.	<i>Irio</i>	2.150.
<i>Hippocampus</i>	2.2.	<i>Iris</i>	1.1.
<i>Hippoglosson</i>	4.116.	<i>Isopyrum</i>	4.106.
<i>Hippolapathon</i>	2.107.	<i>Iudaicus Lapis</i>	5.93.
<i>Hippophaës</i>	4.143.	<i>Iuncus</i>	4.42.
<i>Hippophæston</i>	4.144.	<i>Iuncus odoratus</i>	1.16.
<i>Hippopotami testes</i>	3.21.	<i>Iuniperus</i>	1.86.
<i>Hipposelinon</i>	3.62.	<i>Ius piscium</i>	2.31.
<i>Hirci barbula</i>	3.137.	<i>Ixia</i>	3.8. 6.21.
<i>Hircinum seuum</i>	2.68.	<b>L</b> <i>Abrū Veneris</i>	3.11.
<i>Hirculus</i>	1.7.	<i>Labrusca</i>	5.1.
			Lac



# INDEX

Lac	2.62.	Lepus marinus	2.17.6.30.
Lac coagulatum	6.26.	Lepus terrestris	2.17.
Lac humanum	2.62.	Leucacantha	3.19.
Lacerta	2.56.	Leucanthemon	3.131.
Lactuca sativa	2.129.	Leucas	3.95.
Lactuca sylvestris	2.130.	Leucoion	3.18.
Ladanum	1.109.	Lichen	4.43.
Lagopus	4.15.	Lignorum marcor	1.95.
Lampsana	2.108.	Ligusticum	3.49.
Lana	2.65.	Ligustrum	1.106.
Lana cremata	2.65.	Lilium	3.97.
Lanaria herba	2.155.	Lilium sylvestre	3.117.
Lappa	4.122.	Limonium	4.14.
Lapathum	2.107.	Lingua bubula	4.112.
Lasfer	3.76.	Linozostis	4.169.
Laserpitium	3.76.	Linum	2.95.
Lathyris	4.148.	Lithocolla	5.93.
Lauer	2.120.	Lithospermon	3.135.
Laurus	1.89.	Locusta	2.44.
Laurus Alexadrina	4.130.	Lolium	2.92.
Lauri bacca	1.89.	Lonchitis	3.138.
Lemnia terra	5.63.	Lora	5.5.
Lens	2.99.	Lotus arbor	1.133.
Lens palustris	4.76.	Lotus Aegyptia	4.99.
Lentiscus	1.74.	Lotus sylvestris	4.97.
Lentiscina resina	1.76.	Lotus urbana	4.96.
Leontopetalon	3.92.	Lupinus sativus	2.102.
Leonum pingua	2.68.	Lupinus sylvestris	2.102.
Leontopodion	4.115.	Lychnis coronaria	3.96.
Lepidium	2.167.	Lychnis sylvestris	3.96.
Leptocarya	1.141.	Lycium	1.113.
		Lyco	



# INDEX

Lycopsis	4.22.	Medulla	2.69.	
Lygos	4.115.	Mel Ponticum	2.74.	
Lyncis urina	2.73.	Mel	2.74.	
Lyfimachia	4.3.	Mel Saccharum	2.74.	
<b>M</b> Acer.	1.93.	Mel Sardoum	2.74.	
<b>M</b> Mana	2.37.	Mel Heraction	6.74.	
Magnes	5.93.	Melampsithium	5.5.	
Malabathrum	1.11.	Melanteria	5.67.	
Malicorium	1.126.	Melanthium	3.75.	
Malua	2.111.	Melia terra	5.94.	
Malum	1.130.	Melilotos	3.39.	
Malum Armeniacū	1.130.	Melimela	3.130.	
Malum Cotoneum	1.130.	Melissophyllon	3.99.	
Malum dulce	1.130.	Melitites Lapis	5.93.	
Malum Epiroticum	1.130.	Melomeli	5.18.	
Malum Medicum	1.130.	Memphites	5.93.	
Malum orbiculatum	1.130.	Mentha	3.36.	
Malum Persicum	1.130.	Mentastrum	3.36.	
Malum praeox	1.130.	Meon	1.3.	
Malum Punicum	1.126.	Mercurialis	4.169.	
Malum sylvestre	1.130.	Mespilus	1.132.	
Mandragora	4.65.	6.16.	Milium	2.89.
Manna Thuris	1.71.	Millefolium	4.100.	
Marcor lignorum	1.95.	Millepeda	2.33.	
Maron	3.40.	Misy	5.66.	
Marrubium	3.100.	Mituli	2.4.	
Marrubium nigrum	3.98.	Moly	3.45.	
Mastiche	1.74.	Molybdæna	3.50.	
Meconium	6.17.	Molybdoides lapis	5.48.	
Medica mala	1.130.	Morochthus	5.93.	
Medion	4.16.	Morus	1.142.	
		Mul		



# INDEX

<i>Mullus</i>	2.20.	<i>Nepeta</i>	3.34.
<i>Mulsun</i>	5.7.	<i>Nitrum</i>	5.78.
<i>Muralis herba</i>	4.74.	<i>Nitri spuma</i>	5.78.
<i>Muria</i>	5.75.	<i>Nux Anellana</i>	1.141.
<i>Mures</i>	2.61.	<i>Nux iuglans</i>	1.140.
<i>Muris Auricula</i>	2.176.	<i>Nux Pinea</i>	1.73.
<i>Mus Araneus</i>	2.60.	<i>Nymphaea</i>	3.126.
<i>Muris Aranei ictus, nota, cura- ratio</i>	6.38.40.	<b>O</b> <i>chra</i>	5.58.
<i>Muscus</i>	1.20.	<i>Ocimastrum</i>	4.24.
<i>Muscus marinus</i>	4.84.	<i>Oenanthe</i>	3.115. 5.3.
<i>Mustela</i>	2.23.	<i>Oesypum</i>	2.66.
<i>Myagron</i>	4.102.	<i>Olea</i>	1.117.
<i>Myosotis</i>	2.176.	<i>Olea sylvestris</i>	1.117.
<i>Myrica</i>	1.98.	<i>Oleaster</i>	1.117.
<i>Myrrha</i>	1.66.	<i>Olea Aethiopica</i>	1.117.
<i>Myrrha Bæotica</i>	1.66.	<i>Olei uires</i>	1.27.
<i>Myrrhis</i>	4.101.	<i>Oleum Amygdalinū</i>	1.33.
<i>Myrtidanium</i>	1.127.	<i>Oleum Balaninum</i>	1.34.
<i>Myrtus sativa</i>	1.127.	<i>Oleum candidum</i>	1.28.
<i>Myrtus sylvestris</i>	4.129.	<i>Oleum Carynum</i>	1.34.
<b>N</b> <i>aphtha</i>	1.84.	<i>Oleum Cicinum</i>	1.32.
<i>Napus</i>	2.104.	<i>Oleum Gnicinum</i>	1.35.
<i>Narcaphthon</i>	1.22.	<i>Oleum commune</i>	1.27.
<i>Narcissus</i>	4.142.	<i>Oleum e Gnidio grano</i>	1.35.
<i>Nardi genera</i>	1.6.	<i>Oleū Hyoscyaminum</i>	1.35.
<i>Nardum Celticum</i>	1.7.	<i>Oleum Laurinum</i>	1.37.
<i>Nardum montanum</i>	1.8.	<i>Oleum Lentiscinum</i>	1.38.
<i>Nardinum unguentum</i>	1.63.	<i>Oleum Mastichinum</i>	1.39.
<i>Nasturtium</i>	2.147.	<i>Oleum Melanthinum</i>	1.35.
<i>Natricis ictus</i>	6.38.40.	<i>Oleum Myrteum</i>	1.36.
		<i>Oleū Oliva sylvestris</i>	1.18.
		<i>Oleum</i>	



# INDEX

<i>Oleum Omphacinum</i>	1.27.	<i>Paliurus</i>	1.103.
<i>Oleum Picinum</i>	1.78.	<i>Palma</i>	1.124.
<i>Oleum Raphaninum</i>	1.35.	<i>Palma Elate</i>	1.125.
<i>Oleum Sesaminum</i>	1.34.	<i>Palma Thebaica</i>	1.124.
<i>Oleum Sicyonium</i>	1.29.	<i>Panaces Asclepij</i>	3.47.
<i>Oleum Sinapinum</i>	1.35.	<i>Panaces Chironium</i>	3.48.
<i>Omphacinum</i>	1.27.	<i>Panaces Heracium</i>	3.46.
<i>Omphacium.</i>	5.4.	<i>Pancration</i>	2.165.
<i>Omphacomelites</i>	5.20.	<i>Panicum</i>	2.90.
<i>Onagra</i>	4.103.	<i>Papauer corniculatum</i>	4.
<i>Ononis</i>	3.18.	56.6.18.	
<i>Onosma</i>	3.125.	<i>Papauer erraticum</i>	4.54.
<i>Onyx</i>	2.7.5.93.	<i>Papauer sativum</i>	4.55.
<i>Ophioscorodon</i>	2.145.	<i>Papauer spumeum</i>	4.57.
<i>Ophites</i>	5.93.	<i>Papyrus</i>	1.97.
<i>Opium</i>	4.55.	<i>Pardorum pinguis</i>	2.68.
<i>Opobalsamum</i>	1.18.	<i>Paronychia</i>	4.44.
<i>Opopanax</i>	3.46.	<i>Parthenium</i>	3.132.
<i>Orbiculata mala</i>	1.130.	<i>Pastinaca herba</i>	3.50.
<i>Oreoselinon</i>	3.62.	<i>Pastinaca marina</i>	2.18.
<i>Origanon</i>	3.28.	<i>Pastinaca marina</i>	6.38.
<i>Origanum sylvestre</i>	3.28.	<i>Peplis</i>	4.150.
<i>Ornithogalum</i>	2.138.	<i>Peplos</i>	4.149.
<i>Orobanche</i>	2.136.	<i>Pepo</i>	2.128.
<i>Oriza</i>	2.87.	<i>Periclymenon</i>	4.12.
<i>Ostracites</i>	5.93.	<i>Persea</i>	1.146.
<i>Osyris</i>	4.126.	<i>Persica mala</i>	1.130.
<i>Othonna</i>	2.175.	<i>Personata</i>	4.92.
<i>Ouorum natura</i>	2.42.	<i>Petasites</i>	4.93.
<b>P</b> <i>Ouillum seuum</i>	2.68.	<i>Petroselinon</i>	3.62.
<i>Aeonia</i>	3.134.	<i>Peucedanon</i>	3.74.
		<i>Pha</i>	



# INDEX

<i>Phalangium</i>	3.103	<i>Polygala</i>	4.125
<i>Phalangij ictus, nota, curatio</i>		<i>Poligonatum</i>	4.5
6.38.40		<i>Polygonon</i>	4.4
<i>Phalaris</i>	3.136	<i>Polypodion</i>	4.166
<i>Phasioli</i>	2.100	<i>Pompholyx</i>	5.41
<i>Phoenix</i>	4.35	<i>Populus alba</i>	1.92
<i>Phrygius</i>	5.87	<i>Populus nigra</i>	1.92
<i>Phu</i>	1.10	<i>Porrum capitatum</i>	2.143
<i>Phycus marinus</i>	4.85	<i>Portulaca</i>	2.117
<i>Phyllon</i>	3.120	<i>Potamogeton</i>	4.86
<i>Phytisma</i>	4.114	<i>Poterion</i>	3.15
<i>Picea</i>	1.73	<i>Propolis</i>	2.76
<i>Pingua</i>	1.60	<i>Prunus, pruna</i>	1.136
<i>Pinorum Eruc.</i>	6.53	<i>Pseudobunon</i>	4.109
<i>Pinus</i>	1.2	<i>Psoricon</i>	5.65
<i>Piper</i>	2.151	<i>Psyllion</i>	4.60.6.10
<i>Pissasphaltos</i>	1.83	<i>Ptarmica</i>	2.154
<i>Pistacia</i>	1.139.	<i>Pulegium</i>	3.30
<i>Pitydes</i>	1.73	<i>Pumex</i>	5.74
<i>Pityusa</i>	4.147	<i>Purpura</i>	2.3
<i>Pix liquida</i>	1.78	<i>Picnocomon</i>	4.156
<i>Pix sicca</i>	1.80	<i>Pyrethrum</i>	3.69
<i>Plantago</i>	2.119	<i>Pyrites</i>	5.89
<i>Platyphyllos</i>	4.146	<i>Pyrorum genera</i>	1.131
<i>Plumbago</i>	5.50	<i>Q</i> <i>Vercus</i>	1.120
<i>Plumbum elotum</i>	5.47	<i>Q</i> <i>Quinquefoliū</i>	4.34
<i>Plumbum ustum</i>	5.48	<i>R</i> <i>Adicula</i>	2.155
<i>Pnigitis terra</i>	5.94	<i>R</i> <i>Radix</i>	2.105
<i>Polemonia</i>	4.7	<i>Rana</i>	2.24
<i>Polion</i>	3.105	<i>Rana palustris</i>	6.31
<i>Policnemon</i>	3.90	<i>Ranunculum</i>	2.168
		<i>bb</i> <i>Rapum</i>	



# INDEX

Rapum	2.103	Salamendra	2.54.6.4
Recrementum Argenti	5.51	Salix	1.116.
Resina uaria	1.76	Salvia	3.32
Rha	3.2	Sambucus	4.155
Rhamnus	1.101	Samia terra	5.94
Raphanus	2.105	Samius lapis	5.94
Rhodia radix	4.37	Sampsuchum	3.38
Rhododendron	4.70	Sandaracha	5.61.6.29
Rhus	1.123	Sanguinaria	4.4
Ricinus	4.145	Sanguinaria foemina	4.4
Rosa	1.111	Sanguis	2.161
Rosci pastilli	1.112	Sanguis Tauri	6.61
Rosmarinus	3.70	Sapphirus	5.92
Rosmarinum	3.71	Sarcocolla	3.81
Rubeta	6.31	Sardianae glandes	1.121
Rubia	3.137	Sardonio	6.14
Rubigo ferri	3.46	Sarmentitius cinis	5.82
Rubrica fabrilis	5.62	Satureia	3.36
Rubrica Sinopica	5.61	Satyrion	3.122
Rubus	4.29	Satyrion Erythrionion	3.122
Rubus canis	1.105	Scammonia	4.152
Rubus Idaeus	4.30	Scandix	2.132
Rumex	2.107	Schistum lac	2.62
Ruscum	4.129	Schistos lapis	2.91
Ruta	3.43	Scilla	2.164
Ruta sylvestris	3.44	Scolopendra	2.13
Sacra herba	4.51	Scolopendrea ictus, nota, cura-	
Sagapenum	3.77	tio	6.38.40
Sal	5.75	Scordion	3.106
Salis flos	5.77	Scorodoprasum	2.145
Salis spuma	5.75	Scoria ferri	5.46
		Scoria	



# INDEX

Scoria plumbi	5.48	Silurus	2.25.
Scorpioides	4.171	Silybum	4.140
Scorpius marinus	2.11	Sinapi	2.146
Scorpius	2.10	Sion	2.120
Scorpij ictus, notæ, curatio	6.	Sifer	2.106
38.40		Sifon	3.53.
Securidaca	3.124	Sisymbrium utrunque	2.121
Sedum magnum	4.77	Smarides pisces	2.26
Selenites lapis	5.93	Smilax hortensis	2.140
Selinusia terra	5.94	Smilax arbor	4.68.6.
Semperuiuum maius	4.77	12.68	
Semperuiuum minus	4.77	Smilax aspera	4.127
Senecla anguium	2.16	Smilax laevis	4.128
Senecio	4.82	Smyris lapis	5.93
Sepia	2.19	Smyrnion	3.63
Seps	2.57	Solanum hortense	4.61
Seris	2.125	Solanum manicum	4.63
Serpillum	3.37	Solanum somniferum	4.62
Sertula campana	3.39	Sonchus	2.124
Serum Lactis	2.62	Sorba	1.135
Sesama	2.91	Sory	5.68
Sesamoides	4.135	Sparganion	4.19
Seseli	3.51	Spartion	4.139
Seseli Aethiopicum	3.51	Spondylion	3.72
Seseli Creticum	3.52	Spina acuta	1.104
Seseli Peloponnense	3.51	Spina alba	3.12
Sicyonium oleum	1.29	Spina Arabica	2.13
Sideritis	4.27	Spongia	5.85
Sidium	1.126	Spongiarum lapides	5.7.
Siligo	2.83	Spuma Argenti	5.52 6.72
Siliquæ	1.129	Spuma Nitri	5.78
		Spuma Salis	5.75
		bb 2	Squam



# INDEX

<i>Squamma eris</i>	5.44	<i>Testis</i>	5.94
<i>Squāma ex acie decussa</i>	5.44	<i>Testiculus canis</i>	3.121
<i>Stachys</i>	3.101	<i>Teucrion. Teucris</i>	3.93
<i>Stacle</i>	1.61	<i>Thalossomeli</i>	5.10
<i>Staphis agria</i>	4.137	<i>Thaliētron</i>	4.83
<i>Stibium</i>	5.49	<i>Thapsia</i>	4.138
<i>Stimmi</i>	5.49	<i>Thlaspi</i>	2.148
<i>Stæbe</i>	4.10	<i>Thracias lapis</i>	5.93
<i>Stæchas</i>	3.27	<i>Thunnus</i>	2.29
<i>Stomoma</i>	5.44	<i>Thus</i>	1.69
<i>Stratiotes</i>	4.87	<i>Thuris cortex</i>	1.70
<i>Stratiotes Millefoliū</i>	4.88	<i>Thuris fuligo</i>	1.72
<i>Strigmenta balnearum</i>	1.30	<i>Thuris manna</i>	1.71
<i>Strigmenta gymnasiōrū</i>	1.30	<i>Thyites Lapis</i>	5.93
<i>Strigmenta palaestrica</i>	1.30	<i>Thymælea</i>	4.154
<i>Strobili</i>	1.73	<i>Thymoxalme</i>	5.14
<i>Struthion</i>	2.155	<i>Thymus</i>	3.35
<i>Styrax</i>	1.67	<i>Tilia</i>	1.108
<i>Suillus adeps</i>	2.68.	<i>Tithymali</i>	4.146
<i>Suillus Pulmo</i>	2.35	<i>Torpedo piscis</i>	2.14
<i>Sulphur</i>	5.73	<i>Toxicon</i>	6.20
<i>Sycomorus</i>	1.43	<i>Tragacantha</i>	3.20
<i>Symphiton</i>	4.8.	<i>Tragium</i>	4.40
<b>T</b> <i>Amarix</i>	1.198	<i>Tragoriganum</i>	3.29
<i>Taxus</i>	4.58.6.12	<i>Tragos</i>	2.85
<i>Taurorum pinguis</i>	2.68	<i>Tribulus</i>	4.13
<i>Telephion</i>	2.178	<i>Trichomanes</i>	4.121
<i>Tellinæ</i>	2.5	<i>Triphyllon</i>	3.104
<i>Terebinthus</i>	1.75	<i>Tripolion</i>	4.119
<i>Terra</i>	5.94	<i>Trissago</i>	3.94
<i>Terra fornacum</i>	5.94	<i>Triticum</i>	2.77
		<i>Tuber</i>	



# INDEX

<i>Tuber</i>	2.139	<i>Vinum Cydonites</i>	5.18
<i>Tussilago</i>	3.107	<i>Vinum Daucites</i>	5.39
<i>Typha</i>	5.113	<i>Vinum Dictamnites</i>	5.36
<b>V</b> <i>Enenata</i>	6.34	<i>Vinum ex Fœniculo</i>	5.39
<i>Venerisumbilicus</i>	4.	<i>Vinum è Flore Salis</i>	5.39
78.		<i>Vinum Heleborites</i>	5.39
<i>Veratrum album</i>	4.133	<i>Vinum Hyssopites</i>	5.35
<i>Veratrum nigrum</i>	4.134	<i>Vinum ex Iride</i>	5.38
<i>Verbascum</i>	4.89	<i>Vinum Juniperinum</i>	5.32
<i>Verbenaca</i>	4.50	<i>Vinum Lentissimum</i>	3.27
<i>Vermes terreni</i>	2.59	<i>Vinum Mandragorites</i>	5.39
<i>Vesparum ictus curatio</i>	6.40	<i>Vinum Marathrites</i>	5.39
<i>Vini natura</i>	5.5	<i>Vinum marinum</i>	5.17
<i>Vinum Absinthites</i>	3.23.	<i>Vinum è Marrubio</i>	5.36
5.34		<i>Vinum Melites</i>	5.18
<i>Vinum Acorites</i>	5.39	<i>Vinum Melitites</i>	5.6
<i>Vinum Adynamon</i>	5.5	<i>Vinum Melomeli</i>	5.18
<i>Vinum Album</i>	5.5	<i>Vinum è Myrrha</i>	5.38
<i>Vinum Anethinum</i>	5.39	<i>Vinum Myrsinites</i>	5.26
<i>Vinum Apytes</i>	5.21	<i>Vinum Myrtites</i>	5.25.
<i>Vinum Aromatites</i>	5.37	<i>Vinum è Nardo Sylvestri</i>	5.
<i>Vinum Asarites</i>	5.38	38.	
<i>Vinum è Betonica</i>	5.36	<i>Vinum Neclarites</i>	5.38
<i>Vinum Bunites</i>	5.36	<i>Vinum Oenanthinum</i>	5.22
<i>Vinum Calaminthites</i>	5.36	<i>Vinum Omphacites</i>	5.5
<i>Vinum Catorchites</i>	5.29	<i>Vinum Origanites</i>	5.36.
<i>Vinum Cedrinum</i>	5.32	<i>Vinum Palmeum</i>	5.28
<i>Vinum Cedrites</i>	5.32	<i>Vinum Panacites</i>	5.39
<i>Vinum Cestrites</i>	5.36	<i>Vinum Phthorium</i>	5.39
<i>Vinum Chamædrytes</i>	5.36	<i>Vinum Picatum</i>	5.33
<i>Vinum è Chamælea</i>	5.39	<i>Vinum Pincum</i>	5.32
	bb 3	<i>Vinum</i>	



# INDEX

<i>Vinum è Pipere</i>	5.38	<i>Vlmus</i>	1.94
<i>Vinum resinatum</i>	5.30	<i>Vmbilicus Veneris</i>	4.78
<i>Vinum Rhodites</i>	5.24	<i>Vnguentorum ratio</i>	1.40
<i>Vinum Rhætes</i>	5.23	<i>Vng. Abrotoninum</i>	1.48
<i>Vinum Saluiatum</i>	5.39	<i>Vng. Amaricimum</i>	1.56
<i>Vinum è Satureia</i>	5.36	<i>Vng. Anethinum</i>	1.49
<i>Vinum Scammonites</i>	5.39	<i>Vng. Cinnamoninum</i>	1.62
<i>Vinum Scillinum</i>	5.16	<i>Vng. Crocinum</i>	1.52
<i>Vinum Stachadites</i>	5.36	<i>Vng. Cyprinum</i>	1.53.106
<i>Vinum Strobilites</i>	5.31	<i>Vng. Elatinum</i>	1.42
<i>Vinum è Sycomoris</i>	5.29	<i>Vng. Gleucinum</i>	1.55
<i>Vinum è Syriaca Nardo, Cel-</i>		<i>Vng. Hedycroon</i>	1.58
<i>tica, Malabathro</i>	5.38	<i>Vng. Irinum</i>	1.54
<i>Vinum Terebinthinum</i>	5.	<i>Vng. Malabathrinum</i>	1.64
	27	<i>Vng. Megalinum</i>	1.57
<i>Vinum Thymites</i>	5.36	<i>Vng. Melinum</i>	1.43
<i>Vinum è Thymelæa</i>	5.39	<i>Vng. Mendesium</i>	1.60
<i>Vinum Tragoriganites</i>	5.35	<i>Vng. Metopium</i>	1.59
<i>Viola alba</i>	318	<i>Vng. Narcissinum</i>	1.51
<i>Viola purpurea</i>	4.107	<i>Vng. Nardinum</i>	1.63
<i>Viperæ ictus, notæ, curatio</i>	6.	<i>Vng. Ociminum</i>	1.47
	38.40	<i>Vng. Oenanthinum</i>	1.44
<i>Viperinæ carnes</i>	2.15	<i>Vng. Rosaceum</i>	1.41
<i>Virulentorum ictuum curatio</i>		<i>Vng. Sampsuchinum</i>	1.48
	6.39	<i>Vng. Susinum</i>	1.50
<i>Viscum</i>	3.85	<i>Vng. Telinum</i>	1.45
<i>Vitex</i>	1.115	<i>Vnguis odoratus</i>	2.7
<i>Vitis alba</i>	4.163	<i>Vrina</i>	2.73
<i>Vitis nigra</i>	4.164	<i>Vrsinus adeps</i>	2.68
<i>Vitis sylvestris</i>	4.162	<i>Vrtica</i>	4.79
<i>Vitis uinifera</i>	5.1.	<i>Vua</i>	5.2
		<i>Vua</i>	



# INDEX

<i>Vua passa</i>	5.2	<b>Z</b>	<i>Ea, seu semem</i>	2.81
<i>Vulpinus pulmo</i>	2.35		<i>Zopissa</i>	1.81
<b>X</b> <i>Anthion.</i>	4.122		<i>Zytum</i>	2.79
<i>Xiris</i>	4.20			

FINIS.

bb 4

*Sinus al B. Joseph. Jeronimo  
de Cassanova, y Cardona*



# INDEX

*Rerum que in scolys  
continentur, sinigno-  
rum, Elenchus.*

**A** Brotani, & Absinthij  
facultates diuersa pag.

349

Absinthij discerniculū 348

Acacia discerniculum 109

Acanthi discerniculum 339

Acanthi, à carduo Benedicto  
differentia 337

Achillea, à Stratiote

Millesolio diuersa 502

Acinos, ab Ocymo Caryophyl  
lato diuersus 369

Acorus, à Galanga differt 9

Acorus, in lituania nascitur 9

Acorus, quid hodie 9

Aconiti discerniculum 541

Aconitum. 3. ab herba Paris  
diuersum 541

Adipis omnis discerniculum

197

Adianti discerniculum 585

Aegilops, ab Avena differt  
586

Aethiopis, ignota 90

Agallochi natales 31

Agarici natales 319

Agerati natales 519

Agni facultas 110

Aiuga quid, & quæ falso  
eius nomen usurpent 471

Alabastritis discerniculū 719

Alcea discerniculum 463

Alcibiadi facultas 494

Alcyonij discerniculum 709

Alisma notitiæ uarietas, eiusq;  
cū plātag. aquat. diu. 466

Aloe facultas 345

Alsines facultas 550

Althææ facultas 463

Aluminis discerniculū 699

Alyssi dubia noticia 414

Amaraci discerniculum 366

Ambrosiæ natales 434

Ambrosia Of. Polemo. 434

Ammi ignotum 386

Ammoniaci delectus 410

Amomi à Rosa D. Mariæ di-  
uersitas 24

Ampeloprasi natales 281

Amphisbenæ uenē cura. 730

Amurcæ facultas 114

Amygdalarū ama. facu. 133

Amyli discerni. & fac. 222

Anagallis ab Auricula mu-  
ris diuersa 309

Anagyris pictura, & facul-  
tas 465

Anchusarum discer. 493

Andro



# INDEX

<i>Androsaces ignota</i>	450	<i>Aqua è floribus Myrti</i>	123
<i>Androsamidiscerniculū</i>	469	<i>Aqua è limonibus</i>	128
<i>Anemone, Papauer sylvestre,</i>		<i>Aqua è folijs Arbuti</i>	132
<i>diuersa</i>	307	<i>Aqua è stercore humano</i>	103
<i>Anethi facultas</i>	383	<i>Arabici lapidis nota</i>	717
<i>Anguim senectus, quid</i>	155	<i>Araneorum genera.</i>	180
<i>Anonis, Resta bonis idē</i>	340	<i>Arbuti discerniculum</i>	132
<i>Anonidis uires</i>	340	<i>Arcij facultas</i>	565
<i>Anthemidis discerniculū, &amp;</i>		<i>Arctij discerniculum</i>	565
<i>facultas</i>	454	<i>Argemone, ab Agrimonia</i>	
<i>Anthyllidis dubia notio</i>	452	<i>diuersa.</i>	307
<i>Antidotus Theriacalis Mat-</i>		<i>Argenti recrementi discerni-</i>	
<i>thioli</i>	733	<i>culum</i>	682
<i>Anthipathis Coral. not.</i>	712	<i>Argenti spuma discer.</i>	684
<i>Antirrhini natales, &amp; fa-</i>		<i>Argenti uiui discerniculū</i>	691
<i>cultas</i>	581	<i>Arisari natales</i>	297
<i>Aparines facultas</i>	414	<i>Aristolochia longa &amp; rotun-</i>	
<i>Aphaces discerniculum</i>	142	<i>dæ natales</i>	326
<i>Apiastri facultas</i>	425	<i>Aristolochia Clematidis non</i>	
<i>Apios ubi nascatur</i>	622	<i>comperta notio.</i>	325
<i>Apij discerniculum</i>	390	<i>Armenij lap. nota</i>	687
<i>Apocynon ignota</i>	543	<i>Arimixtura</i>	297
<i>Aqua quintessentialis Mat-</i>		<i>Arrhenogonon, Theligonon,</i>	
<i>thioli</i>	732	<i>Phyllon, Mercurialis, idem</i>	
<i>Aqua ex Aro</i>	297	444	
<i>Aqua è Gentiana</i>	321	<i>Artemisiarum discerniculum</i>	
<i>Aqua è floribus Myrti</i>	123	433	
<i>Aqua Flammolæ Ital</i>	480	<i>Asari discerniculum</i>	18
<i>Aqua è floribus Sābuci</i>	618	<i>Asclepiadis ab Hedera terre-</i>	
<i>Aqua è flore Dictamni Italici</i>		<i>stri, &amp; Vincetoxico discer-</i>	
357		<i>niculum</i>	425
		<i>Ascy</i>	



# INDEX

<i>Ascyri discerniculum</i>	469	<i>lum</i>	82
<i>Asij lap. nota</i>	713	<i>Blattarū discerniculum</i>	166
<i>Aspalathi à Rhodio ligno di-</i>		<i>Bliti discerniculum</i>	243
<i>uersitas</i>	29	<i>Botrys discerniculum</i>	435
<i>Asparagorum facultas</i>	255	<i>Brassicæ discerniculum &amp; fa-</i>	
<i>Aspleni discerniculum</i>	451	<i>cultas</i>	248
<i>Aspidis ueneni animaduersio</i>		<i>Britanicæ à Bistorta discernicu-</i>	
<i>Asteris discerniculum</i>	574	<i>lum</i>	474
<i>Astragali discerniculū</i>	521	<i>Buglossi discerniculum</i>	579
<i>Astrictio in Dioscoride, pro a-</i>		<i>Bulbi esculentus &amp; uomito-</i>	
<i>crimonia</i>	197	<i>rius ignoti</i>	300
<i>Atræthylidis à Cartamo syl-</i>		<i>Bunij natales</i>	570
<i>uestri diuersitas</i>	416	<i>Buprestis ueneni animaduersio</i>	
<i>Atriplicis facultas</i>	245	<i>Buphthalmi discerniculū</i>	455
<i>Auellanae nucis discerni.</i>	136	<i>Butyri facultas</i>	188
<i>Auena facultas</i>	216	<b>C</b> <i>acalia ignota</i>	576
<i>Auripigmenti ratio</i>	699	<i>Cadmia animaduersio</i>	
<i>Auripigmenti ueneni animad-</i>			668
<i>uersio</i>		<i>Cæciliae ueneni cautio.</i>	707
<b>B</b> <i>accharis ab Asaro &amp;</i>		<i>Calaminthæ animaduersio</i>	
<i>Caprifolio discerni.</i>	369		361
<i>Balaustij discerniculum</i>	122.	<i>Calcis uiuæ animaduersio</i>	
<i>Ballote discerniculū</i>	424	<i>Calcanthi discerniculum</i>	693
<i>Balsami discerniculum</i>	29	<i>Cancami discerniculum</i>	32
<i>Barbulæ Hirci facultas</i>	274	<i>Canis rabidi uenenum &amp; cau-</i>	
<i>Basilisci ueneni animaduersio</i>		<i>tio.</i>	
<i>Bdelyj discerniculum</i>	64.	<i>Cannabini se. uires</i>	464
<i>Betæ discerniculum</i>	250.	<i>Cantharidum ueneni cautio.</i>	
<i>Betonicae discerniculum</i>	474.		738
<i>Bituminis, Pissasphalti, Mu-</i>		<i>Capparum facultas</i>	303
<i>miæ, Naphthæ discernicu-</i>		<i>Cardamomi discerniculum</i>	13
		<i>Car</i>	



# INDEX

<i>Carduorū discerniculum</i>	336	<i>Chamaleonis nigri discernicu- lum</i>	332
<i>Carpasi succi cautio.</i>	746	<i>Chamæpeuce discernicu.</i>	578
<i>Cari facultas</i>	383	<i>Chamelææ &amp; Thymelææ di- scerniculum</i>	618
<i>Casæi discerniculum</i>	182	<i>Chrysanthemi discerniculum</i>	518
<i>Cassia &amp; Cinnamomi discer- niculum</i>	23	<i>Chrysocollæ discerniculū</i>	686
<i>Castanearum facultas</i>	116	<i>Chrysocome obscura noticia</i>	516
<i>Castorei discerniculum</i>	160	<i>Chrysogonon ignota</i>	516
<i>Catanance ignota</i>	582	<i>Cicadarum discerniculū</i>	172
<i>Caucalis discerniculū</i>	270	<i>Ciceris discerniculum</i>	225
<i>Cedri discerniculum</i>	88	<i>Cicutæ discerniculum</i>	542
<i>Celticæ Nardi discerniculum</i>	16	<i>Cicutæ ueneni cautio.</i>	745
<i>Cenchri ueneni cautio</i>		<i>Cimicum facultas</i>	165
<i>Centaurij maioris discernicu- lum</i>	327	<i>Cinnabaris animaduersio</i>	689
<i>Centaurij minoris discer.</i>	329	<i>Circeæ ignota</i>	438
<i>Cepææ discerniculum</i>	465.	<i>Cirsij discerniculum</i>	573
<i>Ceræ facultas</i>	208	<i>Cisti discerniculū</i>	103
<i>Cerasiorū discerniculum</i>	124	<i>Clematidis utriusque discerni- culum</i>	480
<i>Cerastæ ueneni cautio</i>		<i>Clinopodij facultas</i>	417
<i>Cerui genitalis uires</i>	167	<i>Clymenum ignotum</i>	485
<i>Ceruini cornu, &amp; ossis Cerui- ni discerniculum</i>	176	<i>Cnici discerniculum</i>	632
<i>Cerussæ animaduersio</i>	743	<i>Cochlearum discerniculum</i>	150
<i>Chalcitis animaduersio</i>	696	<i>Cerulei animaduersio</i>	687
<i>Chamæcissi discerniculum</i>	577	<i>Colchici discerniculum</i>	547
<i>Chamadaphnes discerniculum</i>	592	<i>Colocynthidis facultas</i>	623
<i>Chamaleonis albi discer.</i>	329	<i>Coni</i>	



# INDEX

Conizæ discerniculum	439.	Elaphobosci discerniculū	339.
Corallij animaduersio	711.	Elaterij discerniculum	600.
Coriædri facultas	387. 744	Elæomeli ratio	40.
Corni discerniculum	130.	Electuariū in uenena	739.
Cratæogonon ignotum	443.	Elichrysi discerniculum	517.
Crithymi discerniculū	258.	Empetri dubia noscita.	622.
Croci facultas	34.	Emphemeri ueneni cau.	742
Cucurbitarum discerniculum		Epimedium ignota	490.
264.		Equiseti utriusq; discerni.	511.
Cucumeris syl. discerniculum		Ericæ dubia noscitatio	96.
600.		Erui discerniculum	233.
Cupressi discerniculum	84.	Eryngij discerniculum	343.
Cyniæ discerniculum	633.	Erysimi discerniculum	287.
Cynoglosson, Lycopsis diuersa.		Eupatorij discerniculum	506.
579.		Euphorbij facultas	408.
Cypiri discerniculum	12.	<b>F</b> Abarum facultas	227.
Cytisi discerniculum	569.	<b>F</b> Fabæ Aegyptiæ nat.	228
<b>D</b> Auci discerniculū	395	Felis discerniculum	200.
Dictamni discernicu-		Ferri rubig. animaduer.	677.
lum	357.	Ferulæ discerniculum	401.
Dipsadis ueneni cautio.	788	Filicis discerniculum	629.
Dorycnij dubia noscitatio	537	Filiculæ discerniculum	630.
Dorycnij ueneni cautio.	788	Fœniculi discerniculum	394.
Drabæ dubia noscitatio	286.	Fœnigræci facultas	225.
Draco. mar. discerniculū	152.	Fraxini discerniculum	90.
Drac. mar. ue. cautio.	788	Fumariæ discerniculum	567.
Dryopteris discerniculū	630.	Fungorum discerniculū	545.
<b>E</b> Beni discerniculū	105.	Fungorū ue. cautio.	754.
Eboris discerniculū	175.	<b>G</b> Agatis & Galaëtidis	
Echini discerniculum	144.	lapidū animaduersio.	
Echij discerniculum	495.	Gally discerniculum	557.
		Galio	



# INDEX

- Galiopsis discerniculum* 556. *Hyacinthi discerniculū* 522.  
*Gentianæ discerniculum* 323. *Hyoscyami discerniculū* 532.  
*Gentianæ spēs, Cruciata* 323. *Hipecoi discerniculum* 530.  
*Gerani discerniculum* 436. *Hyssopi discerniculum* 350.  
*Gingiberis discerniculū* 289. **I**ndici ratio 688.  
*Gingidij à Chærefolio diuer-*  
*sitas* 268. *Intybi & Condrillæ descri-*  
*ptio* 262.  
*Gith discerniculum* 403. *Iridis discerniculum* 7.  
*Gladioli discerniculum* 491. *Iunci discerniculum* 514.  
*Glandis unguentariæ discerni-*  
*culum* 605. *Iunci odorati discerniculū* 26.  
*Glaucij facultas* 411. *Iuniperi discerniculum* 85.  
*Glaux dubie noscitur* 587. *Ixiæ uen. cautio.* 752.  
*Glutinātia metallica* 412. **L**abri Veneris discerni-  
*culum* 333.  
*Graminis discerniculū* 498. *Lactis ratio* 185.  
**H**alica ueterū rō. 217. *Lactis coagulati uen. cau.* 756  
*Halimi dubia nosci.* 98 *Lacertarū discerniculum* 131.  
*Helenij facultas* 35. *Lagopi discerniculum* 489.  
*Heliotropij discerniculū* 635. *Lampsanæ discerniculū* 108.  
*Hellebori discerniculum* 596. *Lanariæ herbæ à Saponaria*  
*discerniculum* 292.  
*Helxines utriusque discernicu-*  
*lum* 504. *Lapathi discerniculum* 241.  
*Hemerocallis discerni.* 340. *Laserpitij discerniculum* 405.  
*Hemionitidis discernic.* 452. *Laueris discerniculum* 256.  
*Herbæ Sabinae discernicu.* 86. *Lemniæ terræ animaduersio*  
*Hippocāpi discerniculū* 145. 692.  
*Hippoglossi discernicu.* 580. *Lentis discerniculum* 230.  
*Hippopotami delinatio* 158. *Lentisci descriptio & facul-*  
*tas* 74.  
*Hirudinis ue. cautio.* 761. *Ligusticum à Leuistico differt*  
*Hordei discerniculum* 212. 377.  
*Hormini discerniculū* 447.

Limo



# INDEX

<i>Limonij dubia noscita.</i>	488	<i>Mustellæ discerniculū</i>	161
<i>Lithospermi discerniculū</i>	459	<i>Myricæ discerniculum</i>	95
<i>Lolium, Pseudomelanthium di</i>		<i>Myrrhæ discerniculum</i>	65
<i>uersa</i>	221.	<i>Myrrhis ab Angeli. di.</i>	571
<i>Lonchitis discerniculū</i>	461	<i>Myrti discerniculum</i>	123
<i>Lychnidis uaria noscita.</i>	422	<b>N</b> <i>Arcisii, discerniculum</i>	
<i>Lysimachia discerniculū</i>	476		606
<b>M</b> <i>Aceris discerniculum</i>		<i>Nardi discerniculum</i>	15
	91.	<i>Natricis uen. cautio.</i>	789
<i>Malabathri discerniculū</i>	20	<i>Nerij discerniculum</i>	544
<i>Maluæ discerniculum</i>	244	<i>Nymphææ discerniculū</i>	449
<i>Malorū discerniculū</i>	228	<b>O</b> <i>Chræ discernicu.</i>	689
<i>Mandragoræ discernicu.</i>	539	<i>Ocimastri discerniculū</i>	
<i>Mādragoræ uen. cautio.</i>	748		496
<i>Marcoris Guayaci uires</i>	93	<i>Oenanthe à Filipendula diuer</i>	
<i>Mari discerniculum</i>	368	<i>sa</i>	439
<i>Meconij uen. cautio.</i>	749	<i>Onichis discerniculum</i>	7
<i>Medij dubia noscitatio</i>	489	<i>Oleum Theriacale Matthioli</i>	
<i>Medullarū discerniculū</i>	198		734
<i>Mellis discerniculum</i>	206	<i>Origani discerniculum</i>	355
<i>Mellis Heraclyi cautio.</i>	743	<i>Ornithogali discerniculū</i>	274
<i>Meliloti discerniculum</i>	367	<i>Ouorū discerniculum</i>	171
<i>Mei discerniculum</i>	10	<b>P</b> <i>Acomia discernic.</i>	457
<i>Mespili discerniculum</i>	129	<i>Paliuri uaria noscita.</i>	98
<i>Millesolij discerniculum</i>	571	<i>Palmaæ discerniculum</i>	120
<i>Misy, Melantheria, Sory discer-</i>		<i>Panaces discerniculum</i>	376
<i>niculum</i>	696	<i>Papaueris discerniculum</i>	527
<i>Molybdanæ, Stimmi, Plumbi,</i>		<i>Papyri arb. facies</i>	94
<i>&amp; ei cognatorum discer-</i>		<i>Parthenij discerniculum</i>	455
<i>niculum</i>	681	<i>Pastinacæ discerniculum</i>	379
<i>Mori discerniculum</i>	137	<i>Peucedani Off. adult.</i>	402
		<i>Phylli</i>	



# INDEX

Phyllitidis discerniculum	426	Salis floris, spumæ, Nitri ratio.	
Pini discerniculum	72	Sambuci discerniculum	618
Piperis deliniatio	288	Sandarachæ ratio	699
Pithyusæ discerniculum	613	Sandarachæ uen. cautio.	758
Plantaginis discerniculū	255	Sardonîæ ueneni cautio.	746
Polemoniæ discerniculū	481	Satyriones uix agnoscuntur	
Polygonati discerniculū	479		447
Polygoni discerniculum	477	Scyllæ discerniculum	302
Pompholygis & Thutiæ ratio	671	Semperuui discerniculum	552
Populi discerniculum	91	Seseli discerniculum	381
Propolis discerniculum	208	Sideritis discerniculum	499
Psyllij discerniculū	744.533	Siliquarum discerniculum	125
Purpurarum descriptio	146	Siseris discerniculum	239
Pyrethri discerniculum	397	Sisymbrij discerniculum	257
Pyritis discerniculum	714	Smilax aspera & læuis, quid	
<b>Q</b> Vinquesfolij 4. species	508		589
Quinquesfolij à Tormentilla diuersitas	508	Smyrniij discerniculum	392
<b>R</b> Ecrementi argenti ratio	682	Solani discerniculum	535
Resinarū discerniculum	77	Sparganion à Cotula fœtida diuersum	491
Rhapōtici discerniculum	320	Sphragis ægos & Lemnia terra idem	692
Rhamni discerniculum	97	Spumæ argenti ratio	684
Rhodîæ rad. discerniculū	509	Squamarum aris & ferri uires	674
Rubiginis & Aeruginis ratio	677	Stæchadis discerniculum	
Rubi discerniculum	503		352
<b>S</b> Rubetæ uen. cautio.	760	Styracis discerniculum	66
Agapeni discerni.	407	Sulphuris discerniculum	702
		Symphiti discerniculum	
			483

Taxi



# INDEX

- T** *Axi uen. cautio.* 745. *Tripolij animaduersio* 583.  
*Telephium, fabaria di-* *Trissaginis discerniculū* 420.  
*uersa* 316. *Tussilaginis discerniculū* 432.  
*Terebinthi discerniculum* 75. *Typha animaduersio* 437.  
*Testiculorum canis discernicu-* **V** *Eneni à cibo diuersi-*  
*lum* 447. *tas* 730.  
*Teucrū uariè noscitur* 419. *Venenorum è quattuor quali-*  
*Thapsia discerniculum* 603. *tatibus notæ* 731.  
*Thlappi, Bursa pastoria diuer-* *Venenatorū aliquot remedia.*  
*sa* 285. *Verbasci discerniculum* 563.  
*Thracij lapi. Gagatis, & alio* *Veneni à cane rabido cautio.*  
*rum discerniculum* 719. *Vrinarū animaduersio* 203.  
*Thunnorum delinatio* 164. *Vua passæ animaduersio* 665.  
*Thuris animaduersio* 70. **X** *Iphij discerniculum*  
*Tihymalorum discerniculum* 491.  
612. *Xiridis animaduersio* 492.  
*Toxici uene. cautio.* 751. **Z** *Ea, Spelta idē* 414.  
*Tragacanthæ discerniculum* *Zopissæ, & Picis ra-*  
341. *tio.* 80.  
*Tribuli discerniculum* 487.  
*Trifolij discerniculum* 429.

FINIS.



# PEDANI DIO

## SCORIDIS ANAZAR-

bei, de medicinali materia Libri primi.

Præfatio IO. RVELLIO Sues-  
fionensi Interprete.

*Huic præfationi & toto operi appositæ adnota-  
tiones & doctæ, & compendiosæ.*



**Q**UANTUM amicissime Arce,  
complures non ueterum modo, sed recen-  
tiorum quoque de medicamentorum com-  
positione, uiribus atq; probatione comen-  
tati sunt: nobis tamē nec uanum, nec à ra-  
tione abhorrētem impetum animi ad hoc  
opus incesisse, tibi ostendere tentabimus: quod eorum nonnulli  
absolutum nihil adiderunt, alij quā plurima, quæ auditu per-  
cunctando didicerant, scriptis tradiderunt. Siquidem Bithynus  
Iolas & Heraclides Taretinus, omīssa prorsus herbarum tra-  
datione, rem sanē quā paucis perstrinxerunt. Neq; uerō om-  
nes illi de metallicis quicquam rebus aut odoramētis memoriæ  
prodiderunt. Crateuas autem herbarius, & Andreas medi-  
cus, qui cæteris diligentius hac in parte uersati uidentur, radices  
multas apprimē utileis, herbasq; haudquaquam adnotatas, re-  
liquerunt. Veruntamen priscorum subscribere oportet senten-  
tias: quos, etsi pauca ipsis referantur accepta, magnam tamē im-  
pendisse diligentiam constat. Iunioribus minus assentiendum: è  
quibus Iulius Cassus, & Niceratus, & Petronius Niger, &  
Diodorus, Asclepiada omnes, medicinalem materiam uerna-  
culane



culam cognitamq; uulgo, dignam censuerunt quæ ab ipsis literis exacte mandaretur: & ut medicamentorum uires probationesq; cursim complexi, sic nullo experimēto eorum effectus colligentes, inani uerò reddendarum causarum studio uerba fundentes, alia pro alijs scriptitando, rem in acervum congeriemq; controuersiarum exulerunt. Siquidem qui inter eos egregius habetur Niger, euphorbium, nascentis in Italia chamelææ, succum esse contendit: androsemonq; eandem herbam cum hyperico esse: quinetiam aloen in Indæa fossilem nasci, & pleraq; his similia exponit, reclamante euentia, quæ prorsus ueritati refragantur. Quibus coniectura colligi potest, ea non oculata fide, sed narratione potius ab alijs accepisse. In ordine ydem ipsi aberrarunt, partim eorum discrepantes, nullaq; cognatione cōiunctas uireis collidentes: partim per elementa literarum scripta in ordinem digerentes, quò facilius memoria mandarentur, genera & eorum effectus à sua cognitione disiungentes. Nos uerò ab ineunte, ut ita dicam, inuenta, iugi desiderio cognoscendæ materiæ allecti, permultis regionibus peragratis (nec enim nescis nos militarem uitam exegisse) tuo hortatu commentationem in sex libros cōtulimus, quod opus tibi dicamus, Arce, animi gratitudine obsequentes, ob eum quo nos prosequeris affectum. Etenim natura cum in omneis eruditione excultos, tu uerò in eos quibus cum tibi eiusdem artis necessitudo intercedit, pronus ad amicitiam esse soles: in nos etiam aliquanto peculiaris. Enim uero non paruum præbet tuæ probitatis argumentum, optimi uiri Licinij Bassi singularis erga te amicitia: quam unà nobiscū degentes nouimus, cum mutuam inter uos beneuolentiam amulatione dignam intueremur. Admonitum autē te uelim, eosq; qui in hosce commentarios incident, ne in uerbis facultatem nostram aestimetis, sed potius adhibitam rebus cum peritia curam. Etenim plurima uisu ipsi exactissime cognouimus: quædam etiam

ex ea



ex ea, de qua inter omnes conuenit, historia, percunctationeq;  
rerum apud singulos uernacularum diligenter accepimus. Dabi-  
mus igitur operam, ut differenti ab alijs ordine tradito, genera  
medicinarum uiresq; describantur. Quod autem necessaria sit  
medicamentorum ratio, nemo est ferme qui ignoret, & ea &  
toti coniuncta sit, uniuersisq; eius partibus efficax administret  
auxilium. Quare per medicamentorum compositiones atq; mi-  
sturas, & facta in morbis pericula extendi, & incrementum  
capessere potest, quam plurimum conferente singulorum medi-  
caminum cognitione. Quinetia uernaculam familiaremq; ma-  
teriam coplectemur, ut perfecta sit, quae a nobis relinquetur do-  
ctrina. Verum imprimis curam impendere oportet, ut suis tem-  
poribus singula & demetantur, & recondantur: certe pro ho-  
rum ratione aut ualent uiribus, aut euanido nulloq; munere fur-  
guntur. Serena igitur caeli constitutione demetenda sunt. Ma-  
gni siquidem refert inter colligendum, si uel squalores uel im-  
bres infesti sint: quemadmodum si loca, in quibus prodeunt, cli-  
uosa, & uentis exposita sint & perflata, frigidaq; & aquis ca-  
rentia: in his enim locis uires eorum longe ualidiores intelligun-  
tur. Contra, quae in campestribus, riguis, & opacis, ceterisq; lo-  
cis a uento silentibus enascuntur, plerunque degenerant, & mi-  
nus uiribus ualent: multoq; magis, si non suo tempore nec opor-  
tune colligantur, aut si per imbecillitatem intabuerint. Neque  
ignorandum, saepe pro peculiari loci natura, aut anni clemetia,  
maturius aut serius adulescere. Nonnulla propria ui, hyeme flo-  
rent, & folia pariunt: quaedam bis anno florifera. Quare cui in  
animo est horum peritiam assequi, necesse est eum prima germi-  
natione solo emergentibus, adultis & senescentibus adesse. Nam  
qui pullulanti herba duntaxat adstiterit, adultam cognoscere  
non potest: neque qui adultam tantum inspexerit, nuper erum-  
pentem noscet. Quo fit, ut propter mutatam foliorum facie, cau-



lium proceritates, florum seminisq; magnitudinem, et id genus alias peculiares notas, nonnulli, qui olim has rerum uarietates non perspexerunt, magno in errore uersentur. Quæ causa etiã nonnullis scriptoribus imposuit, qui herbas quasdam, uerbi gratia, gramen, quinq; folium, & tußilaginẽ emittere florem, fructum, & caulem, negant. Ergo qui sæpius ad uisendas herbas & earum natales se contulerit, earum cognitionem maxime consequetur. Scire etiamnum cõuenit, sola ex herbaceis medicaminibus Veratri genera, nigrum, inquã, & candidũ multis edurare annis: reliqua à trimatu inutilia. Quæ uerò fruticosæ sunt, sicut Stæchas, Frixago, Polium, Abrotonum, Seriphium, Absinthium, Hyssopum, & alia id genus semine prægnantia, demetantur. Flores quoque antea, quam sponte sua decidat: fructus autem, ut maturi decerpantur necesse est: & semina, ubi ficcari cœperint, prius quàm defluant. Herbarum succus & foliorum elici debet, germinantibus tum primum cauliculis. Lac & Lachrymæ excipiantur, inciso per summum adolescentiæ uigorem caule. Radices, & liquamenta, corticesue ut recondantur, eximere conuenit, cum herbæ suis folijs exuuntur. Siccantur etiam expurgatæ inibi, locis asperginem non redolentibus: sed quæ luto aut puluere sunt obstitæ, aqua elui debent. Flores & omnia quæ incundum odorem efflant, arculis tiliaceis, nullo sit u obductis, reponantur. Nonnunquam charta aut folijs semina, ut perennent, aptè inuoluuntur. Liquidis medicaminibus densior materia, argentea, uitrea, aut cornea conuenit. Fictilis etiã, si modò rara non sit, accommodatur: & lignea, præsertim è buxo: sed ænea uasa ocularijs medicamentis liquidisq; & omnibus ijs quæ aceto, pice liquida, aut cedria componuntur. Adipem autem & medullas stagnæis uasis recondi conuenit.

Anno



## ANNOTATIO IN PRAE- cedentem Dioscoridis Praefationem.

**E**Nimvero cum summus ille, & in tractanda plantarum & medicinali materia omnium facile princeps Dioscorides, nil in hac praefatione praetereat eorum, quae generatim in plantis considerata sunt: hallucinari tamen (si Theophrasto aliter sentiendi credimus) videtur, qui dicat: Sole ex herbacris medicaminibus veratri genera, nigrum & candidum, in multos perdurare annos, reliqua à trimatu inutilia. Longe alia est Theophrasti opinio, qui libro de Plantarum historia ix. in hanc scribit sententiam. Helleborum in triginta annos utilitatem producit: Aristolochia in quinque, vel sex. Vernilago nigra in quadraginta. Centaurea minor in decem aut duodecim, quod densa sit & crassa: Peucedanum in quinque aut sex: Vitis sylvestris vno perdurat anno, modo non friabilis evadat, ac in umbra seponatur, alias enim putrescet, & in totum reddetur inutilis. Idem eodem loco Elaterium, quae vetustius, eò melius esse scribit. Praeterea se à fide digno accepisse, qui assueveret ducentorum annorum Elaterium apud se habere, quod pretiosi vice monili acceperat. Quin & efficaciae fuisse singularis, causam affert: Ingentem quae in ipso est humoris copiam, atque ob id cum inciditur in cinerem immitti. Huius rei testimonium esse, quod quinquaginta annorum, lucernae admotum eam nulla mora extinguat. Hac nec ignorasse Dioscoridem dicemus, nefas enim: nec ab ipso statim limine voluisse à Theophrasto dissentire, sed quod verosimilius violatum esse à librarij voluminibus eius Graecum: res non infrequens etiam in probatissimis authoribus. Quod si ita, ut vulgo legitur, scripsit, id sane cauit ne prodita à se multorum diuturnitate annorum, herbariorum bona pars (qui vani sunt & nugis vendundis geniti) imposturae ansam abriperet. Quod ab extrusis literis factitatum in Pharmacopolijs videmus, quae nec nomina, nec medicamentorum compositiones, nisi mancas & mutilas, atque adeo conspurcatas reddiderunt. Intantum in his expurgandis tot praeclara ingenia desudarunt.



DIOSCORIDIS  
IRIS. CAPVT I.

NOMENCLATURA.

Græcè, Iris. Latine, Iris. Italicè, la Iride.  
Gallicè, Flambe. Germ. Himelsschöndertel.



\*

Iris.



IRIS à cœ-  
lestis arcus  
similitudine  
nomen acce-

pit. Folia fert gladioli, sed  
maiora, latiora, & pin-  
guiora. Flores à caule æ-  
qualibus inter se spacys di-  
stant incurui, uary: siquidē  
candidi, pallentes, lutei, pur-  
purei, aut cœrulei conspi-  
ciuntur, qua diuersi coloris  
specie, quædam cœlestis ar-  
cus imago representari ui-  
detur. Radices subiacēt ge-  
niculatæ, duræ, odoratæ,  
quæ frustatim dissectæ, in

umbra siccantur, & traictæ lino reconduntur. Melior est Illy-  
rica & Macedonica: & inter has laudatissima, quæ pumila fe-  
rè & densa constat radice, frangenti contumax, subrufo colo-  
re, gustu amaro, odore perquàm sincero, ita ut nullum prorsus  
suum redoleat: quæ dum tunditur, sternutamenta mouet. Secun-  
dum locum habet Africana, candicans, gustuq; amara. Terebi-  
dines in uetustate sentiunt, tunc tamen odoratiores reddi solent.  
Vis omnibus exsalfactoria, extenuans, cōtra tussim efficax: hu-

morum



morum qui agrè reijciuntur crassitiem digerunt, bilem crassam  
que pituitam ex hydromelite drachmis septem epota, purgant  
somnia conciliant, lachrymas ciunt, torminibus medentur. Eæ  
dem pota ex aceto auxiliantur serpentium ictibus, lienosis, con-  
nulsis, perfrictionibus, horroribus, & quibus genitura effluit  
mensēs ex vino pota pellunt. Decoctum earum feminarum so-  
tibus utiliter imponitur, ad emolliendos locos, laxandaque in  
eis uenarum spiracula: ischiadicis infunditur, fistulas ac sinus  
carne explet. Radices ex melle glandis modo subditæ, partus ex-  
trahunt: quin etiam coctæ & illitæ, strumas, ueteresq; duritias  
emolliunt. Siccæ quoque vlcera replent, & cum melle purgant  
nudata ossa corpore operiunt. Doloribus capitis, cū aceto & ro-  
saceo magna utilitate illinuntur. Admotæ cum albo ueratro &  
duabus mellis partibus, lentigines & uitia cutis in facie à sole  
contracta emaculant: pessis, malagmatis, & acopis inseruntur.  
In vniuersum, magni ad omnia usus.

**I**nter Illyricas seu Sclauonicas Irides ea melior est, quæ flauescit, nam  
quæ in albedine Raphanū refert, longe inferior est. Ea in Italia pro-  
uenit, & ex eius succo hydropicis remediū paratur, quod non nisi sic-  
cā Iris eò afferatur. Venetijs quæ videtur Sclauonica Iris, spectaculo  
est, non paræde medicina. Vera Iridis radix calida & sicca est in secūdi  
gradus fine, & tertij principio. Habet id dotis præter eas, quas ei as-  
signat Dioscorides, Cōmanducata oris graueolentiā aufert, & si ex eius  
decocto colluantur dentes, dolorem sedabit. Radix gargarizata faucium  
abscessus discutit. Eadem & eius succus coleram soluuunt, flegma, & a-  
quaum, qui in corpore erit flauī habitus humorem. Si cum aceto biba-  
tur, venenis omnibus aduersatur. Attractus naribus succus, flegma po-  
tenter elicit è cerebro. Stomacho nocet, eaque de causa cum spica offeren-  
da, & hydromelite. Habet hoc Italia, vt nō pluuioso vere, herbas pro-  
ducatur, quæ non inferiores ijs sint, quæ è Candia afferantur. Quod in  
Iride nō contingit. Nam inibi non nisi Sclauonica valens est. Quo ma-  
gis nobis qui ad Septentrionem vergimus danda opera erit, vt è nati-  
uo loco Iridem habeamus, siquidem eius facultates aptare medicina vō-  
luerimus. Profert Valerius Cordus homo in annotanda Dioscoride di-



## DIOCORIDIS

ligens, & acuti, & solertis in perpendendis plantis ingenij, Iridem Germanicam: hanc & odore & gratia inferiorem Illyrica facit, superiorem acrimonia, ut quæ grani Gnidij modo fauces exurat, atque idem fieri ut gustu molesta sit. Sed quod ad odorem & saporem aromaticum attinet, Illyrica cadere, licet alium vehementius, quam illa subducatur.

## ACORVM CAP. II.

### NOMENCLATURA.

Gr. Αχορον. La. Acorum. Ita. l' Acoro.  
Gal. Grāde Galange. Ger. Achetburtzel.



\*

Acorum.

**A**corum folia Iridis habet, angustiora tamen: radices non dissimiles, complicatas, non in retum, sed obliquum actas, & summo cespite sparsas, geniculis interceptas, albicantes, gustu acres, odore non ingratis. Optimum est densum, candidum, plenum, carie non exesum, odoratum, cuiusmodi Colchidicum & Galaticum, quod Aspletion dicunt. Radici vis calfactoria. Decoctum potu urinam cit: prodest lateris doloribus. & iocinoris atque thoracis: itē tor-

minibus, vulsis, ruptis: lienem absomit: urinæ stillicidio, & serpentum ictibus auxiliatur: insidentibus ad muliebres affectus iridis modo utiliter imponitur: oculorum caligines succo discutit: an

tit: an



*in: antidotis radix magno usu commiscetur.*

**D**ioscoridis Acorum non esse Gladiolū vulgarem hinc patet. Quod licet candidās sit Gladioli radix, & quadātenus Iridē representet, nullū tamen acrē, atque adeo nec gratū, aut ingratū gustū præsefert. Nec Galangā esse hinc claret. E Syria ad nos Galāga affertur, sicca adeo & exucca, vt Acori necne folia habeat, diiudicare nō possis. Nam de radice quam candicantem esse in Acoro scribit Dioscorides, aliam esse in Galanga, quam ruffam intus & foris non possis dicere. Adde his quod gustum in Acoro acrem requirit Dioscorides, qui in Galanga acerrimus est. Deinde nullæ amaritudinis particeps Galanga est, quod Acori facultatis esse Galenus ostendit. Postremo si Serapionis hac in re autoritas non repudianda videatur, diuersis & de Acoro & de Galanga capitibus tractauit. Quod si omnium longē in tractando Dioscoride acutissimo Matthiolo Senensi credimus, cui etiam subscribit Valerius Cordus, veram Acorū id esse putabimus, quod Officinis Calamus Aromaticus nominatur. Merlus medicus qui multo tempore medicinā apud Lipruschum Lituaniæ facitauit, Matthiolo constanter asseuerauit, multam apud Lituaniā Acorum gigni, suisq; manibus à terra euulsiisse, omnibus deprehensis dotibus, quas in Acoro desiderat Dioscorides. Nec aliter Dominicus Sennus, qua est fide & autoritate, referente Cordo, Acorum in Syria nasci vidit, natiuis præditum dotibus. Eō fit vt cum in Calamo aromatico veram Acorum habeamus, Calamus itidem aromaticus nobis barbarie temporum deperierit.

## MEVM. CAP. III.

### NON ENCLATURA.

Gr. *μηρόν Αθαμαντικόν*. La. *Meum*. Ita. *Il Meo*.  
Gal. & Off. *Fœniculus tortuosus*. Ger. *Beerddurtz*.

**M** *Meum*, quod *Athamanticum* vocant, in Macedonia et Hispania plurimum gignitur, anetho folijs & caule simile, sed eo crassius, binum ferme cubitorum altitudine attollitur, sparsis in obliquum rectūque radicibus, longis, tenuibus, odoratis, linguam excalescentibus. Quæ seruesactæ ex aqua, uel trita citra coctionem, præclusorum renum, uesicæq; farctæ

a s uitia





\*

**Meum.**

mine ignaris & medicis & spetiarijs à vulgo herbariorum obtruduntur, cum nec vires nec nota consentiant. Rarum fuisse in Italia Meum suo tempore Plinius testatur, adeo ut medici serere cogerentur. Nec hodie provenire in Italia præcellentissimus vir Matthiolus asserit, proinde nec in Gallijs, nec in Germania. Mei loco Galeno autore, Myrobalano, quam etiam Nucem vnguentariam vocamus, & quæ nihil aliud planè est, quàm Ben vnguentariorum, uti possumus. Calida sunt Mei radices tertio ordine & sicca secundo: si tamen plus iusto admoueantur, capitis dolorem excitant, quod cum in eis siccitas à caliditate vincatur, certam quampiam humidam cruditatem capiti subinfert, quæ re-trofa caliditati iuncta, nocuementi causa est.

**CYPERVS. CAP. IIII.****NOMENCLATURA.**

Gr. Κυπρις & Lat. & Offi. Cypirus, vel Cyperus.

Ita.



Ita. Angoloso odorato gionco.  
Gal. Souchet. Germ. Wildde galgen.



*Cyperus.*

**C**yperus, quem aliqui  
Cerysiceptrum, ut aspa-  
lathum appellant, folia fert  
porraceis proxima, sed lon-  
giora & exiliora: caulem  
odorati iunci, cubitalē aut  
maiores, angulosum, in cu-  
ius acumine minuta folia  
cum semine exoriuntur: ra-  
dices, quarum in medicina  
est usus, coherētes inter se,  
oleis oblongis similes, aut  
rotundae, nigro colore, sua-  
ui odore, amaro gustu. In  
lacunosis, palustribus &  
cultis enascitur. Optima est  
grauissima, densa, fractu cō-  
tumax, plena & aspera, o-

doris cum quadam acrimonia iucundi, qualis est Cilicia, Syria  
ca, & quæ à Cycladibus insulis petitur. Huic calida vis inest.  
Venarum spiracula laxat, urinā ciet, ad calculos, aquamq̃ sub-  
tercutem utilissimè bibitur, aduersus scorpionum ictus remedio  
est: perfrictionibus uulvæ, & præclusionibus fotu prodest: pel-  
lit menses. Contra ulcera oris, etiam si depascent uorentq̃, fari-  
na eius efficax est. Malagmatis calfacientibus, & unguento-  
rum spissamentis bene adijci solet. Aliud Cyperi genus tradūt  
in India nasci, gingiberis effigie, quod manducatum croci uim  
reddat, gustu amaro sentitur, & illitum præsentem psilothri-  
um



uim exhibet.

Valerius Cordus eò facit inter se disfidere Cyperidem & Cyperum, Eum iuncum angulosum Cyperidem vocat, cuius radices longæ sunt: Cyperum vero, qui similes Oliuæ habeat, ac sibi inuicem innexas. E Syria Cyperus affertur nostro longe odorator: hic tamen si deficiat, nostrate vti possumus. Radix quæ sub nomine Curcuma ad nos ex India deportatur, Matthiolo putatur esse secūda illa Cyperi species, quam describit Dioscorides eodem è loco transportari, ac gingiberis speciem referre, & cōmāducatam croci odorem reddere cum amaro gustu. Quod verum sane est. Nam omnes respondēt notæ. Antiqua patrum barbaries Curcuma Chelidonium esse putauit, falsi Serapionis superscriptione, qui capiti de Chelidonia titulum imposuerit Curcuma. Cyperi radices calefaciendi & desiccandi virtutem habet. Vnde & vlceribus profunt, quæ, quod nimium humida sint, coire nō possunt. Profunt & orificijs talium vlcerum quod astrictiois in se quippiam habeant. Nec tamen incisoria virtute carent.

## CARDAMOMVM. CAP. V.

### NOMENCLATURA.

Gr. Καρδαμουρον. Lat. & Offi. Cardamomū.

Ita. Il Cardamomo.

Gal. Graine de Paradis. Ger. Cardamoemlin.

**C**ardamomum optimum est, quod ex Comagene, Armenia, Bosphoroq; deuehitur. In India quoque & Arabia prouenit. Eligi debet plenum, frangenti contumax, occlusum, farctumq; (quod enim huiusmodi non est, exoletum iudicatur) & gustu acre, subamarum, & odore caput tentans. Excalfactoriam vim habet, potumq; ex aqua facit ad comitiales, ischiadicos, tusses, nervorum resolutionem: item ad rupta, vulsa, tormina. latas ventris tineas excutit. Ex vino autem potum, renibus, difficultati vrinae, à scorpione ictis, neque non omnibus venenum vibrantibus auxilio est. Cum cortice radicis lauri epota drachma calculos comminuit: ~~parum suffi-~~

tu ene



*scabiem ex aceto illitum adimit: Et ad Vnguentorum  
spissamenta additur.*

**H**oc in loco duo sibi prestantes viri cōpugnant, quorū vterque in  
adnotando Dioscoride egregiā nauauit operā. Matthiolus emū-  
elo iudicio, Valerius Cordus nitida breuitate. Amborum ego opinionē  
recitabo, tum facile erit non obscū naris hominibus, hac de re sententiā  
ferre. Valerius Cordus repudiata Manardi & Antonij Musæ sentētia,  
qui nos vero Cardamomo carere censuerunt, Dioscoridem ait & Sera-  
pionem, integros Cardamomi fructus suis confertos grans descripsisse.  
At nobis sola grana, quod saporis & odoris eximij sint, in vsus serua-  
ri, cortices verò quod lignose, nullōque sapore ac odore prædita sint, ab-  
ijci. Porro duo ad nos Cardamomi genera afferri, maius et minus. Ma-  
ius fructum habere lignosum, iuglandis fere magnitudine, intus angu-  
losis & aromaticis granis, mali punici modo plenū & confertū, & fra-  
ctu contumacem. Minus vero fructum ferre, Auellana multo minorem,  
triquetrum, & minoribus granis repletum, eiusdēque saporis & odo-  
ris, sed quæ vehementius linguam penetrent. Maius ad nos hodie par-  
cius adferri, propterea in eius locum quosdam grana Paradisi substi-  
tuisse, & Cardamomum maius appellasse: improprie tamen & malè.  
Nam sapore, quo piperi similia sunt, & odore plurimum à Cardamo-  
mo differre. Fructum vero figura aliquam habere cognationē, qui oui  
columbini magnitudine conspiciatur, & Cardamomi modo grans an-  
gulosus repletus sit. Grana etiam ipsa Melligette vocantur, quod à re-  
gno Melli aduehantur. Totaque errare via qui Nigellæ citrinæ semen  
Cardamomi nomine dignantur. Hæc pene ad verbum Valerius Cor-  
dus. Videamus quid dicat Ma:thiolus, quem è Thuscis in Latium pro-  
feram. Ignotum nostro tempore Cardamomum est, nec verum à merca-  
toribus qui simplicia alia ad nos aduehunt, desertur. Est apud eos Car-  
domomum maius, Nigellæ semen, & Meligette, quorum trium nullum  
est Cardamomum, vel Gracorum, vel Arabum. Aliud enim pro Car-  
damomo accipiunt Graci, aliud Arabes. Serapio qui Gracos omnes in  
simplicibus reddidit, Cardamomum, Cordumenum appellat: & alio i-  
tidem capiti quod ex mente Isaach facit, titulum do Cardamomo impo-  
nit, quod sua lingua, Saccola maius et minus vocat, quod omnino dif-  
fert à Gracorum Cardamomo, quod sub nomine Cordumeni descripse-  
rat, atque ab omnibus illis, quæ in officinis reperiuntur. Hæc vero non  
esse Dioscoridis semina huic apparet. Parum densa sunt, facile rumpun-  
tur, nec commanducata in gustu amaritudinem quampiam relinquunt.

*Indi*



Indicet æquus lector, ego in Matthioli sententiã accedere malim. De Ele  
siquidẽ & longa hominis experientia probatam fidem assert.

## NARDVM. CAP. VI.

## NOMENCLATURA.

Gr. Νάρδος & . Lat. & Off. Nardũ. Ita. Il Nardo.  
Gal. du Nard. Ger. Spickhen nardi.



Nardum.

**D**vo nardi genera: u-  
num Indicum, alterũ  
Syriacũ appellatur, nõ quod  
in Syria proueniat, sed quod  
mõtis, in quo oritur, pars u-  
na ad Syrios, pars altera ad  
Indos flectitur. Ex hoc Syria  
ci genere præcipuum est re-  
cens & leue, largam gerens  
comam, flauum colore, per-  
quã odoratum, ac Cyperũ  
redolens, breui spica, amaro  
sapore linguã siccante, quod  
diu in sua odoris gratia per-  
maneant. Ex Indicis autem  
Nardum quoddam Gãgitis  
uocatur, a fluuio Gãge, apud  
quem enascitur, montem præterfluente. quod genus ob multam  
loci, in quo prodit, uliginem, uiribus infirmius est atque proce-  
rius adolescit, plures ferens spicas ab unica radice comosas, unã-  
que conuolutas, ac grauitè olentes. Motanum autem odoratius,  
spica breui ac mutila, odore Cypero uicino ceteras habens Syria  
ci dotes. Est & genus quoddam cui Sampharitico nomen locus  
indi



indidit, frutice breui, in magnas se spargens spicas, candidiore in  
terim medio caule, hircorum uirris supra modum redolente, quod  
improbatur. Made factum uendi solet: quod uitium ex eo depre-  
henditur, quod candida sit spica, & squalida, nulloque puluere  
obsita. Adulteratur sibi cum aqua, aut palmeo uino, inspissa-  
tionis ponderis causa inspirato. Intueri autem oportet, si lutum  
radicibus infideat, & in cerniculo puluerem excutere, eluendis  
manibus utilem. Vim habent excalfactoriam & exiccantem.  
Urinam mouent, aluum potu sistunt, uulua profluvia, sanicemque  
apposita supprimunt. Nausea ex aqua frigida auxiliantur, &  
stomachi rosionibus, inflationi, iocinori, regio morbo, renum ui-  
tijs. Aqua autem incocta fotu ad in sessum, uulua inflammatio-  
nibus medentur: Ad glabras oculorum genas ualent: siquidem  
eas ad densiore pilum reducunt: perfusis humore corporibus in-  
sparguntur. Miscentur antidotis, & in fidelili non picato ad ocu-  
laria medicamenta reconduntur, trita in farinam, & cum ui-  
no in pastillos coacta.

**N**ardus non Indica ad nos, sed Syriaca ex Alexandria assertur.  
quam odoratissimam se Venetys uidisse Matthiolus scribit. Di-  
scant igitur mercatores delectum, ne temere & suas profundant pecu-  
nias, & alijs illudant. Spica Nardi non summitas, sed ipsa eius radix  
est. Quod ei expeditissime patebit, qui familiare sibi Galeni effecerit.

## Nardum Celticum. C A P. VII.

### NOMENCLATURA.

Gr. Κελτικὴ Νάρδος. Lat. Nardum Celticum.

Ita, Nardo Gallico. Gal. Nard Gaulois.

Ger. Marien Bogdasenen bleumlin.

**C**elticum nardum nascitur in Liguria Alpibus, saluunca  
patrio nomine appellatum, prouenitque in Istria. Exiguè  
fructificat, & cum radicibus in manuales fasciculos componi-  
tur. Folia habet oblonga, colore in flauum languido, florem lu-  
teum





Nardum Celticum.

teum. Cauliculorum & radicum duntaxat usus est, & odoris suauitas: unde pridie fasciculos aqua abluere expedit, & exempta terra, paulo solo atque humenti (subrepta charta) reponere, postridie repurgare: siquidem utile, cum aceroso alienoque propter humoris vim, non excutitur. Adulteratur imposita herba simili, quæ hirculus uocatur, ab odoris grauitate: sed facilis cognitio: nanque herba candidior est, sine cauliculo, minoribus folijs, radice neque amara, neque odo-

rata, uti uerum Nardum est. Itaque radices atque cauliculi, abiectis folijs triti secernuntur, uino excipiuntur, digerunturque in pastillos, & ita fictili nouo diligenter operto asseruari debent. Laudatur maxime recens, iucundi odoris, radice numerosa coherens, plenum, nec fragile. Ad eadem quæ Syriacum pollet, sed uehementius urinam cit, & stomacho utilius est. Inflammationibus iocinoris, & felle suffusis auxiliatur. Contra stomachi inflammationes, cum absinthij decocto bibitur: item aduersus lienem, renum & uesicæ uitia, & uenenatos ictus, ex uino. Additur in malagmata, potiones, & calfacientia unguenta.

**C**eltica Nardus, quæ & Saliunca, ea planè est quæ Spica Romana Pharmacopolijs dicitur: Nascitur in Liguria Alpibus, in Istria, Carinthia, & Pannonia. Lauendulam seu maiorem, seu Massiliensem, non esse Nardum Celticam hoc uero argumento patet. Sole in Nardo Celtica radices & caules medicinam faciunt, nam flores & folia nullo usui sunt.



sunt: In Lauendula, soli flores & folia medica vi pollent, cum interim radicem, & caulium nullus sit vsus. Celtica Nardus potentius vrinam ciet, quàm Indica aut Syriaca, ceteris in rebus inferior.

## Montanum Nardum. CAP. VIII.

### NOMENCLATURA.

Gr. *Ογδὺν ὡξεδ' &*. Lat. *Nardum montanum*.

Ita. *Nardo montano*. Gallis & Offi. *incognitum*.

**M**ontanum Nardū, quod ab aliquibus thylacitis & niris appellatur, in Cilicia & Syria nascitur, surculo & folijs eryngio similibus, minoribus, minimè tamen spinosis asperisq̃. Radicibus binis nititur, aut pluribus, nigris, odoratis, ceu hastula regia, sed longè gracilioribus, & longè minoribus. Neque caulem, neque fructum, neque florē profert. Ad eadem ad quæ Celticum efficax.



*Asarum.*

**M**ontana Nardus quæ olim è Cilicia coriaceis sacculis adserebatur non in medicina tantum vsus, sed quo etiam ob suaueolentiam ignibus inijceretur, hodie ad nos non afferitur, nisi (quod casu & raro fit) cum alijs mercibus asportetur. In Cilicia abunde provenit, unde & Ouidio, *Spica Cylissa* vocatur. Montana Nardus nō ea herba est, q̃ funiculi modo per terram serpit, vt quæ nullo nec sapore nec odore prædita sit.

## ASARVM.

### CAP. IX.

### NOMENCLATURA.

Græ. *Ασάργον*. Lat. & Offi. *Asarū*. It. *Asaro*.  
b Gal.



Gal. du Cabaret. Ger. Haselburtz.

**A** Sarum, quod & ipsum aliqui sylvestre Nardum appellat, Hedere folijs, minoribus multo, rotundioribusq; floribus cytino Hyoscyami similibus, purpureis, inter folia proximè radicem emicantibus, odoratis, in quibus semen acinosum radices numerosas, geniculatas, tenues, obliquas, Gramini non dissimiles, longè tamen graciliores, odoratas, excalfaciètes, & quæ linguam uehementer mordent. Excalfactoriam uim habet, urinam cit, hydropicis & uetusto coxendicum dolori prodest. Radices senis drachmis ex aqua mulsa potæ, menses trahunt, & Veratri albi modo purgant. In unguenta additur. Vm brosis montibus prouenit, sed plurimum in Ponto, Phrygia, Ilirico, & Italia Iustinensi agro.

**D** iuersa sunt Asarum, de quo hic scribit Dioscorides, & Baccharis de qua in tertio, maleq; actū ab eis est, qui Baccharis, in Asari caput retulerūt. Sed reuera Asarū, Bacchar vulgare est, nō illa Baccharis.

## PHV. CAP. X.

### NOMENCLATURA.

Gr. φού. Lat. Phu, & Nardus sylvestre. It. Phu.  
Offi. Valeriana. Gal. La Valerienne.

**P** Hu, quod & aliqui sylvestre Nardum appellant, nascitur in Poto, folio Olusatri, aut Elaphobosci, caule cubitali, aut altiore, læui, cauo, molli, in purpuram uergente, geniculis intercepto, florib. Narcisso proximis, maioribus tenerioribus, & ex albicante purpureis: radice superius ad digiti minoris crassitudine, ex obliquo uillosa in nigri Veratri aut Iunci odorati modū: capillamentis inuicem contextis, flauescens, odoratis, cū quadam odoris grauitate Nardum emulantibus. Excalfacit, urinam mouet, si sicca potuit detur. Decoctum eadem præstare potest, ad lateris, etiam dolorem efficax, menses cit, antidotis inse-

ritur





\* Phu.



Valeriana.

ritur. Adulteratur radice Rusci ammixta: sed maleficium deprehenditur: quoniam hac dura est, & frangenti contumax, sine ulla odoris gratia.

**P**Hu Val. riana est, non illa quidem minor, sed maior: & quod ad Narcissi florem attinet, corruptus hic Ruellio & Matthiolo Dioscoridis est codex. Valeriana minor subtiles habet & intricatas radices quæ commendando odori scrinijs induntur. Hanc non esse Phu non abs recensuit Cordus.

## Malabathrum. CAP. XI.

### NOMENCLATURA.

Græ. μάλαβαθρον. Lat. & Off. Folium Indum,  
& folium Malabatri. Ita. folio Indico. Gal. Fueil-  
le d'Inde. Ger. Negeelblätter.

b 2

Mala



**M**alabathrum arbitrantur aliqui esse Indici Nardi folium, falsi quadam odoris cognatione: permulta enim Nardum olent, quemadmodum Phu, Asarum, Niris. secus autem res se habet. Nanque Malabathrum folium sui generis est, quod Indica gignunt paludes, lentis palustris modo innatans aquis, sine radice. Id collectum statim lino transsuitur, & siccatum reconditur. Tradunt siccatis aestivo feruore aquis, humum aridis fruticibus uri: quod ubi non euenerit, ne amplius quidem renasci. Laudatur recens, ex candido nigricans, integrum, nec fragile, odore caput feriens: quod diu in suauis odore permaneat, & nardum sapore imitetur, nullo salis gustu. Infirmum uero & minutim contusum, praesertim si cariosum uirus olet, uitiosum est. Easde Nardo sortitur uires, sed efficacius omnia praestat. Uri nam uehementius ciēt, ac stomacho magis prodest Malabathri uis. Lippitudinibus inflammationibusque tritum & in uino seruifaculum commodē illinitur: subditum linguae, oris halitum & suauitatem commendat. Vestium quoque odorem interpositum seruat, & ab erosione tuetur.

**M**alabathrum, quod antiquis Folium, siquidem folium est, & nil praeter ea, paludibus innascens. Hodie ad nos non affertur. Folia Casia huius substituuntur loco, quae profecto ignota arboris sunt. Satius erit, si Galenum secuti, Malabathri uice, nullo periculo Casia utamur, aut Syriaco vel Indico Nardo.

## CASSIA CAP. XII.

### NOMENCLATURA.

Gr. Κασσία. Lat. & Offi. Cassia.

Ita. Casia. Gal. la Casse.

**C**assia, cuius complura sunt genera, iuxta odoriferam Arabiam gignitur, crassi corticis sarmento, folijs piperis. Eligenda est fuluescens, pulchri coloris, coralli amula, perquam angusta, longa, crassa, & fistulosa, gustu mordens, & cum ali-

quan



quanto feruore adstringens, aromatica, uinoso odore, cuiusmodi est, quæ ab incolis *Achy*, appellatur, ab *Alexandria* negociatoribus *Daphnitis*. Huic præfertur crassa, purpurea, et nigricans, *Zigir* cognomine, quæ rosam odore imitatur, præcipui in medicina usus. Secundum locum tenet antedicta. Tertia, cui *Museletico blasto*, id est, germi cognomen est. Reliquæ uiles, & quæ *Aphemum* dicitur, nigra, insuauis, cortice tenui, ac rimoso & quæ *Darca*, & *Citto* uocitatur barbaro nomine. Similior huic est *Pseudocasia*, quam ut explicari possit, quæ gustu coarctatur, cum nec acris, nec odorata sit, hærentemq; medullæ corticem habeat. Inuenitur etiam lata quædã fistula, mollis, leuis, surculosa, quæ antedicta præfertur. Damnatur candicans, scabra, hircinum uirus redolens, & quæ tenui fistula & scabra cute sit. Vim obtinet calfaciendi, urinam ciendi, siccandi, & leuiter astringendi. Conuenit ad medicamenta oculorum, quæ præstandæ claritatis gratia concinnantur, & ad malagmata. Lentigines tollit cum melle illita, menses trahit, contra viperarum ictus pota auxiliatur: aduersus intestinas inflammationes omnes, & renum uitia, pota proficit. Fæminis in solio desidentibus, aut suffimentis, prodest ad dilationem vuluæ. Ea duplo pondere medicamentis mixta, Cinamomi uicem supplet, si ipsum desit: nam eosdem effectus præbet, ad plurima per quam utilis.

## Cinnamomum. C A P. XIII.

### NOMENCLATURA.

Gr. Κίναμονον. Lat. & Offic. Cinnamomū.

Ital. Cinamomo. Gal. Cinnamome.

**C**innamomi genera plura, partium sibi nomen vëdicatia. Præfertur tamen Mosyliticum, quod *Casia*, cui Mosyliti nomen est, aliquam referat effigiem. Sed in eo genere recens, nigrum, ex uinoso in cinerem vergens, læue, tenuibus ramulis,

b

3

ac frs



ac frequentibus nodis cinclum, per quam iucundè olens. Optimi  
 ferè indicium, iucundi odoris proprietate cōstat. Inuenitur enim  
 cum optimo, eoq; quod peculiare est, odor Rutæ aut Cardamo  
 mo proximus. Insuper acre, mordens, & cum calfactione qua  
 dantenus falsum, quod non citò confricanti asperum, aut frian-  
 ti lanuginosum, leuibus tamen internodijs appareat. Si certior  
 fieri uoles, uellito ab radice surculum. facilis est huiusmodi p-  
 batio: namq; fragmenta miscellanea quædā esse videntur. Qua  
 autem melius spirant, suo halitu cum nares primum consulun-  
 tur, olfactum ex plentia, deterioris dignotionem impediunt. Est  
 etiamnum montanum, crassum: pumilum, fuluescēs admodum.  
 Tertium à Mosylitico, per quam suauiter olet, nigrum, frutico-  
 sum, paucis intercedentibus geniculis. Quartum, fungosum, can-  
 dicans, aspectu tuberosum, vile, ac friabile, magnam habens ra-  
 dicem, quæ Cassiā planè representat. Quintum genus, odore na-  
 res feriens subrufum, & cortice fuluæ Cassiæ simile, tangētī fir-  
 mum, minus neruosum, densa radice firmatum. Is quæ Thuris,  
 Cassiæ, Mirti, aut Amomi odorē spirat, minus suauitatis inest.  
 Deligito scabrum, album, rugosum: at laue, & lignosum circa  
 radicem, ut inutile, reijcito. Est etiamnum simile aliud, cui Pseu-  
 docinnamomo cognomen est, vile, inualidi odoris solutarumq;  
 virium. Vocatur etiam Zingiber, cum tamen sit Xylocinnamo-  
 mum, præbens quadam Cinnamomi faciem. Est autē lignosum  
 Cinnamomū, sarmenta longa robustaq; ferens, odore logè Cin-  
 namomo inferiore. Sūt qui Xylocinnamomū, à Cinnamomo ge-  
 nere differre dicant, quod à natura eius abhorreat. Cinnamo-  
 mum omne ex calfacit, emollit, & concoquit, vrinam ciet, tam  
 mēses quam partus potū aut ex myrrha impositū pellit cōtra be-  
 stias quæ virus ei aculantur, venenāq; conuenit: caliginem pupil-  
 lis oculorum obuersantem discutit, crassitiem extenuat, lentigi-  
 nes & vitia cutis in facie ex melle illitum detergit: cōtra tusses,  
 deflu



defluxiones aquam subtercutem fusam, renum vitia, & Urinæ difficultatem efficax est: Unguentis preciosis inseri solet: & in summa, magni ad omnia vsus. Tritum vino excipitur, umbra-  
q; siccatum, quod diutius eduret, reconditur. Est & quoddam Cinnamomum, quod aliqui Pseudocinnamomū appellant, per-  
quam denso atq; crasso sarmento, longè tamen inualidius Cin-  
namomo, & odore & gustu.

## Annotatio in Cap. XII. &amp; XIII.

## De Cassia &amp; Cinnamomo.

**C**ognata adeo plāta sunt Cassia & Cinnamomū, vt perfectè Cas-  
sia ramos in totū Cinnamomo similes Galenus viderit, nec secus  
Cinnamomiramos Cassiā pro maxima parte referre. At si quis Canellā  
vulgo vocatam diligētius expendere, ac Officinarum qui illam cōtinēt  
saccos euoluerit, omnes reperiet Cassiæ descriptas à Dioscoride species. Ea  
enim mercatorum natura est, vt bonas merces sibi putere velint, quo pe-  
iores diuēdant. Cassia dum cortice vestitur, Xylocassia: nudata cortice,  
Cassia Syrinx, quod fistulam representet dicitur. huius vice cortex lon-  
go tempore deportata ad nos radice, quæ amarum, nō aromaticum sa-  
porē haberet. Nūc sed raro aliqua eius species affertur. Arabum Cassia  
fistula quam solutiuam vacant, omnino alia est à Græcorum Cassia fi-  
stula. Siquidē fructus est proceræ arboris qui in India & Egipto nascitur  
quæ & Faba Egyptia dicitur. Cinnamomi multam fuisse penuriā Ga-  
leni tempore constat. Quod si imperatoribus ipsis quibus tum omnia  
parebant cara hac planta erat, intantum vt pro thesauro afferuarent,  
nihil mirum si nostro saculo incognita sit & rarissima.

## Amomum. CAP. XIII.

## NOMENCLATURA.

Græ. Αμομον. Lat. & Offic. Amomum.

Ital. Amomo. Gal. incognitum.

**A**momum exigue frutificat, ex ligno se conuoluens in ra-  
cemi modum, flore, ceu candidæ Violæ paruo: folijs vitis  
albæ similibus. Laudatur quāmaximè Armeniacum, fuluo  
auri colore, ligno subrufo, valde odorato. Medicum, quoniam  
in campestribus & aquosis enascitur, infirmius esse constat. Est

b 4

autem



autem magnum, subviride, tactu tenerum, frutice venoso, odore origani. Ponticum verò subrusum, paruum, fragile, racemosum fructu turgens, & odore nares feriens. Deligito recens, candidū vel subrubrum, quod nec astrictum cohareat, nec conuoluatur, sed solutum diffundatur, seminis plenum, uuis paruis simile, graue, odoratum, modo cariem non contraxerit, acre, gustu mordens, simplici colore non euariante. Vim habet calfaciēdi, astringendi, exiccandi. Somnum allicit, & illitum fronti, doloris sensum aufert, inflammationes & meliceridas cōcoquit, discutitq; inuat quos scorpini percussit, ex Ocimo illitum, & podagricis cōfert, inflammationes oculorum viscerumq; lenit ex vna passa: ad vuluarum vitia in pēsis, aut in seſsionibus vtile est, decoctū iecinori, renibus, podagra, potu conuenit. Antidotis immiscetur & preciosissimis vnguentis. Adulteratur herba Amomo simili, quæ Amomis vocatur, sed sine odore, sine fructu. Nasctur in Armenia, flore Origani. Quare in huiusmodi probationibus fragmenta fugienda sunt: eligēda autem, quæ ab una radice integros surculos emittunt.

**A** Momum cum in Italia, diligētissimo Matthiolo authore nō nascatur, nec sit ea planta, quam Rosam S. Mariæ Italica matrona vocant, his rationinibus (Similes Bryoniae frondes non habet, nullum Origani odorē refert, acrimonia nares non percellit, quin potius nullius est odoris) tantisper dum vero Amomo carebimus (nam Portugalli nō ita pridem verum ex India aduehere cœperunt) authore Galeno eius vice Acoro vtemur.

## COSTVS. CAP. XV.

### NOMENCLATURA.


Græ. Κόστος. Lat. Costus. Ital. Costo.

Gal. & Offic. Incognitus.

**P** Recellit Arabicus, candidus, levis, eximia odoris suauitate. Secundum locum sibi vendicat Indicus, levis, uber, ut  
fern



serula niger. Tertius est Syriacus, grauis, colore buxens, & odore feriens. Optimus est recens, albus, abunde plenus, densus, aridus, à teredinibus non erosus, sine graueolentia, gustu calidus ac



Costus.

mordens. Vis ei excalfactoria, urinam ciet menses pellit, vitis quæ uulnam male habent, tam imposito, quàm fortu & suffitu auxiliatur. Contra uiperarum morsus sextantem bibere prodest: item aduersus pectoris dolores, cōuulsa, inflationesq̃, ex uino & Absinthio, uenerem ex mulso stimulat, latas Ventris tinea ex aqua pellit, horribus ex oleo, ante februm accessiones, & neruorum resolutionibus oblitur: vitia cutis in facie, cum aqua uel melle illitus emēdat. Additur in

antidota et malagmata. Sunt qui admistis Helenij Comageni præduris radicibus, adulterēt, quod deprehensū facile est, si quidem neq̃ gustu seruet Helenium, neq̃ ualidum odorem uibrat, ut caput tentare possit.

Costum ut plurimum Officina habent, amarum, & dulce. Sed de his non loquitur Plinius, aut Dioscorides, at de albo tantū. Paucis ab hinc annis uerus Venetijs affertur. Inde sibi comparent pharmacopole, nec diutius in antiquo errore inueterascent.

## Odoratus iuncus. CAP. XVI.

### NOMENCIATURA.

Gr. Xīvos. Lat. Iuncus odoratus & rotundus.

6 5 Itali



Ital. Gionco odorato. Gal. Pasture à chameaux.

Offic. Squinanthum.

**O** Doratus iuncus, in Africa, & Arabia nascitur. Laudatissimus ex Nabathæa: proximus Arabicus, quem aliqui Babylonium cognominant, alij Teuchitin: pessimus ex Africa. Eligendus est rufus, recens, floribus refertus, tenuis, rubentibus fragmentis, qui manibus confricando rosæ odorem emittit, igneæ mordacitatis ad linguam. Floris, culmorum radicisq; est usus. Vim Urinæ ciundæ habet, menses pellit, discutit inflationes, caput agruat, modicè astringit, comminuit, excoquit, ac venarum spiracula laxat. Flos eius in potu vilis sanguinem reijcientibus, doloribus stomachi, pulmonis, iecinoris, & renum, miscetur antidotis. Radis astringentior est, ideo fastidijs stomachi, hydropicis, conuulsis, drachma vna cum pari pondere piperis, per dies aliquot datur. Decoctum vuluæ inflammationibus, ad desidentium fetus utile est.

**I**uncus odoratus, Squinanthum Officinis vocatur, voce corrupta à Σχοινού & υνθ, unde vox integra prodit Σχοινανθός, qua Squinanthus quasi velint dicere, Flos Iunci odorati. hic ad nos hodie non affertur, sed stipites tantum, & folia, & radices. Iuncus odoratus seligendus est recens, nam à vetere odor omnis & sapor abeunt.

## Calamus odoratus. C A P. XVII.

### NOMENCLATURA.

Gr. Κάλαμος & ἄρωματικος. Lat. Calamus odoratus.

Ital. Calamo odorato. Ga. & Offi. Calam<sup>9</sup> aromaticus.

**C**alamus odoratus in India nascitur: melior est fuluus de-  
se geniculatus, & qui assulose frangitur, plena araneorū  
fistula, albicans, lentus in mandendo, & astringens, ac cum ali-  
quanta acrimonia amarus. Urinam potu ciet, quare cum grami-  
nis aut apij semine coctus, in aquæ subtercutem fusæ morbo, re-  
num



num uitijs, stillicidio urinae, ruptisq, comode bibitur, menses & potu & appositu pellit, tuſſi ſuffitu medetur per ſe, aut ex reſina terebinthina, hauſto per arundinem fumo, ad muliebres inſeſſus decoquitur, & clyſteribus imponitur. ſuffitionibus, malagmatisq, odoris gratia commiſcetur.

**C**alamus Aromaticus, canna odoratiſſima, quæ quibuſdam maioris Aſiæ Lacubus (dum ſiccantur) enaſcitur, ad nos hodie non aſfertur, ſed huius loco acori radix, quæ ſola ex Acoro medicinam facit cū in Calamo odorato uſui ſit arundo, non radix.

## Balsamum. CAP. XVIII.

### NOMENCLATURA.

Gr. Βαλσαμον. Lat. & Offic. Balsamum.

Gal. Baufme.

**B**alsamū, arbor albæ Violæ, Lycij, ſive Pyracanthæ magnitudine conſpicitur. Folium rutæ proximum, longè candidius, perpetuò uirens. In Iudæa ſolum quadam ualle & Aegypto naſcens. his differens modis, ſcabritia, proceritate, gracilitate. Quod igitur tenui & capillacea coma eſt, Theriſtum uocant, quaſi demeſſile: fortæſſis quoniam ob gracilitatem facile demetatur. Aeſtiuis ſub ortu Canis ardoribus, arboris unguibus ferreis inciditur, manatq, è plaga ſuccus, quem Opobalsamum uocant: ſed tam exiguo ſtillatu, ut annis ſingulis, ne plures quidē quàm ſe ni ſeptēniue cogij cogantur, inibiq, pondus duplo reſponditur argento. Succus probatio eſt, ut ſit recens, ualidi odoris, ſyncerus, non ad acorem uergens, dilui facilis, lenis, astringens, ac modicè mordens guſtu. Sed uariè uitiatur, miſto ab aliquibus Terebinthi, Cypri, Lentiſci, Balani unguento: itē ſuſino, metopio melle, aut Cypria cera liquida, quod maleficiū facile deprehēditur. Namq, merus in laneam ueſtem ſuſus, neq, maculam facit,



cit, neq; si eluatur, notam reliquit: uitiatus autē inheret: & la-  
 instillatus coagulat, quod adulteratus nō efficit. Quinetiam Syn-  
 cerus in aqua aut lacte celerrimè liquatur, coloreq; lactescit: ui-  
 tiatus uero olei modo innatat, se conuoluens, aut in stellæ modū  
 diffundēs. Syncerus senescens crasse scit, deteriorq; redditur. Hal-  
 lucinantur, qui aqua concretum pessum ire, & ad ima fidere ar-  
 bitrantur, postea dissipatum supernatare. E ligni genere, quod  
 Xylobalsamum uocant, probatur recens, sermento tenui, fuluū,  
 odoratum, quadam tenus Opobalsamum spirans. Necessarium  
 etiam seminis erumpit usus, quare eligatur flauum, plenum, grā-  
 de, ponderosum, mordens gustu, feruens in ore, modicè Opobal-  
 samum olens. Adulteratur semine hyperico simili, quod à Pe-  
 tra oppido defertur. Sed coarguitur magnitudine, inanitate, ui-  
 rium ignauia, sapore Piperis. Efficacissima uis inest succo, &  
 quam maxime calfaciens, abstergit quæ tenebras oculorum pu-  
 pillis effundunt, medetur perfriktionibus uulnæ, cum rosaceo ce-  
 rato appositus, menses quoq; secundas, & partus extrahit, hor-  
 rores illitu discutit, ulcera sordida expurgat, & cruda conco-  
 quit, urinam potu ciet, ægrè spirantibus prodest: datur in lacte  
 contra Aconitum haustum, aut serpētium ictus, miscetur acopis  
 malagmatis, & antidotis. In summa, præcipua authoritas suc-  
 co, secunda semini, minima ligno. Semen commodè potui datur  
 doloribus lateris: pulmonum uitijs, tussi, ischiadicis, comitialibus  
 uertiginosis, orthopnoicis, urinæ difficultati, torminibus ac ser-  
 pentum morfibz, ad muliebres suffitus per quàm utile est: uul-  
 nam aperit in desensionibus balnearum decoctum, & humo-  
 rem euocat. Lignum easdem habet uires, aliquatò minores. Ex  
 aqua potum cruditatibus, torminosis, uulsis, uenenatorum icti-  
 bus opitulatur, urinam cit, ad capitis uulnera cum sicca Iri con-  
 uenit, squammas ossium extrahit, & ad unguentorum spissa-  
 menta additur.

Balj



**B**alsamum Syriaca arbuscula, in Egypto non secus ac olim nascitur, sed sincerus eius liquor ad nos non affertur. Carpobalsamum, Balsami fructus: Xilobalsamum, Balsami est lignum. Hac adulterata in Pharmacopolijs venduntur. Hac diluunt incolæ ad medicinam & vnuent a, tu viribus destitutâ lignosam substantiam nobis obtrudunt. Balsami vice, Staete vti licebit, qui liquoris è Myrrha elicit flos est. Loco Xilobalsami violarum radice, quas Cheiri officina vocant.

## Aspalathus. CAP. XIX.

### NOMENCLATURA.

Gr. Ἀσπλάτῳ. Lat. Aspalatus. Ita.

Aspalato. Gall. & Offic. nomen  
Latinum vsurpant.

**A**spalatus, alijs Erysisceptron, frutex est surculosus, multis spinis horrens, nascitur in Istro, Nisyro, Syria, & Rhodiorum insula, quo ad unguentorum spissamenta pigmentarij utuntur. Optimus est grauis, detracto cortice rubens, aut in purpuram uergens, densus, odoratus, gustatu amarus. Est & alterum genus candidum, lignosum, sine odore, quod deterius habetur. Vim calfaciendi cum astrictione obtinet: unde decoctum uino ad tetra oris ulcera colluenda conuenit, ad nomas genitalium, & sordida ulcera infunditur: subiectum in pessa, parum extrahit: alium sistit eius decoctum, & sanguinis reiectionem potu cohibet, urinæ difficultatem inflationesq; discutit.

**A**spalatus non illa arbuscula est, quæ Rhodi nascitur Oliuastro similis, patrum memoria pro Agallocho vsurpata, & è qua precati orbiculi fiunt, nigri aut flauis sub cortice coloris, non rubri aut purpurei, quod requirit Dioscorides. Adde his, in re medica Aspalato adicis cortice tantum utimur, in Rhodio ligno, ipsum lignum medicinali vim & odorem habet.

Mus



## MVSCVS. CAP. XX.

## NOMENCLATURA.

Gr. Βρυον. Lat. Muscus. Ital. Mosco.

Gal. Mouffe. Offic. Vinea.

**B**ryon, id est, Muscus, à quibusdam Splechnon appellatur: in Cedro arbore: Populo alba & Quercu inuenitur. Optimum est cedrinum: proximum populeum: in quo genere candidum & odoratius præstat, nigricans improbat. Astringendi vim habet. Decoctum insidentium uuluis utile: unguento balanino, oleisq; inspissandi gratia inseritur: thymiamatum, acoporumq; compositionibus conueniens.

**M**vscus seu villosa illa arborum canities, non pro eo hic accipitur, qui in quavis arbore nascatur, sed tantum qui in cedro, Populo alba, Picea, Quercu, Larice, Abiete proveniat ac sit odoratus. Muscus vulgaris, Indici animalis pus est. Qui diligentiores sunt, quo hac clarius distinguant, illum muscum, moschum hunc appellant.

## Agallochum. CAP. XXI.

## NOMENCLATURA.

Gr. Αγάλλοχον. Lat. &amp; Offic. Agallochum. Ita.

Agollocho. Gal. nomen non indiderunt.

**A**gallochum, lignum est quod ex India atq; Arabia deportatur, Thueia ligno simile, maculatum, odoratum, gustu astringens, cum quadam amaritudine, cute uerius, quam cortice uestitur, aliquantulum uersicolore. Manditur, aut decocto os colluitur, commendandi halitus gratia. Sudores arcet toto corpori insparsum: pro thure ad suffimenta substituitur: radix epota drachmæ unius pondere, humida stomachi uitia & imbecillitatem, feruoremq; mulcet: si lateris, iecinorisue dolor excruciat, si dysenteria, aut tormina infestant, ex aqua bibere prodest.

Agallo



**A** Gallochum, Xiloaloes, seu lignum aloes, referentibus Portugallis in insula Taprobana nascitur, suauissimi odoris etiam si non vratur. Venetijs affertur quod probatissimum est. Agallochum calidum & siccum est in secundo gradu.

## Narcaphthum. CAP. XXII.

### NOMENCLATURA.

Gr. Νάρκαφθου. Lat. Gal. Offic. Narcaphthum.  
Ital. Nercaphtho.

**N**arcaphthum ex India desertur corticosum, simile Sycomori libro, quod iucundi odoris gratia sufficitur. Miscetur thymiamatis compositis: constrictionibus uulnæ suffitu prodest.

**N**arcaphthū aut hodie ignotum, aut Storax est sicca, aut Corzumbrum, aut potius Tignamæ, quod plane nil aliud est, quàm Thymama.

## Cancamum. CAP. XXIII.

### NOMENCLATURA.

Gr. Κάρκαμου. Lat. Cancamum. Ital. Cancamo.  
Offic. Lacca. nec aliud nomen habet.

**C**ancamum Arabici ligni lachrima est, myrrhæ quodammodo similis, uirosi gustus, quam ad suffimenta usurpant. Vestes eo, Styrace & Myrrha additis suffiuntur. Vim proditur obtinere extenuandi obesos, si ternum obolorum pondere ex aqua, aut mulso aceto plusculos dies ebibatur: lienosis datur, comitialibus & suspiriosis: menses cum aqua mulsa pellit, oculorum cicatrices confestim emendat: uino madefactum medetur eorundem hebetudinibus, aduersus gingiuas humore prægnantes: doloresq; dentium, non aliud efficacius.

Can



**C**ancamum ex Arabia ad nos hodie, nec alijs locis affertur. Nec est gummi illud spissum & transparens, quod Laccam vocat, nempe nullum gustu, suffitūve odorē prae se fert, quod in Cancamo reperiri scribit Dioscorides. A tenim in cap. de Cancamo seipsum confundit Serapio, qui dicat: Laccam ē cōelo super arbores Manna in modum decidere, & ex eius fece Carmesinum in tinctorijs fieri. Cavēdum proinde ne pro Cācamo aut Laccam, & minus Dialaccam accipiamus. Astringit enim Dialacca: Laxat & aperit Cancamum.

## CIPHI. CAP. XXIII.

### NOMENCLATURA.

Gr. *Κύφι*. Lat. *Cyphi*. Ital. *Ciphi*.

Gal. & Offic. *Cypheos*.

**C**yp̄i thimiamatis compositio est dicata dijs, qua abunde Aegyptij sacerdotes utuntur. In antidota misceri solet suspiriosis datur in potu. Permulta componendi rationes, quarum una haec est: Sumito cyperi dimidium sextarium, cum paribaccarum Iunperi adultae modo: una passae pinguis, exemptis uinaceis, minas duodecim: resina repurgata minas quinq; Calami & Iunci odoratorū. & Aspalathis singulorum minam: Myrrha duodecim: uini ueteris sextarios nouem, cum duabus mellis minis: unā passam detractis uinaceis tusa, cum uino & Myrrha subigito: cetera tusa & cribrata adjcito: die uno humorem combibere finito: dein mel coquito, dum sibi glutinis ascescat crassitudinem: eliquatam resinam accurate permisceto cum reliquis diligenter contritis, & in fictile uas recondito.

**A**diectitū quibusdam hoc esse caput Dioscoridis videtur, quod in antiquis exemplaribus non repperiatur. At cum Cyphi amplam Aetius mentionem fecerit, id certò statuere non audeo.

## CROCUM. CAP. XXV.

### NOMENCLATURA.

Gr. *Κρον* & . Lat. & Offic. *Crocum*. Ital. *Zaffarano*.

Gal. *Saffran*. Ger. *Saffran ziment*.

Cro





Crocum.

**C**rocum, optimū in me-  
dendi usu Coryceum,  
recens & boni coloris, pau-  
lum candidi gerēs in capreo-  
lo, oblongum, omnibus suis  
partibus constans, non fragi-  
le, plenum, a quo detractum  
est nihil, quod madefactum  
manus inficit, nec situm redo-  
let, aut carie sentit, subacre:  
sin huius generis non est, aut  
uetus, aut humore perfusum  
creditur. Secundus locus da-  
tur Coryceo, è tractu Lyciæ  
contermino. Tertius Licio è  
monte Olympo. dein ex Ae-  
gibus Aetoliæ. Cyrenaicum

& Centuripinū inter Sicilica omnia uiribus infirmius est. Om-  
nium natura oleacea. Itali tamen ob succi copiam, & coloris  
uenustatem, tingendis mortarijs dicauerūt: quibus de causis ma-  
gno uenditur. Vtilissimum in medicina quod ante descripsimus.  
Adulteratur immisto Crocomagmate tuso, atq; etiam sapæ su-  
blitu: contrita, quò pondus adiciatur, simul argenti spuma, aut  
plumbagine. sed malefictum declarat insidens puluis, præsertim  
si defrutum in odorando subolet. Thessalus ipsum tantum odora-  
tum esse uoluit. Alij exitiosum, tribus drachmis ex aqua potis.  
Proculdubio uim coquendi, emolliendi, atq; substringendi ha-  
bet: urinam cit, elegantem colorem præstat: qui ex passo biberint  
crapulam non sentient: oculorum fluxiones illitum cum huma-  
no lacte, cohibet: additur in potiones, quæ interaneorum causa  
temperatur: ad uulnæ etiam sedisq; cataplasmata utiliter inditur

c

uene



uenerem stimulat, uergentes ad ignem sacrum inflammationes mulcet, auricularijs collectionibus utile. Quò facilius conteratur in calido fictili sole siccari oportet, celeriterq; uersari. Urinam mouet radix ex passo pota. Fit etiam expressis unguenti crocini odoramentis, & in formas digestis, quod Crocomagma uocat. Optimum est odoratum, modice Myrrham olens, graue nigrum, ligni expers, laeue, subamarum, quod madefactum Croci colore reddit, gustatumq; uehementer dentes ac linguam inficit, multis durans annis, quale est, quod à Syria defertur. Habet suas uires ad delenda quæ caliginem oculis obuersant: urinam cit. calfacit, coquit, & emollit. Vires Croci proportionem quadantenus representat, quando quidem plurimam Croci partem sibi Crocomagma uendicat.

**C**rocom quod certis olim in provinciis nascebatur, nunc & in Gallia excellentissimum, et in ipsa adeo Germania prouenit in Austria maximè & Vienna territorio. Abundè quid sit Crocomagma et deducet Dioscorides. Tota Croci substantia procedit in secundum caliditatis gradum & siccitatis primum, eaq; de causa vim habet maturandi, cui subsidiaria est astringentia qua participat virtus.

## Helenium. C A P. XXVI.

### NOMENCLATURA.

Gre. Ελένιον. Lat. Helenium. Ital. Euola.

Gal. & Offic Enula Campana.

Ger. Alantwurtzel.

**H**elenium folia habet Verbasci angustioris folij, asperiora, oblonga: caule quibusdam in locis non emittit: radicem sub  
albi





Helenium.

albidā, interdum subrusam,  
odoratā, subacrē, uegetam,  
magnā, ex qua agnata ppa-  
gines liliorū aut ari modo se-  
rūtur. Motibus in umbrosis,  
siccoq; solo prouenit. Foditur  
estate radix, particulatimq;  
dissecta siccatur. Potū radice  
decoctum menses & urinas  
ciet, ipsaq; in eclegmate ex  
melle pdest tussi, orthopnææ  
ruptis, conuulsis, inflationibus  
& serpentium morsibus. In  
summa excalfaciens. Folia  
ex uino cocta utiliter ischia-  
dicis illinuntur. Helenium sto-  
macho utile in passo conditū:  
siquidem salgamarij paulu-  
lum siccata radicem, mox

decoctam, & frigida aqua madefactam, in sapam conij-  
ciunt, & ad usus recondunt. Trita potaq; ad cruentas execra-  
tiones efficax est. Alterum Helenij genus in Aegypto gigni-  
Cratæas tradit. Herba est cubitalibus ramulis, Serpylli modo  
per humum repentibus, folijs Lenticulæ circa ramos. sed longiori-  
bus crebrisq; radice pallida, digiti minoris crassitudine, per ima-  
tenui, superne crassa, cortice nigro. Nascitur in maritimis, colli-  
busq;. Radix una in uino epota, contra serpentium ictus auxilia-  
tur.

**I**Nula seu Helenium, ex Helena lacrymis nata, dum Canopi gu-  
bernatoris mortem deflet, duplex. Nostras, nulli non cognita, Aegy-  
ptia, quæ humilis & coronaria est. Nostratis radix, non statim à gustu

c

2

excal



excalfacit, ut piper nigrum, & album: superflue enim humida est. Iure igitur electuarijs inseritur, quæ sunt ad crassos et viscosos humores e pectore & pulmone educendos.

## Omphacinū, oleūq̃. C A P. XXVII.

### NOMENCLATURA.

Gr. Ελαιον ὁμότριβες, καὶ Ελαιον κοῖνον.

Lat. Omphacinum oleum, & oleum commune.

Ital. olio Omphacino è uolgare. Gal. Huyle

d'Oliue. Offic. Latino utuntur nomine.

Ger. Baumol.



Omphacinum.

**O**leum quod ex immaturis oliuis exprimitur, ad multos usus recte ualentibus accomodatissimū Omphacinum id appellatur. Præstat recens, odoratum, quod non mordeat. Tale unguentorum compositionibus idoneum intelligitur. Stomacho utile est, quod astringat: gingiuas contrahit, dentes firmat: si contineatur in ore, sudores cohibet. Et quò uetustius ac pinguis, eò ad medicamenta aptius est. Et, ut reliqua in commune dicantur, omne oleum cal-

facit, emollit uentrem, à perfrictionibus corpus tuetur, ipsumq̃ pro



promptius ad obeunda munera reddit, aluum emollit: ulceratium uenerorum uires permistum hebetat: contra uenena datur, assidue potum redditumq; uomitionibus, soluit aluum hemina mensura cum pari ptisana succo aut aqua potum: ad tormina calidum simul decocta ruta tribus sextarijs in potu datur: uentris animalia pellit, idem maxime ilei intestini morbo laborantibus infunditur, uetus magis calfacit & uehementius discutit, oculorum claritati sublitum confert. Si uetusti non sit occasio, in uase decoquitur ad mellis crassitudinem, ut uetustatem representet.

## Oleum syluestris oliuæ.

### C A P. XXVIII.

#### NOMENCLATURA.

Gr. Εκ τῆς ἀγρίας ἐλαίας ἑλαιον. Lat. *Oleum syluestris oliuæ.* Ital. l'Olio che si fa delle oliue saluatiche. Gal. & Offic. commune nomē non mutant.

**O**leum quod syluestres oliuæ fundunt, uehementer adstringit, & ad sanorum usus secundum sibi locum uendicat. In doloribus capitis utiliter pro Rosaceo substituitur, sudores arcet, defluentes capillos inhibet, furfures, ulcera capiti; manantia, scabiem, leprasq; abstergit, tardius canitiem sentiūt, qui eo quotidie perunguntur. Candidum oleum fit hoc modo: Album colore, nec anniculo uetustius, in nouum fictile oris patuli funditur, centum heminarū mēsurā, & sub solem media quaque die concha refunditur, ex altoq; demittitur, ut assidua deuolutione, ictuq; agitatum respuet: octaua die fœnum gracum mundum quinquaginta denariorum pondere, calida aqua madefactum donec emollescat, in supradictum oleum deycitur, ita ne

ε ιγ extil



extillet aqua. Postea tede præpinguis piceæ assulatim case aqua  
le pondus adycitur, & transanctis octo diebus, oleum concha  
mouetur. Vbi candore contraxerit, in uas nouū uetere uino affu-  
sum recondi debet. substratis fertula Capanæ corollis drachmas  
undecim pendentibus, cum pari Iridis pondere: sin minus rursus  
soli mandandum, & idem munus obeundum, usq; dum inalbe-  
scat.

### Annotatio in Cap. xxvij. xxvij.

**O**leum cum simpliciter dicimus, illud intelligimus, quod ex satiuis  
Oleis: Omphacinum, quod ex immaturis Oleis exprimitur. Can-  
didi Olei conficiendi rationem docet Dioscorides. Candidum Oleum in  
Portugallia Vlsbona conficitur.

### Sicyonium. CAP. XXIX.

#### NOMENCLATURA.

Gr. Σικιόνιον. Lat. Sicyonium. Ital. Sicionio. Eo  
Galli & Officinæ carent.

**S**icyonij componendi ratio hæc est: In lebetem oris lati stan-  
no inductum, funditur olei albi quod crude oliua reddide-  
runt, cōgius unus: aqua semicōgius. Leni id igne coquitur, leni-  
ter mouendo: at ubi bis efferbuit, & subtræcto igne refrixit,  
innatans oleum concha decapulatur, & adiecta noua aqua con-  
feruescit, & reliquis ut diximus peractis, reponitur. In Sicyo-  
nia maxime fieri consuevit, Sicyonij inde accepto cognomine.  
Calsaetoriam adquendam usq; modum uim habet. Febri ac ner-  
uorum uitij prodest: fœminæ ad commendandum faciei nitorem  
eo utuntur.

**I**N Sicyone Peloponensi vrbe è candido oleo, preparabatur oleum eo  
quo scribit Dioscorides modo. Hodie fieri desit.

Stri



## Strigmēta balnearum. CAP. XXX.

## NOMENCLATURA.

Gr.  $\rho\acute{\upsilon}\omega\theta$  βαλανείωρ, καὶ  $\rho\acute{\upsilon}\omega\theta$  ἐκ τῆς παλαί-  
 sgas. Lat. Strigmenta balnearum Strigmenta  
 palestrica. Ital. Le rasure de i bagni. Le rasure della  
 palestra. Hæc antiquorum, non nostratis usus.

**S**trigmenta à balneis calfaciunt, molliunt, discutiunt: ad se-  
 dis rimas, & condylomata illinuntur. Illa uerò quæ ex pa-  
 lestris puluerem sibi ascuerunt, in sordis speciem redacta, arti-  
 culorum nodos imposita adiuvant: ischiadicis in fotus aut ma-  
 lagmatis locum, calida commodè sufficiuntur. Derafe gymna-  
 siorum parietibus simulacrisq; sordes calfaciunt, tubercula, quæ  
 agrè ad coctionem perducuntur, dissipant, desquamatis &  
 ulceribus senum prosunt.

**A**ntiquitus Oleo corporibus in balneo perunctis, sudorem Oleo mi-  
 xtum serui vel publici vel priuati strigilibus eradebant. Id strig-  
 mentū vocatum est. Luctaturi itidem iuuenes Oleo perungebantur. In  
 palestra, dein puluere oblineabant sese. Cænosa illa crassities quæ eis à lu-  
 do eradebatur in balneis, in vsus medicina cedeat.

## Elæomeli. CAP. XXXI.

## NOMENCLATURA.

Græ. Ελαϊόμελι. Lat. Elæomeli. Ital.  
 Eleomele. Res nostris incognita &  
 officinis.

**I**N Palmyris Syria, quod Elæomeli uocāt, ex quodam caudi-  
 ce manat oleū, melle crassius, sapore dulci. Bile, cruditatesq;  
 detrahit, sextario cū una aquæ hemina dato, sed q; sumpsere, tor-  
 6 4 pescunt



pesunt, & uiribus deficiuntur: quod minimè uereri oportet, uerum crebrò excitare, ne ueterno pressi somnos capient. Fit & oleum è pinguitudine firculorum Oleæ: optimum uetus, crassum pingue, non turbidum. Calfacit, priuatimque caliginibus oculorum illitur: lepras, neruorumq; dolores illitum emendat.

**E**leomeli ad nos hodie non affertur. Quod è Quercuum & Betularum uetustis truncis fluit, sapore habet mellis, pinguitudinem olei, proritat ad nauseam & vomitum Eleomeli, & laxat aluum.

### Cicinum oleum. C A P. XXXII.

#### NOMENCLATURA.

Gr. Κικινον έλαιον. Lat. Cicinum oleum. Ital.

l'olio Ricino. hoc Offic. nō parant: proinde nec apud Gallos nomen habet.

**C**icinum oleum hoc modo temperatur: Maturi Ricini, quauoles quantitate, torrido sole flaccescunt, & ouarum more instrati tantisper insolantur, dum uestiens cortex fractus decidat: caro colligitur, & coniecta in pilam diligenter tunditur: postea in lebetem stanno illitum, qui aquam habeat, demittitur, subiectoq; igni feruescunt: & ubi insitum prorsus humorem reddiderunt, sublato ab igni uase, innatans oleum concha tollitur, & reconditur. Sed in Aegypto, ubi largior increbuit usus, longè secus fieri solet Nam repurgatos Ricinos mola mandant & accurratè molitos per sportulam torculo exprimunt. Tum quidem ematuruerunt Ricini, cum continentibus orbiculis exuuntur. Ad psoras, & ulcera capitis manantia ualet, prodest sedis inflammationibus, uuluis conuersis atq; præclusis: item indecoris cicatribus, & aurium doloribus emplastra efficaciora reddit additum: potu aquam aluo extrahit, uentris animalia pellit.

**H**oc oleum hodie fit sub nomine Olei de Kerna, seu Catapucia maioris Arabum.

Amg



## Amygdalinum. CAP. XXXIII.

## NOMENCLATURA.

Gre. Αμνγδαλινον ἐλαίου. Lat. Oleum Amygdalinum. Ita. l'olio delle Mandole. Gal. Huyle d'Amendes. Off. Oleum amygdalarum.

**A**mygdalinum oleum, quod aliqui Metopium uocant, hoc fit modo: Semodius ex amaris nucibus repurgatis siccat<sup>isq</sup>, in pila ligneo pistillo leniter tunditur in offas, aqua quæ ferbuerit sextarius adijcitur, & ubi dimidia hora humorem hauserit, uehementius quàm antea tunditur, mox tabellis premitur, & quod digittis hæsit, concha excipitur. Pressis nucibus rursum hemina aqua inspergitur, & postquàm ebiberint, idē opus prosequendum. Singulas heminas reddunt singuli modij. Contra uuluarum dolores, strangulatus, conuersiones, & eorundem locorum inflammationes efficax est: uitjs renum, calculosis, difficili urina, suspiriosis, lienosisq<sup>3</sup> proficit: dolores capitis, grauitatem auditus, sonos incertos, tinnitusq<sup>3</sup> discutit: maculas & uitia cutis tollit e facie, & eam erugat cum melle, radice Lilij, & Cypria cera, aut rosaceo cerato: & oculorum hebetudines emendat, ulcera capitis manantia, & furfures cum uino abstergit.

**E**t si hodiè ex Amygdalis dulcibus & amaris oleum exprimatur. Satius tamen aget, qui hoc in negotio Mesue præscriptionem sequetur.

## Balaninum. CAP. XXXIIII.

## NOMENCLATURA.

Gre. Βαλάνινον ἐλαίου. Lat. Oleum Balaninum.



Ita. l'olio di Ben. Gal. Huyle de Ben. Off. Oleum de Ben.

**S**imili modo fit Balaninum Oleum, quod repurgat maculas, lentigines, uaros, & cicatrices nigras: aluum soluit, stomacho aduersatur, contra aurium dolorem, sonos, & tinnitus auxilio est, cum anserino adipe instillatum. Similis sesamini ratio. Fit etiam è nuce iuglande oleum, quod caryinum uocant. Eandem uim habet quam balaninum.

**O**leum Balaninum, quod è Glande vnguentaria fit, & Oleum è Ben dicitur, apud Italos vulgare, nobis penè incognitum quod ad bonitatem attinet.

## Hyoscyaminum. CAP. XXXV.

### NOMENCLATURA.

Υοσκυάμινον, κνιδελαϊον, Κνίκικον, ράφανελαϊον.

Lat. Hyoscyaminum, Gnidicum oleū, Cnicinum oleum, Oleum Raphaninum. Ita.

l'olio dell' Iusquiamo, del Grano

Gnidio, del Cartamo, del Ra

fano. Officinis, si præpa

rentur, nomina la

tina habent.

**H**Yoscyaminum sic fit: Semen candidum, recens ac siccum tunditur, & calida aspergitur aqua, ut in amygdalino diximus: dumq; insolatur, siccata, quæ sub manu sunt, partes cū reliqua massa permisceantur: hoc autem fieri oportet dum nigrescat, & grauitè oleat: mox pressum atque excolatum reconditur. Ad aurium dolores efficax est, pessis miscetur, ad emolliendum utile. Fit & è Grano gnidio purgato & tuso. Vis ei alium soluere potu. Non secus Cnicinum oleum temperatur, cui facultas eadem est quæ factò è Gnidio grano, uerum inualidior. Raphaninum è Raphani semine fieri solet, ceterorum more. Phthiriasis mala ualitudine contractas tollit. Scabrities cutis



utis in facie emendat. Ad obsonia utuntur Aegyptij. Melan-  
thinum idem quod Rhaphaninum potest. Tritum Sinapis semē,  
& calida aqua madefactum, adiecto postea oleo exprimitur.  
Id ad diurnos dolores efficax est, transfert humores qui in ali-  
qua parte concreuerunt.

Commodius nostro tempore tritum & calefactum Hyoscyami se-  
men cogitur oleum reddere, quā olim malefactum aqua. Idem fit  
in Rhaphanino & Sinapino. & vetustus mos desijt. E Grano Gnidio  
oleum exprimitur, quo rustici Itali ad se purgandos vtuntur. Olei ē  
CARTHAMO & Nigella rarus aut nullus est vsus.

## Myrteum. CAP. XXXVI.

### NOMENCLATURA.

Græ. Μυρτινέλαιον. Lat. Myrteum. Ita. l'Olio  
Mirthino. Gal. Huyle de Murte. off.

Oleum Myrtinum.

Myrtei faciēdi ratio hæc est: E Myrto nigra syluestri, aut  
satiua, foliorum mollißima quæq; tusa premuntur. succo  
vires omphacini olei portiones adiunguntur, subiectisq; carboni-  
bus inferuescunt donec concoquantur, innatans oleum deradi-  
tur. Sed longè facilius hæc compositio: Tenera folia contusa co-  
quantur in oleo & aqua, & quod innatat eximitur. Priua-  
tim alij deiecta in oleum folia in sole macerant: alij prius oleum  
inssillant Malicorio, Cupresso, Cypero, et Iunco odorato. Efficax  
est amarum gustu, & oleosum, uiride, translucēs, & olens  
Myrtu. Astringit & indurat: ideo medicamentis miscetur, quæ  
cicatricē obducunt, prodest ulceribus in capite manantibus, am-  
bustis igni: & papularum eruptionibus. Facit ad attrita & fur-  
fures, sedis rimas, cōdylomata, articulos laxatos, corporis sudo-  
res cōpescit, et omnia quæ ad strictionē inspissationēq; desiderāt.

Alii ratione parant seplasia Myrtinum oleum quam Dioscorides  
aut Mesue præscripserint. Et sanè melius cederet, si paratur in bal-  
neo Mariae, & cum olio Omphacino.

Lau-



## Laurinum. CAP. XXXVII.

## NOMENCLATURA.

Gr. Δαφνέλαιον. La. Laurinum. Ita. l'Olio

Laurino. Gal. Huyle de Laurier. Off.

nomen latinum in usu.

**L**aurinum fit hoc modo: Lauri bacca cum matura sunt, in aqua coquuntur: siquidem ex obducto cortice quandā pinguitudinem reddunt, quæ manibus subacta, concha excipitur. Alij omphacinum prius oleum Cypero, Iunco odorato, & Calamo inspissant, deinde tenera Lauri folia concoquunt: alij etiam baccas, donec oleum odorem contraxerit alij Styracē & Myrtum addunt. Optima Laurus ad id latifolia & montana. Oleum Laurinum utilius quò recentius, quoq; uiridius colore, amarissimum, & acre. Vis ei ex calfactoria, emolliens, uenarū spiracula aperit, lassitudines discutit, omnibus neruorum uitijis, algoribus, destillationibus, aurium doloribus, malis renum frigore contractis, illitum, non aliud iuuantius, attamen potum nauseam parit.

**O**leum Laurinū aliter à Mesue paratur, aliter à Dioscoride, aliter ab Officinis. In quibus qui eruginē admiscunt, malè agūt. Enervat enim erugo olei temperamentum. Probe praparatum prater uires quas ei tribuit Dioscorides, ualet dolori Hepatis, Hemicranæ proueniētis à causa frigida, dolori stomachi, dolori colico, matricis, & splenis.

## Lentiscinum. CAP. XXXVIII.

## NOMENCLATURA.

Gr. Σχινέλαιον. Lat. Lentiscinum. Ita. l'Olio del

Lentisco. Gal. Huyle de Lentisque. Offi-

cina Galliarum rarum aut nullum Len-

tiscinum habent.

**S**imilis Lentiscini ratio. Nam è maturo fructu temperatur, fractis prius spissamentis, ut in Laurino diximus: hoc scabiē iumen-



umentorum canumq; sanat, utilissimum pēssis, acopis, & le-  
rarum medicamentis sudores cohibet. Nec secus Terebinthi-  
um fieri solet. quod refrigerat & astringit.

**O**leum Lentiscinum in pluribus hodiē Thuscīa partibus paratur,  
& in comitatu Senensi, præcipuē in insulis Helba & Giglio, fit eo  
facto: Sumuntur fructus Lentisci, aliquot ante diebus ex arbore de cer-  
ti, numero & pondere qui satis esse videtur, immittuntur in aquam,  
ullunt lento igni, & cum crepare incipiunt, tum torculari immittun-  
ur, & non addito altero oleo, ex eis oleum exprimitur, nam satissu-  
erq; ex sese reddunt. Rustici qui eo vtuntur in cibo, laudant vt valens  
medium ad acuendum visum. Oleum quod ē Terebintho fit ad nos nō  
fertur, proinde nec in vsu est.

## Mastichinum. CAP. XXXIX.

### NOMENCLATURA.

Gr. Μασίχ'ελαιορ. Lat. Mastichinum. Ita. l'Olīo di  
Mastice. Gal. Huyle de Mastic. Off. Oleum de Mastice.

**M**astichinum ē trita fit Mastiche, quod contra omnia  
uulua mala efficax est, mediocriter calfacit, astringit, et  
mollit. Aduersus prominentes stomachi duritias, celiacorum,  
ysentericorumq; cruciatus utile: faciem emaculat, & colorem  
tuidum facit. Optimum in Chio insula componitur.

**R**atio parandi olei Mastichini, quod fit ex Mastiche quæ Lētisci re-  
sina est, rectius doctorū hominū iudicio cū alābico vitreo pareretur.

## Vnguentorum compositio.

### CAP. XL.

### NOMENCLATURA.

Gr. Σύνθεσις μνρωρ. Lat. Vnguentorum compositio. Ita. la compositione de gli unguenti. Galli &  
Officinæ, hæc si præparant, nomi-  
na vt lubuit imponunt.

**D**E ratione Vnguentorum consequenter tractandū existi-  
mauimus, quando quidem ea in nonnullis corporū utijs,  
ant



aut medicamentis mista, aut corpori persusa, aut naribus obiecta, plurimum prosunt. In quorum probationibus consulere nares oportet, an ea oleant, ex quibus temperantur. Optimum huiusmodi iudicium: quod in quibusdam planè observari non potest, propter ea, quæ admiscuntur, odore cæteris prævalentia: ut in Amaracino & Crocino, Telino, & plerisque alijs, quæ crebra circa hæc meditatione experiri conveniet.

**D**ioscorides ab hoc capite xl. ad lxxvj. de Unguentis tractat, non illis plagiarijs, sed odoratis, quæ planè nihil aliud sunt quàm olea, materia cuiuspiam aromatica permixta: Olea vero simpliciter cum dicit, Oleum è fructibus & seminibus arborum expressum intelligit, sine alterius mixture olei.

## Rosaceum. CAP. XLI.

### NOMENCLATURA

Gr. Ρόσιον. Lat. Rosaceum. Ita. l'Vnguento Rosado.

**R**osaceum sic fit: Iunci odorati quinque libras & bessem tundito, & subactas aqua in viginti olei libris & quincunce subinde mouenda, coquito: dumq; percolaueris, in olei libras viginti, & quincuncem, adijcito Rosas non madesactas numero mille, & manibus melle perunctis identidem moueto: interdiu premens, finito nocte tota macerari, postea exprimito: et ubi recrementu pessum ierit, mutato uase, in craterem melle illitum recondito. Cæterum Rosas quæ antea pressæ fuerunt, in labelum demittito, & affusis octo libris & quadrante spissati olei, iterum premito, eritq; secundarium oleum. Quod si tertias usq; quartæ sue perfusiones infundens exprimere uoles, secundarium fiet, tertiarium, & quartarium unguentum. Sed quoties id feceris, uasa melle oblini debent. Si uerò secundam infusionem instituire libet, in expressum oleum, numero pari recentes Rosas, nullo humore imbutas injcito: manibus melle præmadesactis,

agi-



egitans premito: & iterum, tertio & quarto, simili modo exprimens facito, totiesq; recenteis Rosas detractis unguibus immittito: fiet enim ita oleum multo ualidius: nam septies oleum rosarum infusionem admittit, nec amplius. Prælum melle perungatur, oleum à succo diligenter secerni oportet, nam si minimū quid relinquatur, unguentum corrumpet. Alij autem detractis unguibus, Rosas tantum oleo macerant in sole, hoc modo: Rosæ quæ se libram pondere æquant, in sextario olei diebus octo marescunt, & usque tertiam perfusionem quadraginta diebus insolantur, & sic oleū reconditur. Alij Calamo, aut Aspalatho prius olei spissamenta faciunt. Alij coloris causa Anchusam admiscunt, & salem, quo minus oleat. Vim astringendi & refrigerandi obtinet, fomentis & cataplasmatibus utile. Potum soluit aluum, stomachi ardorem restringit, ulcera caua replet, & mulcet, quæ cacoëthe uocantur: ulceribus in capite manantibus, atque feruidis eruptionibus illinitur: caput dolens eo persunditur: dentes inter initia doloris collui prodest, ad genarum duritias illitum efficax est, ad laceßita interanea & concitatas uulnas utilissime subijcitur.

**V**nguentum Rosatum si probè fiat è præscriptione Mesue, nihilum cedit illi, quem Dioscorides ostendit. Nostras è Mesue, inflammationes sistit, congregat, confortat, spissat, & prohibet cursum materiae ad male affectos locos. Potum valet in dysenteriam. Vulneribus capitis prodest: mirum enim in modum caput firmat, & inflammationem inhibet.

## Elatinum. CAP. XLII.

### NOMENCLATURA.

Gr. Ελάτινον. Lat. Elatinum. Ita.  
Vnguento Elatino.

Fracta



**F**rac̃ta Elate tusa & scarificata, in labellum deijcitur: omphacinum oleum triduo infunditur, mox par sportulam exprimitur: uerum pares esse debent utriusque portiones, dein mundo uase ad usus reconditur. Viribus Rosaceo proportionē respondet, alium tamen non mollit.

**E**Latinum vnguentum antiquitus fiebat è carnosō dactylorum cortice, qui Elate Gracis dicitur. Quæ dictio quoniam etiam Abietem sonat, quidam etiam ex Abiet. parant Elatinum oleum, sed malè.

## Melinum. CAP. XLIII.

### NOMENCLATURA.

Gr. μέλινοϋ. Lat. Melinum. Ita. l' Vngueto Melino.

**M**elinum hoc modo temperatur: Olei congius, decem a-  
quæ sextarijs admiscetur. Adijcitur elatæ palmarum  
frac̃tæ quadrans, & Iunci odorati uncia, quæ die uno macerata  
coquuntur, mox in uas oris patuli oleum excolatur, & indita  
arundinacea crate, aut uetusta tegete, Cotonea mala superponun-  
tur, & uestimentis operta tâtisper inibi resident, dum malorum  
uires ad se oleum alliciat. Aliqui Cotonea, decem dierum spacio  
operimentis inuoluunt, ut contineatur odoris suauitas, nec eua-  
nescat: postea biduo macerata oleo exprimuntur, oleumq; recondi-  
tur. Id uim refrigeratorem & astringentem habet. Contra  
scabiosa ulcera & quæ serpunt, ac surfures, perniunculosq; ef-  
fectum præbet, exulceratis uuluis infunditur, citatam urinam  
sistit infusum, sudores cohibet: contra cantharidas, buprestim,  
pinorum erucas, bibitur. Laudatur maximè quòd Cotonea ma-  
la olet.

**M**elinum vnguentum fit cum Cotoneorum fructu probè maturo, in  
particulas conciso, tum in oleum omphacinum immisso, ac insolato  
cum bona succi portione, postremò in balneum Mariæ infuso, iterata ut  
docti sciunt, infusione.

Oenanthini



## Oenanthini compositio. CAP.

## XLIII.

## NOMENCLATURA.

Gr. Οινανθίνου. Lat. Oenanthinum. Ita.

l'Vnguento Enanthino.

**O** Enanthe è Labrusca, optimè olens postquam emarcuit, dielecta in Omphacinum oleū mouetur, uoluiturq̃, & cum biduo manserit, exprimitur, & reconditur. Astringit, proximum rosaceo effectū prabens: sed aliū non resoluit, aut molli. Probatissimum est quod odore Oenanthem refert.

**I**D quamuis non paretur, ipsa tamen verba satis ostendunt, quæ è re, parari debeat. Nam vires non desunt.

## Telini cōponēdi ratio. CAP. XLV.

## NOMENCLATURA.

Gr. Τήλινου. Lat. Telinum. Ital.

l'Vnguento Telino.

**F**oenigræci libræ quinq̃, calami libra una, cypiri libræ duæ olei libris nouem, septenis diebus macerantur, quotidie ter mouentur, postea præmuntur, & reponuntur. Aliqui pro Calamo Cardamomū substituunt, & Cypiri loco Xylobalsamū macerant. Alij oleo antea his odoribus spissato, Fœnumgracis macerantes exprimunt. Hoc Telinum abscessus emollit, & conroquit, omnibus uuluarum duritijs magnoperè conuenit, scemini difficile parientibus subijcitur, ubi præ excretis humoribus loci siccitatem contraxerunt, sedis inflammationes lenit, tenes-

d mo



mo subditum prodest, ulcera capitis manantia surfuresq; expurgat, ambustis & perionibus addita cera proficit, uitia cutis in facie emendat, pigmentis ad conciliandum faciei nitorem inseritur. Eligi oportet recens, quod non uehementer Fœnigraci odorem præ se ferat, & manus abstergat, sapore ex dulci in amarum inclinato: tale enim optimum indicatur.

**T**elinum seu Fenugracinum unguetum vulgò è Fenigraci semine Oleo incocto, vel ad solem macerato, paratur. Qui sit ut vires cū Dioscoridis Telino non respondeant, Nam aromatum ut in horum plerisque omnibus spectus est usus.

### Sampsuchini compositio.

#### C A P. X L V I.

#### N O M E N C L A T V R A.

Gr. Σαμψύχινον. Lat. Sampsuchinum.

Ital. l' Unguento del Sansucco.

**S**Erpylli, Casia, Abrotani, florū Sisymbrij, frondium Myrti, Sampsuchi, singulae portiones quadā pro uiribus ipsorum coniectione, unā tunduntur, atque is omphacini olei modus adijcitur, qui madentium uires non euincat. hæc post quadriduū exprimuntur: denuò noua alia, simili mensura & equali tempore macerata premuntur, ita enim ualidius reddi solet. Eligi oportet Sampsuchum colore ex atro uiridi, plurimum redolens, mediocriter acre. Vim habet acrem, cascatoriam, extenuantē. Aduersus uulnæ præclusiones, conuersionesq; efficax est, menses & secundas & partus extrahit, uulnæ strangulatus recreat lumborum inguinumq; dolores lenit, sed cum melle uti eo præstat, quandoquidem uehementi astrictione locos indurat: lassitudines illitum discutit: in opisthotonicorum, uulforumq; catoplasmata utilissimè additur.

Ama



**A** Maracus Galeno, & Paulo, non ille est Amaracus, quem Theophrastus, Dioscorides & Plinius Sampsuchum vocant, sed Mariū Quod vero diuersis Dioscorides tractauit capitulis de vnguento Sampsuchino, & de vnguento Amaracino, id duabus rationibus motus effecit. Prima fuit. Si Amaracini & Sampsuchini compositiones conferas, longè pretiosiorē & odoratiorem iudicabis Amaracinum: & idcirco vt eius excellentiam separatim notam faceret, separatim etiam assignauit caput. & Amaracinum vocauit. Secunda, Sampsuchum (vt patet è proprio in tertio libro capite) Amaracum dicitur Cixici, vnde electissimum hoc vnguentum exportatur, & quod optime Cixicini id suum componant Amaracinum, nomē Dioscorides mutare noluit, quod è Cixico retulerat.

## Ocimini compositio. CAP. XLVII.

### NOMENCLATURA.

Gr. *Οκίμινον*. Lat. *Ocimum*. Ital.

*Vnguento del Basilico.*

**O** Ciminum oleum fit ut Cyprinum. Ocimi folia decerpta librarum undecim & beßis pondo, die noctuq; viginti olei libris macerato, premito, colato: cumque exhauseris qualulum, rursus parem olei modum fundito, & exprimito. Vocatur autem id secundarium, nam tertiæ perfusionis nō est capax. Deinde recens Ocimum equali pondere, ut in rosaceo diximus, rursus maceratur, & cum tanto temporis spacio maduerit, exprimitur, & oleum reconditur. Quod si in animo fuerit ter aut quater madesacere, semper Ocimum recens addes. Potest ex omphacino confici, sed illo modo melius, Idem quod Sampsuchinum potest, sed inefficacius.

## Abrotonini compositio.

### CAP. XLVIII.

### NOMENCLATURA.

Gr. *Αβροτονινον*. Lat. *Abrotoninum*. Ital.

*Vnguento dell' Abrotano,*

d

2

Olei



**O**lei Cyprini odoribus imbuti libris nouē & quincunce, foliorum Abrotoni libras octo die noctuq; madefactas, premito. Quod si in longum tempus oleum uelis asseruari, eie-  
ctis prioribus folijs, noua appones, & macerata exprimes. Cal-  
facit, ad uluæ duritias præclusionesq; efficax est, menstrua &  
secundas pellit.

### Anethi compositio.

#### C A P. XLIX.

#### NOMENCLATURA.

Gr. *Ανηθινον*. Lat. *Anethinum*. Ita.

Vnguento dell' Anetho.

**O**lei libris octo & dodrante, florum Anethi libras un-  
decim & bessē, maceratas in oleo die una, manibus  
premito, & recondito: quod si iterum persundere uelis, recentes  
Anethi flores cōsimiliter madefacito. Vuluarum duritias emol-  
lit, uenarum spiracula laxat, contra horrores febrū circuitu re-  
deuntes auxiliatur. Calfacit enim, & lassitudines discutit, pro-  
dest articulorum doloribus.

### Susinum. C A P. L.

#### NOMENCLATURA.

Gr. *Σουσινον*. Lat. *Susinum*. Ital.

Vnguento de i Gigli.

**S**usinum, quod alij Lilinum appellant, sic temperatur: Olei  
libræ nouem cum quincunce, Calami libræ quinq; & qua-  
drans, Myrrha uncia quinq;, permixto odorifero uino decoquū-  
tur, & colato oleo, cardamomi tusi & cælesti aqua madefacti  
libræ tres & semis macerantur: premunturq;, tres libræ cum se-  
mis spissati olei: assumuntur mille Lilia decerptis folijs in latū nō  
tamen



eamē pfundūt, labellū demit untur: iniectū oleū, manibus melle perunctis agitatur: die noctuq, cōquiescunt, & in pyxidem matutinis exprimuntur, quod defluet oleum, protinus ab aqua, quæ simul expressa fuerat, colo incerni oportet (non enim, ut rosaceū moram tolerat, nam concalfactum feruet & comprutescit: quare sepius decapulandum) uasa melle illinenda, tenuis sal inspar-gendus, & si qua sordes uasis faucibus hæsit, eximenda. Odo-ramentis iam expressis ex quasilo in labellum transfusis, rursus oleis prius odoribus imbuendi, quod primum pondus æquet, & Cardamomi tusi drachmæ decem conijciuntur. Hac manibus scite pressa, interiecta breui mora exprimuntur: quod profluit, repurgatur. Tertio eadem infunduntur, adiecta Cardamomo & sale, & manibus malle madefactis. Longè optimū: erit, qđ prius exprimūtur secūdū qđ sequitur: tertiū locū sibi uendicat qđ nouissimū p̄dit. Denuò in mille Lilia euulsis folijs expressum pri-mò oleum infunditur: tum eadē ratione proseguendum, idemq, fa-ciendū ut prius, addito Cardamomo, dein expresso, & quo fre-quētius recētia Lilia maceraueris, eò unguentū ualidius efficies. Deniq, cum factū abūdē uidebitur, singulis cōpositionibus misce-re conuenit Myrrhæ quam optimæ duas & septuaginta drach-mas, & Croci decē, Cardamomi quinque & septuaginta: Cro-ci uerò & Cinnamomi pares portiones tunduntur, & cribra-tæ in lutrem cum aqua demittuntur, expressumq, primò un-guentum infunditur, & paulò pōst excipiuntur uasculis zccis, Myrrha aut gummi antea perfusis, & Croco, melle & aqua madefactis. Eadem sunt in altera aut tertia expressione. Ali-qui simplex ex Balanino, alioue oleo, & Lilijs componunt. Op-timum esse constat in Phœnice, mox Aegypto factum. Sed cum primis laudatur quod Lilia redolet. Excalfacit, emollit, uuln-æ præclusiones, & collectiones apperit, utilissimum ad muliebria mala: ulcera in capite manantia, feruidas eruptiones, uaros, fur-



furesq; emendant, uibices cicatricesq; celerrimè ad colorem reducit, ita ut sæpe fallant. In summa extenuat, potum bilem per aluum extrahit, urinam ciet: sed stomacho alienum est, & nauseam parit.

Annotatio in Cap. xlvij. xlvij. xlvij. l.

**C**Lara sunt hæ compositiones, nec minus Officinarum parandi modus, licet multo inefficacior: viderint secreti iudicij medici, ut in his priuatim utantur.

## Narcissinum, C A P. L I.

### NOMENCLATURA.

Gr. Ναρκίσσινον. Lat. Narcissinum.

Ital. l'Unguento del Narcisso.

**N**arcissini olei spissamenta ita fiunt: sex libræ Asphalathi cum sextante tunduntur, olei eloti libræ septuaginta cum uncijs quinq; assumuntur. Asphalathus aqua madefactus in tertia olei parte coquitur, quo exempto, Calamus quinq; libris & besse adyicitur, cum Myrrhæ gleba contunditur, cribrataq; ac uino ueteri odorato immista decoquitur: simulac autem cum ijs efferbuerit, eximitur: refrigeratum oleum excolatur, eius portio in labellum mittitur, flores Narcissi quamplurimi conyiciuntur, qui bidui spacio (ut in Susino dictum est) permoti exprimuntur. Oleum subiude decapulandum, siquidem celerrimè putredinem sentit. Valet hoc ad emolliendas uulnæ duritias præclusionesq; sed capitis dolores facit.

**I**n quibusdam Dioscoridis codicibus habetur, Aspalathum solum coquendum cum tertia olei parte. Superfluum sane esset septuaginta libras olei desumere, & postea tertia tantum parte uti, nisi dicamus, Aspalathum cum tertia olei parte concoctum, spissamentum esse primum & præcipuum unguenti Narcissini tum secundæ olei partem inspissari Calamo & myrrha. Postremò spissamentum tertium fieri, cum Narcissi floribus ex tertia tertia Olei parte, quod Græca attente legenti satis declarat. Νάρκισσινον, non ad specierum tantum illam in labello confusionem referuntur, sed ad totam compositionem.

Croci



## Crocinum. CAP. LII.

## NOMENCLATURA.

Gr. Κρόκινον. Lat. Crocinum. Ita.

l'Vnguento del Zaffarano.

**C**um Crocinū cōponere uoles, prius olei (ut in Susino dixi-  
mus) spissamēta facies eisdē pōderibus & mēsuris, cuius  
olei libras treis & semissē, Croci uncia unā assumes, idētidē quo-  
tidie moueto, & sexta die quā hoc assiduo peregeris oleū à Cro-  
co colis incernito: eidē Croco parē olei modū adycito, moue tri-  
duo, dein cōtusa Myrrhæ atq; cribrata drachmas quadraginta  
permisceto, & in pilo agitatū reconditio. Aliqui oleo aromati-  
bus ad Cyprinū imbuto in Croci cōpositione utūtur. Optimū est  
qđ abūdē Crocū spirat, in medēdi usu expetitū. Proximū quod  
Myrrhā refert. Calfacit, somnū allicit: quare per sepe phreniti-  
cis: subuenit, persusum, aut naribus admotum, aut illitum pus  
mouet, ulcera purgat, contra uulua duritias atque præclusio-  
nes, & ulcera quæ cacoëthe uocantur, pdest, cū Croco, cera, me-  
dulla, duplicato olei pōdere: cōcoquit enim, emollit, humeclat &  
permulcet, Ad oculorū glaucitates ex aqua illinitur. Huic au-  
tē proportionē respōdet Butyrinū, onychinū & Styracinū, quæ  
& si nominibus distant, uiribus & cōpositione cognata sunt.

## Cyprini spissamētum. CAP. LIII.

## NOMENCLATURA.

Gr. Κυπρίνον σύψις. Lat. Cyprini spissamentū. Ital.

l'Vnguento Ligustrino.

**O**lei Omphacini eloti pars una, aquæ cœlestis tantundem  
cū semisse, cuius una parte oleū diluitur, altera adiciēdis  
odoramentis admiscetur, dein assumptis Asphalathi libris quin-  
q; & semisse, calami libris sex & semisse myrrhæ libra una car-  
damo



damomi libris tribus & drorante, olei libris nouem, & uncis quinque. Asphalathus tusus & aqua affusus decoquitur in oleo, donec conferuescat: Myrrha autem uino uetere odorifero subacta contususq; simul Calamus digeruntur in offulas quæ ex æpto Asphalatho immittuntur, & ubi efferbuerint, sublato atheno, oleum percolatur. Cardamomum tustum reliqua aqua aspersum insnuatur, spatha agitur, nulla, dum refrigerit, interpellatione. Post hæc colato oleo, in uiginti octo libras olei, floris Ligustri, quod cyprium uocant, sex & quadraginta libræ cum besse instillantur, quæ sufficienter madefactæ per sportulam exprimuntur. Quod si copiosius desideretur, idem recentium florum pondus iniectum, simili modo prematur, & iterum aut tertio, si quis uelit, madefacere poterit, & ita reddetur efficacius. Eligi oportet bonum, quod cum odoris suauitate nares feriat. Aliqui Cinnamomum addunt. Calfacit, emollit, ora uenarum adaperit, uulua neruorumq; uitis conuenit: pleuriticis, fractisq; per se, uel cerato immistum: malagmatis imponi solet, quæ opisthotonicis: angina laborantibus, inflammationiq; inguinum opitulantur: item in acopa adijcitur.

### Irini spissamentum. CAP. LIIII.

#### NOMENCLATURA.

Gr. Ἰρίνου σπύσις. Lat. Irini spissamentum.

Ital. Vnguento Irino..

**S**patha quàm minutissime cōtusa sex libras cū besse, in tribus & septuaginta libris & quincunce olei, æreo uase, additis decem aquæ hæminis incoquito, quoad odorẽ acceperit: postea in capulam melle oblitam colato: ex eo aromatibus imbuto oleo, Irinum primo temperatur, Iride ex oleo inspissato macerata, ut scripsimus. Sed alia est componendi ratio: In olei septuaginta libris & quincunce, Xylobalsami, ut dictum est, con-

tusi



usi, libras, quinque & sextantem excoquito: postea detracto Xylobalsamo: nouē libras & dextantē adjcito, & Myrrhae glebam uetere uino odorato persusam, & in olei ita odori- bus imbuti quatuordecim libris, totidem tusæ Iridis, binis die- bus ac noctibus madefacito, strenuē & uehementer adstringi- o. Quod si uis ualidius fieri, par pondus iterum ac tertio simili- er maceratum exprimito. Longe optimum est quod solam Irin- olet, quale est in Perga Pamphiliæ, & Elide Achaia natum. Irim habet calfactoriam atque emollientē, crustas adimit, sordi- da ulcera & putrida purgat, confert fæminis uulua causarijs, item inflammationibus eiusdem atque præclusionibus, partus- ricit, hæmorrhoidas recludit, cōtra auriū sonitus ex aceto, Ruta & amaris nucibus, prodest, diuturnis destillationibus, naribus- llitum, & contra graueolentia earum ulcera, quas ozenas uo- ant, auxiliatur, aluum purgat cyathus epotus, facit ad ilei cru- iatus, urinam mouet, difficileis uomitiones adiuuat, perunclis- o digitis & immisissis, uel ijs quæ ad uomitum ciendum indun- ur, anginae etiam illinitur, aut ex aqua mulsa gargarizatur: item contra arteria scabritiem datur ijs, qui Cicutā, Coriandrū, aut uenena fungorum hauserunt.

### Annotatio in CAP. LII. LIII. LIIII.

**A**perta sunt quæ de Crocino & Ligustrino tradit Dioscorides, & hoc modo preparari poterant, pharmacopola tritam sequuntur se- nitam. Cum tamen de Iride præcipit Dioscorides, radicem intelligit, non florē, nempe qui ingratum odorem aspiret, cuius contrarium repperi- tur in radice. Quod uero optimum Irimū fieri tradit in Elide Achaia, non Achaia legendum, sed Arcadiae. Elidem enim cosinographi, non in Achaia, sed in Arcadiam referunt.

### Gleucinum. CAP. LV.

#### NOMENCLATURA.

Gr. γλεῦκινον. Lat. Gleucinum. Lat.

Unguento Musteo.

d s

Gleu-



**G** Leucinū absolute constat omphacino oleo, Iunco odorato, Calamo, celtica Nardo, Spatha, Aspalatho, Sertula Cāpana, Costo, & musto: circumdatis interim uinaceis uasi, quod aromata, uinum & oleum conceperat. Tricenis diebus, bis in die mouetur, postea expressum oleum reconditur. Calfacit, emollit, remittit: horroribus & neruorum uuluaq; uitijs auxiliatur, omni acopo iuuantius, quippe quod emolliat.

**T** *Λικνίς*, quod Græcis Mustum significat, huic vnguento nomen dedit, in cuius tradenda facultate diuersum sapiunt, hinc Columella et Plinius: inde Dioscorides & Galenus. Quorum hū frigus, isti calorem inducere iudicent. Sed Galenus, qui vinacea lento igni decoquit, non am-  
plo fumario, idem sentire quod Dioscorides videtur.

## Amaricinum. CAP. LVI.

### NOMENCLATURA.

Gr. *Αμαρίνιον*. Lat. *Amaracinum*. Ita.

*l' Vnguento Amaricino.*

**A** Maracinum longe optimum in Cyzico fieri solet ex omphacino & Balanino, spissamētis è Xylobalsamo, Iunco odorato, et Calamo factis, conditisq; Amaraci, Costi, Amomi, Nardi, Casia, Carpobalsami et Myrrha odoribus. Aliqui, quod preciosius fiat, Cinnamomum addunt. Mel autem & uinū assumuntur: hoc in uasorum illitionem, illud ad cogendas tuorum aromatum offas. Amaracinum calfacit, soporem mouet, uenarum spiracula aperit, emollit, feruorem excitat, urinam cit, putrilaginibus ac fistulis per quā utile: nec non humentibus hernijs, postquam medica manus operam suam impenderit: crustas, & tetra ulcera, quæ theriomata uocant, rumpit: difficili urina, illita sede, & eius inflammationibus auxiliatur: hæmorrhoidas illitu soluit, uulua subditum menstruos cursus euocat, duritias, ac uulua tumores discutit, uulneratis neruis, musculis confert, laneo centunculo modicè madefactum & impositum.

*Supra*



**S**upra in Sampsuchino diximus quæ res Dioscoridem mouerit ut se-  
paratim tractaret de Amaracino & Sampsuchino vnguentis. Tra-  
ctat Galenus sui temporis vnguentarios cum Amaracinam Cixici compo-  
sitionem vellent imitari, Amaraci loco, Marum quo magis aspiraret in-  
miscuisse, se vero cum Amaraco parasse, in qua ut odoris minus, ita vir-  
tuti nihil diminutum.

## Megalinum. CAP. LVII.

### NOMENCLATURA.

Græ. Μεγαλειον. Lat. Megalinum. Ita.

Vnguento Megalino.

**F**acilitabatur olim Megalinum, sed nunc compositio exole-  
uit & prorsus oblitterata est. Cuius ad historia complemen-  
tum meminisse non fuit alienum. Mistura cum Amaracino eadē  
erat, sed resina exuperabat, hac tantum ratione differens. Qua-  
leuiter emollit. Resina unguētis, neque tutela neque volupta-  
tis gratia adijcitur, sed coloris crassamentiq; causa. Ea tantisper  
quiritur, dum desinat olere: cuius coquendæ ratio declarabitur,  
cum de resina differemus.

**H**oc hodiè non conficitur, & desierat fieri Dioscoridis tem-  
pore.

## Hedychroum. CAP. LVIII.

### NOMENCLATURA.

Gr. Ἡδύχρον. Lat. Hedychroum. Ita.

Vnguento Hedichroo.

**Q**uod Hedychroon uocāt, in Co fieri solet: eisdē præditū  
uiribus et misturis, quibus amaracinū, sed suauius spirat.

**E**st Hedychroon vnguentum cuius compositionem hic tacet Dio-  
scorides. Nostro etiā tēpore nō præparatur. Sunt etiam Hedychroi pa-  
ulli, qui ingrediuntur Theriacen Andromachi, & quorum conficiendo  
rationem tradit Galenus in libro de Antidotis.

## Metopium. CAP. LIX.

### NOMENCLATURA.

Græ.



Græ. Μετωπίον. Lat. Metopium. Ita.

℞ Unguento Metopio.

**F**it in Aegypto unguentum, quod Metopion patrio nomine appellatur, propter Galbani missionem: nam lignū in quo Galbanum enascitur, Metopion uocat: constat amaris nucibus, omphacino oleo, Cardamomo, odorato Iunco, Calamo, melle, uino, Myrrha, Balsami semine, Galbano & resina: probatur pingue, graui odore, quod magis Cardamomum & Myrrham, quam Galbanum respiciat: Calfacit uehementer, & adurit, atq; extrahit, ora uenarum aperit, ulcera purgat, extrahitq; ad precisos nervos, & musculos, ad hernias humore contractas, cum erodentibus medicamentis efficax est: ceratis & malagmatis inseritur: horroribus, conuulsisq; præsertim quibus cernix in scapulas deiecta, & retrorsum contracta est, utile habetur: sudores ciet, uulvæ spiracula recludit, & eiusdem duritias laxat: in summa, moliendi naturam habet.

## Mendesium. CAP. LX.

### NOMENCLATURA.

Græ. Μενδύσιον. Lat. Mendesium. Ita.

℞ Unguento Mendesio.

**M**endesium constat Balalino oleo, Myrrha, Casia, & resina. Aliqui tamen post singulorum pondera, Cinnamonum exiguum addunt, nullo compendio: nam quæ simul excocta non fuere, uim nullam exhibent. Similem Metopio uim obtinet, sed inferiorem multo.

Annotatio in Cap. lix. & lx.

**H**æc duo præcedentia capita, satis clara sunt, & in his satissimè se ipsum exponit Dioscorides. Non consciuntur in Europa.

## Staete. CAP. LXI.

### NOMENCLATURA.

Græ.



Græ. ΣΤΑΚΤΗ. Lat. Staete. Ita. Statte.

Storace liquida. Off. Styrax liquida.

**S**taete uocatur pinguitudo recentis Myrrhae, cum exigua aqua tusa, & Origano expressa. Ea perquam odorata, ac preciosa est: atque unguentum per se facit, quod Staete nominatur. Maxime probatur quæ nullam olei mistionem admisit, cuius minima portio compos est uirium plurimarum. Vim calfactoriam Myrrhae & calidis unguentis respondentem habet.

**G**raphice pingit Dioscorides quid sit Staete, ut non alio opus sit sermone. Differunt tamen Styrax liquida, & Staete, siquidem diuerse sunt arbores, Styrax & Mirrha. Staete est receti Myrrha in aqua resoluitur. Styrax liquida, est Styrace Calamita antea oleo & resina imbuta exprimitur. Myrrha recentis inopia, Staetes itidem penuriam parit. Affertur ex Oriente, sed parum sincera. E selectissima tamen Myrrha fieri potest.

## Cinnamominum. CAP. LXII.

### NOMENCLATURA.

Græ. Κινναμόμινον. Lat. Cinnamominum.

Ita. Vnguento del Cinnamo.

**C**innamominum confit est Balanino oleo, & Xylobalsami, Iunci odorati spissamentis, atque Cinnamomi, & seminis Balsamini suauitate conditur, quadruplaque Myrrha ad Cinnamomum portione, mel ad cogenda omnia adyicitur. Laudatur non acre, molli odore, plane Myrrham redolens, crassum, odoratum, gustu perquam amaro. Id non est resina, sed Myrrha, crassitudinem obtinuit: resina enim neque amaritudinem præbet, neque ullam odoris gratiam adyicit. Vim habet admodum acrem, amaram, & calfacientem. Itaque ora uenarum aperit, calfacit, discutit, diffundit, humores et spiritus attrahit, caput aggrauat, contra uulnæ uitia cum duplo oleo, cera, & medulla efficax est. Ita enim ferè multum acrimonia exolefcit, & quedam emolliendi



liendi vis contrahitur, alioqui adurit, & præ omnibus crassis unguentis indurat. Facit mirum in modum ad fistulas & ulcera, quæ putredinis uitium senserunt: item ad hernias humidiores, carbunculos, febrium horrores, tremores, gangrenasq; cum Cardamomo: aduersus serpentium morsus illinitur, scorpionum & phalangiorum ictibus cum tritis grossis imponitur.

### Nardinum. CAP. LXIII.

#### NOMENCLATURA.

Gr. Νάρδιον μύρον. Lat. Nardinum unguentum. Ita. Unguento del Nardo.

**R**atio Nardini faciendi uariat. Nā aut Malabathrino folio, aut sine eo fit: plerunq; autem Balanino oleo, aut omphacino, Iuncus odoratus spissamenti gratia adycitur: sicuti propter odoris suauitatē, Costus, Amomum, Nardū, Myrrha, Balsamū. Laudatur tenue, non acre, Nardi arida aut Amomi odorem referens. Vis ei extenuans, acris: expurgat, excalfacit, absterget humores, rarefacit. Hoc liquidum est, nec habet strigmenti crassitudinem, nisi resinam recipiat. Fit etiam simplex ex omphacino oleo, Iunco, Calamo, Costo & Nardo.

### Malabathrinum. CAP. LXIIII.

#### NOMENCLATURA.

Gr. Μαλαβάθριον. Lat. Malabathrinum. Ita. l' Unguento Malabathrino.

**M**alabathrinū spissamēta Nardini habet, insuper Myrrhæ plusculum additur: qua de causa calfacit, Crocino, aut Amaricino uiribus respondens.

### Iasminum. CAP. LXV.

#### NOMENCLATURA.

Hoc caput non est in Græco codice.

apud



**A** pud Persas fit, quod Iasminum cognominatur, ex albis floribus Viola: quorum sextans, in Italicum sextarium Se-  
samini olei demittitur, uiolis, ut in Lilino diximus, uicissim per-  
mutatis. Apud Persas inter epulandum usurpatur odoris causa.  
Nam toti corpori conuenit, praesertim cum in balneas descensum  
est. Sed his opitulatur corporibus, quae calfactionem, laxatio-  
nemque desiderant, grauius enim spirat, quam ut libenter à ple-  
risque recipiatur.

**T** Rium praecedentium capitum confectiones clarae sunt. Porro lv.  
cap. cui titulus Iasminum vnguentum, in nouissimè editis exem-  
plaribus graecis non habetur. Quidam cum floribus quos Iosseminos vo-  
cant conficiunt. Quod non esse è mente Dioscoridis facile (siquidem hoc  
caput non adiectitium est) cum Matthiolo concesserim. Iasminum Grae-  
cis, Violatum Latinis redditur. A tenim de his Violis intelligendum, quae  
Arabice Keiri dicuntur. Porro radices, caulis, longitudo, densitas, rami,  
folia, & pleraque aliae partes Iosseminorum longe absunt a Violarum  
albarum deliniatione.

## Myrrha. CAP. LXVI.

### NOMENCLATURA.

Gr. *Σύμυρα*. Lat. & Off. *Myrrha*. Ita. *La*  
*Myrrha*. Gal. *la Myrrhe*. Ger. *Mirtzen*.

**M** Yrrha lachryma est arboris, quae in Arabia gignitur,  
Aegyptiae spinæ non dissimilis: è cuius uulnere defluit la-  
chryma in subiectas tegetes: alia circum caudicem concrefcit. Di-  
citur ex his aliqua *Pediasimos*, praepinguis, qua expressa, stacte  
emittitur: alia *Gabirea* pinguisima, leto & pingui solo nascens,  
ea copiosam sudat stactem. Omnium prima est quae *Trogloditica*  
appellatur, accepto cognomine à loco, in quo prouenit, splendens,  
subuiridis, ac mordens. Quinetiã legitur tenuis quaedam, quae à  
*Trogloditica* secunda est, *Bdellij* modo mollis, uerum odore gra-  
uifcula, apricis nascens. Alia *Caucalis* cognominatur, praeter  
modum exoleta, nigra, & retorrída. Omnium deterrima quae  
Erga-



*Ergasima* dicitur: pingui carēs, cano situ obducta, acris, ad gummi imaginē uergēs, & uiribus eius proxima, improbatur *Ami*nea cognomine. Ex ijs pastilli fiunt, sed ē pinguibus, pingues, & odorati: ē siccioribus, haud quaquam pingues, & inodorati: minus odore pollet, quā oleum non admisit, cum in pastillos digerebatur. Adulteratur macerato gummi aqua, in qua *Myrrha* maduerit. Eligenda est recens, squalore obsita, leuis, undique cōcolor, quā confracta uenas unguium modo candidas & leues ostendat, minutis glebis, amara, acris, odorata, calfaciens: super uacua & inutilis est ponderosa, coloris picei. Calfacit, cohibet, soporem gignit, glutinat, siccāt, astringit, uulnam emollit, & praeclusam aperit, menses & partus celeriter extrahit, cum *Absinthio*, *Lupinorum* cremore, uel succo *Rutae* admota: tuberculo *Fabae* deuoratur in uetere tussi, orthopnoea, in laterū pectorisq; doloribus, in alui profluuio, & dysenteria: horrores discutit, duabus horis ante februm accessiones, faba magnitudine pota cum *Pipere* & aqua: subdita linguae liquataq; scabritiem arteriae expolit, obtusam uocem expedit, uentris tineas enecat: contra grauem oris halitum manditur, & aduersus alarum tadia, cum liquido alumine illinitur: gingiuas & dentes stabilis: colluto cum uino & oleo ore: uulnera capitis illitu glutinat: medetur fractis auribus, ac ossibus nudatis, peruncta cum cochleae carnibus: itē purulentis auribus inflammatisq; cum *Meconio*, *Castorio*, & *Glaucio*: ad uaros autem cum casia & melle illinitur: impetigines ex aceto purgat: defluentes capillos cum *Ladano* & uino myrteo illita, firmat: diuturnas destillationes lenit, illitis penna naribus: oculorum ulcera complet, albugines tollit, caliginem discutit, scabritiem lenigat. Fit ē *Myrrha*, perinde atque thure, fuligo, & ut postea ostendemus, ad eadem conueniens. *Bæotica* *Myrrha*, dissecta radix est arboris cuiusdam in *Bæotia* nascentis. Melior est quā *Myrrham* odore representat: uis ei calfa-

Eloria



Toria inest: emollit, discutitq; suffimentis commodissime inseritur.

**M**Yrrha selectissima pauca adeo quantitate ad nos affertur, ut monilis potius sit vice, quam aromatis. Vulgata hac Myrrha non Bdelium est, ut ei patebit qui caput de Bdellio Dioscoridis diligenter legerit, cuiusq; vulgare nostram Myrrham contulerit. Adulterabatur Myrrha Galeni tempore cum liquore Carpasi, arboris venenose & mortalis, quam ui ita preparatam (etiam Theriara immixta) sumpsisset, proculdubio noxiebatur. Caterum extrinsecus applicita multis malis vsui erat. Vileant pharmacopola ut Myrrham seligant, Materia listaq; qua possunt purgeant, ut selectissimam Myrrham Alexandria comparent, ne inscientes remedij loco, venenum exhibeant. Arbor Myrrhe quinum est cubitorum altitudinis, non sine spinis caudice duro & intorto, crassiore quam thuris, cortice laui, similiq; Vnedoni, folio Oliue, sed crispiore & culeato. Myrrha excalfacit & desiccatur secundo ordine, amara est, & histerioria. Myrrha ubi deerit, Calamus odoratus substituetur. Lachrynam esse, Myrrham Bæoticam quæ è radice incognita nobis arboris distillet, satis liquet: at si plura dicere voluerimus, aut insomnia, aut mentis acia proferenda.

## Styrax. CAP. LXVII.

### NOMENCLATURA.

Gr. ΣΤΥΓΑΞ. Lat. Styrax. Ital. Lo stirace.

Offic. Storax Calamita.

**S**Tyrax lachryma est arboris malo Cotonæ similis. Præfertur sordescens, flavus, resinusus, & albicantibus grumis, quamplurimum in sua odoris gratia permanens: qui dum mollior, melleum liquorem reddit: qualis è Cataballis, Pisidia, & Cilicia deuehitur. Deterior niger, surfurosus, friabilis, canoq; si obductus. Caterum lachryma inuenitur gummiu similitudine, perlucida, & Myrrha æmula: uerum per pauca manat. Adulteratur ligni scobe, quam uermiculi erodentes excusserunt, melle, & iridis sedimento, & quibusdam alijs. Alij ceram aut adipem odoribus imbutum, flagrantissimis foliis cum Styace subigunt, & per laxa cribri foramina in frigida aqua uer-

c

mich



miculos exprimunt, uenūdantq̃. Styracem hunc, quoniā in uermiculorū specie cōtrahatur, Scolecitē cogmināt, quē tāquā synce rū imperiti approbāt, nō animaduertētes ad prācipuā odoris fragratiā, siquidē acer admodum est, qui adulterationis uitio caret Styrax calfacit, emollit, & cōcoquit. medetur tuſi, deſtillationibus, rauedini, grauedini, & interceptæ uoci, uulnæ præcluſæ duritiæ laborati cōuenit, cit mēſes potu appoſituq̃, aliū leuiter mollit: ſi exiguū cū reſina terebinthina catapotij modo deuoretur. Miſcetur utiliter diſcutiētibus malagmatis, acopiſq̃. Adole tur autē & igni torretur, ut fiat ex eo, uelut ex thure, fuligo, ad eadē cōueniens ad quæ Thuris fuligo: ex eo etiā in Syria Styra cinū oleum componitur, quod calfacit uehementer, & emollit: uerū caput dolore afficit, adgrauatq̃, & ſoporem adfert.

**S**tyrax in quibuſdā Aſiæ minoris tractibus prouenit. Calamita autē nomen duxit ē libro Galeni de Antidotis, Vbi ſimplicia recensens quæ intrant Theriacen, Styracem laudat ut præſtanti orem, quæ ē Pamphilia in iūcis afferretur: id anſam præbuit, ut Calamita nomen acciperet. Quod uero iuncea reliquis præſtaret, deinceps ſtatū medicis, ut Styraci ſemper Calamita nomen adiungerent, nimirum quod excellētiorē designarēt. Quod uero legitur in textu Dioſcoridis (Qualis eſt Catallis) legendum ē Plinio eſt (Qualis eſt Gabalites) qui dicat: Styracem naſci in Syria Iudea proxima, iuxta Gabala Marathunta, & in Seleucia mōte Caſſio. Pulueris in Styrace cauſa eſt uermiculi arborē exadētes.

## Bdellium. CAP. LXVIII.

### NOMENCLATURA.

Gr. Βδέλλιον. Lat. Bdellium. Ita. Bdellio. Res

Gal. incognita. Of. nomine utuntur Latino.

**B**dellium, alij Bolchō appellant: alij Madelcon: lachryma eſt Saranice arboris. Probatuſt guſtu amarum, tranſlucidum, taurini glutinis in morem, intus pingue liqueſcens facile, li gni ac ſordis expers, ſuffitu odoratum, ungui ſimile. Eſt etiam num Bdellij genus ſordidum, nigrum uberioribus glebis in offas

conuo



conuolutū, Aspalathi odore, ex India aduectum. Defertur etiā à Petra oppido siccum, resinosum, lineescens, sed facultate secundum. Adulteratur gūmi: sed ita uitiatū nō perinde gustui amaritudinem repræsentat, nec usque adeo suffitionibus odoratum calfacit & emollit duritias, & turgentia guttura, humiditas hernias discutit cū ieiuna salina dilutum, uulnæ spiracula laxat appositum & suffitu, & partus humiditates q̄ omneis extrahit: calculos potu cominuit, urinā mouet: et tuſſietibus, à serpēte percussis, utilissimè datur: ualet ad rupta, uulsa, laterum dolores, & discursantes spiritus: malagmatis inseritur, quæ contra duritias & neruorum nodos prosunt: contusum resoluitur affuso uino aut aqua calida.

**B** Dellij loco hætenus Myrrha deprauata uenit. Seplasijs rarum, & monile habēti, Siciliense Bdelliū (Neapolitanis Cefaglioni) Palmæ figuram, cubito nō amplius, altum. Tenerum & sapidum semen, pluribus septum inuolucris, edendo est.

## THVS. CAP. LXIX.

### NOMENCLATURA.

Gr. Λιβανος. Lat. Thus. Ital. Lucenso Off. Lat. nomine. Gal. Encens. Ger. Weirauch.

**T**hus in ea gignitur Arabia, quæ thurifera cognominatur. Primatum tenet in eo genere masculum, Stagonias appellatum, suapte natura rotundum: tale autem indiuiduum est candidum cum frangitur, intus pingue, in suffitu statim ardens, Indicum uerò fuluescit, & colore liuet, sed rotundum industria faciliat: nam in quadrangulares formas dissectum, fictilibus uersant, donec rotunditatem contrahat. Verum eiusmodi Thus tempore flauescit, quod Atomum, aut Syagrum appellant. Secundum locum habet Arabicum, & Similo nascens, quod aliqui Copiscum uocant, minus multo & fuluius. Est & ge-



nus aliud, cui *Amomita* cognomen est alioqui candidum: quod dū mollitur, mastiche more digitis cedit. Adulteratur in itinere Pini resina & gummi, quod facile deprehendi potest: siquidem suffitum gummi flammam non ei aculatur, & resina in fumum euanesceat, thus uero statim ardet: idem maleficium odor prodit. Ad calfaciendum & astringendum pollet, oculorum caliginem discutit, caua ulcera complet, & ad cicatricem perducit, cruenta uulnera glutinat, infrenatq; cunctas sanguinis eruptiones, etiamsi cerebri mēbris effluat: ulcera quæ cacoethe uocantur, & sedis & reliquarum partium permulcet tritum cum eo & lacte linamentum: formicantes uerrucas inter initia impiginesque ex aceto & pice illitum tollit, ambusta igni, permionēque cum suillo adipe aut anserino, & ulcera in capite manantia cum nitro si infricetur, sanat: paronychys cum melle, auribus fractis cū pice, medetur, ad reliquos aurium dolores cū dulci uino infunditur: instammata à partu mamma cum cimolia & rosaceo magna utilitate perungitur: additur ad arteriæ uiscerumq; medicamenta: prodest sanguinis excreationi potum: sed in secunda uale tudine haustum, insaniam mouet, & largius cum uino potum interficit. In fictili mundo Thus crematur, flagrante glebula succensum à lucerna, donec exuratur: post perfectā uestionem operire oportet: usque dum restringatur, sic enim in cineres non redigitur. Aliqui ollulam æneo uase cauo circa mediū perforato cingunt ad excipiendam fuliginem, ut in eius mentione mox ostendemus. Alij crudo fictili luto oblito, & in fornacem indito, cremant. Fistili etiam nouo uiuacibus prunis torretur dum non amplius bullet, aut pinguitudinē uaporē mue emittat: facile enim comminuitur quod perustum non est.

Thuris cortex. C A P. L X X.  
NOMENCLATURA.

Græ



Gr. φλοιὸς λιβάνης. Lat. & Off. *Thuris cortex.*

Ita. Cortesia dello incenso. Gal. l'Escorce de l'Encēs.

**P** *Resertur* *Thuris cortex* crassus, pinguis, odoratus, retens leuis, minimè scaber, siue membranis. Adulteratur admisto Pini aut nucis eius cortice, sed horum index ignis est: siquidē reliqui cortices suffiti nequaquam incenduntur, sed sine odore fumum eructant: *Thuris* uerò cortex ardet, & cum odoris fragrantia uaporem eiaculatur. *Thuris* modo writur, & uis eadē quæ *Thuri*, sed ualidior astringentiorq;. Quare potu cruentis ex creationibus, uuluis fluxione laborantibus, in pessō confert: ad cicatrices oculorum. & caua sordesq; efficax est: tostus scabris lipitudinibus auxiliatur.

## Manna thuris. CAP. LXXI.

### NOMENCLATURA.

Gr. μάνη λιβάνης. Lat. *Manna Thuris.*

Ital. *Manna dello incenso.*

**M** *anna Thuris* probatur candore, micarum frequentia, & puritate. Vim habet eandem quam & *Thus*, sed in ualidiusculam. Sunt qui cribrata Pini resina, ac polline, aut cortice *Thuris* contusi adulterant, sed hæc igne deprehenduntur. Neq; enim æquè suffitu aerium uaporem sed fuliginosum & impurum expuit, & permistum suaueolentiæ halitus uirus habet.

## Thuris fuligo. CAP. LXXII.

### NOMENCLATURA.

Gr. Αἰθάλη λιβανότης. Lat. *Thuris fuligo.*

Ital. *La fuligine dello incenso.*

**F** *uliginē Thuris* sic facito: Forcipiculæ, lucernis accensas singulatim *Thuris* glebas, innouā fictilē ollā cōcauā imposito, & æreo uase in medio perforato, deteresa diligenter sorde, obtegit: alterā admoneto, ex altera eius parte aut utraq;, subiectis



quaternū digitorū altitudine lapillis, quò facilius perspici queat, si uratur: & qua locus capax fuerit, glebularum alias supponito, & antea quam prorsus prior gleba restinguatur, aliam imponito: donec sufficiente fuligine uidearis coegisse: Cōtinuo tamen externæ aramenti partes spongia, aqua frigida madefacta, abstergantur: ita enim tēperato aris feruore, fuligo omnis inhaerebit, quæ aliò qui per leuitatē decidua, Thuris cineribus admiscetur. Derasa itaq; fuligine, cinis cremati Thuris seorsum substrahendus est. Idem opus, quoad satisfactū tibi uidebitur, obeundū. Oculorū inflammationes mitigat, fluxiones suspēdit, ulcera purgat, caua explet, carcinomata sistit. Simili modo è Myrrha, resina, styrace reliquisq; lachrymis fuligo excipit ad eadē cōueniēs.

#### Annotatio in Cap. lxi. lxx. lxxj. lxxij.

**T**Hus, Thuris cortex Thuris Māna, & Thuris fuligo ex vna eadē q; plāta pdeūt ac ideo nō alienū fuerit de his etiā simul tractare. Ac primo de ipso Thuris arbore, qui licet in Arabia sola nascatur, non vbiuis tamen, sed in medio ferē regni Sabeorū, vbi. Atramita habitat Solū id rubrū ē lacteo traditur, spectās ortus solis aestiui, vndiq; terra argillosa crustacea q; raris fontibus ac nitrosis per Mineos pximū pagū euehitur tramite angusto. Sole trecetā familie ius in Thura habēt, & ob id sacra vocātur, & cū arbore vulnerāt, nec sēminarū cōgressu nec funerū polluūtur. Duplex eius vindemia. Prior naturalisq; canis ortu flagrantissimis aestibus cortice qui pregnās & tenuissimū tēditur, laxato plaga: nō adēpto. Indē psilit spuma pinguis, q; cōcreta dēsatur, vbi loci natura poscit tegete palmea excipiente. aliubi area circūpauita, purius illo modo, sed hoc pōderosius. Quod hās in arbore ferro depectitur ideo cortico sum. Saucias arbores nemo custodit. Cōtrā, Alexādria vbi Thus rude interpollatur renouaturq; nihil tutū à fure. Autūno quoq; legitur partu aestiuo, hoc purissimū & calidū, Carpheotū vocāt. Sequēs vindemia verna, incisis per hyemē arboribus: rufum hoc exit, nec cōparādū priori dathiatum appellant. Quod ex eo rutūditate gutta pepēdit, masculū vocatur, cū fere aliās nō vocetur mas, vbi nō sit sēmina. Religioni tributū, nē alter sexus vsurpetur. Masculū putāt à specie testiūdictū. Præcipua gratia māmoso cū inhaeret lachrymā priore cōsecuta aliā sē miscuit Singula hæc manū implebāt, cū tardius depecteretur. Græci hoc modo

Sta



Stagoniā & Atomū Thus vocant, minores guttas Orobiū appellāt. Mācas concusū elisas Mānā vocamus. In insulis etiam Thus nasci perhibet. Dioscorides, recētiore addunt nebulosas esse insulas ac morbidas, atq; adeo in has ablegari fontes, quò citius pereāt, nec mercatores à cōtagio innoxios si ppius acceſserint. Thuris cortex cū lachryma arefacta depectitur, & cū Thure affertur. Valētius quā Thus ipsum, astringit & desiccat. Quid sit Māna Thuris superius (è Plinio) diximus. si quis rudius malit, puluisculus est & pollē masculi Thuris qui dū inuicē atteruntur grumi, resoluitur. Māna illa solutua rosicidus est è cælo feruētissimis ut plurimū, diebus nocte decedens humor, nunc in grumos coactus, nūc in mel eliquatus, ut cognata cū cælo erūt supra quā ceciderit. De fuligine Thuris plura dicere superflū sit, ipse enim sibi interpres est Dioscorides.

## Picea & Pinus. CAP. LXXIII.

### NOMENCLATURA.

Gr. Πίτυς. Lat. Pinus & Picea. Ita. Il Pezzo & il Pino. Off. Pineæ. Gal. Pin & Pesse.  
Ger. Rot dannen

**P**inus & Picea generi eidem ascribuntur, sed quandam flagitant specierunt distinctionem, arbores uulgo cognita: quarum cortex astringit, prodest tritus & illitus intertrigini, ulceribus summū corpus occupantibus, ambustisq; cum spuma argenti & manna. Ulcera delicatulorum acrimoniam recusantium, cerato Myr tino exceptus, ad cicatricē perducit: tritus cū sutorio atramento serpentia cohibet, suffitu partus & secundas eicit, potus aluum sistit, urinam mouet. Folia eorum trita & illita inflammationes leniūt, uulnera ab inflammationē uindicāt: trita autē & decocta in aceto, feruēti collutiōe, dentiū dolores: mulcēt: hepaticis utilia sunt, drachmæ pōdere in aqua aut mulsapota. Pineæ nucis cortex & folia potu idē præstant. Teda earū particulatim secta si in aceto coquat & decocto dēs colluat, dolores leuat. Ex his etiā fit spatha acoporū pessorumq; compositionibus

e 4 bus



bus idonea. Quin etiam earum crematarum fuligo ad librarij atramenti confectionem excipitur. Ea circumlitionibus efficacissime imponitur, quibus palpebras ornant: coloremq; mentiuntur. Calliblephara Græci uocant. Arrosis oculorum angulis, callofis glabrisq; genis, & collachrymationibus opitulatur. Pityides appellantur Pinorum Piceæque fructus, qui in conis inueniuntur. Vim astrictoriam habent, & aliquantum excalfacientem, tussi & pectoris uitjs auxiliantur, per se, aut ex melle sumpti. Nuces Pineæ cum repurgatæ manduntur, aut cum passo aut cucumeris semine bibuntur, urinam cient, acrimonias in renibus & uesica hebetant, storiachi rosiones leniunt, datæ cum portulacæ succo, uirium infirmitatem roborant, corruptorum quoque humorum labem obtundunt. Pineæ nuces integræ recen ter arboribus decerpæ in passo franguntur, & decoctæ uetustæ tussis ac tabitudini conferunt, si quotidie ex eo liquore terni cya thi bibantur.

**P**icea græcis Peuce: Pinus, Pytis: si sponte proueniat, Pinafter, nam Pinus culturam recipit. Coni Piceæ & Pini inter se differunt. Longus est Piceæ conus, ita crassus ut manum compleat: squamas habet tenues, & à sese resolutas, sic ut sub squamis nuces uideri queant, At breuior latiorq; est Pini conus, & Pyramidalis figura, crassior, lignosior, & compactior, ut uideri non possint nuces. Verum si in calido estuario habeatur, aut ad feruentem solem exponatur, disiliunt, spargenturq; ingenti cum fragore nuces. Pini syluestris & Piceæ plures esse species, Italia testis est & Alpes, nam Picea frigoribus gaudet. His cognatæ sunt arbores, Larix, Abies. Teda. E Larice extrahitur liquida & summa virtutis resina, quæ Terebinthina vocatur, quod in eius è locis successerit quæ olim è Terebintho parabatur. Inciditur Larix ad medullam usque, unde postea æstate distillat in certa uasa è Piceæ cortice cõfecta. Picea resinam edut duram, & intra corticem cõdensatam, distillat tamè aliquando & trun cus, liquidam similem Laricinæ. Profert Abies liquorem hunc excellentissimum, cuius nulla apud veteres sit mentio, vocaturq; ab Italis Lachrimo vel Oliod' Auezzo. Errant qui hunc putant Laricinæ resinæ florè esse. Colligitur enim is liquor è cortice tum trunci, tum ramorum, aperientibus se  
se ue



se reficis quibusdam: quæ turgentes indicant hunc eo loci esse liquorem, qui enatus reperitur corticem inter & corticem. Est hic liquor limpidus, clarus, & transparens, odoratus, & amarus. Hic odor & amaritudo in Laricina resina non reperiuntur. Vetus plus anno flavescit ab illa sua transparentia, & induratur aliquantum. Carnem inducit: emundat discutit, consolidat. Potus ventosos humores discutit, tutissimumq; remedium est laterum doloribus, & ad purgandos aremulis renes, & ad arcendam horum generationem. In cibo sumptus, prodest doloribus neruorum, & iuncturarum. Consolidat nullo negotio plagas, maxime capitis.

## Lentiscus. CAP. LXXIIII.

### NOMENCLATURA.

Gr. Σχῖνος. Lat. Lentiscus. Ita. Lentisco.

Off. res incognita. Gal. Lencisque.



Lentiscus.

& eiusdem aut sedis procidentia. In totum Acacia & Hypocisthidis

**L**entiscus nota arbor est, cui uis toti inest astringendi: semini enim, folio, ramo, cortici, radicibusq; cognatae insunt uires. Liguamētum autem ita fieri solet: Folia, cortex, & radix in aqua coquuntur, & ubi abunde cocta refrigerataq; sunt, folia abijciuntur: aqua denuo coquitur, donec mellis habeat crassitudinem. Lentiscus sua adstringendi dote, ualet aduersus sanguinis reiectiones, alui profluvia, & dysenterias in potu. Item contra eruptionem sanguinis è uulua,



cisthidis uicem repræsentat. Idem facit succus è tritis folijs. Deco-  
ctum fotu cana explet, & fracta ossa ferruminat: uulua fluxio-  
nes sistit, nomas arcet, urinam pellit, motus dentium collutione  
stabilis. Virentes surculi calamulorum uice dentibus repurgan-  
dis affricantur. Fit è semine oleum, quod prodest cum quid a-  
stringi opus est. Lentiscus resinam gignit, quæ Lentiscina cogno-  
minatur, & ab aliquibus Mastiche. Pota utilis est sanguinem  
reijcientibus, & tussi ueteri: stomacho auxiliatur, sed ructum  
mouet. Additur in dentifricia & illitiones faciei, ad nitorem  
cuti conciliandum. Palpebras oculis incommodas replicat, man-  
ducata halitum oris commendat, gingiuas contrahit. Optima  
& copiosissima in insula Chio prouenit. Præfertur (nitedula  
modo) resplēdescens, & candore Tyrrhenicæ ceræ similis, adul-  
ta, retorrida, friabilis, odorata, stridorem edens. Viridis autem  
inferior est. Adulteratur Thuris, resinæq; pineæ nucis mistura.

**L**entiscus resinifera arbor, lentis folijs, in Italia tum alibi, tum in  
Sena maritinis nascitur, in ruinarum Romanarum macerijs, &  
toto illo maris Tyrrheni tractu, Caietam vsque, & circa Neapo-  
lim. Ibi & procera & humiles nascuntur. Producit Lentiscus in Italia  
Mastichem, sed non ea abundantia qua in Chio & Creta insulis. Len-  
tiscus desiccatur secundo gradu, vel initio tertij: in caliditate & frigidita-  
te propē æquē temperatus. Astringunt omnes eius partes. Itidem succus  
foliorum viridum astringit. Mastiche alba astringit & emollit, excal-  
facit & desiccatur secundo ordine.

## Terebinthus. CAP. LXXV.

### NOMENCLATURA.

Græ. Τερμινθος. Lat. Terebinthus. Ita. Tere-  
tho. Gal. & Officine Terbentinam  
vocant. Ger. Terpentin.

**T**erebinthus cognita arbor est, cuius folia, & semen, &  
cortex astringunt, & ad eadem ad quæ Lentiscus conue-  
niunt, simili parata modo sumptaq;. Fructus esui aptus est, sed  
stoma-



omacho aduersatur: ex calfacit, urinam mouet, uenerem exci-  
 it: contra phalangiorum morsus conuenienter in uino bibitur.  
 Resina eius ex Arabia petraea defertur. Prouenit etiam in Iu-  
 daea, Syria, Cypro, Aphrica & Cycladibus insulis. Sed praeua-  
 t candida, perlucida, uitreo colore, & in caeruleum uergente,  
 dorata, Terebinthum olens. Terebinthina resinas omnes ante  
 edit, proxima Lentiscina, & è Pinu, & Abiete. Has sequitur  
 Picea & Pineis nucibus resina. Natura omnibus calfacere,  
 molliare, discutere, expurgare. Tussi ac tabi conueniunt per se, aut  
 eclegmate ex melle: uitia pectoris expurgant, urinam cient,  
 cruda concoquunt, uentrem emolliunt. Palpebras commodissi-  
 è replicant, lepras tollunt, cum ærugine ac sutorio atramento,  
 utroq; auribus saniem emanantibus cum melle & oleo, ite in  
 ruritu genitalium utiles, malagmatis, ac opisq; admiscuntur, la-  
 rum doloribus per se, illitu & appositu auxilio sunt.

**T**erebinthus, quem Græci Terminthon vocant, arbor in Græcia,  
 Asia minore, Africa, & India nascens, nascitur etiam in Italia,  
 monte castri Tridentini, ubi Iulius Alexandrinus Medicus, Matthio  
 antea non visam ostendit, quæ in totum Theophrasti Terebintho re-  
 wonderet. Vidit & postea Matthiolus in pluribus alijs locis, ut apud  
 hunc in monte quem eorum lingua Baldo nominat, & in alio, cui  
 nomen facit Carso. Venetijs non ita pridem afferri cæpit, sed maiori ex  
 arte cocta, raro liquida. Hac ideo dixi, ut Terebinthinam resinam scia-  
 mus non omnino esse deperditam.

## Resinæ aliæ. CAP. LXXVI.


### NOMENCLATURA.

Gr, Πητίνη ὕλη, Πητύνη, καὶ Ρευκίνη. Lat.

Resinæ aliæ. It. l' Altre ragie.

**L**iquida resina è pinu et picea, à Gallia & Hetruria cōuehi  
 solet, atq; olim à Colophone petebat: hinc Colophonie sibi  
 gnomētū uedicauit. A Gallia quoq; subalpina, quæ uernaculo  
 ore latrice appellat incolæ. Ea in linctu, et p se, magnopere pdest  
 tussi





Larix.

tuſi ueteri. Colore inter ſe aſtat, ſiquidē alia candida eſt alia oleoſa, alia mellei liquoris ſimilitudine, ut Larigna Cupreſſus etiam liquida ſundit reſinam, quæ ad eadem pollet. Quæ uerò aridarum generi aſcribuntur, quædam ex Pineis nucibus, alia Abiete, alia Picea & Pinu exierunt. Eligi debet longè omnium odoratiſſima, tranſlucens, non retorrida, neque oluta, quandam ceræ faciem præbens, & friabilis. E Picea et Abiete reſinæ cætera antecedunt: odoratæ enim ſunt, atque Thus odore imitatur. Præſtantioreſ à Pityuſa inſul deferuntur, quæ ſecundum Hiſpaniam ſita eſt. Sed quæ e Picea nucibus Pineis & Cupreſſo manarunt, nihil ad illas, nec tantum uiribus potiuntur. Veruntamen eorundem gratia quorum & illæ ſumi ſolent. Lentiſcina Terebinthinæ reſpondet. Vritur reſina omnis liquida in uaſe quadruplæ capacitatis ad humorem qui inſunditur. Itaque reſinæ congius, in duobus aquæ pluuiæ coquitur, ſubiectis leuibꝰ prunis: reſina aſſiduè mouetur, donec omnis odor aboleatur, & friabilis & retorrida reddatur, a digitis cedat. Cæterum ubi refrigit, in fictile non picatum, quo aconitum uocant, id eſt, non illitum, reconditur. Fiet etiam eximiꝰ candoris, ſi reſina omnis eliquata præcoletur, quò ſæculentæ ſordes excernatur. Vruntur quoque ſine aqua, primum lentè igne, & ubi coire cœperunt, maior carbonum ſtrues ſupponi

tui



r, & triduo citra intermissionem discoquuntur, usquedum  
 dictas naturæ suæ notas exuerint, mox ut dictum est, repo-  
 untur. Aridas unius diei spacio decoxisse satis est. Vt & odora-  
 malagmatibus, & acopis, & unguentorum colorationibus  
 agnoperè utiles sunt. E resina perinde atque Thure fuligo exci-  
 pur, ad circumlitiones idonea, quibus palpebras fucant, & co-  
 rem mentiuntur. Prodest glabris genis, collachrymationibus,  
 osiq; oculorum angulis, ex ea fit atramentum scriptorium.

**H**æc sunt Resinarum nomina. Resina Terebinthina, è Terebin-  
 tho. In huius locum successit frigidis in locis Piceæ resina, alijs La-  
 na, è Larice. Lentiscina quæ & Mastiche, è Lentisco. Pineæ, è Pino.  
 nigra, ex Abiete. Strobilina, è Strobilis, nempè Pini conis. Pix Hispa-  
 nica, Pix Græca, & Colophonia officinarum, resina cocta spēs est, cuius  
 fectionem docet Dioscorides. Color ex eo in pice prodit, vt plus mi-  
 ve colorata fuerunt resina. Resinarum præcipua est è Mastiche, mo-  
 è enim astringit, & nequicquam pungit, aut acris est. Ceterarum po-  
 tissima est Terebinthina, astringit enim & amara est, & ob id plus  
 mastiche digerit. Quinetiam astringit eius amaritudo. Pini resina licet  
 Terebinthina sit acrior, non plus tamen attrahit, aut digerit. Mediant  
 er has Piceæ & Abietis resina. Vt enim resina Terebinthina acriores  
 it, ita non perinde acres, Pini & Cupressi resinas. Emollit resina Te-  
 rinthina, secundo ab hac loco Lentiscina: has acrimonia superat Cu-  
 ssina.

## Pix liquida. CAP. LXXVII.

### NOMENCLATURA.

Gr. ἡ πῖσσα ὑγρὰ. Lat. & Offic. Pix liquida.

Ita. Pece liquida. Gal. Poix fondue.

Ger. Schiffberß.

**P**ix liquida, quam alij Conum uocant, è pinguisimis Pini  
 Piceæq; lignis congregatur. Optima est splendens. Sincera,  
 is. Contra venena, phthisim, purulentam excreationem, tuf-  
 suspiria, & pectoris humores, qui difficile extussumuntur, ef-  
 ax est, eclegmate cyathi mensura cum melle dato. Tonsillarū  
 & nuæ



& uua inflammationes, anginaeque utiliter perunguntur: purulentis auribus infunditur cum rosaceo, & illinitur cum trito sale serpentium morsibus: adiecta uero pari cera scabros ungues extricat, impetiginesque emendat: uulua duritias ac sedis tubercula discutit: cum farinaque hordeacea & pueri impubis urina decocta, strumas rumpit. Cohibet ulcera quae serpunt, cum pine cortice, aut sulphure, aut furfuribus illita. Caeterum cum Thurmannam & cerato profundos ulcerum sinus conglutinat, rimas sedis & pedum, magno auxilio illinitur, ulcera replet, & cum melle purgat. Quin & cum uua passa & melle carbunculos & putrida ulcera emarginat, disrumpitque. Erodentibus medicamentis, quas Septas uocant, probe immiscetur.

### Picinum oleum. CAP. LXXVIII

#### NOMENCLATURA.

Græ. πισσελαίου. Lat. Picinum oleum.

It. l' Olio della pece. Off. non præparant.

**E** Pice fit quod Pisselæon appellatur, separato liquore aquoso, qui supernatat Pici, sicut serum lacti. Nam expansa, quando Pix coquitur, supra cortinam uellera pura madescunt, acceptoque halitu eius exprimuntur in uas. Quas pix liquida, præbet utilitates. Alopecias capillo replet, cum farina hordeacea illitum: quibus & liquida Pix medetur, iumentorum ulcera sibi emendat.

### Fuligo liquidæ picis.

#### CAP. LXXIX.

#### NOMENCLATURA.

Græ. λίγνυς τῆς ὑγρᾶς πίσσης. Lat. & Offi. Fuligo liquidæ Picis. Ita. la Fuligine della Pece. Gal. Suye de poix fondue.



**F**it hoc modo è liquida pice fuligo: In lucerna noua quæ el-  
lychnium habeat, nonnihil picis incendito, lucernamq; ficti  
i uase in clibani speciem eonformato, superius in angustum for-  
icato, inferius perforato, ut clibani esse solent: operito, & ado-  
eri finito, consumptoq; liquore nouum infundito, quoad sufficie-  
em usui fuliginem collegeris. Vis ei astringens, acrisq;. Vtui est  
ad pigmenta quibus palpebras linunt & uenustant, & ad cir-  
umlationes. Item ubi glabris pilos restitui oportet, ad imbecilles  
achrymososq; oculos: insuper ad eorundem ulcera non inuti-  
is est.

## Pix arida. CAP. LXXX.

### NOMENCLATURA.

Græ. ξηρὰ πισσα. Lat. & Off. Pix ari-

da. It. la Pece secca. Gal. Poix seche

Ger. Griechisch bech.

**L**iquida Pix decocta in spissam coit, quam uocant aliqui  
Palimpissam. quo in genere quedam uisci modo lentescit,  
foscas cognominata: altera sicca est. Probatur pura, pinguis,  
odorata, subrufa, resinosa. Talis Brutia et Lycia, picis resinaq;  
imul naturam habentes. Calfactoriam uim habet: dura emol-  
lit, pus mouet, tubercula panosq; discutit, ulcera replet, uulnera-  
q; medicaminibus commode permiscetur.

## Zopissa. CAP. LXXXI.

### NOMENCLATURA.

Græ. ζώπισσα. La. & Ita. Zopissa.

**Z**opissam aliqui aiunt derasam nauibus resinam cum ce-  
ra, quā alij Apochyma appellant. Ea dissipandi naturā ha-  
bet



bet: quoniam marino sale macerata sit. Alij pineam resinam hoc nomine vocauerunt.

**C**ognata hæc quinque capita sunt, & aperta, ideo priuatim tractari non debet. Liquida picis aut nullus, aut rarus hodie in medicina est usus. Oleum Picinum nostro tempore non preparatur. E pice tamen & resina per alebicum rectius distillaretur. Fuligo qualiter excipi debeat, satissuperque ostendit Dioscorides in cap. de Thure. Sicca pix nulli non nota est. Vt fiat plures rustici in hyrcinia sylua norunt. Zopisfa quæ & Græcis Hypochina, Latinis, Pix naualis, fiebat Græcis ad illinendas naues è resina & cera: Nunc verò Germani ex liquido Bitumine picem naualem concoquunt, quod etiam in Epiro fit, vbi Pissasphaton, id est, Picibitumè copiosè habetur. Pix sicca excafcacit & desiccacit secundo ordine, plus tamen desiccacit, quam calefaciat. Contrarium accidit in liquida. Et liquida & sicca pix, astergunt, maturant, digerunt, & cum gustatur, amara sunt, & acres. Fuligo picis desiccacit, quæ è Terebintho & Myrrha eadem facilitate abstergit, quæ ea quæ è Thure fit. Plus tamen potest, & plus acrimonie habet quæ è Stryace, & hac plus quæ è pice liquida, hancque superat resina Cedrina. Vtiles sunt oculorum morbis.

## Bitumen. CAP. LXXXII.

### NOMENCLATURA.

Græ. Ασφαλτος. Lat. Bitumen.

Ita. Bitume.

**B**itumen Iudaicum cæteris antepositur. Cuius probatio est, ut purpure modo splendeat, sitq; ponderosum, ac ualidum odorem uibret. Nigrum autem & sordidum, uitiosum est. Adulteratur pice. Gignitur in Phœnice, Babylone, Zacyntho, & Sydone. Liquidum inuenitur in Agragantino Sicilia, fontibus innatans, quo utuntur ad lucernarum lumina, olei uice. Halucinantur qui id Sicilicum oleum nominant: nanque liquidum bituminis genus esse constat.

## Pissasphaltum. CAP. LXXXIII.

### NOMENCLATURA.



Gr.  $\pi\iota\tau\alpha\sigma\phi\alpha\lambda\tau\omicron$ . Lat. Pissasphaltum.

Ital. Pissasphalto.

**N** Ascitur in Appolloniatarum agro circa Epidaurum, quæ Pissasphaltos appellatur. Ea Ceraunijs montibus deuoluta, impetu fluminis rapitur, æstuque in littus expuitur, illic cocta in glebas, mistam Bitumini picem redolet.

Naphta. CAP.

LXXVIII.

NOMENCLATURA.

Gr.  $\nu\alpha\phi\theta\alpha$ . Lat. Ital. &

offic. Naphta.

**N** Aphtham uocant Babylonij, Bituminis colamen, colore candidum: inuenitur etiam nigrum. Vis ei ignium rapax, ita ut ex spacio protinus in eam transfiliat. Ad suffusiones oculorum, & albugines utilis. Bitumen omne discutit, glutinat, emollit, ab inflammatione tuetur: uuluarum procidentia, strangulationesq; olfactu, suffitu, imposito emendat. comitiales morbos suffitum deprehendit, Gagatæ lapidis more, purgationes mulierum cum uino & Castorio potum elicit: tuſſim ueterem, & anhelitum adiuuat, serpentium morſibus, coxendicum laterumq; doloribus auxiliatur, datur cæliacis in catapotio deuorandum cum aceto: potum discutit sanguinem concretum: dysentericis cum ptisana liquatum infunditur: distillationibus suffitio ne medetur, mitigat dentium dolores oblitum: ceterum pilos in commodos siccum replicat, specillo impositum. Concalfactum au

f tem



tem & cum farina hordeacea, nitro & cera illitum, podagris articularum doloribus, lethargicisq; prodest. Pissasphaltos eadem, quæ Pix & Bitumen, si misceantur, potest.

Annotatio in Cap. lxxxij. lxxxij. lxxxij.

**B**itumen quod Asphaltos est Græcis, pinguis est ceu terra adeps, calore & substantia picis, qui fit ut facillimè ignem concipiat. Verum Bitumen est Iudaicum, quod è lacu, cui mari mortuo nomen est elicitur. Est & liquidum è Sicilia bitumen, quod etiam in Gothia & Saxonia provenit. Hoc Barbari axes ungūt, & iumentorum scabiem: hoc etiam lucernarum lumina accedunt. Pissasphaltum Bitumen est Pici permixtum, quod apud Apolloniam nascitur, & nunc in Transylvania fluminum impetu è montibus defertur, quod Germani purgant, & cū ad cera crassitudinem coxerint, ad faces pro cera utitur. Arabes duas Mumie species faciunt. Vnam quæ verum est Dioscoridis Pissasphaltum: alterā, quæ vera est Mumia. Porro vera Mumia est, quæ è Myrrha: Aloe, Croco, & ex humiditate quæ ex cadaueribus humanis resudat conficitur. Atenim cum in Asia diuitum tantū & principum corpora ad eum condiantur modum, pauperum verò cum Asphaltum & Pice: nec mercato-ribus diuitum auferre corpora facultas sit: restat vram nos Mumiam non habere, cum pauperum tantum cadauera ad nos afferantur. Bitumen verum excalfacit & desiccatur secūdo gradu. Naphtha olim è Parthia afferebatur, bituminosus liquor, seu ut quidam volunt, eliquatum terræ seu saxi occulta natura, Bitumen, & in oleasam materiam resolutum, vulgo oleum petræ, seu Petroleum vocatur.

Cupressus. C A P.

LXXXV.

NOMENCLATURA.

Gr. Κυπρίσος & . Lat. Cupressus. Ital. Cipresso.

Off. Latino nomine. Gal. Du Ciprez.

Ger. Cypressen nuss.

**C**upressus refrigerat, & astringit. Cuius folia ex passo & exiguo Myrrhæ pota, vesicæ rheumatismis & urina difficultati auxiliantur. Pilulæ autem ex uino tuscæ in dysenteria,

alio





Cupressus.



Chamæcyparissus.

alui fluxione, tuſſi, & orthopnœa, aut ſi reijciatur ſanguis con-  
 uenientiſſimè bibuntur. Earum decoctum eoſdem præbet effe-  
 ctus. Tuſæ cum fico duritias emolliunt, nariumq; polypo meden-  
 tur. In aceto coctæ, & cum lupinis detritæ, ſcabros ungues ej-  
 ciunt. Hernias inteſtinorum prolapſu erumpentes illitu repri-  
 nunt. Folia eadem præſtant. Pilulæ cum arboris coma ſuffitæ,  
 ulices abigere exiſtimantur. Folia trita & impoſita, uulnera  
 conglutinant, ſanguinem ſupprimunt, capillum ex aceto tingūt.  
 Illinuntur per ſe aut cum polenta ignibus ſacris, ulceribus quæ  
 erpunt, carbunculis & oculorum inflammationibus, admota  
 cum cerato ſtomachum corroborant.



**C**Vpressus procera arbor, & fronde semper virecente, fructus (nēpe ter in anno) feracissima: vocantur hi galbuli, pibila, & nuces: colliguntur mensibus Ianuario, Maio, Septēbri. Semen habet adeo minutū vt etiam visui imponat. Miraculo naturæ est tam exiguo semine, ingentem adeo arborem procreari. Nulla vetustate lignum eius corrumpitur. Cupressi lachrima liquida est, Larigna similis, dum gustatur, admodum feruens.

## Iuniperus. C A P.

### LXXXVI.

#### NOMENCLATURA.

Gre. Αγρευθις. Lat. & Off. Iuniperus.

Ital. Ginepro. Gal. Geneure.

Ger. WBechholter.



Iuniperus.

**I**uniperi genera duo. Altera maior altera minor. Vtraque acris est excalfacit et urinam mouet, accēsa serpētes fugat. Baccarū nonnullæ nucis iuglandis magnitudine non nunquam grandescere aliæ nucem Ponticam æquare inueniuntur, rotundæ, odoratæ, immandendo dulces, subamaræ quæ Arceuthides etiam id est, bacca Iuniperi, nominantur. Modice calfaciunt & astringunt, stomacho utiles, contra pectoris vitia, tuſſim, inflationes, tormina, & serpentium ictus efficacissime bibum



buntur: urinam cient, unde ruptis, conuulsis, & uulua strangu-  
latui subueniunt. Foli acrimoniam habent, ideò tam ipsa quam  
eorum succus ex uino contra uiperarum morsus illini aut bibi  
prodest. Corticis cinis cum aqua illitus lepras eximit. Ramenta  
ligni deuorata interficiunt.

**E**st Iuniperus proceræ altitudinis: est & humilis, ac parem fructum  
obseruata proportionem referunt, quo etiam in medicina utimur.  
Fert Iuniperus gommam similem Mastiche, hanc Sandaracam, & ver-  
nicem scriptorū, diuersissimum tamen à Sandaracha quam quinto libro  
describit Dioscorides. Sandaracha hæc, recens, lucida est, alba, & tran-  
sparens, sed veterascendo rufescit. E Sandaracha & ligni semine fit Ver-  
nix. liquida utilis est ambustis, & eximij remediij in dolores & tumo-  
res hæmorrhoidum. Sandaracha calida & sicca est in primo gradu. Oleū  
quod cum duobus vasis sibi inuicem oppositis vel cum vitreo alembico fit  
e Iuniperi ligno admodum sicco, dolorem dentium à frigiditate catar-  
rhi sistit.

## Herba Sabina. C A P.

### LXXXVII.

#### NOMENCLATURA.

Gr. Βεῤῥυς Lat. & Off. Sabina. Ital. Sauina.

Gal. Sauinier. Ger. Sanelboon.

**S**abina duorum generum est: una folijs Cupresso similis, spi-  
nis horridior, grauius olens, acris & feruens. Arbor est  
coactæ breuitatis, quæ sese magis in latitudinem fundit, huius  
folijs nonnulli pro suffitu utuntur. Altera Tamarici folio similis  
est. Vtriusque folia nomas sistunt, collectiones illitu mitigant,  
& cum melle nigritias sordēsque repurgant: carbunculos cum  
uino pota rumpunt: sanguinem per urinam eliciunt: partus ap-  
f 3 post





posita extrahunt, & suffitu idem præstant. Unguentis calfacientibus immiscentur, & priuatim Gleucino.

**S**abina vtraq; & ea quæ Cuspreßi similitudinē refert, & quæ Tamarici, in Italia vulgò planta nota est. Nascitur & in Gallijs, sed nō adeò vulgata. Selago quadantenus folijs Sabina refert, non perinde odore vel sapore. Sabina excalfacit & desiccatur tertio ordine, & de eorum est medicamentorum numero, quæ subtilissimis constat partibus. Pota, crassos humores disgregat, & concoquit.

Sabina.

Cedrus. CAP.

LXXXVIII.

NOMENCLATURA.

Gr. Κέδρος. Lat. Cedrus. Ital. Cedro.

Gal. Cedre. Offic. Ignota. Ger.

Ein Zederbaum.

**C**edrus arbor magna est, ex qua picem colligunt, quæ Cedria uocatur, Iuniperi modo baccas parit: baccarum Myrti magnitudine, rotundas. Cedria optima est crassa, perlucida, grauis odoris, quæ dū effunditur, guttatim nō dissipata coit. Cui ea uis inest, ut defuncta corpora coferue & uineta corrūpat. Qua ex causa mortuorum uita, aliq̃ appellauere. Vestimenta quo

3 &



q̃ & pelles eximia calfaciēdi & siccādi dote, corrūpit. Magni ad ocularia medicamēta vsus. Quippe illita oculis claritatē affert albugines cicatricesq̃, detergit: instillata autē cū aceto, uermes, aurium necat: cū hyssopi decocto infusa, sonitus sibilosq̃, sedat canis dentiū indita eos frangit, & dolores leuat: idem facit cum ex aceto colluitur. ~~Myrica~~ Angina ea perunguntur. Tonsillarum inflammatio nibus auxilio est: lēdes pediculosq̃, illitu enecat. Cerastra mor- sibus cum sale imposita subuenit, contra hausta leporis marini uenena: in passo sumpta, auxiliatur. In elephantia, aut linctū, aut perunctione proficit: pulmonum ulcera purgat, & si cyathus eius sorbeatur, persanat: uermes & tineas subterindita ne- cat: & partus extrahit. Fit & oleum, à Cedria separatum, diū coquitur, uelleribus supra halitum eius expansis, ut in Pice, eius- dem ad omnia vsus. Priuatim uehementer perunctum, scabiem quadrupedum, canum, boumq̃, persanat, inherentes ricinos ene- cat, ulcera quæ ex tonsura acceperunt, ad cicatrices perducit. Ce- drides Cedri fructus uocantur. Calfactoriam uim habent, sto- macho aduersantur, auxilio sunt tussi, conuulsis, ruptis, strangu- ria, menses ciunt, ex polline Piperis poti. Contra haustum lepore marinum in uino sumuntur. Serpentes fugantur, peruncto ex adipe ceruino, aut medulla, corpore, in antidota adduntur. Fuli- ginem, quomodo ex pice, congeri oportet, quæ eandem quam picea fuligo uim præbet.

**C**edrus Iunipero in totum similis. Nec bacca, baccis Iuniperi dissimī- les, purpureæ, leues, odoratæ, esculentæ, & magnitudo eadem. Ma- turescūt autumnō, uerum priusquam maturescant recentes baccas pro- ducunt. Qui fit, ut id temporis in Cedro uisuntur & noui & vete- res fructus. Gaudet Cedrus locis frigidis & saxosis, ac montibus mirum in modum delectatur. Nascuntur Cedri in Istria, at eos habent inco- la pro Iuniperis. Georgius Reffinger. Doctor Medecinae ramum dono dedit Matthiolo, quaquauersum Baccis, onustum, purpureis, leuibus, odoratis, & magnitudine Myrtilorum. Iamiam id notum quod du-



rißimum est Cedri lignum, & ea causa fuit antiquis ex eo statuas cōficiēdi, quod perēniores putarent, eis quæ e lapide vel metallo fierent. Nascuntur etiam Cedri in aureis Italiae hortis, in ripis Tyrrhami maris, lacu Benaco, qui vulgo dicitur Laco di garda. Cedrus duarum est specierum. Vna qua similis est Iunipero, ramosus est & brevis, Altera, arbor est in ste altitudinis. Vtraque species calida & sicca est tertio ferè ordine. Cedria quartum ordinem attingit, intantum calida est, & subtilis in suis partibus. Corpora mortua desiccant, & illorum humiditatem absumit, corpora solida non attingit.


## Laurus. C A P.

### LXXXIX.

#### NOMENCLATURA.

Gr. Δάφνη. Lat. & Offic. Laurus. Ital. Lauro.

Gal. Laurier. Ger. Lorbeerbaum.



Laurus.

ciunt. Ergo in eclegmate trita cum melle vel passo prosunt  
tabi

**L**aurus quedā tenui folio constat, altera latiore. Vtraque excalfactoriam naturam habet, & emollientem. Vnde decoctum earum in muliebres infessus additum, uulua & uesicae uitis conuenit. Virentia folia sensim substringunt: illita quoq, ac trita, uesprium apiumq, iclibus opitulantur. Eadem cum polenta & pane illita inflammationē omnem mitigant: sed pota stomachum effundunt, & uomitiones mouent. Lauri baccae magis quā folia calfa-



tabi, orthopnœa, & omnibus thoracis rheumatismis. Contra scorpionum ictus ex uino bibuntur, uirilignes emaculant. Succus baccarum utilissimè aurium dolori & grauitati instillatur, cum uino uetere, & Rosaceo. In medicamenta autem adijciuntur, quæ neruorum lassitudines reficiunt, acopa uocant: & ad unguenta quæ calfaciunt & discutiunt. Cortex radice calculos rumpit, partus necat, hepaticis prodest, tribus obolis in uino odorato potus.

**L**aurus odoratissima arbor, & Apollini dicata, pacem presert, quemadmodum oliua, à fulmine non percutitur. Vim habet ex sese producendi ignis. Si enim bacilla duo è Laurus sicca, superposito sulphure inuicem magna agilitate conficueris, confestim ignis exiliet. Folia, & fructus Lauri potenter desiccant & excalfaciunt, plus tamen fructus quam folia. Cortex radice minus in se acrimonia & caloris habet, sed amaritudinis magis, & aliquantum astringit.

## Platanus. CAP. XC.

### NOMENCLATURA.

Gr. πλατάνος. Lat. Platanus. Ita. Platanus. Arbor officinis ineognita.  
Gal. Plan. Ger. Ashorn.

**T**enerrima Platani folia in uino decocta, mox illita, oculorum fluxiones sistunt, tumores & inflammationes leuant. Decoctus cortex in aceto, dentes in dolore colluit. Virides pilule in uino potæ, serpentium morsibus auxiliantur: exceptæ autem adipe, igni ambusta sanant. Insidens foliorum pilularumq; anugo, oculos & aures offendit.

**P**latanus Orientalis arbor, gratiam ex umbra, amplitudine, & amœnitate meruit, eamque ob causam olim in Italiam aduecta. Platani non longè à nostro æuo in Italiam asportati, non in altam proceritatem increuere, attamen spissum corticem gignunt. Media in temperamento & Platanus inter frigiditatem, & humilitatem: desiccât cortex & fructus.

f 5

Fraxi-



## Fraxinus. CAP. XCI.

## NOMENCLATURA.

Gr. μελία. Lat. Fraxinus. It. Frassino.

Gal. Fraisine. Off. Vt latinis. Ger.

Eim aefchbaum.

**F**raxinus arbor nota est, cuius foliorum succus, & ipsa peruncta, aut ex uino pota, uiperarum ictibus auxiliantur. Corticis cinis ex aqua illitus lepras eximit. Ligni ramenta scobemq; potu perniciem afferre tradunt.

**F**raxinus arbor notissima, duas habet species, proceram, & humilem, utramque armandis hastilibus aptissimam. Fraxinus serpentibus inimica, ut nec eius umbram sustineant. Composita una ex parte è Fraxini frondibus corona, & propter extructo igne, in medio collocatus serpens, per ignem potius, quam per Fraxineas frondes pertransierit. Fructum fert Fraxinus auium linguis similem, huiusque in medicina est usus, sub nomine, Lingua auis.

## Populus. CAP. XCII.

## NOMENCLATURA.

Gr. λεύκη. Lat. Populus alba. Ita. Popolo bianco.

Gal. Tremble. Officina pilulis utuntur, quas Oculos Populi uocant. Ger.

Sarsachbaum.

**P**otus albae Populi cortex uinciae unius pondere, ischiadicis ac urinae stillicidio prodest. Arbortium fieri tradunt, si cum mulino rene bibatur: folia quoque cum uino post purgationes pota, idem praestare produntur. Tepens foliorum succus, utiliter aurium dolori instillatur. Pilulae quae primo foliorum partu exiliunt, illitae cum melle, oculorum hebetudini medentur. Memoriae prodiderunt, corticem albae Populi & Nigrae, particulatim casum, & sulcis stercoratis mandatum, omni tempore anni edules fungos proferre. Populi nigrae folia cum aceto illita, magna



gna utilitate podagricis doloribus illinuntur. Resinam Populus fundit, quæ in malagmata additur. Semen potum ex aceto comitialibus utile est. Lachrymam Populorū commemorant, quæ in Padum amnem defluat, durari, ac coire in Succinū, quod Eletrum uocant, alij Chrysophorum. Id attritu iucundum odorem spirat, & aurum colore imitatur: tritum potumq; stomachi uentrisq; fluxiones sistit.

**P**opulus alba & nigra eò tantū inter se differunt, quod alba in inferiori parte folia candida habeat. Succinum seu Ambra fulua non à Populo distillat, verum in certis maris Septentrionalis insulis nascitur. Id antiquitus Germani Glesum vocarunt, quod quidam eorum qui cū Casare Germanico erant, eo temporis quo ijs in regionibus res ageret, Glesariam, eam quæ plus abundaret Succino, insulam vocauerunt. Iis in insulis Succinum nasci certum est: distillat è certis arboribus qui Pinis notratibus, multum sunt adsimiles, & in terram decidunt. Cūq; inibi congelatum duritiam conceperit, raptum ab undis quas eò insaniēs ventus detulerit, in Germaniam postea defertur.

## Macer. CAP. XCIII.

### NOMENCLATURA.

Gr. Μακρη. Lat. Macer. Ita. Macero.

Gal. & off. Macis.

**M**acer ex Barbaria aduehitur, cortex flauescens, crassus, gustu perquàm astringens, qui contra cruentas excreationes, dysenterias, & alui fluxiones bibitur.

**D**vobus præcipuè argumentis patet, Græcorum Macerem, & Macis Arabum inter se distare. Dioscorides, Galenus, & Paulus nunc Muscata nulla habita mentione, corticem (vt verisimile est) non agnoscunt. Porro Macer Galeno, cortex est Indicus, modicè acris, odoratus, & admodum acerbus. Macis noster, os & guttur potenter vellicat, ab odore desiccatur, amarore penè insensibili, secunda classe calidus & siccus: cum suis Galeno frigidum inter & calidum temperetur. Quocirca vester Macis, Græcus non est: ita nec illorum, noster est.

Vlmus.



## Vlmus. CAP. XCIIII.

## NOMENCLATURA.

Gr. *πτελέα*. Lat. *Vlmus*. Ita. *Olino*.Ger. Orme. Off. *Inusitata*.Ger. *Wlmerbaum*.

**V**lmi & folia, & cortex, & rami, uim habent spissandi. Folia trita ex aceto ad lepras efficaciter illinuntur: uulnera glutinant, sed multò magis corticis Tilia, si fascia loco intorqueatur. (nam in lori morem flecti potest) crassior cortex in uino aut aqua frigida unciatim potus, pituitas trahit. Fraëta ossa celerius solidescunt, si decocto foliorum corticis aut radicis foveantur. Humor in folliculis enascens, prima germinis eruptione, cuti illitus, nitorem inducit, faciemq; splendidiorē præstat: Qui dum siccatur, in animalia abit, quæ culicum formā gerunt. Folia cum tenerescunt coëta, olerum more ad obsonia usurpantur.

**V**lmus ingens arbor, & vulgo cognita. Vesicæ Vlmi liquor præter eas quas ei attribuit vires Dioscorides, opem adfert singularem, pueris quibus intestinum est ruptum, si cum lineis fasciis, potenter è bracciis ruptura adalligetur.

## Lignorum marcor.

## CAP. XCV.

## NOMENCLATURA.

Græ. *σαπροτὴς ξυλῶν*. Lat. *Lignorum*marcor. Ita. *Tarlatura*

ra del legno.

Ex



**F**X caudicibus lignisq<sup>3</sup> ueteribus caries congeritur, quæ farina modo illita, ulcera purgat, & ad cicatricem perducit, serpētia cohibet, si cum pari Aniso & uino subacta, linteisq<sup>3</sup> imposita, illinatur.

**V**illis res arborum caries, exiliēs erodentibus vermibus velut farina, & tamen vlieribus mirē utilis. Sed longē præstantior quæ ex India adfertur, collecta ē Guayaco in curam Neapolitani morbi. Desiccatur enim & consolidat non vlcera tantum mediocria, at ea etiam quæ eo in malo prodeunt in pudendis.

## Harundo. CAP. XCVI.

### NOMENCLATURA.

Gr. κάλαμος. Lat. Harundo. Ita. Canna.  
Gal. Roseau. Ger. Ror.

**I**N Harundinum genere quædam Nastos, id est, farctior uocatur, ex qua sagittæ factitari solent. Alia fœmina, qua tibiarum ligulas efficiunt. Alia quod fistulis addicta sit, Syringias, cui multum inest carnis, crebris cincta geniculis, ad librorū conscriptionem accommodata. Alia crassa, concava, apud omnes nascens, quæ à quibusdam Cypria, ab alijs Donax appellatur. Alia Phragmites, seu uallatoria, gracilis, candicans, uulgo cognita: cuius trita radix per se, aut cum bulbis suis illita, spicula aculeosq<sup>3</sup> corpore extrahit: luxata, lumborumq<sup>3</sup> dolores cum aceto mulcet. Virentia folia tusa & imposita ignibus sacris, mendentur, & cæteris inflammationibus. Corticis cinere perunctæ cum aceto alopecie sanantur. Panicula lanugo si aures intrauerit, exsurdatur. Eundem effectum implet Harundo, quæ Cypria dicitur.

## Papyrus. CAP. XCVII.

### NOMENCLATURA.

Græc.



Græ. Πάπυρος. Lat. Papyrus. Ita. Papiro.

Papyrus officina non norunt.

**P**apyrus qua chartæ fiunt, nullis non cognita, præcipua in medicina utilitatis ad laxandas fistulas: madefacta lino inuoluitur, usque dum inaruerit: Constricta enim atque immissa in hiatum, humore completur, & intumescendo fistulas aperit. Habet nescio quid alimenti radix: itaque Aegyptij eam mandunt, succum tantum deuorantes, & mansam expuunt: ipsis radicibus pro ligno utuntur. Cremata Papyri cinis, depascentia ulcera cum omnium partium, tum oris maximè, cohibet: uerùm melius id combusta charta præstat.

Annotatio in cap. xcvi. xcviij.

**C**aput xcvi. ex sese apertum est. Papyrus, arbor triquetra, grãdis, nusquam tamen decem cubitis altior, nascitur certis propè Nilum locis, ubi aquæ post inundationem restagnant. Flores producit, quæ antiquitus corollæ toxebantur dijs, nullum tamen aut fructum, aut semen producit. Nascitur & in Syria Papyrus, eodè quo Calamus odoratus laeu, & eo inibi nihil præter funes fit, prouenit & iuxta Euphratem.

Myrica. CAP. XCVIII.

NOMENCLATURA.

Gr. Μυρίκη. Lat. Myrica vel Tamarix. Ita.

Tamarigio. Gal. & Ger. Tamaric.

off. Tamariscus.

**M**Yrica seu Tamarix, arbor uulgo cognita est, cum apud nigras & stagnantes aquas enascatur, fructum quasi florem ferens, compage muscosum. Aegyptus Syriaq; alteram gignunt mitiorem, syluestri cetera similem. Fructum parit Gallæ proximum, inæqualiter astringentem gustu, quo conueniēter utimur uice Gallæ in medicaminibus oculorum orisq; datur cruentæ excreationi in potu, & cæliacis, & contra profluvia fæminarum,





Myrica.

minarum, regium morbum,  
& phalangiorum morsus.  
Illitus tumores inhibet. Cor-  
tex in eosdem usus adhibe-  
tar. Decoctum foliorum cū  
uino potum, lienē absūmit.  
Ad dolorem dentium in col-  
lutionibus salutare, & mu-  
lieribus fluxioni uulvæ op-  
portunis in desessionibus.  
Pthiriasi lendibusq; circum-  
fusum prodest. Abundan-  
tiam fœminarum sistit impo-  
situs arboris cinis. Potorios  
calices è caudice lienosis mo-  
liuntur, quò datus in his po-  
tus proficiat.

**D**omesticam habet Aegyptus & Syria Tamaricen: sylvestris est,  
quæ in hortis Italiæ habetur, cuius rei manifestum dant signum,  
flos & fructus, quos similes Gallæ non producit, ut domestica. In Neapo-  
litano malo decoctio radicis Tamaricis succidaneam agit Guayaci. Ta-  
marix abstergit, incidit, & cum propemodum nil desiccare videatur,  
aliquantam vim habet astringendi.

## Erica. CAP. XCIX.

## NOMENCLATURA.

Gr. Ερίκη. Lat. Erica. Ita. Erice. Huius vsum  
off. non habent. Galli, putant esse, quod di-  
cunt. Bruyere. Ger. Heyd.

**E**rica fruticosa arbor, Myricæ similis, logè minor, cuius flo-  
re apes reprobum mel efficiunt. Tam flos quàm coma ser-  
pentium ictibus illitu medetur.

Erica





Erica.

**E**rica arbuscula Asia et Graecia propria, bis in anno florescit. Prodidit Hermolaus in Italia nasci, & Cordus in Luniburgensi solitudine. Hic haeret Matthiolus, tum quod ea verborum breuitate a Dioscoride descripta est, ut iudicandi rationem abstulerit, tum quod non admodum respondere videtur.

Acacalis.

C A P. C.

NOMENCLAT.

Græ. Ἀκκάλιν. Lat.

Acacalis. Ita. Acacalide.

Fructus Officinis incognitus.

**A**cacalis fructus est nascens in Aegypto fruticis, seminis Myricæ quadatenus similis: cuius aqua in qua maderit, ad collyria additur, quæ ad excitandam oculorum aciem conueniunt.

Rhamnus.

C A P. C I.

NOMENCLATURA.

Gr. ῥάμνος. Lat. Rhamnus. Ita. Ramno.

Galli. Bourg Espine. Off. una cresspa.

Ger. Creutzbeet.

**R**hamnus fruticat in sepibus, ramos ferens rectos, & aculeos in acuta spinæ modum, folijs paruis, oblongis, superpinguibus, teneris. Alterum ei genus candidius. Tertium nigrioribus latioribusq; folijs constat, & quadatenus rubetibus, cuius





Rhamnus.

cuius rami quinque cubito-  
rum longitudinem implent,  
spinofiores quidem, sed infir-  
mioribus minusq; rigentibus  
aculeis. Fructum ædit latū,  
candidum, tenuem, folij cula-  
rij specie, uerticillo similem.  
Omniū folia igni sacro, &  
serpentibus ulceribus, effica-  
citer illinuntur. ~~Hamnus albus & niger~~  
~~copiosè in Italia apud Thuscos nascitur, vocaturq; vulgata~~  
~~eorum lingua Marruchè, nec est~~  
~~Spinus merlus Thuscorum, aut~~  
~~Longobardorum Spinus cerui-~~

**R** Hamnus albus & niger  
copiosè in Italia apud Thus-  
cos nascitur, vocaturq; vulgata  
eorum lingua Marruchè, nec est  
Spinus merlus Thuscorum, aut  
Longobardorum Spinus cerui-

us. Quod hic largis sit folijs, & in baccis fructum nigrum producat,  
similem Ligustro, quo pictores vtuntur ad virorem bellissimū inducen-  
tum: quæ res nequiquam cui voles Rhamno conueniunt. Rhamnus  
siccat & digerit secundo ordine, & in frigidat in fine primi, aut in ini-  
secundi.

Halimus.

CAP. CII.

NOMENCLATURA.

Græ. Ἀλὺμ. Lat. Halimus. Ita. Halimo.

Gal. Blanchepute. Off. in usu non est.

**H**alimus frutex est sepimentis idoneus, similis Rhamno,  
sine spinis, folijs oleæ, sed latioribus. nascitur in sepibus  
maritimis. Folia decoquuntur ciborum gratia. Radix con-  
cisa, rupta, torminaq; mitigat, dragma pondere in aqua mul-

g

sa



sa pota eadem lactis ubertatem facit.

**H**alimus de earum genere plantarum est, de qua authores diuer-  
sissime sentiunt. Quidam arbusculam cum Dioscoride sentiunt,  
quidam falsi saporis herbam quæ in littore maris nascitur. Cratenas  
herbarius nasci sub hedera, nec alibi, longis & hirsutis folijs, odore ad-  
modum Cupressum referentibus. Solinus nasci in Candia, ac solo demon-  
su famen sedare. Arabes Molochiam & Atriplicem marinum vocant,  
ac eo apparet herbam eos putasse, non arbusculam. Ruellius franciputã  
francicam proferit, cuius frondes edendo esse possint, ea in eis grata falsi-  
tudo inest: Matthiolus herbam falsam quæ in venetiarum littore na-  
scitur, cui nomen vulgo Bidone est, neuter tamen affirmare audeat, quæ  
producit plantam, Halimum esse. Satius igitur fuerit, Halimum nobis  
incognitum dicere, quàm Halimum nescio quem proferre, qui & nobis  
non perinde vsitatus, & sit medicina non utilis.

## Paliurus. CAP. CIII.

### NOMENCLATURA.

Græ. παλιουρ. Lat. Paliurus. Ita. Paliuro.

Gal. Aubepin. hoc Off. non vtuntur.

Ger. Meerbein.

**P**aliurus frutex cognoscitur aculeatus, durus, cuius semē  
pingue & fuliginosum inuenitur, quod potum tussi opitu-  
latur, vesicæ calculos comminuit, serpentium iclibus aduersatur.  
Folia & radix astrictoriam uim habent, quorum decoctum po-  
tu aluum sistit, urinam trahit, contra uenena & serpentium mor-  
sus auxiliatur. Radix recentia tubercula, tumoresq; omneis di-  
scutit, trita & imposita.

**V**ariât itidē authores in historia paliuri, dioscoridis paliurus diuer-  
sus est ab eo quē diuersis generibus describit theophrastus. Palu-  
ri Theophrasti diuersi sunt ab eo quē annotat Agathocles. Agathoclis  
Paliurus ab eo discrepat quē deliniat Plutarchus. Plutarchi itidem Pa-  
liurus ab omnibus alijs differt. In hac sententiarum diuersitate, certum  
quid statuere temerarium fuerit, ni cum Matthiolo dicamus, plantarū  
spinosarum nomen esse, quæ diuersæ sint pro ratione regionum.

ACH



## Acuta spina. CAP. CIIII.

## NOMENCIATURA.

Græ. Ὠξυάνθη. La. Acuta spina. Ita. Oxiacantha.

Gal. Espine vinette. Off. Berberis.

Ger. Erbselen.



Acuta spina.

**A**cuta spina, quam pyrinam aut pithyanthen aliqui uocant, arbor est pyraſto ſimilis, ſpinoſa ualde, & minor. baccas profert myrti, plenas, rubras, fragiles, & intus nucleum: radicem multifidā, altē deſcendentē. Huius bacca potu aut cibo, alui profluuiū, & abundantiam ſæminarum ſiſtunt: radix illita aculeos & ſpicula extrahit: abortū fieri tradunt, ſi ter radice uenter, aut ſenſim feriatur, aut perungatur.

**O**xiantham nō eſſe Berberim Arabū, & multa alia declarant, & quod Pyroſylueſtri, collatis inuicē formis, neutiquā ſimilis. Si Matthiolo credimus, Oxiantha erit arbor illa ſpinoſa, quæ apud Thuſcorū regionē maritimā, trunco, cortice, & ramis Pyroſylueſtri ſimilis eſt, quæ ſua lingua uocant Bogaia, & in Tridentinis montibus Amperlo, & Pane d'Orſo, & apud forum Iuliū, Barax zo biāco. Notas enim omnes habet, quas Oxiantha attribuit Dioſcorides. Habet & ſuas vires Creſpinum, ſeu Ribes, vulgo cognitæ nec quicquam illi deperijt, ſi nō Oxiantha ſit, ſicut nec Væ ſpina aut Væ marina, quod Ribes non ſit. Suis quæq; prædita eſt dotibus, quæ peti ex Arabibus & recentioribus poſſunt. Oxiantha Galeno Pyriſylueſtris eſt

g z ſpc



species, paræque & in sese & in fructibus vires habent, licet Pyri sylvestris fructus in totum stipticus & acerbus: cum Oxiaëthæ fructus, præter id quod stipticus est, è partium etiam subtilitate incisoriis sit. At enim quod ad formam attinet, Oxiaëthæ fructus ad Myrti, non Pyri sylvestris similitudinem accedit.

## Rubus canis. CAP. CV.

### NOMENCLATURA.

Græ. ρυβός βαλ. Lat. Rubus canis. Ita. Rouo canino. Gal. Eglantier sans odeur. Off. Rosa sylvestris. Ger. sambutten.

**F**rutex est arboris instar, rubo longè maior: folia fert multo latiora myrto, firmis circa ramos spinis: flore candido, fructu oblongo, nucleo oliuæ simili, qui per maturitatē fulvescit, & flocculos intus continet. Fructus exemptis interioribus floccis arefactus, aluum sistit: feruefacti enim in vino, mox potius arteriam infestant.

**R**ubum canis seu Cynosbatum non esse Rosam sylvestrem multi patet argumentis. Folia non habet Rosa sylvestris Myrto similia, fructus habet longè grossiores Oliuæ baccis. Theophrasto Rubus caninus fructum fert purpurascens, similem malo punico, & magnitudine medium inter eum quem stirpes ferunt, & punica malus: folia vitici similia: id ostendit quantum Rosa sylvestris a Rubo canino differat, atque adeo diuersis capitibus de eis tractatur à Dioscoride.


## Ligustrum. CAP. CVI.

### NOMENCLATURA.

Græ. λυγώ. La. Ligustrum. Ita. Ligustro. Gal. Throesne.

**L**igustrum arbor est Oliuæ folijs circum ramos similibus, latioribus, mollioribus, & uirentioribus: flore candido muscoso, odorato: semine sambuci, nigro. Optimè nascitur in Cynope & Ascalone. Folia astrictoriam uim habent: quare conmanducata ulceribus oris medentur, illata feruidis inflamma-





Ligustrum.

oscoridis est Pixacantha, & non Periclimenon.

tionibus, carbunculisq<sup>3</sup> pro-  
sunt, decocto eorundem igni  
ambusta fouentur: capillum  
rufant trita folia, quæ in ra-  
dicula succo maduerint. Flos  
ex aceto fronti illitus capitis  
dolorem sedat. Cyprinum  
oleum quod ex eo fit odora-  
tum, excalfacit, mollit ner-  
uos: si quæ feruenti natura  
prædita sint, assumat.

**L**igustrum publicis in Italia  
vix inter sepes nascitur, flo-  
ret ineunte vere, & astatu ini-  
tio. Seruius Virgilij interpres,  
Ligustra malè interpretatus est  
cōuolunli flores. Nec minus falsi  
sunt qui censuerūt. Ligustrum,  
Arabum esse caprifolium, quod

## Philyrea. CAP. CVII. NOMENCLATURA.

Græ. φιλύρεα. Lat. Tilia. Ita. Phillerea.  
Gal. Til. & Troesne.

**P**hilyrea arbor est ligustri magnitudine, folijs oleæ, ni-  
grioribus & latioribus, fructu lentisci, nigro, subdulci,  
sematim coherente, asperis nascitur. Huius folia astringunt:  
eadem vtilia ad quæ oleaster, cum astrictione est opus: ma-  
nè ad oris ulcera, commanducata, aut si decocto colluantur:  
a urinam ac menses cient.



**N**ulla est inter Theophrastum & Dioscoridem controuersia, cum Theophrastus è Phyliræ nomine Tiliam (vt est) intelligat: Dioscorides sui generis arborem, quàm abundè depingit. Et vt scribit Matthiolus, arbor est à multis cognita, nascitur enim & crescit in multis Italiae locis, & præcipuè saxosis & montanis, vnde excellentissimus medicus D. Maphæus à Maphæo transplantauit eam, qua hodie Venetj's horto suo nobilissimo viridescit.

### Cistus. CAP. CVIII.

#### NOMENCLATURA.

Græ. κ'is & . Lat. Cistus. Ita. Cisto. Off. Latinum nomen usurpant.



Cistus.

**C**istus, quem aliqui Citharon, aut cissaron uocant, ramosus frutex est, sed improcerus, foliosus, saxosis locis nascens, folijs rotundis, acerbis, hirsutis, flos masculo ut mali puniceæ, feminae albet: Vis astringens, unde flores in uino austero bis in die poti, prosunt dysentericis, & nomas per se illiti cohibent: uetustati ulcerum & igni ambustis cum cerato medentur. Hypocistis, orobethron, aut cytinus nonnullis cognominata, iuxta cisti radices nascitur, floris punici similitudine. Quæ

dam flaua, altera herbacea, tertia candida. Liquatur acaciæ modo. Aliqui tamen exiccant, fractamq; macerant, & incoquunt, reliquaq; ut in Lycio prosequuntur. Vires acaciæ habet, uerum aliquant



aliquantò magis siccatur, & astringit. Prodest dysentericis, celiacis, sanguinem excreantibus: sceminarum profluuiò & pota & indita.

**N**ascuntur Cistus & hypocistis in pluribus Thusciae locis, quinetiã abundè proueniunt in asperissimis & maximè saxosis Apenninib. Deberent igitur quorum est munus, inde sibi omni labore & diligentia conquirere, præcipuè cum sine vero hypociste confici Theriaca non queat, nec alia item medicamenta quibus quotidie nobis in medicina sit opus. Vbi vera hypocistis defuerit, vera Acacia, aut Balaustiorum succo uti possumus. Astringit priuatim Cistus: folia desiccant & astringunt: valentiores sunt flores. Sic frigidus est Cistus, ut etiam quippiam in se tepidi caloris habeat. Plus astringit hypocistis.

## Ladanum.

## CAP. CIX.

## NOMENCLATURA.

Græ. Λάδανον. Lat. & Off. Ladanum. Ita. Ladano.

**E**st & alterum cisti genus, ledon à nonnullis appellatum, frutex simili modo nascens, longioribus folijs, & nigrioribus, quæ uerno tempore quidam contrahunt pingue. Foliorum uis astringens, atq; effectus cisti præbens. Fit ex eo quod Ladanum dicitur: Siquidem cum cisti frondes pascuntur caprae, hirg, pinguetudinem conspicuè barba carpunt, & suo lentore illosis cruribus adhaerescenẽ reportant: quam depectentes incola, colantesq; cogunt in offas, & ita recodunt. Alij uerò attractis funiculis, insidentem fruticibus lentorem abstergunt, conlomerantq; in Ladanum. Maximè probatur odoratum, subuide, facile mollescens, pingue, quod arenas non collegit, nec ualore oblitum est, resinosum, quale in Cypro gignitur. Arabicum uerò Libycumq; uilius. Natura ei spissandi, calfaciendi, molliendi: ora uenarum patefacit, capillum fluentem connet, addito uino, myrrha, & myrteo oleo: cicatricibus dorem reddit, cum uino illitum, medetur aurium doloribus, cum

g 4 hydr



hydromelite aut rosaceo infusum: suffitu secundas eicit. Pessis immistum, uulue duritiem sanat. In medicamenta quæ dolore tuissimæ finiunt, & malagmata utiliter inseritur. Aluum sistit cum uino uetere potum, & urinam ciet.

**S**atis apparet è Dioscoride quid sit Ladanum. Galenus differre quidem nihil specie à Cisto, qui eo ubi tum uinebat nasceretur, dicit: & regionis gratia quæ calida sit, excellentius esse. Id prouidendum ut non adulteratum, sed verum Ladanum habeamus. Venetijs probatissimum, sed paucis in locis habetur, ideo hic sedulo iudicio est opus.

## Ebenus. CAP. CX.

### NOMENCLATURA.

Græ. ΕΒΕΥΘ. Lat. Ebenus, Ita. Ebano.

Gal. l'Ebene.

**E**benus optima habetur Aethiopica & nigra, nullos habens uenarum discursus, factitij cornus leuore. Cum frangitur densa apparet, mordens gustu, atque astringens. Suffitur iucundo odore supra carbones sine fumi tadio. Recens autem ad ignem prolata, ob pinguitudinem acceditur, & trita ad cotem flauescit. Altera est Indica, internatis segmentis candicantibus & modicè fuluis, item frequentibus maculis: caterum prior, bonitate antecedit. Apud quosdam sesamina, aut spinea ligna cōsimilia pro Ebano uaneunt: quod discernitur ex eo, quod fungosa sunt, & in purpureas assulas resoluuntur, nihil mordacitatis in gustu, nec redolentia in suffitu præferentia. Caliginem oculorum absterget: ad ueteres destillationes, pustulasq; mirum in modum pollet. Si quispiam facta ex eo coticula collyrijs utatur, melius proficiet. Ad oculorum medicamenta efficax est, si scobes ramentæue uino Chio die noctuq; macerata, in collyria digerantur. Nonnulli prætrita ipsa excolant, reliquaq; eundem in modum peragunt. Alij pro uino aqua utuntur. Vritur in stili nouo, donec in carbones redigatur: lauatur plumbi usti mo

do



lo, & ita siccis scabrisq; lippitudinibus conducit.

**S**ola (vt inquit Plinius) terrarum India fert Ebenum, nec tota, at in modica tantum ipsius parte nascitur. Si Dioscoridi tamen & Herodoto credimus, in Ethiopia etiam prouenit. Ebenus sicca notissima in Italia est, apud eos enim qui pectines conficiunt infiniti trunci reperiuntur, ac in eorum itidem officines qui orbiculos horarios faciliant Ebenus composita est subtilibus partibus, virtutem habet absterforiam & alidam. Quidam Gayacum Ebeni specie putant, istud nec affirmare nec negare ausim, cum a nullo veterum scriptorum pradiclum sit, quae folia, flores, & fructus Ebenus producat.

## Rosa. CAP. CXI.

### NOMENCLATURA.

Græ. Ροδον. Lat. & Off. Rosa.

Gal. Rose. Ger. Rosen.



Rosa.

ti intestini, ac uulua, pinna illitus aut infusus. Eadem sine expressio

**R**osa refrigerat & astringit, sed sicca multo magis. Succus recentibus folijs exprimitur, desectis forfice unguibus (sic appellatur candidæ foliorum partes) reliquum in pila premi & teri debet in umbra, donec cogatur, & ita ad oculorum circumlitiones recondi. Siccantur etiamnum folia rosarum, continuo uersata, ne muceant, neue sitis is insideat. Aridis rosis & in uino decoctis expressus liquor, facit ad dolores capitis, aurium oculorum, gingiuarum, sedis, g s pressio



pressione tusa, præcordiorum inflammationibus, humidis stomachi vitis, igni sacro illini prodest: siccis ac tritis semina asperguntur. Misceri solent uulnerarijs antidotis, atq; compositionibus, quas *Antheras* uocant. Folia uruntur in *Calliblephara*. Flos qui in medijs rosis inuenitur, siccatus, gingiuarum stuxionibus efficaciter inspergitur. Capita pota citam aluum, & cruentas reiectiones sistunt.

### Rosei pastilli. CAP. CXII.

#### NOMENCLATURA.

Græ. Ροσίδιον. Lat. Rosei pastilli. Ita. Pastilli delle Rose. Off. Trochisci diarhodon.

**P**astilli, quos *Rhodides* uocant, hac ratione conficiuntur: Rosarum uiridium, quæ nullo antea humore madefacta extabuerint, drachmæ quadraginta, Indicæ nardi drachmæ decem, myrrhæ drachmæ sex, trita digeruntur in pastillos, qui triuobolorum pondus æquent, siccatiq; in umbra in fictilli non picto, atq; obturato reconduntur. Alij adiiciunt costi drachmas duas, iridis Illyricæ totidem, & uinum Chium cum melle miscent. Mulieribus monilium uice collo circumdato usui sunt, ad retundendum graue sudoris uirus: tritis etiam utuntur ad illitiones & diapasmata, quæ fiunt ad sudores coercēdos, ita ut à balneis inarescant corpora, dein frigida aqua abluantur.

#### Annotatio in Cap. cxj. cxij.

**M**ulta sunt Rosarum differētiæ, rubris tamen plus in medicina utimur, decerptis nondum sese aperiētibus calathis. Rosei pastilli, quos trochiscos de Rosis *Pharmacopolia* uocant, nō eo quo apud *Dioscoridem* conficiuntur modo.

### Lycium. CAP. CXIII.

#### NOMENCLATURA.

Græ. Λύκειον. Lat. & Off. Lycium. Ita. Lycio.

Ly



**L**ycium, quod aliqui Pyxacanthan uocant, arbor est spinosa, ramis trium cubitorum, aut longioribus: folijs buxifensis: fructu piperis, nigro, laui, amaro, densoq; cortice pallido non dissimili Lycio madefacto, radicibus multis obliquis lignosis: Nascitur plurimum in Capadocia, Lycia, & plerisq; alijs locis, aspera loca amat. Succus extrahendi ratio hæc est: Rami cum adiculis tusi, & ante per multos dies macerati coquuntur, tum bictis lignis itide liquor, donec mellis crassitudo fiat. Adulteratur id Lyciū, adiecta decoctioni amurca, aut absinthij succo, ut felle bubulo. Innatās spuma inter coquendū exēpta, oculorū medicamentis additur, reliquo ad alia utuntur. Simili modo fit yciū, semine expresso & insolato. Optimū quod uri potest, re-rinctumq; rubentē spumam ostendit: glebis extrinsecus nigris, utus cum fregeris rufis, odore minime uiroso, cum amaritudine stringens, crocino colere, cuiusmodi Indiciū est, ceteris præstan-us. Lycium astringit, caliginē oculorū discutit, genarū scabiem, ruritus, ueteresq; fluxiones sanat. Facit ad purulentas aureis. exulceratas gingiuas, tōsillas, labiorū fissuras, sedis rimas, attri-sq; illitū. Cæliacis, dysentericis potū inditūq; cōuenit. Dat san-guinē excreatibus & tussi, ex aqua. Cōtra rabiosi canis morsus catapotio deuoratur, aut in aqua bibit. Flauos facit pilos, redu-ys, ulceribus quæ serpūt aut putrēt, medet, fæminarū profluvia oppositū sistit, rabiosorū iclibus ex melle potū, aut uice catapotij deuoratu, auxiliatur. Tradunt Indiciū fieri Lyciū, ex frutice lon-gitide appellato, ea spinarū generi ascribitur, ramos restos ha-rens, ternū cubitorū lōgitudine, maioresue, rubo crassiores, à ra-ce numerosos, fractus cortex rubescit, folia olea similia. Herba aceto decocta proditur lienis inflammationibus & regio mor-mederi, & fæminarū purgationes elicere. Assenerāt etiam uadā in potu, eosdē effectus præstare: semē cyatho dimidio potū uitā expurgare: uenenis quoque auxilio esse.

offi



**O**fficinarum Lycium adulterina res est è pluribus succis cōficta, nec ad nos hodie è Lycia affertur. Pyxacanthæ unde verum extrahi Lycium possit, in Lyguria Alpibus proueniunt, sed aded modicè curamus quæ ad vsum medicine faciunt, vt ignoremus ea etiam, quæ sponte nobis à natura offeruntur. Deficiente Lycio Amurca olei quæ in vase æreo cocta sit vtamur, aut Sumacho. Paucis ab hinc annis Pyxacanthæ fructus piperi similes in Italiam ex Alexandria aduehuntur.

## Acacia. CAP. CXIIII.

### NOMENCLATURA.

Græ. Ακασία. Lat. Ita. & Off. Acacia.



Acacia.

**A**cacia in Aegypto nascitur, spina instar arboris fruticosa, non se in rectum attollens. Florem habet candidum, & semen lupino simile in folliculis, ex quo succus expressus siccat in umbra, niger ex maturo semine, subrufus ex viridi. Eligatur modicè rufus & odoratus, ut in hac arbore esse potest. Aliqui exprimunt ex folijs & semine succum. Manat & gummi ex ea spina. Vis ei ad spissandum, refrigerandumq; efficax. Succus oculorum medi-

camentis utilis, ualet ad ignem sacrum, ulcera quæ serpunt, per-niones, pterygia, & oris ulcera: procidentes oculos reprimi, mensum abundantiam sistit: prociduam uuluam cohibet, citam aluum supprimit, aut potus aut subter inditus, capillos denigrat. Lauatur oculorum medicamētis, trito in aqua, mox effuso quod

con



concreuerat, donec pura extet aqua, & ita cogitur in pastillos. Vritur etiam in cruda fidelia, donec fictile fornacibus percoquatur, torreturq; in carbonum halitu perflata. Spina decoctum solutos artus fotu committit. Præfertur eius spina gummi, quod in uermiculorum speciem contrahatur, & utri modo perluceat, ligni expers. Proximum est candidum, sordidum uero ac resinofum, inutile. Cutis meatus obstruit, & medicamentorum, quibus admiscetur, acrimoniam hebetat. Ambustis ex ouo illitum, pustulas non patitur erumpere. Alium Acaciae genus in Cappadocia Pontoq; provenit, Aegyptiae spinae similitudine, longe minus, tenerius, humile, aculeorum uallo munitur, folia habens rutæ, semine lenticula minus fert autumno, in loculis connexis, ternum quaternumue capacibus. Succus eius atringit, uiribus inferior, & ocularibus medicamentis inutilis.

**A** Acaciae succus apud nos non nascentis arboris, hodie non affertur, sed huius loco succus prunorum syluestrium vulgo successit. Aptius tamen huius vice folijs Rhois uteremur, & liquore qui è folijs lentisci & hypocistidos conficitur. Vocat Serapion Acaciae gommam, Arabicam gommam quæ è sua descriptione alia est ab officinarum gommâ Arabica. Hac enim nil simile habet contractis vermiculis: at arenosa est, quæ res satis coarguit nos Arabicam gommam, & perinde succo carere. Acacia stiptica est & astringentia. Arabica gomma lenit & aperit, & non ob causam nec implere aut stringere poros carnis potest, quod in gommâ spinae Aegyptiae requirit Dioscorides. Vulgaris hæc Arabica gommâ Matthiolo è Galeno ea est gommâ, quam Græci simpliciter gommâ vocant, & mixtio è diuersis arborum gommis, id quod eorum iudicio contrarium est, qui ubi nomen gommæ simpliciter apud Græcos vident, non aliam, quàm spinæ Aegyptiae gommam intelligunt. Tolerabilis duci poterat gommâ Tracacanthæ, si ad nos vera Acacia afferretur, sed hac destituti, qui gommam habeamus? Vera Acaciae succus debeat tertio ordine, & elotus frigidus est in secundo, purus in primo.

**Vitex. CAP. CXV.**

**NOMENCLATURA.**

**Græ. Ἀρν. Lat. Vitex. Ita. Agno casto.**

Gal



Gal. &amp; Off. Agnus castus.

**V**itex siue lygos, frutex est in arborem assurgens, nascitur in fluminum ripis, asperisq; locis, ac torrentium alueis: ramus gerit praelongos, fractu peruiaces: folia oliuæ: sed molliora. Duo genera eius: Vna harum album florem mittit cum purpureo: altera tantum purpureum, & semen, ut piper. Excalcificationes vires habet, & adstrictorias. Semen eius potum uenenatis ictibus, aqua quæ cutem subijt, lienosisq; auxiliatur, lac euocat, menses ciet, drachmæ pondere in uino potum, geniturâ exoluit, caput tentat, & soporem affert. Decoctum herba & seminis in desessione, mulieribus uulua malo opportunis opitulatur: ite inflammationibus, purgationes mouet semen cum pulegio potum, etiam suffitu uel appositu: capitis dolorem dissoluit illitum: instillatur cū aceto & oleo capiti in lethargo & phrenitide. Folia suffitu aut substractu fugant uenenata: illita quoq; serpentium moribus auxiliantur, testium duritias cum butyro & folijs uittium emolliunt. Rimas sedis semen cum aqua illitum mitigat: & cum folijs medetur luxatis, uulneribusq;. Virgam qui manu teneat dum iter facit, negatur intertriginem sentire. Agnū, quasi dicas castum, uocant Græci, quoniam matronæ in Thesmophorijs Atheniensium castitatem custodientes, folijs huius cubitus sibi sternunt. & lygon quasi iumen, propter inuictam ferè ramorum stexitatem.

**V**itex seu Agnos à castitate, arborum prima vere floret, calida & sicca est tertio ordine, & è multis subtilibus partibus composita. Nigra & alba abundè in Italia proueniunt.

## Salix. CAP. CXVI.

## NOMENCLATURA.

Gr. *Itex*. La. & Off. *Salix*. Ita. *Salice*. Gal. *Saulx*.

**S**alix uulgò nota est. Cuius semen, folia, cortex & succum spissandi uim habet. Trita folia cum exiguo pipere & uino pota





Salix.

pota, illiosis subueniunt: sum-  
pta per se & cū aqua, præ-  
stant mulieribus ne conci-  
pant. Salignū semen in po-  
tu sanguine expuētibus pro-  
dest. Cortex eosdem præbet  
effectus: corticis cinis admi-  
sto aceto maceratus, illitu  
clauos & callos tollit. Ex  
folijs & cortice succus cū ro-  
saceo in calyce punici calfa-  
ctus, aurium doloribus auxi-  
liatur. Decocto eorū poda-  
gras foueri utilissimū: fursu  
res purgat in corpore. Exci-  
pitur succus qui manat ex  
ea, cū storet, exciso cortice: in  
plaga enim cōcretus humor

uenitur, qui ad purganda, quæ obstant oculis, suā uim præbet.  
S Alix multarum specierū & cognita arbor, succos è Plinio tres confi-  
cit, Vnum qui è trunco resudat in modum gomme: Secundum qui  
inciso cortice: Tertium qui incisus per autumnum truncis. Vulgare est  
ondes & flores Salicis ægris somnum conciliare.

## Syluestris olea. CAP. CXVII.

### NOMENCLATURA.

Gr. Αργελαία. La. & Off. Oleaster & Syluestris  
olea. Ita. Oliuo saluatico. Gal. Oliuier sauage.

Syluestris olea, quam aliqui Oleastrum appellant, alij Æ-  
thiopiam oliuā, folia astringunt: trita autem & imposita  
nem sacrum, ulcera quæ serpunt, epinyctidas, carbunculos,  
lunias, nomasq; cohibent, crustas emarginant cum melle il-  
lita





*Syluestris olea.*

primitur succus tuis folijs, affuso uino aut aqua, siccatusq; sole in pastillos digeritur. Sed longè ualidior ad recondendum succus habetur, qui cum uino, quàm cum aqua expressus est. Auribus subuenit, siue ulcerentur, siue pus effluat. Folia conuenienter cœliacis cum farina hordeacea illinuntur. Uruntur cum floribus folia, ut spodij uicem cinis præstet in cruda olla, oblito ore luto, usque dum figlinum percoquatur: restinctaq; uino, & rursus subacta, eodem modo uruntur, postremò cerusæ modo elota coguntur in pastillos. Huiusmodi cinerem in medicamentis oculorum constat spodio non cedere, sed eisdem uiribus præditum esse putandum est. Foliorum satius oleæ eadem uis intelligitur, sed aliquanto inferior: unde ocularibus medicamentis ob suam mitiorem uim conuenientior est. Sudor ligno uirenti accenso manans, illitu sanat lichenas, furfures & scabiem. Oleaginum semen

lita. Quinetiam sordida ulcera repurgant: inflammationes panosq;, cum melle imposita discutiunt: cutem à capite uulsam conglutinant: oris ulceribus & priuatim infantium, commanducata medentur. Succus & decoctum eosdem habent effectus: sanguinis eruptiones, ac muliebri profluuio admotus succus inhibet, uua oculorū, pustulisq; prodest, ulcera & ueteres defluxiones sistit: quapropter in colyria additur, ad genarū erosiones perquàm utilis. Ex-



semen illitum medetur furfuribus, & ulceribus, quæ depascunt  
 uorantq;: quod autem intra nucleum est, ex adipe & farina sca-  
 bros ungues excutit. Colymbades trita & ambustis illita, pu-  
 tulas gigni prohibent, sordida ulcera purgant. Muria succus col-  
 utas gingiuas contrahit, & motus dentium firmat. Oliua fla-  
 ua & recens stomacho utilior est, uentri difficilis: nigra autem  
 & matura corruptioni opportuna est, stomacho aduersatur, ocu-  
 lis non conuenit, capitis dolorem mouet. Arefacta illitu depas-  
 centia ulcera sistit, & carbunculos emarginat. Oleum sylue-  
 stris Oliuæ gingiuis putri uligine laborantibus colluitur, dentiū  
 mobilitates stabilis, calfacti fotus, gingiuis fluxione laboranti-  
 bus utilis est: lanam enim specillo circumligatam oleo madeface-  
 re oportet, & gingiuis admoouere, donec albæ spectentur.

## Lachryma æthiopicæ oleæ.

### CAP. CXVIII.

#### NOMENCLATURA.

Gr. Δάκρυον τῆς αἰθιοπικῆς ἐλαίας. Lat. Lachry-  
 ma Aethiopica Oleæ. Ital. Gomma dell'oluo  
 d'Ethiopia. Off. Gummi Eleni,

Lachryma quæ Aethiopica olea stillat, Scamomio simi-  
 lis quadantenus est, fulua, stillis exilibus cōstans, mordax  
 uæ autem Ammoniæ aut gummi similitudinem refert colo-  
 nigricans, nec gustu mordens, superuacua est. Nostrates Oleæ  
 castriq; similem lachrymam sudant, quæ commodè ad oculo-  
 rum hebetudines illinitur, cicatrices albuginesq; illitu emendat,  
 nam & menses ciet, cauis dentium impressa, ad dolores ef-  
 fux est. Inter uenena scribitur, partus pellit, lepras & impeti-  
 gines



gines sanat. Appellatur autem Aethiopica & agrestis Olea.

## Amurca. CAP. CXIX.

### NOMENCLATURA.

Gr. Ἀμόργη. Lat. & Off. Amurca. Ital.

La Morca dell' Olio

**A**murca expressæ oliuæ recrementum est. Decocta in cupreo uase ad crassitudinem mellis astringit, ceteros præbens Lycij effectus: insuper dentium dolori & uulneribus, cum aceto, uino aut mulso commode illinitur: additur in medicamenta ocularia, & meatus inductu suo obstruentia: uetustate meliorem fieri constat. Vtiliter infunditur sedis, genitalium, ac uulnæ exulcerationi. Si uero cum omphacino recoquatur ad mellis crassitudinem, cariosos dentes extrahit. Iumentorum scabiem decocto Lupini & Chamæleonte illitu sanat. Cruda & recēti Amurca podagras articularesq; dolores foueri utilissimum: peruncta in ullosa pelle, & hydropicis imposita, tumoris molem reprimat.

### Annotatio in Cap. cxvii. cxviii. cxix.

**N**arbonensis Gallia Oleastris itidē ut Oliuis abundat. Inter Oliuam & Quercū mortalis est inimitia. Emoritur Oliua Quercui applantata. Gomma syluestrium aut Aethiopicarum Oliuarum, & si ad multa sit utilis, nostro tamen tempore usu desit, nec sane notum est colligatur necne. Amurca olei, teste Catone, calci mixta inducendis officinis quæ pannos sericeos contineant utilis est. Araneas enim aut tineas, aut quosuis vermiculos non sustinet, & ab humore muros tuctur.

## Quercus, Glans, Fagus, Ilex.

## CAP. CXX.

### NOMENCLATURA.

Gr. Ἀγρὺς. Lat. & Off. Quercus. Ita.


Quercia. Gal. Chesne.

Quer





Quercus.



Viscum quercinum.

**Q**uercus omnis adstrictoriam uim habet, præsertim li-  
ber qui cortici & ligno intercedit: quinetiam tunica  
putamini glandis subiecta. Decoctum ex ijs datur dysentericis,  
coeliacis, sanguinem excreantibus. Trita in pesso, sæminis fluxio  
ne uulua laborantibus subycitur. Glandes eosdem effectus ex-  
hibent, urinam ciunt, capitis dolorem & flatus in cibum sum-  
ptæ pariunt, resistunt esitæ uenenatorum ictibus. Decoctum ea-  
rum & corticis cum lacte uaccino potum, prodest cōtra toxica.  
Intritæ crudæ, inflammationes illitu leniunt: ad duritias quas ca-  
roëthe uocant, & malefica ulcera cū salsa axūgia cōueniūt. Ili  
glandes uiribus Quercus antecellūt. Fagus & Ilex, Quer-  
cus generi assignatur, & cōsimile munus obeūt. Iligneæ radi-  
cis cortex cū aqua coctus dū mollitus intabescat, & tota nocte  
h 2 illitus



illitus, denigrat capillos, prius Cimolia terra purgatos. Folia omnium tusa & trita tumoribus prosunt, & imbecillas membrorum partes corroborant.

**A**qua è Quercus frondibus, tum cum primum prodeunt tenerimis per Alembicum distillata, potu sanat fluxus hepaticos, lapillos renum comminuit, & albis mulierum fluxionibus medetur. Fagi folia commanducata, labra & gingivas aeras sanant. Ex adusti Fagi cinere linimentum fit ad extrahendos è renibus lapillos. Habet id carbo Ilicis ut caput non offendat. Quercus Ricini, ijs similes quos sylvestres Rosæ produciunt, sicci & in puluerem redacti potenter astringunt, & ob id omnibus corporis fluxibus commodant, & alias ubi restrictione est opus.

### Castaneæ. CAP. CXXI.

#### NOMENCLATURA.

Gr. Κασανα. Lat. Castaneæ. Ital. Castagne.

Gal. Chataigne. Off. Nucces Castaneæ.



Castaneæ.

**S**ardianæ glâdes, quas Saliqui Castaneas, aut Lopima aut glandes Iouis appellant, adstringunt, similesque effectus præbent, præsertim tunica quæ carnem & corticem media intercusat, caro his qui ephemereum biberunt, conueniens est.

**C**astaneæ manducata liberalius dolorem capitis inducunt, flatus generant, obstipant corpus, & agre digeruntur. Sed quæ torrentur sub cinere, tollunt quippiam de nocumeto, si postea cum Pipere & sale aut cum Saccaro manducentur. Reuera quamuis nutrant corpus, tamen bona non sunt.

Galla



## Galla. CAP. CXXII.

## NOMENCLATURA.

Græ. Κέντις. Lat. Galla.

Gal. Noix de Galle.

**G**alla fructus est Quercus. Aliqua Omphacitis appellatur parua quidem, sed tuberosa, solida, nullo foramine perforata: altera plana, leuis, perforata. Eligi debet Omphacitis, quæ efficacior est: Vtriusque vis uehementer astringere. Trita excrescentia in carne, fluxiones gingiuarum & uulæ, atque oris ulcerationem cohibent. Nucleus dentium cauernis inditus dolorem sedat. Cremata carbonibus donec igne flagrent, & uino aut aceto aut acida muria extincta, sanguinem supprimunt. Decoctum quibus insidere expedit, efficax est, & contra uulvas procidentibus, fluxionesque capillos denigrant, aceto aut aqua macerata, dysentericis celiacisque cum uino aut aqua trita conuenienter illinuntur, aut bibuntur: obsonijs addi debent, aut integra in aqua præcoqui, in qua nonnihil excoquendum est, quod his affectibus conferat. In summa, his utendum ad astringenda, aut siccanda quæ opus sunt.

**G**alla in pediculis ut glans nascitur. Proueniunt & in folijs glandes, quæ aquosiores, statim ut deciderint, flaccescunt. Galla Omphacites medicamentum est potenter acerbum, & maiori ex parte terrestris & frigida, & cum ea facultate dissecat & repercutit fluxus: astringit etiam, & membra luxata & languida in priorem habitum restituit. Grandis Galla desiccata, sanguinem uita restingit.

## Rhus. CAP. CXXIII.

## NOMENCLATURA.

Gr. Ρῆς. Lat. Rhus. Ital. Rhoe.

Gal. &amp; Off. Sumach.

**R**hus quæ obsonijs aspergitur, ab aliquibus Erythros appellata, semen est coriarij fruticis, sic uocati, quoniam corio

h 3 rum



rum infectores eo utatur ad inspissandas pelles, arbuscula in petris nascens, binum cubitorum altitudine, folijs oblongis, subrubentibus, in ambitu serratis, acino uuarum gracilium denso, magnitudine Terebinthi, quadantenus lato, Cuius corticosa tunica perquam utilis est. Folia uim habent astringendi, & Acacia effectus præbent. Decoctum capillos denigrat. Dysentericis infunditur, & in potus eorum in seßusq; adycitur. Instillatur auribus purulentis, gangrenas & pterygia cohibent folia, ex aceto aut melle illita. Liguamentum fit ex aridis folijs, ad crassitudinem mellis in aqua decoctis, ad eadem, ut Lycium, conueniens semine eosdẽ effectus exhibet. Cæliacorum dysentericorumq; obsonijs inspergitur: fracta, desquamata, liuida q; illitũ ex aqua, ab inflammatione uindicat: lingua asperitates cum melle abstergit: candida sceminarum profluvia sistit, hæmorrhoidas sanat cum querno carbone intrito admotum. Aqua in qua semen maduit decocta cogitur, coitq; efficacior ipso semine. Gummi defert quod detium cauis imprimitur, ad dolores finiendos.

**R**Hus cuius fructum Læti similem, Sumach Pharmacopolie vocant, nascitur in Italia in pluribus Apennini locis, cum notis omnibus quas ei tribuit, Dioscorides. Fructus & succus Rhos plurimum in se assteri habent, & ideo desiccant tertio, & infigidant secundo ordine.

## Palma. CAP. CXXIIII.


### NOMENCLATURA.

Græ. φοίνιξ. Lat. Palma.

Gal. Palmier. of. Dactyli.

**P**alma in Aegypto gignitur. Ea medio maturitatis uigore, autũno decerpi solet, Arabici Myrobalani similis, Pomatis cognomine, colore uiridi, & odore mali Cotonei, quod si ad maturitatem peruenire sinatur, Phœnicobalanus fiet. Palma acerbata est & adstringens. Contra alui sceminarumq; profluvia, in uino austero bibitur, hæmorrhoidas sistit, vulnera glutinat illi





Palma.

nat illitu. Phœnicobalani re-  
centes plus siccis adstringūt  
capitū dolorē afferūt, copio-  
siores in cibo inebriat: siccio-  
res sanguinē excreatibus, sto-  
machicis & dysentericis uti-  
les in cibo: illinuntur cū Coto-  
neo & cerato anathino ue-  
sica vitis. Cariotæ præsertim  
esu, faucium asperitati medē-  
tur. Thebaicarum decoctū  
potu æstuationem sedat vires  
recreat cum hydromelite ue-  
teri sumptū, cibo idem faciūt  
Fit ex eis vinū ad eadem con-  
ueniens. Decoctū per se potu  
& gargarisatione magno-

rerē astringit, & cohibet. Nuclei palmarum, cæterorum more  
cremati in crudo fictili, & uino restincti, cinere loto, spodij uicē  
efficiunt, miscēturq; in Calliblephara. Quod si non iustā uisionē  
acceperint, denuō cremandi. Vim adstringendi habent, & spi-  
acula cutis obductu suo claudunt. Contra oculorum uulnē & pu-  
tulas, palpebrarum defluuia, cū Nardo effectum præbent, cor-  
poris excrescentias cum uino reprimunt, ulcera ad cicatricem  
perducunt. Sed inter primas utiles ex Palmis humilibus Ae-  
gyptiæ.

## Palma, elate. CAP. CXXV.

### NOMENCLATURA.

Gr. φοίνιξ ἐλάτη. Lat. Palma. Elate. Ital.

Corteccia della Palma. Gal. l'Escorce du Palmier.

h 4

Palma



**P**alma, quam aliqui Elaten aut Spatham appellant, fructus Palmarum adhuc florentium, inuolucrum est calixq, quo in spissamenta unguentary utuntur. Optima habetur odorata, astringens, ponderosa, praelusa, intus pinguis. uis ei adstrictoria, sistit ulcera quæ depascunt. laxatos artus comittit. trita miscetur cataplasmatibus & malagmatis, prodest præcordijs, imbecilli stomacho, & iocinori affecto mista cõferentibus cataplasmatibus. Eius decoctum subinde detersum, capillos denigrat, datur bibendum congruè, renum, uesicæ, & uiscerum uitjs: uulnæ ac uentris fluxiones sistit, scabiem cum resina & eera sanat, si uiginti diebus recens apponatur. Inuolutusq, in ea Elate fructus, quem suo amplexu fouet, Elate etiam uocari solet, & ab aliquibus Borassus. Adstringit, & Spathæ effectus præstat, non sic unguentis expetitus. Alba medulla caudicis recens in cibo, aut decocta, eadem facit quæ Borassus.

#### Annotatio in Cap. cxiii. & cxv.

**P**almæ fructus paruuli hodie Caryota, & olim Dactyli vocabantur. E Syria, Venetijs asseruntur, & Neapoli ex Africa & Barbaria. Palmam habet Italia, sed fructum non producit. In Hispania fructum procreat, sed perfectam maturitatem non attingit. Ad hanc perueniunt utunque fructus Palmæ Cretensis: at his nihil deest quæ in Cypro proueniunt, palmula quas Nicolaos vocat Plinius quatuor cubitorum longitudinem æquant. Distillat ex Indianarum Palmarum trunco & ramis, liquor quo incole uicè uini utuntur. Hoc ita conficiunt. Arbore mense Augusto ab incolis inciso, liquor statim defluit quem certis suis uasis excipiunt, hunc decoquunt (Quippe si non coquatur, ultra tertium diem vigorem non extendit, quin fortissimum fit acetum) eo quo nos mustum, sapa conficienda modo: deinde fit suauissimum mel, quod postea in aqua dissoluunt, & dierum viginti spacio certa quadam ipsorum solertia id percolant, quousque probe fæce purgatum, & benè clarum euadat, ac inde suauissimum euadit in uinum, quod diu asseruetur.

Malum



## Malum punicū. CAP. CXXVI.

## NOMENCLATURA.

Gr. Ρόα. Lat. *Malum Punicum*. It. *Pomo Granato*. Gal. *Grenadier*. Ger. *Granatopffel*.

**M**alum Punicū omne boni succi est, stomacho utile, per-  
exiguum sufficiens alimentum. Dulcia stomacho utilio-  
habentur, sed aliquantulum in eo calorem gignunt, inflatio-  
es pariunt, unde in febris abdicantur. Acida adstringunt, estu-  
iti stomacho auxiliantur, & multo magis contrahunt, ac uri-  
m cient, ora gingiuasq; ledunt. Vinosa uero mediam sortiun-  
r naturam. Nuclei acinorum acidi Punici in sole siccati et ob-  
nys insparsi, concoctiue, fluentem aluum stomachumq; sistunt:  
elesti aqua madescunt, bibunturq; commodè sanguinem ex-  
eantibus: ad desessus dysentericorum, fœminarumq; fluxione  
lue laborantium utiles sunt. Expressus nucleorum succus co-  
uitur cum melle, ad oris, uirilitatis, & sedis ulcera, nomas, re-  
uias, & ea quæ in corpore extuberant, aurium dolores &  
urium uitia, præsertim acidorum. Huius flores Cytini uocan-  
r, qui adstringunt, siccant, cohibent, sanguinolenta glutinant,  
as Punicum, præstant utilitates. humida gingiuarum uitia mo-  
esq; dentes decocto colluuntur: herniam prolapsu intestini e-  
mpentem cataplasmate repellunt. Memoria tradunt, qui tres  
am minimos Cytinos deuorauerit, nullā eo anno lippitudinē  
surum. Eliquatur Hypocistidis exemplo. Malicorium, asperū  
mali Punici putame, quod aliqui Sidion appellant. Id spissan-  
um habet, & quos Cytini, præbet usus. Decoctum radice  
u latas uentris tinea pellit, & easdem euocat. Balaustium  
uestris Punici flos est, Cytino similis, cuius cōplura genera re-  
iuntur, candidum, sulum, colore rosaceo: succus ex eo expri-  
h s mitur



mitur, Hypocistidis modo, cui adstrictoria vis inest, eadem faciēs quæ Hypocistis & Cytinus.

**P**unica mala à conientis multis in se granis, Granata vocantur. Quæ acida erunt in dulcia vertentur, si eorum radici porcinum, humanum ve letamen cum urina multis asseruata diebus apposueris. Squilla arbori applantata, facit ne fructus in arbore dissindantur. Seruatur mala Punica contorto in arbore pediculo. Pariter si creta inducas cum aqua temperata, & postea siccanda soli exponas. Idem facies si aqua bullienti immerferis, & tum per octo aut decem dies desiccaueris ad solem. Cytinus Dioscoridi, mali Punici domestici flos est: Balanstium, flos est quem sylvestris producit. Cytinus Plinio, Punici mali tam domestici quam sylvestris flos est, modo non sit apertus: Balanstium, vtriusque flos, qui apertus sit. Optimi domesticorum flores purpurei, flammei, & viridi coloris. Venetys hodie ex Oriente, Cypro, & Candia afferuntur, visui admodum grati, & singularis in sua facultate effuacia: at suo Itali artificio sic ea prodire cogunt, ut nihilum cadant extraneis. Sidion Græcis, Malicorum Latinis, mali Punici cortex est immaturus.

## Myrtus. CAP. CXXVII.

### NOMENCLATURA.

Gr. *Myrtus*. Lat. *Myrtus*. Ita. *Mirto*. Off. *Myrtilli* Gal. Du Murte.

**M**Yrtus satiuia nigra utilior est medicina, quam candida, & in hoc genere multo magis montana, semen tamen imbecillius parit. Vis & Myrti & seminis adstringit. Semen viride aut aridum in cibo datur sanguinem excreantibus, & uesticæ erosionibus. Succus uirentibus baccis expressus, eosdem effectus exhibet, stomacho utilis, urinam cit: prodest contra phalangij morsum, & scorpionis ictus, in micro. Seminis decoctum capillum tingit. Ius decocti in uino ulcera in extremis membris nata sanat, oculorum inflammationes illitum cum polline polenta lenit, contra ægilopas illinitur, crapulam arcet præsumptum uinum, quod feruescæto aliquantum eius semine exprimitur, alias



lias enim acorem contraheret. Præstat idem seminis effectus, utile procidentia uulnarum in dessectionibus, sedis utriusque, & foemina fluxione nula laborantibus, purgat surfures, ulcera capitis manantia, atque eruptiones papularum fluentes continet: adlitur quoque in medicamenta, quas liparas uocant, uti oleum quod ex folijs eius factum est. Decoctum foliorum ad dessectiones balnearum conuenit, & contra laxatos artus, & male solidescences: eo fracta ferruminationi repugnantia utilissimè fomentur, uiriliginem emendat, purulentis auribus infunditur, & capillos denigrat. Succus eadem efficit. Trita folia & ex aqua allita humidis ulceribus & partibus omnibus fluxione laborantibus, cæliacisquæ profunt: & admisto Omphacino oleo, aut exiguo Rosaceo cum uino, ad ulcera serpentia, ignem sacrum, testium inflammationes, epinyctidas, & condylomata. Arentium foliorum farina utiliter inspargitur paronychijs, pterygijs, & contra alarum feminumquæ perfusiones, cardiacorum sudores cohibet. Folia cruda seu cremata cum cerato, ambustis, paronychijs, pterygijsquæ medentur. Exprimatur folijs succus adfuso uetere uino aut aqua cælesti, cuius recentis usus est, nam exiccatus planè cariem sentit, & uires amittit. Myrtidanum dicitur, adnatum inæquabile, uerrucosum, intumescensquæ, & concolor, quod perinde quasi manus, Myrti caudicem amplectitur. Magis quàm Myrtus astringit. Tusum addito austero uino reponitur, coactumquæ in pastillos siccatur in umbra: multò efficacius & folio & semine, cerato, pessis, insectionibus, cataplasmatibus admistum, ubi astringendum aliquid est.

**M**YRTI domestica utraque species, & sylvestris itidem, in tota maris Tyrrheni ripa, in Genuensibus, & Romanis fluuijs, in omni Neapolitano regno, natura abundè prouenit. Omnium flores albi sunt et odoriferi, perplacetque unguetarijs aqua ex ijs alëbico distillata. Alba et nigra Myrti domestici, baccas ferunt oblongas, ferè similes oliuis sylvestribus, sed maiores. Redactis in puluerem frondibus & semine baccarum Myrti,



ti, ijs succurrit qui Fungos maleficos manducarint. Myrtidanum re-  
nota est, & vulgaris ubi nascuntur Myrti. Fit à mulieribus. Italis  
fructibus recentibus & maturis, & exacte molitis conditum, quo  
diu acervatur, ac gustui non iniocondum est, si cum tostis carnibus eda-  
tur. Confert etiam fluxionibus dysentericis & stomachicis, & supe-  
fluis feminarum mensibus. Myrtus e diuersis composita substantijs, vi-  
centem in se habet qualitatem frigidam & terrestrem. Quinetia sub-  
tilium est partium, & calida: & ob id potenter desiccatur.

### Cerasia. CAP. CXXVIII.

#### NOMENCLATURA.

Græ. κέρασις vel κεράσιον. Lat. Cerasus. Ita.

Cirego. Gal. Cerisier.



Cerasia.

perire oportet. Cerasia præcoquos edunt fructus, quibus calx radici, non  
dum editis floribus circumspanditur.

Cerasia aluo utilia sunt. Si uiridia sumantur, eadem siccata, illam sistunt. Gummi quod Cerasi resudant, cum uino diluto, tussi uetustæ medetur, colorem commendat, uisum exacuit, appetentiam inuitat: idem ex uino potum, calculosis auxilio est.

Cerasia è Ponto primum in Italiam aduecta, cum Lucullus victoria contra Mithridatem potitus est, multorum sunt generum, quæ secundum species, usus itidem in medicina variant. Nullo alio letamine gaudet Cerasia, quam suorum ramorum putamine, quos circa radicem infodere, dein terra o-

Siliqua



## Siliquæ. CAP. CXXIX.

## NOMENCLATURA.

Græ. κεράτσια. Lat. Siliqua. Ita. Carobe vel  
Carobole. Gal. Carouge. Off.  
fructus Xilocaracta.



Siliquæ.

Siliquæ recentes stoma-  
cho aduersantur, aluum  
soluunt: eadem siccata sistunt,  
stomachoq; utiliores fiunt,  
urinam ciunt: sed præcipuè,  
quæ uinaceis condiuntur.

Siliquæ Latinis, Ceratia Græ-  
cis, quod cornibus similia  
sint, nomen acceperunt. Abun-  
dè in regno Neapolitano &  
tota via Appia visuntur. Flo-  
rent in ipso statim initio & fi-  
ne veris, fructum itidem ferunt  
tota æstate, & per omnem autu-  
num. Cum primum ex arbore  
leguntur, prorsus ingrati sunt,  
& gustui horridi, at sicci dul-  
ces enadunt, & summè grati.

## Mala. CAP. CXXX.


## NOMENCLATURA.

Gr. μήλα, μηλον, Lat. Malus, Malum.

Prior dictio arborem, secunda fru-  
ctum designat. Ita. Me-  
la. Gal. Pommes,

Folia





Mala Cydonia.

dorum assumptus orthopnoicis salutaris est. Decocto fouentur uulnæ, & sedes si procidant. Cotonea quæ melle condiuntur, urinam mouent: mel autem sibi constringentem illorum uim & inspissantem asciscit: quæ cum melle coquuntur, stomacho atque ori gratiora sunt, sed minus inspissant. Cruda cataplasmatibus adijciuntur, ad cohibendam aluum, aut si stomachus æstuet, aut in uomitiones effundatur, ad mammarum inflammationes, præduros lienes, & condylomata. Fit uinum ex ipsis tuis expressisq; sed quò perduret, quindecim sextarijs succi unus mellis adiungitur, alioquin in acorem degenerat. Prodest ad omnia quæ dicta sunt. Fit & oleum ex ijs, quod Melinum uocauimus, quo utimur quoties astringenti oleo est opus. Eligi oportet uera, quæ sanè sunt rotunda, parua, & odorata: quæ uerò Struthia dicuntur, magna quidem sunt, sed minus utilia.

Flos





Persica.

Flos & uiridis & siccus ca-  
taplasmatibus imponitur, ijs  
conueniens quæ astrictionem  
desiderant, inflammationibus  
oculorum, reiectionibusq;  
sanguinis, contra citam  
aluum, & mensium  
impetus, in uino bibitur.

Melimela uentrem molli-  
unt, & ab eo animalia ex-  
pellunt, stomacho negotium  
exhibent, æstuosa. Ea mul-  
tis dulcia Mala uocantur.

Epirotica Mala, quæ Latine  
Orbiculata dicuntur, stoma-  
cho utilia, sistunt aluum, uri-  
nas euocant, Malis tamen  
Cotoneis inualidiora. Syl-  
uestria Mala similia sunt

ernis, & adstringunt. Sanè in hunc usum immatura omnia  
sunt. Persica Poma matura tam stomacho quàm uentri  
utilia sunt. Acerba aluum cohibent, sed sicca uehementius.  
Decoctum è siccis alui stomachiq; fluxiones sistit. Arme-  
nica, quæ a Latinis præcocia dicuntur, minora sunt supradi-  
ctis, & stomacho utiliora. Medica Mala aut Cedromela,  
quæ Latini Citria uocant, nemini non cognita. Arbor ipsa om-  
nibus anni temporibus pomifera, alijs deciduis, alijs subna-  
uentibus. Malum oblongum est, rugosum, colore aurum imi-  
tans, cum grauitate odoratum, semen habet Pyri. Id in uino  
potum uenenis resistit, aluum mouet, oris suauitatem commen-  
dat



dat, decocto eius colluto, aut succo. Estur in malacia mulieribus, uestiarijs impositum ab erosionis uitio uestes uindicare existimatur.

**T**Am multe sunt Malorum differentie ut nulla non regio, nulla vrbs, nullum oppidum, nullum castellum sit, quod non priuā quādam suam aut originem, aut insitionem ostendet. Infinita ea de re sit operis, species omnes describere. Nota omnibus Cydonia: Melimela a melio dulcore nomen sortita sunt. Quid Epirotica mala sint, ignoramus. Agrestia Mala & vbiuis nascuntur, & suas & diuersas habent species. Persica Mala, & ex earum genere Armeniaca que Abricocavocant satis nota sunt. Medica mala, Cedromela, Citria, ouali forma sunt, lata carne, succo acetoso, cortice citrino: hæc ne putrescant in Hordei aceruo sepeliuntur. Virtutem habent in venena omnia & præcipuè illorum semen. Limones, Aurentia in Medicorum Malorum genus cadunt. Aqua qua per vitreum alembicum è Limonibus educitur, præter id quod seminarum faciem expolit & erugat, impetiginem sanat: infusa Syrupus, ardorem febrium compefcit. Pota pueris, vermes necat.

## Pyra. CAP. CXXXI.

### NOMENCLATURA.

Græ. Ἀπίος. Lat. Pyrus. Ita. Pera.  
Gal. Poirier.

**P**Yrorum multa genera, quæ tamen omnia astringunt: proinde adduntur conuenienter in repellentia cataplasmata. Decoctum è sticcis, & cruda ipsa aluum sistunt, ieiunos esitata ledunt. Achras Pyrastri genus est, quod tardissimè ematurefcit. Vim Pyro astringentiozem habet, & ad eadem conuenit. Stringunt etiam eius folia. Ligni Pyrorum cinis efficaciter his auxiliatur, quos Fungi strangulant. Ciunt Fungos, si Syluestria Pyra cum eis coquantur, innoxios fieri.

Pyrorum



**P**Yrorum itidem vt malorū infinita differentie sunt, quarū facultates ē sapore & gustu deprehēdemus. Pyra stomacho grata sunt, & deficiāt. Plurastringunt syluestria, ideo in fluxibus valetiora domesticis

## Mespilus. CAP. CXXXII.

### NOMENCLATURA.

Gr. Μέσπιλον. Lat. Mespilus, Ital.

Naspolo, Gal. Meslier.

**M**Espilus, q̄ a nonnullis Aronia uocatur, spinosa arbor est, folio Oxiaanthæ fert pomū suauē, exigū, tribus intus ossiculis quæ ex causa id nonnulli Tricoccō appellauerunt: tarde maturescit, esū astringit, stomacho gratū est, aliūq̄, supprimit. Alterū Mespili genus in Italia nascit, quod alq̄ Setaniū, alij Epimelida uocat. Arbor folijs mali, sed minoribus, pomū fert rotūdū, suū, umbilico latiore, quod astringit, seroq̄ maturescit.

**M**Espillū tricoccū ea est arbor quā Itali Azarolo nomināt. Porro Oxiaanthæ reposuimus, qđ Azarolo Apij folia habeat, & Pyracanthæ buxi quæ sibi nō cōuenire nullus nō uidet. At Oxiaanthæ Theophrasti testimonio apij folia habet, p̄inde cōueniētius legetur folio Oxiaanthæ. Epimelis vel Sitaniō vulgo notā sūt. Epimelides autē nominātur qđ iuxta syluestria mala adnascātur: Vnedones, qđ nisi vnū nullus de orare possit priusquam mollescat, adeo fauces astringit. Vnedonis hæc vox efficit Galeno, vt Mespillo arbuti vicia tribueret, qđ sanè vēdicare nō possumus, nisi dicamus de alio eū Mespillo quā Dioscoridē intellexisse.

## Lotus arbor. CAP. CXXXIII.

### NOMENCLATURA.

Gr. Λωτὸν, Lat. Lotus. Ita. Loto, Gal. Alisier,

**L**otus arbor est vastæ magnitudinis, ferēs baccā Pipere maiore, dulcē, cibis gratā stomacho facile. Aliū sistit baccis. Ametorū ligni decoctū siue potu, siue infusione, dysentericis ac heminis fluxione uulnū laboratibus auxilio est, rufat capillos, etiam aluum cohibet.



**L**otus arbor, quam latini Celtim & Fabā græcā (vt quidā volūt) nomināt, Gallis cū suo fructu notissima est: nō multū astringit, at è subtilibus partibus composita, desiccatoria est, & ob id rasura ligni valet ad fluxus menstros, ad dysenteriam, & fluxus stomachales. Coquitur ad eū effectū modò in aqua, modò in vino, vt res exiget, & nō tantū per clysterem infundetur, sed ipsa etiam decoctio bibetur.

## Cornus. CAP. CXXXIII.

### NOMENCLATURA.

Gr. Κραμία Lat. Cornus. Ital. Corniolo.

Gal. Corneillier.

**C**ornus dura arbor est, baccas ferens Oliuæ modo oblōgas, quæ primū uirēt, dein per maturitatē rubescunt, aut ceræ colorē repræsentant. In cibo astringūt, profluuio alui atq; dysentericæ salutes, siue in edulio, siue in defruto exhibeantur. Mu-



Sorba.

ria, ut oliuæ cōdiuntur. Samies quā uirētia folia torrēdo resudarunt, impetigini conuenienter illinitur.

**T**heophrastus Cornū matrē & feminā facit ac suas cuiq; dotes assignat. Cornus uicinas apes nō sustinet, cōmoritur enim statim vt flores illa deserpserint, fit è pulpa fructuū, mixtio Cydoniata similis, & ex eorū decoctione Gelata cū Zucharo, quæ præter id quod grata sunt gustui, proficiūt etiā fluxionibus dysentericis, & redūdantibus mensibus.

## Sorba. CAP.

### CXXXV.

NO



## NOMENCLATURA.

Gr. ὄζα. Lat. &amp; Ital. Sorba. Gal. Cormes.

**S**orba colore luteū referētia prius quā maturescat, dissecta & sole siccata mandūtur, ut aluum sistat. Eadē est functio molitorū farinae, si polenta loco sumatur quod & decoctum eorum in potu praestat.

**S**orba duorū sunt generū. Nā aut rotūda, & alijs dulciora, & sapidiora sunt: aut oblonga paruorū Pyrorū in more, praedictis asperiora & rudiora. Preter haec sunt & syluestria gustu nō ingrata & quae plus astringunt, si immatura desiccantur.

## Prunus. CAP. CXXXVI.

## NOMENCLATURA.



Prunus

Gra. Κοκκυμηλέα.

Lat. Prunus. Ita.

Susino.

Gal. Prunier.

**P**runus arbor est nota, cuius pomu estur, sed stomachum male habet, aluum mollit. Syriaca Pruna & praecipue quae Damasci gignuntur, exicata stomacho utilia sunt. aluum astringunt. Folia Pruni in uino decocta collutione & gargarizatu uiam, gingiuas, & tonsillas fluxione laboranteis reprimunt. Praestant idem syl-

uest



uestrium Prunorum bacca, post maturitatem exiccata. Cum sapa uero decocta, stomacho utiliores redduntur, aliumque magis astringunt. Gummi Prunorum agglutinat, potum in uino calculos comminuit, ex aceto quoque illitum, lichenas infantium sanat.

**P**runorum itidem ut Malorum & Pyrorum multa sunt differentie, & varij est qualitate effectus. Sunt Pruna virilia, rubra, alba, crocea, purpurea, grossa, media, parua, dulcia, acetosa, mediocris saporis, dura, fragilia, longua, rotunda, oualia. Pruni fructus soluit corpus: plus tamen recens, quam siccus. Damascena alium solunt, & astringunt. Sic enim corpus solunt, ut semper stipticum reliquant, quod idem faciunt Tamarindi, & Myrobalani.

## Arbutus. CAP. CXXXVII.

### NOMENCLATURA.

Græ. Κομαρ. Arbutus. Ita. Arbuto.

Gal. Arroches.

**A**rbutus sine Vnedo, arbor est Cotoneæ malo non dissimilis, tenui folio, cuius fructus Pruni magnitudinē implet, nullo intus nucleo, huic Memæcylo cognomen est. Maturus aut flauet, aut rubescit, in esu acerosus, stomacho aduersatur, capitisque dolorem mouet.

**A**rbutus in Italia abundè prouenit, sed quod Dioscorides dicit, Cotoneæ malo similem esse, id ad proceritatem potius referendū, quā ad frondes aut corticem. Arbuti enim frōdes similes sunt Laurinis & I-lignis, nisi quod è viridi flauescunt. Cortex è nigricante rubescit, rudis & squamosus plus tamen rubescit & lauis est in ramis. Floret sub aestate sine flore albo paruarum campanarum specie, adfabrè in oblongos racemos extructo. Foliorum aqua per alembicum extracta cum osse cordis ceruini, mirū in modū in pestē cōducit, præcipuè antequā cōfirmetur,

## Amygdalæ. CAP. CXXXVIII.

### NOMENCLATURA.

Græ. Αμυγδαλη. Lat. Amygdala. It. Le Mandole.

Gal. Amendes. Off. Latino nomine,

Amyg





Amygdale

**A** Mygdale amara radicū tritarū decoctū, vitia cutis in facie corrigit, illitæ nuces idem munus præstat: menses admotæ ciūt, capitis dolori auxiliantur, illitæ fronti aut tēporibus cū aceto vel rosaceo, epynictidas sanāt, ex uino ite putrescētia ulcera, & quæ serpūt, & morsus canū cū melle: earū autē esu dolores finiūtur. Aluum emolliūt, somnū faciūt, urinā ciēt, cōtra sanguinis reiectiones cū amylo assumūtur. Renū vitis & pulmonū inflammationibus ex aqua in po-

tu aut eclegmate cū resina Terebinthina datur. Calculosis difficiliq; urinæ in passo auxiliantur, & illinctu cū melle & lacte, hepaticis, tussi, & inflationibus coli, nucis Auellane magnitudine. Quinis septemsiue præsumptis ebrietatē nō sentiūt potiores. Vulpes si cū quadā esca eas uorauerint, emoriūtur. Gummi eius calfacit & astringit: reijciētibus sanguinē, potū auxilio est: impetigines quæ summū corpus occuparūt, illitū cū aceto tollit, tussi uetustæ cū diluto uino potū medetur, calculosis cum passo bibere prodest. E nucibus Græcis, dulces cibo idoneæ: sed multo minus ualēt in remedijs, quàm amaræ: attamē extenuāt, urinā ciūt. Recentium esu cum suo putamine, stomachi uitia emendatur.

**A** Mygdale dulces sunt, aut amaræ. Eæ calidiores sūt & valentius deficcant. Amygdale quantum velis dulces, de amarore tamen occultato dulcore aliquatū participant, quod processu tēporis agnoscitur.



## Pistacia. CAP. CXXXIX.

## NOMENCLATURA.

Gr. Πισακία. Lat. Pistacia. Ital. Pistachi.  
Gal. & Off. Fistici.


**P**istacia, quæ cōstat in Syria gigni pineis nucibus similia sūt  
& stomacho amica. Trita cum uino contra serpentium  
ictus prosunt sine edantur, siue bibantur.

**V**itellius Censor Syria legatus, sub prima Tyberij Caesaris tēpora,  
Pistacia in Italia intulit. Pistaciorū plātæ Venetijs visuntur, Ca  
ieta, & Neapoli. Pistacia maturāt, leniūt, resoluūt, cōferūt putridæ pul  
monis humiditati, puri pectoris, & tussi. Stomachū, vellcāt, non prius  
in aquam infusa.

## Nux iuglans. CAP. CXL.

## NOMENCLATURA.

Gr. Κάρυα Βασίλικα.  
Lat. Noces iuglādes. Ita. No  
ce. Gal. Noix.



Nux iuglans.

**N**oces iuglādes quas nō  
nulli Persicas uocant  
sunt difficiles cōcoctu, stoma  
cho inutiles, biliosa capitis do  
lorē inferētes, tussiētibus ini  
micæ, & uomituris ieiunis  
in cibo aptæ, cum Ruta uerò  
& ficis præsumptæ, & à  
summo cibo, uenenis resistūt:  
nec minus si à ueneni haustu  
comedantur: largius esitata  
tineas latas pellūt. Illinuntur  
mammarum inflammatioi,  
abscessibus, luxatisq; cū mel  
lis



lis exiguo & Ruta: cū Cepa autem, sale & Melle, canis hominisq; morsu proficiūt: tormina, cum calyce suo perusta, & umbilico admotæ, sedant. Putamē combustum tritumq; in oleo & nino, infantium capite peruncto, nutrit capillum, alopecias replet. Sistunt menses nuclei usti, si triti ex uino admoneantur, ydē ē ueteribus, illiti carbunculis, gangrænis & agilopijs medentur alopecijs commanducati & impositi præsentī sunt remedio. Nucibus tufis Oleum exprimitur. Recente stomacho innocentiores sunt ut pote suauiores, itaq; Allio mistæ eximunt acrimoniam, liuores in corpore illitu tollunt.

**N**ux simpliciter, Nux Regia, Iuglans, Glans Iouis, Nux Persica, idem sonant, nempe arborem satis cognitam. Siccæ Nuces astringunt, virides & recentes nullam ostendunt facultatem quæ oleosa sit, & astringentia. Indicæ nuces calidæ sunt secundo ordine, humidæ primo. Sumptæ in cibo stomachum grauant, & prauum alimentum generāt.

## Nuces auellanae. CAP.

### CXLI.


#### NOMENCLATURA.

Gr. Λεπτοκαρυα. Lat. Noces auellanae.

Ital. Nocciuolle. Gal. Noysettes.

**N**oces auellanae, quas & Leptocarya uocant, stomacho infestæ sunt: ipsæ tamen tritæ, & in aqua mulsa potæ, tufi ueteri medentur: tostæ & cum exiguo Piperis potæ, destillationem concoquunt. Crematarum cinis cum axungia aut adipe urfi perunctus alopecijs capillum reddit. Aiunt nonnulli usta earum putamina, & in cineris speciem redacta, cum oleo, casiorum oculorum pupillas infantibus denigrare, peruso sincipite.



*Auellana nux.**Auellana sylvestre.*

**N** Vces, à Ponto, vnde asportata, domestica sunt & sylvestres. Domesticarum alie oblongæ sunt, alie rotundæ. Oblongæ, suauiores gustu. Ea tardius quam rotundæ maturescunt.

### Morus. CAP. CXLII.

#### NOMENCLATURA.

Gr. Μορέα ἢ Σινάμινεα. Lat. *Morus*. Ital. *Moro*.

Gal. Meurier. Off. Latino nomine usurpatur.

**M**orus arbor nota est, cuius fructus aluum soluit, stomacho inutilis est, & facile corruptionem sentit. Hoc idem præstat Mori succus: decoctus autē æreo uase atq; insolutus, adstringentior redditur. Facit ad fluxiones, nomas, & tonsillarū inflammatioes, addito mellis exiguo. Sed inolefcit uis eius adiecto scißili Alumine, Galla, Croco & Myrrha: itē myricæ semine tri,



**Morus.**

Iri, et Thure. Immatura Mori poma siccantur, tusaq<sup>3</sup> acinorū Rhois uice obsonijs miscentur, ut cæliacos inuent. Radicis cortex decoctus in aqua, & potus aluum resoluit, latas uentris tineas excutit: his quoque auxiliatur, qui Aconitum hauserūt. Folia trita ex aceto illita, ambustis igni medentur, tinguntq<sup>3</sup> capillum, uitium & Fici nigræ frondibus simul coctis in aqua cælesti. Succus foliorum cyathi mensura potus, contra phalangiorum morsus auxilio est. Feruesca-

ti corticis & foliorum iure dentes aptissime in dolore colluuntur. Radix circiter messem incisa, facto in ambitu scrobe, succū mittit, qui postridie concretus inueniri solet. Is in dolore dentium efficax est. Tubercula discutit, & aluum purgat.

**M**orus alba et nigra nunc Gallijs cognite sunt. Multo minus astringunt, Mora alba, quam nigra, nempe admodum & manifeste dulcia, quamuis aliquantum insipida, Matura Mora soluant corpus, immatura (sicca) astringunt. Manducata ante omnem cibum, statim è stomacho descendunt, viam cibis qui ea consequuntur parant: quod si ab olio cibo edantur, & se & alium cibum corrumpent.

## Sycomorus. CAP. CXLIII.

### NOMENCLATURA.

§

Gra.



Græ. Συκόμορος. Lat. Sycomorum. Ita. Sicomoro.  
Gal. & Off. incognita arbor.

**S**Ycomorum aliqui etiam Sycaminum, id est, Morum, uocant, cuius fructus Sycomorum etiam propter inefficacem gustum appellatur: arbor est magna, fico similis, frondosa, multo lacte abundans, folijs Mori. Pomum ter aut quater anno fert, non ramis, ut ficus, sed caudice ipso, Caprifico non dissimile, dulcius grossis, sine granis interioribus, quod non maturescit, nisi ungue aut ferro scalpatur. Nascitur plurimum in Caria, Rhodo, locisq; non multi tritici feracibus, ubi prouentu sæcundo restibiliq; iuuamentum adfert, cum annonæ caritas premit. Pomum aluo utile est, sed perquam exilem præbet alimoniam. Stomacho aduersatur. Succus primo uere tenera arbore, antequam fructum ferat, eximitur, lapidis ictu summo cortice desquamato: si enim altiore plaga uioletur cortex, nihil effluet. Spongia aut uellere, lachryma excipitur, quæ siccata & in pastillos coacta, fictili uase reponitur. Vis succi emollit, uulnera conglutinat, discutit collectiones coctioni repugnantes. Bibitur etiam aut illinitur contra serpentium morsus, duratos lienes, stomachi dolores, & perfrictiones, celerrimè teredinem sentit. Gignitur & in Cypro arbor genere distans, quæ cum sit Ulmus, prædita tamen est folijs Sycomori, fructu Pruni magnitudine, multo dulciore, supradictis cætera similis.

**H**abet id proprium Sycomorus (propria Aegypto arbor) ut cæsa uiridis persistat, nec siccetur, priusquam in aquâ immittatur. Hæc Aegyptiam, sed nec Cypriâ cognoscimus, ac proinde supersedere satius, quam plura dicere.

Fici. CAP. CXLIIII.

NOMENCLATURA.

Græ.



Gr. ΣΥΚΗ. Lat. Ficus. Ita. Ficho.

Gal. Figuier.



Ficus.

**F**ici maturæ recentes stomachum lædunt, aluiū soluant, sed facile contracta ab eis fluxio sistitur, sudorē euocant papulasq̃, sitim sedant, calorem restringunt. Siccis natura excalfaciendi, uires alunt, sed sitim magis stimulant. Aluo utiles, rheumatismis uentris & stomachi contraria: gutturi autē, arteriæ, renibus, uesicæ, & ijs quos longa ualetudo decolorauit, anhelatoribus, hydropicis, comitialibus aptissima. Feruescētæ cū Hyssopo & potæ, thoracem purgat: tussi ueteri, diuturnisq̃ pulmonum

uitijs conueniunt: aluum molliunt tussæ cū Nitro & Cnico, dein manducatæ. Decoctum arteriæ et tonsillarū inflammationibus gargariatu prodest. Cum hordeacea farina cataplasmatibus miscentur, & in muliebres fatus cum Fœnugraco & ptisanâ. Cæterum cum Ruta coctæ torminibus infunduntur: coctæ illitæq̃, duritias discutiunt, parotidas et furunculos emolliunt, panos ad maturationem perducunt, maxime Nitro, Iri aut calce addita. Crudæ si cum antedictis tundantur, eadem efficiunt: cū Malicorio, pterygia purgant: cum atramento sutorio, deploratis uere tibiarum iuxtionibus, & cacoethicis ulceribus medentur. Quin et cū uino decoctæ addito. Absinthio et hordeacea farina, utilis



utilissimè hydropicis illinuntur. Crematæ cum cerato sanāt per-  
niones, pruriges, sonitusq; si crudæ terantur, & Sinapi liquo-  
re q; aliquo exceptæ auribus instillantur. Tam sylvestris quàm sa-  
tiua Fici lacteus succus coaguli modo lac contrahit, concretumq;  
dissoluit, ut acetum. exulcerat corpora, meatus aperit, soluit al-  
uum, uulnam recludit cum detrita Nuce græca potus, menstrua  
ciet cum luteo oui appositus, aut Tyrrhenica cera: podagricorū  
cataplasmatibus cum farina Fænigræci et aceto utilis: lepras, liche-  
nas, utiligines, uitia cutis in facie, psoras, ulcera in capite manan-  
tia, cum polenta expurgat. Instillatus plagæ, percussis à scorpio-  
ne, uenenatorum ictibus, & rabiosi canis morsibus auxiliatur.  
Prodest dentium dolori lana exceptus, & canis eorum addi-  
tus, uerrucarum informicationes tollit cum adipe, circumlita in  
ambitu carne. Hoc idem præstat succus è teneris ramis sylvestris  
Fici, qui lacte prægnantes, silente adhuc oculo tusi exprimuntur,  
& siccatus in umbra reponitur. Et lac & succus imponuntur  
exulceratorijs medicamentis. Decocti cum bubulis carnibus ra-  
mulis ficulni, facilem afferunt decoctionem. Lac efficiunt quod  
magis soluat, si inter coquendum Ficulneo surculo, spathæ loco,  
moueatur.

**F**icus hodiè trium specierum ab extraneis afferuntur. Flaus, sparteis  
corbibus compacta. Alia in cistis, interstratis Lauri folijs. Tertia è  
Mafsiliensi prouincia veniunt minutis & turbinatis sparteis corbibus  
inclusæ. Paruæ hæ sunt, sed admodum suauis. Caricas peculiare suum  
habere genus censuit Hermolaus in corollario. Hæ aperta sunt.

## Grossi. CAP. CXLV.

### NOMENCLATURA.

Gr. ὄλυνθici. Lat. Grossi. Ita. Fichi  
grossi. Gal. Les Gros.

**G**rossi, quæ Erinei nonnullis uocantur, coctæ, illitæ, stru-  
mas nodosq; omneis emolliunt. Crudæ formicas, uerru-  
cas



cas & thymos, nitro farinaq; additis, tollunt. Folia eadem possunt. Illita cum sale & aceto ulcera in capite manantia, epinyetidas & furfures sanant: ijs ficosæ extuberationes, & genarum scabritia perfricantur. Nigræ Ficus folijs cauliculisq; candidæ utiligines perunguntur: faciunt ad canum morsus, & ulcera quæ ceria, id est, fauos, uocant. Grossi cum sylvestris Papaueris folijs ossa extrahunt: furunculos cum cera discutiunt, contra muris aranei morsus, & scolopendræ uenena, cum Eruo & uino illitæ, auxiliantur. Fit ex cinere Ficus tam sylvestris quàm sativæ lixiuium, crematis ramorum cauliculis, quod subinde macerari opus est & inueterascere: siquidē inter caustica intelligitur. Gangrenis prodest: nanque expurgat & consumit quæ excrescunt: eoq; sic utendum est. Spongia assidue hoc lixiuium imbuta superponitur. Interdum dysentericis, & in fluxiones uetustas, & sinus cuniculatim exedentes, magnosq; instillari conueniet. Etenim purgat, conglutinat, carne replet, & oras committit, non secus atque emplastra, quæ cruentis uulneribus inijciuntur: enema uocant. Bibitur ad discutiendum sanguinem concretum, & contra præcipitationes, rupta, conuulsa, cum cyatho aquæ recenter colatum, addito olei exiguo. Cæliacis, dysentericis per se cyathus datus prodest, neruorum uitij, conuulsionibus. Commode illinitur ex oleo, utpote quod sudores moueat. Aduersus Gypsi potum et phalangiorum morsus bibitur. Hec eadem præstant reliqua lixiuia, præsertim quernum, omnia tamen adstringunt.

## Persea. CAP. CXLVI.

### NOMENCLATURA.

Gr. Περσεα, Lat. Persea. Ita. Perseo.

Gal. Off. ignota.

**P**ersea arbor est in Aegypto, fructum ferens cibo idoneum, stomacho utilem, in quo phalangia cranocolapta nomine

inue



inueniuntur, præsertim in Thebaide. Arida folia in farinam redacta, illitu sanguinis eruptiones sistunt. Arborem hanc proderunt aliqui in Perside exitiosam esse, translata in Aegyptum, mutata natura in cibos receptam.

**P**ersea Aegyptia, non est nostra Persica. Vtraque tamen è Perside è ducta. Persica in frigidis regionibus prouenit. Persea Rhodi seruen-  
ti regione vix florem emittit. Perseam scribit Galenus malignam & venenosam in Perside, asportatam in Agyptum hac malitia defuncta.

## Iberis. C A B. CXLVII.

### NOMENCLATURA.

Græ. Ἰβέρης. Lat. Iberis. Ita. Iberide.

Gal. Chasse rage.



Iberis.

dè tractat in sequenti libro, adieclitum hoc caput non iniuria esse videtur. Qui enim acris herba cum arborum serie?

**I**beris siue Cardamantica, folia habet Nasturtij, uere uirentiora: caulem cubitalem, aut minorem: in incultis nascitur: æstate lacteum florem promit, quo tẽpore efficacior est. Radices duas Nasturtio similes habet, calfacientes & adurentes. Ipsæ enim ischiadicis cū salsa axungia emplastri modo utiles, quaternis horis alligatæ, ut dein in balneas descendantur, & postea oleo cum lana locus perungatur.

**C**um clarum sit Iberidem idem esse cū Lepidio, quo



# PEDANII DIO-

SCORIDIS ANAZAR-

bei, de Medicinali materia, Li-

ber secundus. Ioanne Ru-

ellio Sueffionensi

interprete.

*Ad puncta annotationes doctæ &  
compendiosæ.*

## P R A E F A T I O.



**I**N PRIMO, charissime Aree, Libro, quem de medicinali materia condidimus, de aromatibus, oleis, unguentis, arboribus, & nascentibus ex eis succis, lachrymis, seminibusq; differuimus. In hoc autem secundo de animantibus, melle, lacte, adipe, frugibus, atque oleribus explicabimus, subnexis herbaceis, quæ acri prædita sunt facultate, utpote quæ cū ipsis cognatiōe iuncta sunt: qualia Alliū, Cēpa, Sinapi, intelliguntur. Idq; ideo, ne cognatorū vires disiunxisse videamur.

## Echinus, siue Erinaceus. CAP. I.


### N O M E N C L A T V R A.

Gr. Εχίνος θαλάττιος. Lat. Echinus marinus. Ita.

Riccio marino. Gal. Herison de mer. Porc espic.

*Marinus*





**M**arinus Echinus stomacho uentriq<sup>ue</sup>, utilis est, urinam cit, huius testa cruda inassata, commodè medicamentis admiscetur, quæ psoras abstergunt, crematæ uerò cinis sordida ulcera expurgat, luxuriantem carnem reprimit. Terrestris Erinacei corium combustum alopecijs cum Pice liquida aptissime illinitur. Assiccatum corpus, & aceto mulso potum, renum uitij auxiliatio est, item aquæ quæ cutem subijt, conuulsionibus, elephantia & malè habitis, quos cachectos uocant, uiscerum fluxiones exiccat. Eiusdem iecur scitili solibus excocto arefactū, ad eosdem usus utilissime reconditur.

**E**chinus Marinus spinosus est, rotundus. Echino terrestri cetera similis, nisi quod spinæ nigriores & breuiiores sunt. Crustam habet ab aculeis, cochlearum forma, & in huius connexo carnem, partim luteam, partim caruleam. Cibis est non ingratus gustu, modo ut decet preparatur. Spinis, orbiculatim conuolutus, pedū loco graditur, eoque fit ut plerique retritit reperiantur aculeis. Est & aliud maioris genus, quod longius à littore capitur. Hunc Echinometram uocant. Erinaceorum omnium cinis abstergit, digerit, attrahit. Echinus terrestris animal est cuius cognitum, nunc canino, nunc porcino rictu. Noctu tantū è latebra prodit. Frigida eius natura, multa que huius superfluitates, nutriendis seruiunt aculeis. Testes habet renibus animum more astrictos, ac  
ideò



ideo velocissimus est in coitu. Perterrefactus pile in modum sese contrahit, at superuncta aqua, distrahitur, & incedit. Caro eius medicinis, quam cibis aptior, quippe terrestris, & digestionem non parens. Histrix Africanum & Indicum animal, ex Erinaceorum est genere.

## Hippocampus. CAP. II.

### NOMENCLATURA.

Græ. ἵπποκαμπός. Lat. Hippocampus.

Ita. Hippocampo.

**H**ippocampus marinum animal est exiguum, cuius cremati cinis exceptus, cum liquida pice aut axungia seu Amaricino unguento illitus, alopecias replet.

**I**ndicat hac dictio Hippocampus prægrandem Erucam, quod vulgari-  
ribus maior sit, ideoque nihil mirum si hanc exiguum animal vocet  
Dioscorides. Nam additam (Hippo) dictionem, Græcorum idioma facit.  
Animalculum est mediocri Gambaro, & corpore & forma simile, præ-  
terquam quod brachias bifidas non habet, collo & capite oblongo, &  
in totum colore bruchis ad simile, è nigro rubescens, subq; terram in hor-  
tis & campis delitescens ac herbarum & frugum radices edens. Itali  
Cagne & Orsolane: ut Hippocampus, Fallopa vocant. Hippocampi ci-  
nis desiccatur & resoluit.

## Purpura, buccina, eorumq; volutæ.

### CAP. III.

#### NOMENCLATURA.

Græ. πορφύρα κνευξή κίονια. Lat. Purpura Buccina.

Cionia. Ita. Porpore Buccine Cionie.

**P**urpura usta exiccat, detes abstergit, excrescētias in carne  
cohibet, ulcera purgat, & ad cicatricem perducit. Eadem præ-  
stant cōcremata Buccina, sed uehementius vrunt. Si quis salis ple-  
na, fictili crudo adurat, dentifricio conueniunt, ambustis utiliter  
illinuntur, quibus solui medicamentum non oportet: nā posteaquā  
vulnus cicatricem duxerit, ipsum in testa modum induratum sponte  
sua decidet. Fit etiam calx è Buccinis, ut in eius mentione de-


k

mon



monstrabimus. Cionia uocatur Purpurarū Buccinorūq; mediae partes, circa quas testa uolumen clauiculatim intorquetur, cremata simili modo, maiore purpuris buccinisq; facultatē urendi consequuntur, quoniā apprimendi naturā obtinet. Buccinorum carnes ori gratæ sunt & stomacho utiles, sed aliū nō molliunt.

**P**urpure dura sunt testæ, & in se liquore illum continenti, è quo superba illa vestes antiquitus finge-  
batur. Lique-  
rem hunc ha-  
bent in candi-  
da gutturi ve-



na, quæ in mortuis nō reperitur, sed cum ipso spiritu euanescit idq; quo viuas caperent, eo artificio piscatores utebatur. Est Purpuris lingua digitali longitudine ea duritia ut cuiusvis ostraceorū generis (è quorū carne pascuntur) testam perforet. Huius rei gnari piscatores, captis in littore ostreis, nassarū formā è iuncis intextis ostreis, metiebatur, ac longo fune alligatas in mare proiciebat. Tamē ostreae siti pene emortuæ, ut senserāt aquā, statim aperiebāt sese, ad quas accurretes purpure ut inde pascerentur, durā illā linguā ostreis inferebāt. Eæ punxi se sentiētes, occlusa testa, ac inter duos eius parietes linguā Purpurarū oppressā, piscatoribus viuas offerebāt. Per quinquaginta dies extra aquā viuunt Purpure, sola sua in nutrimentū salina cōtenta, ac statim ab attacta dulci aqua moriuntur. Species purpurarū sunt Buccina, ita nūcupatæ, quod cornu militaris imaginē referāt. Maiores sunt purpure, cū longo canalis in modū rostro, vnde linguā exerūt. Id totū è spinosis circulis est cōpactū, & in Buccinis nō reperitur. Et purpure & Buccinae tot habet in dorso circulos, quot vixere annis. Buccinae solis affiguntur & reperiuntur in scopulis.

Mituli.

CAP. IIII.

NOMENCLATURA.

Græ



Græ. *Μυταίς*. Lat. *Mituli*.

**M**ituli laudatissimi in Ponto. Cremati eundem Buccinis effectum præbent: priuatim plumbi more eloti, oculorū medicamentis tum melle utiles habentur, genarum crassitudines absumūt, albugines purgant, & cætera quæ oculis caliginē offundunt. carnes eorum ad canis morsus utilissimè imponuntur.

## Tellinæ. CAP. V.

## NOMENCLATURA.

Græ. *Τελλῖναι*. Lat. *Tellinæ*. Ita. *Telline*.

**R**ecentes Tellinæ aluo utiles, sed maxime ius earum: salita uruntur, tritæq; in cinerem & cum cedria instillatæ, auulsos pilos renasci non patiuntur.

## Chamæ. CAP. VI.

## NOMENCLATURA.

Græ. *Χῆμαι*. Lat. *Chamæ*. Ita. *Chame*.

**C**hamarum Conchularumq; in exigua aqua decoctarum ius, aluum ciet: id cum uino assumitur.

## Annotatio in Cap. iij. v. vj.

**C**um diuersis in capitibus de Mitulis & Tellinis scripserit hoc in loco Dioscorides, & Galenus libro de facultate simplicium in cap. De vipera, tractet de Mitulis: & de Tellinis proprio capite, ac peculiare cuiq; & diuersas ab alterutro facultates assignet, nec aliter egerit Paulus Aegineta fidelis utriusque imitator, constat nō vnā (ut quidā volūt) sed diuersas esse Ostreorū species, Mitulos, & Tellinas. Eæ notissimæ sunt in Italia & maxime Romæ, vbi magna illarum probat copia, quod probè ab arena purgatæ, gustui gratæ sint. Mitulos nullus est qui deliniet, & proculdubio, aut nō reperiuntur, aut hoc nomine nobis sunt incognite. Hiattule eæ esse possunt quæ cum leni testa, aperta in Adriatici maris ora reperiuntur.

k 2

vng



## Vnguis odoratus. CAP. VII.

## NOMENCLATURA.

Græ. οὐγγύ. La. Vnguis odoratus. It. Vnghia odorata.  
Gal. & Off. Blattæ Bisanthiæ.

**V**nguis siue onix Conchily tegumentū est, ei simile quo purpura integitur: quod in Indiæ nardiferis lacubus inuenitur: suauem ideo spirans odorem, quod conchylia inibi nardi pabulo uescantur. Colligitur posteaquā stagnantes aquæ æstius squalloribus inaruerunt. Laudatissimus qui à rubro mari defertur, candicans, pinguis, Babylonicus nigrescit, atque minor conspicitur. Ambo odoris gratia suffiuntur, sed aliquatenus Castoreum olent. Idem suffitu excitant feminas uulnæ strangulatu oppressas, comitialesq; poti uentrē molliunt. Crematū conchylum eadem efficit, quæ purpura & Buccinum.

**V**nguis odoratus, quod vnguis speciem reseat, Blattæ Bisanthiæ, (per Arabes) Officinis, ut plurimum dum vritur, ingratiū odorem spirat, Res multum ab illa præstantia disidens, quam ei in conficiēdo thimiāmate sacra etiam tribuunt literæ. Excellentē vidit Matthiolum, sed rarum: Ideo hic admonendi Pharmacopola, & officinas nō tam qnerent copia, quā certo & modico specierum delectu.

## Cochleæ. CAP. VIII.

## NOMENCLATURA.

Gr. κοχλίας κερταί & καὶ θαλάσσι. La. Cochlea terrestris & marina. Ita. Chiocciole terrestri & marine. Gal. Escargots. Ger. Schnercken.

**T**errestris Cochleæ stomacho utiles sunt, & nō facile corrumpuntur. Optimæ Sardonica, Aphricana, Astypale-

ca





ea, & quæ in Sicylia ac Chio gignuntur & quæ in Liguria al-  
pibus. Pomatiæ, id est, operculares, cognominatæ. Marina sto-  
macho idonea, & facile aluo excernitur: fluuiatilis uirus olet.  
Quæ uerò uepribus frutetisq; glutinata cohæret, quam uocant  
nonnulli Sefilon, uentrem & stomachum turbat, uomitiones  
excitat. Crematæ omnium testæ excalfaciendi & urendi na-  
turam sortiuntur: purgant lepras, uirilignes, dentesq; emēdant  
oculorum cicatrices, & uitia cutis in facie, albugines, ac uisus  
hebetudines, si cum carne sua uisæ tritæq; ex melle illinantur.  
Caudæ cum tegumentis impositæ, aquæ inter cutē tumores exu-  
gunt: sed non ante soluantur, quàm omnis hauriatur humor: po-  
dagricas inflammationes leniunt, impactos corpori aculeos illitæ  
euocant, menses tritæ & admotæ ciunt. Carnes earū cum Thu-  
re & Myrra illitæ, cum uulnera alia, tum maximè quæ nerui  
acceperunt, conglutinant: tritæ in aceto, sanguinē naribus erum-  
pentem infrenant: uiuæ corpus, & præsertim Africana, cum  
aceto deuoratum, stomachi dolores mitigat: trita cum testa, ui-  
no & Myrrha, si exiguum inde bibatur, coli uesicæq; cruciatus  
sanat. Terrestris pilos incommodos replicat, si quis abrafo acu-  
lentore eius, pilum attingat.



**C**ochlearum apud veteres adeo exquisitus fuit cibus, ut eas vndiquaq; cōquirerent, asseruaretq; & nutrent. Terrestres Cochleæ secundum eas quibus pascuntur herbas gustui grata, aut ingrata sunt. Nam quæ Calamentho, Origano, alijsve similibus herbis pascetur, eas nemo recusabit. Cōtra quæ in Lacubus, cœnũ: quæ in fluuijs, virus redolebunt. Concharum omne genus leniter cōcuias crustas seu testas habet, quibus aperiendis & claudendis natura potentes sunt. Rarũ est in quibusdã vnica & latiuscula cōcha regi. At Cōchlearũ species omnes vnica & cōtinua testa cōduntur, quã (domus vice occlusa) cum incedunt dorso appensam post se trahunt. Spiras habet hæc testa planas, cōuexas, turbinatas, acuminatas. Testas, quæ proprie Limaces sunt, non habent, macula alioqui nigra aut lutea insignes. Habent eæ, ut vulgus opinatur, certum in capite lapillum, qui tertianis remedio est. Viunt opacis & vdis in locis ex eis per alembicũ aqua paratur decorãda mulierũ faciei.

Cancrĩ.


CAP. IX.

NOMENCLATURA.

Græ. Καρκίνοι ποταμίοι. Lat. Cancrĩ fluuiatiles.

Ita. Granchi di fluui. Gal. Cancres de riuiera.

Ger. Heusser.



**C**ancrorũ fluuiatiliũ exustorum cinis, qui duo cochlearia expleat adiecto dimidio radicis Gentiane modo, triduo potus cum uino, magnoperè prodest canis rabiosi morfibus, rimas pedum, sedisq; perniunculos, & carcinomata, cũ decocto melle lenit: triti crudi, potiùs ex asinino lacte, auxiliatur contra serpentium phalangiorũ morsus, atque scorpion



ponum ietus: decocti autem & cum iure esitati, ijs profunt qui tabe conficiuntur, aut leporem marinum hauserunt: necant scorpiones triti, & cum Ocimo admodum. Possunt eadem marini, uerum inefficacius omnia praestant.

**C**Ancri quos hic describit Dioscorides, Astaci aut gamari, quas Galli (Escreuiffes) vocant, non sunt: sed solū ex crustaceorū genere cauda carens, & rotundo corpore, quod locustis & squillis oblongū est. Est inter Astacum tamen, & Gammarum differentia, quod Astacus marinus sit & crassius pisces: Gammarus vulgaris sit Escreuiffa, aut marina, aut fluuiatilis. Errant proinde medici, qui in canis rabiosi morsibus, phthisicis ve curadis: cū Cancrorū vsu Dioscorides & Galenus praescripserint, Gammaris vtuntur. Recentes medici, lapillos qui in Gammarorū capite reperiuntur, in puluerem redigunt, bibendūq; offerunt ad purgandos arenulis renes.

## Terrestris scorpio. CAP. X.

### NOMENCLATURA.

Græ. Σκόρπιος & χερσαίος. Lat. Terrestris Scorpio.

**T**errestris Scorpio tritus & impositus, suae plagae remedium est: quin estur assatus, ad eadem.

**I**etus Scorpj terrestris locis frigidioribus, innoxia, calidioribus, noxia est. Nullibi gētū venenati magis & mortiferi Scorpj, quā in Scythia frigidissima regione brutis etiā ad porcos vsque, qui morsum cuiusuis alterius animalis nō timeāt. Nouē in Scorpjs colores nēpe Cedrinū, rubeū, cineritiū, ferrugineū, viridē, fuluū cū cauda nigra, vinosum, albū & fumeū. Qui in cauda septinodes, magis alijs venenati. Cinis scorpionem qui vini ambusti erūt, illis proficiet, quibus vrina ob arenularū opilationem, aut lapidē qui in vesica sit, retardatur.

## Marinus scorpio. CAP. XI.

### NOMENCLATURA.

Græ. Σκόρπιος & θαλάσσιος. Lat. Marinus scorpis.

**M**arini Scorpionis fel conuenit ad suffusiones oculorum, albugines, & hebetudines.

**F**ertile elemētū mare, exprimēdis omnibus q̄ in alijs viuūt elemētis. Atq; adeo multa habet q̄ in nullo caterorū. Producit & scorpis.

k 4

Sed



Sed ij non satis noti. Nam quas Itali Scorpenas seu Scarpenas vocant, non esse marinos Scorpios ex Athenai & Aristotelis descriptione cōtendit Matthiolus, & dubitans proponit, piscem qui Italis Ragno dicitur fieri posse vt sit Scorpis. Habet hic in dorso spinas quasdā quibus trāfigit, venenatas, itidem & Scorpena, quēis nō raro & ē punitione piscatores confecit.

## Draco marinus. CAP. XII.

### NOMENCLATURA.

Græ. Δράκου θαλάσσιου. Lat. Draco marinus. Ita. Draco marino. Gal. Dragon marin.

**D**Raco marinus dissectus & apertus impositusq; ictus spinæ suæ qua ferit, medela est.

**D**Raconem describunt marinum Plinius & Albertus ingentem piscē, serpentis effigie, alis non amplioribus quā qua ad natandum sufficiant, ijs viribus & velocitate, vt paucissimo tempore ingentia maris spacia transcurrat. Venenata bestia, quoduis pisciū seu animalis genus, simul atque dente attigerit, morti condonans. Piscatorū arte capta, statim vt in arenam sese protrahi senserit, fossam excavat qua occultet sese. At si exactum illud Matthioli iudicium sequuti, diligenter verba Dioscoridis expanderimus, alium esse Plinij & Alberti draconē marinum, aliud Dioscoridis reperiemus, duabus his coniecturis emoti. Prima est, draco marinus Dioscoridis ferit cum venenata spina, seclus & appositus plagæ suæ remedio est: & illa ingens bellua, sola dente noxia est. Secunda est, paucis verbis medicum huius animalis negotium explicat Dioscorides. Ipse suo veneno remedio est. Quod difficillimum apparet in pręgrandi bellua. Qui sit vt Dioscoridis Draco marinus, a superiore differat, quin & ē minutis sit piscibus, quos inter littorales numerat Aristoteles. Poterit esse Draco marinus, quē vir ille eximius a se visum describit, longus in morem piscis quem Sommeſso Itali vocant capite & rostro draconis peculiari, pectore arcuato, dorsi spina in gibbi modum subrecta, totus ē capite ad caudam per rectas ex utroq; latere lineas spinosus. Spina per capitis medium eleuata, crista speciem præbent. Nec disparibus spinis torquis figura cingitur collum, ē quibus linea in latum pectoris procedit. Hæc duarum media est, quæ suo quaque latere pectus inscindunt.

Sco



## Scolopendra. CAP. XIII.

## NOMENCLATURA.

Græ. Σκολόπενδρα θαλασσία. Lat. &amp;

Ita. Scolopendra marina.

**S**colopendra in oleo decocta si illinatur, auellit capillos, sed contactu pruritus facit.

**S**colopēdra marina terrestri (referēte plinio) similis, statim à deuorato hamo intestina omnia euomit, ac inde extracto, rursus ea innocuè reuomit, & sane bella esset huius animalis anatomia, si quis eo potiri & noscere artificium posset. Scolopendra terrestris, Italis, Centogābe, insectū spadicij coloris, minimi digiti longitudine, cum in humecto solo repit, Cicindule in morem micat, digitis attrectata, pruritum vt Scolopendra excitat. Amat humentia adiu, & salsas hortorum arcas, & estuofas paludes.

## Torpedo piscis. CAP. XIIIII.

## NOMENCLATURA.

Græ. Νάρκη θαλασσία. La. Torpedo marina. Ita.

Torpedine marina. Gal. Turpilles.

**M**arina Torpedo diuturnis capitis doloribus admota, cruciatus uehementiam mulcet: eadem apposita euerfam sedem prociduamq; coeracet.

**T**orpedo piscis ab effectu nomen sortita, quod per medios hamos, setas, & hastam piscatoriam vis eius pertransiens, stupidam reddit manum, tum subinde & totum piscatoris corpus, dorso est in rubedinem vergente, supra quod distinctas habet notas, ingrescentes, oculis non dissimiles, interiori corporis parte albescit. Experiētia didicit Galenus, in capitis doloribus, euerfa & procidua sede non mortuā, sed uiuam Torpedinem admoendam. Hunc piscem Veneti Tremalo vocant, quod à stupore membri, tremorem inducat: Romani Batti potta, & fatterigia.

## Viperæ. CAP. XV.

## NOMENCLATURA.

k s

Gra.



Græ. *Ἐχιδνα*. Lat. *Vipera*. Ita. *Vipere*.  
Gal. *Viperes*. Ger. *Brantschlangen*.

**V**iperinae carnes si coactæ edantur, claritate oculis asserunt, nervorum vitis auxiliantur, incrementum strumas reprimunt: detracta autem cute, caput caudamque, quoniam carne uacant, amputari debent: quippe commentitium est, quod precipitur, certam utrinque mensuram præcidi oportere. Reliquum uero corpus exemptis interranis elotum dissectumque, discoquitur cum oleo, uino, salis exiguo, & anetho. Aiunt is qui uiperas esitens, pediculos procreari, quod plane à ueritate abhorret. Adiciunt aliqui longam senectutem agere, qui eo cibo uestuntur. Sal ex eis ad eadem conficitur, sed inefficacior est. Vina autem uipera in fictile nouum demittitur, adiciuntur salis caricumque, tritarum, singulatim quinque sextarij, mellis cyathi sex: mox fictilis operculum luto oblinitur, & fornacibus inassatur, donec sal in carbones redigatur, qui postea tritus in pulueris faciem, reconditur. Plerumque, ut ori gratior fiat, immiscetur Nardi spica, aut Folium, aut Malabathri momentum.

**M**ale intellectus Aristoteles doctissimis etiam uiris erroris uiam præstruxit: Non enim id is sensit, Viperinos partus non nisi necata matre nasci, sed eos qui tardius exeunt (Siquidem non plus uno, die nascitur) more impatientes, rodere qua continentur pelliculam, quo citius prodeant in lucem. Itali circumforanei, qui serpentibus alendis quæstum faciunt, uiperas in capsulis ostentant, fetibus comitatas, & nequicquam à partu lasas. Nicander & Galenus abunde uiperam deliniant. Vipera calida & sicca est, anguillarum in morem condita, nempe cum oleo, sale, anetho, & porris. Viperam curare totum corpus per cutis poros, duorum in Asia & Misia hominum experientia approbat Galenus, qui elephantiasis, ab hausto uino, cui immortua fuerant Vipera, cadentibus pustulis & renouata, anguinem & ostreorum in morem, pelle, sani euaserunt. Vipera in his qui corruptis abundant humoribus, comestæ pediculos creant. Olim ut anguille mandebantur in Aegypto, & nostro seculo



lo in orbis recenter inuenti multis partibus, conficienda Theriaca ratio,  
& trochiscorum è Viperis, non ab alio, quam à Galeno petenda.

## Senecla anguium. CAP. XVI.

### NOMENCLATURA.

Græ. Ἰνέκλας ὄφεθ. Lat. Senecla anguium. Ita. Spoglia delle serpi. Ger. Schlangen balck.


**S**eneclus anguium in uino decocta dolori aurium, infusu,  
& dentium collutione, auxilio est. Addunt eam in medi-  
camenta oculorum, sed præcipuè uiperinam.

**S**enecla anguium, seu Vernatio nota res, nempe cuticula qua sese  
sanguis primo vere è terra prodeuntes exiunt, saxi aut stirpibus  
affricato & restricto corpore.

## Lepus. CAP. XVII.

### NOMENCLATURA.

Græ. λαγὼς θαλάσσιος καὶ χερσαίος. Lat. Lepus  
marinus & terrestris. It. Lepre marina & terrestre.  
Gal. Licure de terre & de mer.



**L**epus mari-  
nus Loligi-  
ni parua simi-  
lis est, qui per  
sefe tritus aut  
cū urtica ma-  
rina illitus, ca-  
pillis euellit.  
Terrestris Le-  
poris in assatu  
cere



cerebrum manditur, iuuandis tremoribus qui ualitudine contracti sunt: affriclu aut cibo facilem infantibus dentitionem præstat: exustum caput & cum adipe ursino aut aceto illitum, alopeciarum inanitatibus medetur. Leporinum coagulum post tri-  
duum à concubitu potum, conceptum adimere, partusq; spem in-  
tercipere proditur, uulua & alui fluore sistit, comitiales iuuat,  
contra uenena ex aceto bibitur, præsertim aduersus concretum  
lac, & Viperarum morsus. Sanguis eius si calidus illinatur, ui-  
tia cutis in facie, uutiliginem, lentiginesq; sanat.

**L**epus marinus in Adriatico mari, est quædam velut carnis parti-  
ticula, Lepori solo colore similis, sed qui in India gignitur, pilos ha-  
bet & corpus longe maius. Tertiam Leporis marini speciem profert Al-  
bertus cætera reliquis piscibus similem, præter caput quod Lepori simile  
habet, & spinam dorsi rubram. Nullum animalium, excepto Lepore  
terrestri, coagulum habet in ventre. Superfœtat itidem ut cuniculus,  
quod tantam horum copiã facit, non quod hermaphroditi sint, ut qui-  
dam existimant. Caro Leporis crassum sanguinẽ gignit, humores me-  
lancolicos, & difficulter digeritur. Prodest tamen dysenteria maxime  
tosta. Siccatum iecur, iecinorosos iuuat, si bibatur. Totus exustus in va-  
se probè operto, valet ad proritandam vrinam, ad calculos renum, &  
vesica. Fel Leporis xuccharo mistum, flocculos albos qui visum offu-  
scant, aufert. Stercus Leporis naturæ mulierum impositum, fluxus mē-  
struos potenter refrenat, & matricem desiccat.

## Pastinaca marina. CAP. XVIII.

### NOMENCLATURA.


Græ. Τρυγὼν θαλασσία. Lat. Pastinaca marina.

Gal. Glorin. Ger. Roch.

**M**arina Pastinacæ radius, qui eius cauda enatus aduer-  
sis squamis reflectitur, dentium dolorem mitigat: nam  
eos frangit & euocat.

**P**astinaca piscis est latus & cartilaginosus, ut Raya, Torpedo, &  
similes. Habet in superiori caudæ parte, robustum & acutissimum  
aculeum, qui in transfigendo præsentaneum affert venenũ, atq; adeo  
mor





mortiferum, vt Aetius testatur, siquidem vi sua neruos vsque penetrans, spasmus, & post, mortem inducit. Pastinaca cinis, cum aceto mistus, suæ plagæ remedio est. Iecore oleo incocto, scabies non hominum, sed pecorum etiam inungitur, nec moratur effectus. Editur Pastinaca sublata è dorso cum aculeo illo mortifero, parte omni illa fulua, quæ Croco similis est, adempto etiam capite.

## Sepia. CAP. XIX.

### NOMENCLATURA.

Græ. Σηπία. Lat. & Ita. Sepia.


Gal. Seche. Ger. Blacsfich.

**S**epia coctæ dū estur atramentū, agrè cōcoquitur, aluū molis collirijs è testa factis cōueniēter genarū scabritiæ perfriantur, ustu in sua testa donec id quod crustosum est abscedat, postea tritū expurgat uutiligines, surfures, dentes, & uitia cutis in facie. Elotū in medicamenta oculorum addi solet, contra albugines, oculis iumentorum efficaciter inspiratur: pterygia oculorū absomit, cum sale tritum & iniectum.

**S**epia Polipis nō absimiles, præterquā quod ampliori sunt corpore, & plures habēt pedes. In Gallijs cū alibi, tum apud Xanctones cognita. Osse albo quod in dorso reperitur, exterius durū, leue: interius tenerū, fungosum, leniter rude, subtilissimis & intortis lineamētis plenū: ad anulorū surfurū utūtur aurifices et ex eo medici dētificia faciunt. Vetus est illud & iuxta verū de Sepijs, quod è se in aquā nigrore protenso, tātisper visum frustratur, dū se premi senserūt. Sed ea nec est ho-

minum





minū sollertia, vt nec Sepia suū  
atramētū, nec Torpedini torpor  
nec Loligini marcor profint, quo  
minus in potestate hominum ve  
niāt. Valētibus stomachis probē  
digerūtur Sepia, aliā difficulter  
permeāt, & crudos humores ge  
nerant. Sepiarū oua cum alliatā  
(quā vocant) à salacibus man  
duntur, quo potentiores sint ad  
coitum.

## Mullus piscis. CAP. XX.

### NOMENCLATURA.

Græ. Τρίγλα. Lat. Mullus. Ita. Triglio.

Gal. Barbeau.

**M**ullorum assiduo cibo acie oculorū hebetari constat. Is  
marini Draconis, Aranei, ac Scorpionis morsibus me  
detur, si crudus atque dissectus admoueatur.

**M**ullū quē tantopere ob caput amplū, & sapidū iecur antiqui expe  
tiuerunt, vt librā piscis libra argenti penderent, hodie Itali penē Græ  
co nomine, Triglia vocant, qui piscis est marinus, colore tabū exprimēs,  
seu eum quē illi, Παύροχρο vocant. Sit ne ille quē Barbatū vocamus,  
incertū: fluminalis est species, ille marinus, aut in piscinas marinas in co  
loniā abductus. Quod a nostro Barbato alienū est. Veneti riglias, Spa  
ros vocant.

## Hippopotamus. CAP. XXI.

### NOMENCLATURA.

Græ. Οἰχίς ἱπποπόταμου. Lat. Testes hippopotami.

It. Testicoli de l'Hippopotamo. Gal. cheuaus marins.

**H**ippopotami testes exiccati ac triti, contra serpentium  
morsus bibuntur.

**H**ippopotamus piscis è Plinio & aristotele, magis quā à marinis pi  
scatoribus agnitus, corpore asinū nō excedit, in bā, dorso, hinnitu  
equum exprimit canda apri. Auersus intrat in segetē: Sibi ipsi sangui  
nem,



nem, prauis humoribus distentior, acuminatis iuncis elicit. Fluentē cum visum est, cæno aut alga superpositis, sistit. Cute est gladio impenetrabili, ex eaque scuta & thoraces fiunt. Cinis corij illitus cum aqua, panos sanat. Adeps rigorem febrium eleuat.

## Fiber. CAP. XXII.

### NOMENCLATURA.

Græ. Κῶσος & ὄρχις. Lat. Fibri testiculi. Ita. Testicoli di Castoreo. Gal. Bieure. Ger. Ein Byber.



**F**iber ancipitis uitæ animal, plerūque cū piscibus & Canceris ex aqua uictū capeſſit. Huius testes ſerpētū uenenis aduerſantur: ſternutamenta mouēt, & in uniuerſum uarios obtinent uſus: ſiquidē menſes ac partus ciunt, duabus drackmis cū pulegio poti: partus ſecundasq; eyciunt, contra inflationes, tormina, ſingultus, uenena, ixiāmq; ex aceto bibuntur. Lethargicos, & utcunque ueterno obdormiſcentes excitant infuſi: cum aceto autem & roſaceo, olfactu & odoris ſuffitu, idē faciunt: poti & illiti proſunt tremulis, conuulſionibus, & omnibus neruorum uitijſ: in ſumma, caſaſtoriam uim habent. Eligi debent testes ex uno ortu cōnexi ſunt (ſieri enim nō poteſt, ut gemini folliculi in una



in una membrana coniuncti reperiantur) liquore intus ueluti cerebroso, odore graui, & uirus redolente, gustu acri mordēte ac friabili, naturalibus tunicis circumdato. Quem fraude aliqui corrumpunt, conijcientes in follem gummi, aut ammoniacum cum sanguine & castorio subactum, & ita exiccantes. Vanū est quod traditur, testes ab ipsis euelli, & à sese abijci, cum uenatu urgentur: siquidem tangi nequeunt, ita, ut in sue, substricti. Operæ autem pretium est diuisa pelle melleum liquorem cum euestiente tunica assumere, & siccatum potui dare.

**C**astor inferiori Germaniæ & Galliæ notum animal, quā Rhodanus Rhenus, & Danubius fluunt, tamen Austriæ & Vngariæ, amphibiū est in terra & in aquis uiuēs, Lutræ simile, præterquā quod aliquātum maior est. Qui fit ut inter medicos quidā, Lutræ testes, pro castoreis usurpent. Forocissimis & acutissimis est dentibus, quibus truncos arborum dissecat, ad parenda in cauernis tuguria. A demorso membro dentes non prius aufert, quā tusorum ossum crepitū senserit. Castoreum calidū est & siccum. Cum in spasmo, tremore, stomachi singultu, paralyti, abundantia humorum eijcienda, ac desiccandū est, tum Castoreum in potionem, aut exterius impunē applicabitur. Quod fieri nō nisi maximo detrimento potest, quibus spasmus ē sicca qualitate, prouenit ex humorū & alimenti defectu, mordacitate, vel acrimonia. Huius grauis sapor & odor, corpori nihilum nocent, si probē applicentur.

## Mustela. CAP. XXIII.

### NOMENCLATURA.

Græ. γαλή. Lat. Mustella. Ita. Domola.

Gal. Hermine. Ger. Meuszdres.

**M**ustela quæ in domibus nostris oberrat, ambusta exenteratur, & inueterata sale, in umbra siccatur. Ea binis drachmis cū uino pota, aduersus omnia serpentium uenena præsentaneo est remedio. Toxico, simili sumpta modo, resistit. Eius uentriculus Coriandro sarctis inueteratusq; percussis à serpente, & comitialibus potu auxiliatur. Cremata in fictili podagriis cōfert, cinere ex aceto illito: sanguinēue peruncta strumæ in-

nam



uantur, comitialibus etiam prodest.

**M**ustella Latinis Græca duo nomina representat, nēpē γάλα & ἰκτίε  
Galarū species sunt, Mustella, quæ licet generis sit nomē, tamen id  
propriè animal significat, quod Galli Herminas vocāt. Vuisella vulga  
ris est fouinus. Fretta, & Latinis Vinerra, est quæ Furonē nūcupāt. Do  
mestica Gale sunt Vuisella: Hermina & Fretta sylvestres. Ictidū itidē  
duo sunt genera. Vnū quod Mardrā seu Mardrā vocāt: Alterū, quod  
Galli quod puteat, Putoys vocāt. Mustella nomē, in hac quinq; proten  
ditur. Dimicaturā cū serpētibus, Ruta sese ad bellū muniūt. Cōficiūt &  
Basiliscos, licet in ipso etiā certamine è graueolentia cōmoriātur. Mustel  
læ cinis illitus, capiti prodest, & oculorum suffusionē.

## Ranæ. CAP. XXIIII.

### NOMENCLATURA.

Gr. Βάτραχοι. Lat. Ranæ. Ita. Rane.

Gal. Grenoille. Ger. Frosch.

**C**ontra omniū serpētū uenena pro antidoto sunt Ranæ, si  
ex sale & oleo decocta edātur, iusq; earū itidē sorbeatur:  
contra inueteratos tendinū rigores pollent: illitus earū cinis, pro  
fluētis sanguinis impetus sistit, explēdis alopeciarū inanitatibus  
ex liquida pice illinitur. Viridiū Ranarū cruor auulsos genis pi  
los renasci prohibet, in uestigia euulsorum instillatus. Decocta in



aceto & a  
qua, dentium  
dolores collu  
tione leniunt.

**I**nter Ranas,  
marina, flu  
uiatiles, palu  
stres recipiūtur:  
terrestres vene  
natae sunt. Na  
scūtur nigris tā  
tum et minutis  
carneis portiūc  
lis.

Rana



lis, è queis totum deinceps corpus protenditur, cum antea nihil altud-  
essent, quam oculi & cauda. Vulgatum hodie ranarum oleum, expeti-  
tum in podagris fructum non assequitur. Quorundam experientia cō-  
pertum Ranarum sanguinem non eo esse effectū, quem describit Dio-  
scorides,

## Silurus. C A P. XXV.

### NOMENCLATURA.

Gr. Αἰλουρῶ. Lat. Silurus. Ital. Siluro.

Gal. Ignotus. Ger. Basilich.

**S**ilurus recēs in cibo nutrit, & facile præbet aliū: sale uerò  
cōditus, minimū suppeditat alimentū, arteriam expurgat,  
& uocem expedit. Illita saliti caro, aculeos & infixa corpori  
spicula extrahit. Muria eius incipientibus dysenterijs prodest, si  
in desidentium fots adyiciatur: fluxiones siquidem ad summa  
cutis elicit, ischiadicis infusa medetur.

**S**ilurum non esse Storionē ex Aristotole & Plinio cōstat, quorū alter  
robustis adeo dētibus Silurū scribit, ut ferreos etiā hamos cōminuat:  
alter inuales equos inuadere: cū Storiones quāuis pragrādes, edētes  
tamē sint. Ambo fluuiatilē Silurū describūt: at Storio mari, quā fluuijs  
frequentior. Silurus Matthiolo, in Vngariæ Danubio nascitur, &  
ab accolis Acchia nominatur: nec aliter in Germania ab accolis Rheni  
Bolich. Obuium omne animal inuadit, ferrocissimis est dētibus, huicq;  
opiniōi astipulatur Plinius qui dicat Silurū in Rheno & Danubio nasci.

## Smarides. C A P. XXVI.

### NOMENCLATURA.

Gr. Σμῆγρις. Lat. Smaris. Ital. Smaride. Non  
satis de gallico nomine constat.

**S**maridis piscis caput exustum, excrescentes ulcerum oras  
spuluillosquē reprimat, nomas cohibet, thymos clauosq; ab-  
sumit, caro non secus atque salsamentum prodest à scorpione  
percussis, aut à cane demorsis.

Ma



## Mænæ. CAP. XXVII.

## NOMENCLATURA.

Gr. Μαῖνις. Lat. Mænæ. Ital. Mena.

Piscis non satis nobis cognitus.

**M**ænæ ex capitibus cinis si illinatur, callosas sedes rimas abolet: eius etiam garum oris putrilagines collutione sedat.

## Gobius. CAP. XXVIII.

## NOMENCLATURA.

Gr. γόβις. Lat. Gobius. Ital. Gobio.

Gal. Gouions.

**G**obius recens in suillum uentrem coniectus, si consuta rimæ in duodecim aquæ sextarijs donec duo supersint decoquatur, excolatus & sub diuo refrigeratus, potui detur, alius sine molestia deijcitur, illitus contra serpentium canumque morsus auxilio est.

**S**marides & Mænæ pisces non satis noti. Matthiolus non assenerâter tamen simile Mænæ profert piscem, qui Italis Menole dicitur. Nec errare censet eos qui Smarides putarint, minutos hosce pisciculos, qui Mænæ similes Venetijs vulgo Girolî vocantur. Gobius frequens in Venetiæ lacunis provenit, & foetificat. Quod non secus scribit Aristoteles Gobium marinis littoralibus, & ubi pauca sit aqua lacunis delectari. Venetî Go vocitant. Gustu persnaues sunt, facile digeruntur, probè nutriunt, præcipuè qui in arenosis & saxosis littoribus & scopulis capiuntur. Quin & in fluuijs & lacubus Gobij repperiuntur, ob iecoris saporem in pretio, maximè ovis onusti, hujq; perfacile digeruntur.

## Thunus. CAP. XXIX.

## NOMENCLATURA.

Go. ῥῥῥ. Lat. Thunnus Ital.

Tonno. Gal. Thun.

1 2

Com



**C**onditanei Thunni caro, quam Omotarichon uocant, sumpta ijs auxiliatur, quos uisera, nomine Prester, momordet: sed oportet uinū quāplurimum subinde cogantur haurire, ita ut uomitione reddatur. Contra acrimonias esitatorum maximè ualet: canum moribus utilissimè illinitur.

**T**hunnus crassus & pulposus piscis, porco similis, sub mēsem Maiū ex Oceano per columnas Hercules in Tyrrhenum & Aegæum maria, in amplissimas partitus turmas fugienti similis procurrit, pulsus ab ingenti pisce, quem vulgo Spada vocant, quod ori insidentem habeat durissimum & acutissimū os, ensi per simile, quo demergit & perferat naues. Thunnorum fuga, Gaditanis & spectaculum prabet, & prouētum. Piscatum enim totus accurrit populus, cum ingenti strepitu vocum tympanorum, & scopietariorum. Stolidum & pavidum animal Thunnus, hoc rumore stupefactus, in terra proximavada deuoluit sese, & inibi in retia pregrandia incidens, praeda fit, & questus. Diebus canicularibus percellitur à vermiculo, è quo in furias abactus, totas naues prateruolat, nec id temporis gratus est cibus. Thunnorū pinguitudo gustui satisfacit, stomachum offendit: Contra caro gustui ingrata, non aque stomacho molesta est. Ingentes ij pisces carne sunt dura, digeruntur agrè, parum nutriunt, superfluos creant humores, ob idque saluti probioris recentibus, duritia & viscositate à sale consumptis.

### Garum. CAP. XXX.

#### NOMENCLATURA.

Gr. ραῖς ὀπ. Lat. Garum, Ital. Garo,  
Gal. & Off. Ignotum.

**G**arū omne, quod ex piscibus carnibusq; sale maceratis liquamen est, si ex eo sodus fiat, depascentia ulcera sistit: morsis à cane medetur: dysentericis atque ischiadicis infunditur nonnullis ut exulcerata adurat: alijs autē laceffenda ad quæ ulcera non senserunt.

### Ius piscium. CAP. XXXI.

#### NOMENCLATURA.

Gr. ζώμας νεαγῶν ἰχθυῶν. Lat. In recentium piscium.  
Ital



*Ital. Brodo de i pesci freschi. Gal. Le brouet des poissons frais.*

**R**ecentium piscium ius, modo per se, modo ex uino potum alium subducit. Priuatim ad hunc usum conficitur e Phycidibus & Scorpionibus, & Iulide, e Percis, & recetibus alijs saxatilibus, nec uirns recipientibus, simpliciter cum aqua oleo & Anetho.

**G**arum antiqui vocauere, quod ex piscis Gari interaneis, maceratis & dissolutis cum sale conficerent. Id postea & ex Scobro factum est: fuit olim Garum copulorum ciborum condimentum. De isto tamen non intellexit Dioscorides, sed generatim de omnibus piscium & carniū salsamentis. Ius piscium esculentū, satis ab ipso auctore explicatū est.

## Cimices lectularij. CAP. XXXII.

### NOMENCLATURA.

*Gr. Κύγεις. Lat. Cimices. Ital. Cimici.*

*Gal. Punaises.*

**C**imices, qui in cubilibus enascuntur, canis fabarum inclusi, si ante februm significationes septeni deuoretur, quartanis auxilio sunt: & citra fabas sumpti, percussis ab aspide pro sunt: uuluarum exanimationes olfactu reuocant. Poti cum uino aut aceto, adherentes sanguisugas abigunt. Triti & urinarie fistulae impositi, urinae angustias leuant.

**C**imex nocturnū & infestum animal nō suo priuatur in medicina remedio. Vinas applicuant recentes medici, non mortuas, ut prescribit Dioscorides. Matthiolo id magis placet quod e motu illo quem in genitali suscitant, vim vrinae expultricem prouident.

## Millepeda. CAP. XXXIII.

### NOMENCLATURA.

*Gr. Ονίσκος. Lat. Asellus, Millepeda. Ital.*

*Porcelletti, Gal. Cloporte. Ger. Esel.*



**M**illepedæ, quæ sub aquario vase stabulatur animalia sunt multis pedibus nitentia, quæ cōtacta manu, contrahuntur orbem. Hæ ex uino potæ difficilli urina, & regio morbo auxiliantur. Millepedas illini anginis cum melle utilissimum: trita & in cortice mali Punici calfacta, doloribus aurium addito Rosaceo, conuenienter instillantur.

### Blata pistrinaria. C A P.

#### XXXIII.

##### NOMENCLATURA.

Græ. Σίλφκ. Lat. Blatta pistrinaria. Ital.

Blatte de mulini. Gal. Grillons de molins.

**B**latta eius quæ in pistrinis inuenitur, interanea trita aut cum oleo decocta, aurium dolores instillatu mitigant.

**M**ultipedis noti animalculi vires aperte describit Dioscorides. Blatta itidem satis nota. Veruntamen non sunt vulgares grilli, at pressiore corpore, & subtilioribus penè araneorum in morem pedibus & ob incursum velocissima. Mirum in modum lucem odere, locos amant humidos.

### Pulmones. C A P.

#### XXXV.

##### NOMENCLATURA.

Gr. πνευμωρ θαλάσσιος. Ital. Pulmo marinus.

Ital. Pulmone marino. Gal. Chappeaux de chair.

**P**odagras pernionesque emendat Pulmo marinus recens tritus & illitus. Suillus & agninus ursinusque pulmo impositu, attritus à calceamentis contractos, ab inflammatione tueretur. Vulpinus uero si arefactus bibatur, suspiriosos adiuvat. Adeps quoque liquefactus, infususq; auris dolorem finit.

Pulmo



**P**Ulmo marinus zoophyton, vt Vrtica, Stella, cum super vndas maris fertur, tempestatem denunciat. Si ex eis bacilli atterantur, lumē sedarum iustar reddunt. Reliqua plana sunt.

## Genitale cerui. C A P.

## XXXVI.

## NOMENCLATURA.

Gr. Αἰδοῖου ἑλάφου. Lat. Genitale cerui.

Ital. la Verga del Ceruo. Gal. la Verge  
d'un Cerf. Ger. Der Ramp.

**G**enitale Cerui tritum, & in uino potum, à uipera demorsis auxiliatur.

**M**aris Cerui genitale valet ad retentam urinam, ad dolores colicos, probè elotum, haustaque lotionē. Quidam siccatum & tritum in puluerem proponunt in dysenteria, asserentes efficacissimum esse remedium.

## Vngula asini. C A P.

## XXXVII.

## NOMENCLATURA.

Gr. Οὐξόρου. Lat. Vngula Asini. Ital.

l'Vnghie dell' Asino. Gal.

l'Ongle d'un Asne.

**V**ngularum asini cinis per dies multos binis cochlearibus potus, proditur comitiales adiuuare, eadem oleo subactæ strumas discutiunt. & illitæ per nionibus medetur. Caprinarum cinere perunctæ ex aceto alopecia sanantur.

**R**asis, & Vacca vngulas producit, & mule: has ad inhibendam imprægnationem, illas ad lac pecori prouocandum.

## Lichenes equorū. C A P. XXXVIII.

## NOMENCLATURA.

Gr. Λειχῆνες ἵππων. Lat. Lichenes equorum.

l 4

Ita



Ital. Calli delle gambe de i Caualli. Gal. Les

Cal. des iambes des cheuaux.

**L**ichenēs sunt in equorum genibus, & super ungulas in flexu harum partium indurati calli, qui triti & in aceto potati, comitialibus mederi traduntur.

Iocinera. C A P.

XXXIX.

NOMENCLATURA.

Gr. Ηπαρ. Lat. Iecinora. Ital.

Fegati. Gal. les Foyes.

**A**sini iecur inassatum esu comitialibus prodest, ueruntamen ieiuniis edendum praecipitur. Caprae uero inassati decidua sanie, inungi lusciosos prodest, & dum coquitur, apertos oculos halitu eius uaporari: prodest in cibo tostum ad eadem. Tradunt hircini iocinoris cibo comitiales deprehendi. Aprinum recens si arefactum teratur, ex uino potum contra serpentium uolucrumque morsus auxilio est. Iecur canis, qui rabie exagitur tostum & in cibo ab emorsis sumptum, ne tententur metu aquae tueri creditur. Utuntur autem ad arcendos aquae pauores dente eo, qui caninus dicitur: hunc a cane qui momordit exemptum, & folliculo inditum, pro amuleto brachio adnectunt. Inueteratum autem sale mergi iecur, ex Hydromelite binis ligulis potum, secundas pellit.

**C**allos in puluerem tritos prodesse dicit Plinius, dolori dentium si in aures infundatur cum Oleo. Galenus & Paulus, ad omnem animalis morsum. Satis sese in iocinoribus explicat Dioscorides.

Coria ueteramentaria.

C A P. XL.

NOMENCLATURA.

Gr. Κατρυματτα. Lat. Coria veteramentaria. Ital. Scarpe uecchie.

Vete



**V**eteris corij cremati illitus cinis ambusta igni, intertrigines, nec non calceamentorum attritus sanat.

**V**eterum calceamentorum corium, carbonibus impositum, hausto fumo, mirum in modum mulieres a matrice suffocatas refocillat. Expellit hic fumus serpentes, non è domibus tantum, at è corporibus etiam, quod expertum in Vipera est.

## Gallinæ. CAP. XLI.

### NOMENCLATURA.

Græ. Αλεκτορίς. Lat. Gallinæ. Ita. non aliter. Gal. Gellines. Ger. Henner.



**D**issecta gallinæ, & adhuc calentes appositæ, serpentium morsibus auxiliatur: sed identidem alias sufficere oportet. Earum cerebellum in uino bibendum datur contra serpentium morsus: sanguinem à cerebri membrana profluentem sistit. Quæ interiore uentriculi galli sinu residet membrana, secti in laminas cornus specie similis (ea uerò inter coquendum abijci solet) siccatur, tritaq; in uino conuenientissime stomachicis datur in potu. Ius è uetere gallinaceo alium deijcit. Abiectis itaque interaneis salem conijci oportet, & consuto uentre decoqui in viginti sextarijs aquæ, donec ad tres heminas redigantur, totum

l 5

id



id refrigeratum sub diuo, datur. Aliqui incoquunt olus Marium, Mercurialem, Cnicum, aut Filiculam. Crudos humores crassosq̃, atram bilem, & strigmenta elicit: prodest longis febribus, suspirijs, articularijs morbis, & inflationibus stomachi.

**I**us Gallinarum simplex, astringit corpus, quāvis ius veterum gallorum longo tempore cum sale incoctorum, soluat. Vulgatum deglabare sedes Gallinarum, & plagæ venenatorum apponere, quo inde venenum exugant. Datur & ius Gallinarum iuuenum cum Saccharo manē in modum syrupi, in declinatione febrium ad reſtificandos humores. Testes gallorum gallinis haud dum admissorum, valenter lapsas vires reparant, & ideo heclicis dantur, & longo morbo extenuatis.

## Quorum natura. CAP. XLII.

### NOMENCLATURA.

Gr. ωον. Lat. Ouum. Ita. Vouo.

Gal. Oeuf..

**O**uum molliculum plus alit sorbili, & durum plus molli. Luteum oui, contra oculorum dolores utile est: in assatu sedis inflammationibus prodest, cum Croco & Rosaceo: & cōdylomatis, cum Meliloto: cum uua autem fruticis eius, quem Rhoea dicunt, aut Galla, in patinis frigitur, ut cibo aluos sistat, per se etiam offerri solet. Candidum oui crudum refrigerat, spiramenta cutis occludit, inflammationes oculorum infusum lenit, ambusta, si statim eo perungantur, pustulas non sentiunt, faciem à solis adustione tuetur, fronti impositum cum Thure fluxiones arcet, auertitq̃: inflammationes oculorum lana exceptum, addito Rosaceo, Melle & uino, mitigat: utiliter contra hemorrhoidis serpentis morsus crudum sorbetur: summè tepidum, prodest uesticæ rosionibus, renum exulcerationibus, gutturis scabritiæ, reiectionibus sanguinis, destillationibus, & thoracis rheumatismis.

Gal



**G**Allinarum oua sapore & gustu omnibus alijs praeſtant. Ab his Otidum & Phasianorum. Anatum, anſerum & aliorum aquatiliū oua ſtomachum grauant, craſſos gignunt humores, & difficulter digeruntur. Calida ſunt columbarum, & plus medicinam quam cibum reſipiunt. Damnantur in totum pauonis & ſtruthij. Laudantur oua tremula, quæ preſi lactis more tremant. Albumine & vitello ſimul cum oleo roſato contritis vtentur ad inflammationes palpebrarum, aurium, mammarum, quauis è ratione prodeant, cubiti, digitorū, fibrarum, iuncturarum manuum & pedum. Incocta aceto & manducata, fluxus corporis ſiſtunt, & fixa lento igni ſine fumo, cum ſimplici quopiam aſtrictorio, vt Rhoe, Gallis, flore & teſta mali Punici, cochleis cum teſtis exuſtis, aut aliquo ſimilium, iuuant fluxus tum ſtomachales, tum dyſentericos. In meduinis quæ humiditatem deſiccant, elixa ſint oportet, fixa, aut toſta: cum in eis qui lentos, & viſcoſos pectoris & pulmonis humores incidunt, aqua incoquenda ſint, quouſque probè calorem conceperint, iſſque non ſecus vtendum in cannae gutturis aſpretudine, è nimio clamore, aut humorum deſluxu conciliata. Quod ex ouorum vitellis, oleum exprimitur, perfectè primum in patella torrefactis, perunctu prodeſt cuti ſcabrae, impetigini, ſciſſis labris, manibus, pedibus, & ſedi: Valet ad dolentia iuncturarum, ac omnium neruoſorum locorum vlcera: ad auriunque dolores & vlcera. Vnguntur eo vtiliter ambuſti igne, & mirandum in modum contuſas cerebri membranas, à partibus ſanis gregat, quod ſummo ſuo cum honore & agrorum emolumento expertus eſt diuinus ille Matthiolus. Hippocrates Ariſtoteſi cōpugnās, Creatur (inquit) pullus è vitello, nutritur ex albumine, cū pullus a feminis, ex ouo, extractus, magna corporis parte vitello implicita comperiat, Teſtudinis oua etſi in aqua bulliant, nunquam tamen cōdenſantur, vitello licet durifſimo, & reperit teſtudinem Matthiolus, cum ſeptem ouis teſta obductis in ventre. Id animalium alio nulli contigit.

## Cicadæ. CAP. XLIII.

## NOMENCLATURA.

Græ. τεττιρες. Lat. Cicadæ. Ita. Cicale.

Gal. Cigalles.

**C**icadæ quæ inaffatæ manduntur, ueſica doloribus proſunt.

Cica-



**C**icade vocale animal, duorum est generum. Sunt maiores, sunt minores Cicade. Minores celerius prodeunt, tardius finiunt, & non cantant. Maiores tardius nascuntur, velocius finiunt, & cantant. A messe in campis cauda terra producta, foetificant, & in vineis Imbre ad foeturam aluntur. Vt primum à partu, è terra prodire, vermiculorum speciem referunt, qui crescendo in animalia euadunt quæ vocamus Tettigometra, è quibus circa estatis solstitium noctibus Cicade volando prosiliunt. Rore viuunt, & ore carent. Ligulam habent in pedore, è qua rorem attrahunt. Cava est hac, canalis instar, ac ex ea sonum illum mixtum & mirandum edūt. Oleis gaudet, atque adeo omnigenis arboribus. In frigidis regionibus non proueniunt. Parthi, & alij quidam Orientales Cicadis vescuntur, & Aristoteles suauissimi gustus, ante verum latum prædicat. Dolores colicos sedant cum pari granorum Piperis pondere, isque vsus è paroxysmorum ratione variatur.

## Locustæ. CAP. XLIIII.

### NOMENCLATURA.

Gr. Αγκυδῆς. Lat. Locustæ. Ita. itidem.

Gal. Sauterelles.



**L**ocusta odoris suffitu urinæ difficultates adiuvant: præsertim quæ fœminas malè habent earum carnes nullo sunt in usu. Est & quoddam genus Locustæ, quæ Asiracos aut Ouos dicitur, sine pennis, præ longis cruribus. Exiccata autem si ex uino bibatur, contra scorpionis morsus magnoperè proderit, hac



*hac abunde uescuntur Aphri, qui Leptin incolunt.*

**L**ocustæ mares, maiores fœminis, hæ defixa in terram cauda, oua parturiunt, è quæis postea nascuntur vermiculi tenui membrana cõditi, qua rupta Locustæ procreantur. Calidas amant regiones, nec temerè in frigidis reperiuntur. Ex æstuosis quandoque in Europam transuolant. Quod atate Plinij contigit, & non ita pridem anno. 1542. Cyrenaici, Lemnij, & Syrij, turmatim bis, ter ve per annũ ad vastãdos Locustarum nidos, & cum editæ sunt, conficiendas proficiscuntur. Indictæ trium pedum longitudine, mordaces admodum sunt.

## Osisifragus. CAP. XLV.

### NOMENCLATURA.

*Gr. φῖβις..Lat. Osisifragus. Ita.*

*Osisifrago.*

**V**enter eius auis quam Latini Osisifragum appellant, particulatim potus, calculos cum lotio pellere proditur.

**O**sisifragum ex Aquilarum genere esse constat, qui earum pullos, se ditione in cibo excitata, nido expulsos, foueat ad perfectum volatum. Plinius Alieti ( Aquilæ marinæ ) pullum, nec propriam esse speciem, sed ex Aquila diuersis maribus admissa, procreari. Albertus, aquaticam auem esse contendit, cigno maiorem, oblongo rostro, cuius pars inferior sacci speciem præferat, in quam magnum piscium numerum occulit, quos postea paulatim deglutiat. Hos Itali vocant Agrotti. Eruditorum nullus est, qui superiores duos cognouisse constanter asseneret.

## Galerita. CAP. XLVI.

### NOMENCLATURA.

*Gr. κορυδαλλος. Lat. Galerita. Ita. Lodola. Gal. Alouette.*

**G**alerita auicula est parua, apicem in uertice, paonis modo, gestans: quæ assa in cibo sumpta, cœliacos adiuvat.

*Galeri*



**C** Alerita & sine, & cum crista reperitur, Campeſtres aues, cibantur vermiculis, & quæ decidunt aut creduntur terræ ſeminibus. Mares argutè canunt, auunque primæ, aſtatem cantu præſagiunt. Accupes aues adeò verentur, vt Speruieri & Smerili ſeroci volatu terre facta, in hominis ſinum, aſylli loco confugiant.

## Hirundines. CAP. XLVII.

### NOMENCLATURA.

Gr. χελιδόνες. Lat. Hirundines. Ita. Rondini.

Gal. Arondelles. Ger. Ein Ddaſſerch.

**D** iſſectis creſcente luna pullis Hirundinis, qui primo partu excluſi ſunt, in uentre eorum lapillos offeſdes: è quibus duos, unum colore uarium, alterum purum eximes: ꝫ priuſquam terram attigerint, in iuuenta corio, aut ceruina pelle brachio aut collo adalligati, comitialibus proderunt, & ſepe proruſ eos recreabunt. Hirundines, uti ficedula, in cibo, aciei uſus medicamentum præbent: tam pullorum quàm matrum in ſictili olla crematarum cinis cum melle oblitus, oculis claritatem adfert, angina eo commode perunguntur. uua & tonſillarum inflammationibus hoc cinere ſuccurritur: & ipſæ & pulli exiccati, ſi drachmæ pondere ex aqua bibantur, hos inuât qui angina morbo conſueſcantur.

**H** irundinum vna ſpecies domibus noſtris nidos figit. Altera veſtorum edificiorum muros, cauernulas, & montium ſcopulos expetit. Tertia fluuiorum ripas ſectatur. Vt primo æquinoctio prodeant, tum vt autumnali ſecedant, reparandoque pullis viſui Chelidoniam inquirant, nulli non in cõperto eſt. Soia auium, non rapacium, carnes edunt.

## Ebur. CAP. XLVIII.

### NOMENCLATURA.

Gr. Ελεφαντος οδόντος ρηνισμα. Lat. Eboris

ſcobs. Ita. La Limatura dell' Auorio. Gal.

La ſcieure de L' yuoire.

Ebo-



**E**boris scobe illito paronychia sanantur. Vim adstringendi Ebur obtinet.

**E**Bur elephantorum sunt dentes, quod vt alias summoperè, expetitur, ita nostro sæculo pretiosissimum. Eò factum vt nullibi penè verum Ebur reperiat, at quod vulgò huius vice in officinis prostat, marinorum piscium sunt dentes. Cum de Elephantis recentiores qui meridianum orbem lustrarunt, satissuperque scripserint, superuacaneū mihi visum est hac de re cartam onerare, at stolidam hanc ex hominum mentibus opinionem optarim extirpari, nimirum continuis esse pedibus, cū nostratis etiam temporis homines viderint, inflexis in genna pedibus, & in hac procumbentes, solem & lunam adorare. Eboris, porphyrii (quem vocant) planitie intriti, cinis, valet ad fluxus albos seminarum, potum in lacte seminis lactucae, cum aqua ferro extincta, extracti.

## Suillus talus. CAP. XLIX.

### NOMENCLATURA.

Græ. Ἀσράγᾱλος ὄος. Lat. Suillus talus. Ita. Talone del porco. Gal. Talon de Porceau.

**S**vis talus comburitur, dum è nigro albescat: qui tritus & potus, inflationibus coli, longisq; torminibus medetur.

## Ceruinum cornu.

### CAP. L.

### NOMENCLATURA.

Græ. Ελάφου κέρας. Lat. Ceruinum cornu. Ita. Corno del Ceruo. Gal. La corne de cerf. Ger. Bertz Horn.

Ceru



**C**eruini cornu cinis elotus, binis ligulis epotus prodest dysentericis, excreantibus sanguinem, celiacis, regio morbo, & vesica doloribus cum tragacatha: feminis fluxione uulvae laborantibus, cum liquore huic rei accommodato. Cerui cornu contusum, crudo fictili luto circumlito, & in furnum inditum uritur donec albescat. Id Cadmie modo elotum, ulceribus oculorum & defluxionibus salutare est, infictum dentes expurgat. Crudi cornu suffiti nidore serpentes fugantur: feruesactum in aceto, si eo gingivae colluantur, maxillarum a dentitione dolorem adimit.

**P**lanum est xlix. cap. illud tamen sciendum, non omnia animalia os in iunctura pedum habere, talum vocant. Quod ad Ceruos attinet, Dictamnium herbam eiciendis utilem sagittis in Creta docuere: manifesto felle, et iecore carent, quemadmodum equi, asini, muli, cameli, & piscium, vitulus marinus, & delphinus. Fellis loco venas per intestina sparsas habent, in quibus inspersus est liquor ille, quo in animantium ceteris sel conficitur, & ea est causa amaroris, qui perpetuus earum in carne sentitur. Viridis est eis in cauda humor, mortifer, si edatur. Sanguis Cerui cum oleo attritus, clysteris in modum valet ad ulcera & antiquos intestinorum fluxus, potus in vino, ad sagittas venenatas prodest. Cerebrum, nervorum & iunctarum abscessus emundat. Cornu, combustum & potum cum paucis melle, vermes e corporibus eicit. Ceruorum iuuenum cornua pilo conestita, in portiunculas dissecta, vasa testaceo indita, quod postea probe coopertum & lutatum fornaci credatur, siccata & in pulverem redacta, mirabili sunt effectu ad dolores colicos, si cum Pipere & Myrrha praebeantur. Os cordis Ceruini eximia in omnia venena mortifera virtutis est: & utiliter inseritur remedijs, quae in pestem fiunt.

Eruca.

CAP. LI.

NOMENCLATURA.

Græ. κάρπυ. Lat. Eruca. Ita. Bruchi.

Gal. Chenilles. Ger. Ranp.

Eru



**E**RUCIS quæ in oleribus gignuntur, cum oleo peruncti, à venenatis bestiis feriri negantur.

**E**RUCA ex herbarum & præcipuè Brassicæ folijs nascuntur, has ab horti ejiciet, qui equæ cranium ad palum horti medio suspenderit, idem efficiet fluuiatilis cancer. Si arbusculi, quem Sanguin vocant, ramusculo herba & caules attingantur, non dispar sequetur effectus.

## Cantharides. CAP. LII.

### NOMENCLATURA.

Gr. Κανθαρίδες. Lat. Cantharides. Ital. Cantarelle. Gal. Cantarides.

**E**FRUMENTIS congestæ cantharides ad recondendum idoneæ sunt, quæ fictili vase non picato conduntur, & raro linteo obligato ore, & deorsum conuerso suspenduntur super aceti feruentis quàm acerrimi halitum, donec æstu exanimentur, postea lino transfixæ reponuntur. Potentiissimæ omnes uariæ, luteis lineis, quas in pennis transuersas habent, promissoq; corpore crassæ, ac Blattarum modo perpingues: sed inertes ac imbecillæ, quæ unius sunt coloris.

## Buprestes, & pinorum erucæ.

### CAP. LIII.

#### NOMENCLATURA.

Gr. Βύπρησις καὶ πίτουράμπα. Lat. Buprestes & pinorum erucæ. Ital. Bubrești, & Bruchi de Pini.

**S**IMILI modo reconduntur Buprestes, genera quædam Cantharidum, & pinorum Erucæ. quæ supra cribrum suspensum feruenti cinere paulisper intostæ, reponuntur. Vis omnium communis erodere, ulcerare, calorem elicere. Qua de causa admiscuntur medicamentis, quæ lepras, ferasque lichenas & carcinomata sanant: menses ciunt, pectus emollientibus additæ. Aliqui Cantharidas antidotis impositas, aqua subtercutē auxiliari

m                      prodi



prodiderunt: argumento, quod urinam moueant. Alij penas pedesq; contra potarum ueneficia, remedio esse tradiderunt.

**C**antharides vulgata sunt animalia, noménque à Cantharo deductum, ac si diceret, pusillos scarabeos. Eligi debent vigentis ætatis, nam veteres tabescunt, & in vsum medicinae sunt inutiles. Buprestes in Italia & Gallijs non perinde vulgares, Animal est (Cordo) scarabeo simile, sublatis pedibus, vltra cimices fetidum, eò frondes & fructus, si qua per eos repat, inficit. Tela qua sese inuoluunt pinorum eruce astringendo sanguini valet. Medicorum vulgus ex Hippocrate (vt putant) in præbendis Cantharidibus caput, alas, & pedes abijciunt, pernitioso in duobus Hydropicis, quemadmodum narrat Galenus, exemplo, qui paucis post diebus à sumptis ita Cantharidibus periire. At non ea fuit mens Hippocratis, caput, alas, & pedes auferendos, sed potui præbendum priuatim corpus, post caput, alas, & pedes, & non corpus extremitatibus abiectis, nam ita priuaretur remedio, quod eis ob veneni malitiam, à natura datum est. Cerotis & emplastris inditæ, scabros yngues exerunt. Inseruntur & medicamentis quæ lepram & scabiem sanant, in quæ integræ apponendæ. Præstantiores sunt quæ in triticis campis reperiuntur, lineis rubris alas intersectæ. Hæc è Galeno decerpta, cuius Cantharidum & Buprestium, quod omnibus notum sit, præparandi præscriptum hic non additum.

## Salamandra.

### CAP. LIIII.

#### NOMENCLATURA.

Græ. Σαλαµενδρα. Lat. & It. Salamandra.

Gal. Salamandre. Ger. Ein osin.

**S**alamandra lacerta genus est, iners, uarium, quod frustra creditum est ignibus non uri. Vim habet erodentem, calfacetoriam, exulcerantem. Additur, ut Cantharis, in medicamenta, quorum vis est exesse, & lepras abolere, similiq; modo reconditur:





conditur. Li-  
quesfacta in  
oleopilos euel-  
lit. Exentera-  
ta, detractis  
pedibus &  
capite, in mel-  
le seruatur ad  
eundem u-  
sum.

**S**alamandra tempore pluuiæ sub initium veris & autumno conspi-  
cua est, at calente æstate & frigescente admodum vere, raro exit è  
terra. Animal est corpore lacertis simili, præterquã quod maiore sunt ca-  
pite & corpore, altioribus pedibus, & breuiore cauda, ad cursum tar-  
dissima. Colore sunt nigro & ruffo virgis adeò ad viuum à natura ex-  
pressis, vt æs arte sumaria attritum dixeris. Aliquanto tempore pro sua  
frigidityte in igne Salamandra perdurat, si diu tamen perstiterit, absu-  
mitur. Marem aut fœminam Salamandra non habet, sed è putrefa-  
ctione generatur. Venenatus est harum morsus, & si quæ fructus aut  
herbas attigerint, saluam quampiam relinquunt, quæ proculdubio  
mortifera est, quod multi suo damno experti sunt.

## Araneus. CAP. LV.

### NOMENCLATURA.

Græ. Αράχνη. Lat. Araneus. It. Ragno.

Gal. Areine. Ger. Spinn.

**A**raneus, quem holcum, alij lycon, id est, lupum uocant,  
subactis cum splenio, & linteo illitus, prolatusq; utrisq;  
temporibus aut fronti, tertianos circuitus persanat. Tela eius im-  
posita sanguinem sistit, uulnera quæ summam cutem occupa-  
runt, ab inflammationis iniuria uindicat. Est & alterum  
Aranei genus qui candidam, tenuem, densamque telam

m 2 ord



orditur, quem in aluta ligatum, & lacerto appensum, quartanis circuitibus mederi narrant. decoctus ex rosaceo & infusus, aurium doloribus auxiliatur.

**S**ex Araneorum sub Phalangij nomine genera describit Aetius. Primum est Rhagius seu acinosus, acino uua nigra similis, & inde nomen sortitus: os habet in uentris medio, & pedes quaquaversum breuissimos. Secundum Lupus, hic in cibum captat & conficit muscas. Largum est illi corpus est uodubile, & incisa partes collo proxima. Tertium Formicarius, quod forma grandes formicas referat, fuliginij est coloris, stellatis maculis notato corpore, & praecipue dorso. Quartum, Cranocolaptes, figura corporis oblonga, colore uiridi, adiacente collo spina qua transfigit. Quintum Sclerocephalus, capite est saxi in morem duro, corporis lineamentis in totum Farfale similibus. Sextum Scoletius, vermi attrito & maxime circa caput ad simile. Phalangios in Italia nasci negat Plinius. Est tamen in Apulia Aranei genus quod Tarentole vocant. Id misere, horrificè, & variè ictos affligat. Quod è diuersis & varijs tum animantis, tum ictorum naturis provenit. Animantium horum veneni muscae sono mitescit. At cessante sono, paulatim redit morbus. Et eam ob causam visitatum est musicorum instrumentorum sonum non ante cessare, quin pariter cesset etiam morbus. Quod longus sonus & desultatio elicit per iocum sudore, vincat tandem veneni malitiam, tantum si interim dum sonus hic perdurat, offeratur agro Theriaca & Mithridatarum, & generatim quae ad morsus serpentum & aspidum valent.

## Lacerta. CAP. LVI.

### NOMENCLATURA.

Gr. Σαύρα Lat. Lacerta It. Lucertola,  
Gal. Lisarde,

**L**acerta caput intritum & appositum, aculeos & omnia corpori infixæ extrahit, uaros, formicantes uerrucas, & pensiles, quas acrochordonas uocant, tollit. Iecur exesis dentibus coniectum, dolores finit. Si diuulsa admoneatur, ictis à scorpione leuamentum praestat.

Seps,



## Seps. CAP. LVII.

## NOMENCLATURA.

Græ. Σηψ. Lat. Seps. It. Sepa.

**S**eps, quam aliqui lacertam Chalcidicam uocarunt, in uino pota, morsus suos sanat.

**L**acertæ, quas hic describit Dioscorides, Lacertis vulgaribus ut plurimum similes, oua ut serpentes pariunt, cochleis inimicissimæ. In calidis regionibus grandiores quam in nostro orbe reperiuntur. Nicander Chalcidicas Lacertas nostris similes esse contendit. Græci aliquando Lacertam pro Ceraſte seu Sepe usurpant, & hæc confundunt nomina, aliquando Sauron, aliquando Ceraſten genus facientes. Romæ Lacertæ gignuntur dorso stellis notato, quæ quod sub terrâ lateant, Terrantolæ vocantur, tam atroci veneno ut Chalcidicæ haberi possint, aut saltem antiquorum Stelliones. Seps sine pedibus serpens, vipere similis, a Chalcidica lacertâ diuersa est, sed nomina apud auctores confunduntur.

## Scincus. CAP. LVIII.

## NOMENCLATURA.

Græ. Σκίγκ. Lat. Scincus. It. Scinco.

**S**cincus aut Aegypti, aut Indiæ, aut rubri maris alumnus, quamuis inueniatur in Lydia Mauritaniæ. Est autem terrestris Crocodilus sui generis, sale inueteratus cum Nasturtio. Ciunt carnes, quæ renes amplectantur, id sibi uirium uendicasse, ut si drachmæ pondere bibantur, uenerem accendant. Verum decocto lentis cum Melle aut semine Lactucæ cum aqua potio, ueneris cupiditates inhibentur. Additur in antidota.

m 3

Marin





**M**Arini Stinci qui è mari rubro & Aegypto Venetias asportatur, licet crocodilorum speciem referant, magnitudine tamen pregrandes Lacertas non excedunt, squamis sunt albis in luteum vergentibus, cum caesia à capite ad caudam linea. Hanc crocodili non habent, dorso enim natura sunt liuido. Pausanias in Lybia nasci scribit duum cubitum longos. Officina fluuiatilibus cum marini desunt vtuntur, non pari tamen effectu.

## Terreni vermes. CAP. LIX.

### NOMENCLATURA.

Græ. τῆς ἐν τῇ γῇ. Lat. merreni vermes It. Vermi della terra. Gal. Vers de terre Ger. Regen Wuurm.

**T**Erreni vermes impositi, præcisos nervos glutinant, tertianas discutunt. Decocti cum anserino adipe, infusi, affectis auribus medentur: cum oleo autem decocti, si in contrariam aurem instillantur, dentium doloribus præstant auxilium: triti in potu, ex passio, urinam ciunt.

**E**Lumbricis fit oleum, ad nervosorum locorum, & iuncturarum sedandos dolores. Verus preparandi modus in balneo Mariae, nam inde humor & virtus extrahitur, nihilum ambusto aut torrefacto oleo, vel Lumbricis. Id oleum podagris calidis multum prodest, peruncto primum



primum oleo, loco vbi sentitur dolor, dein supra illitis vermibus incoctis, tritis & immistis cum aequali pondere ceroti, quod triapharmacum vocant. Lumbrici probe in vino eloti, ac postea in vas vitreū diligenter, obturatum vt in balneo Maria bulliant inditi, in viscosum quempiam humorem vertuntur, qui solus nervorum & intestinorum plagas consolidat. At præstantius operatur cum oleo gummi Laricis, aut Abietino oleo, quod mirum in modum recentes omnes plagas consolidet, præterquam capitis. Ambusti & in subtilissimū puluerem reducti Lumbrici, potique cum aquis Marrubij & Absinthij, ictericos iuuant.

## Mus araneus. CAP. LX.

## NOMENCLATURA.

Græ. μυγάλη. Lat. Mus araneus. Ita.

Topo ragno. Gal. Rat areigne.

**M**us araneus dissectus & impositus, sui morsus ueneficia luit.

**M**us Araneus colore est mustellino, magnitudine muris vulgaris, more vt talpa in acutū desinēte, in hoc altrinsecus ordines duos dētium habet, tenues, acutos, cauda quàm mus breuiore. Huius morsus quibusdam in locis innocuus, quemadmodum & scorpj.

## Mures. CAP. LXI.

## NOMENCLATURA.

Græ. μύες. Lat. Mures. It. Topi.

Gal. Ratz.

**M**ures, qui in domibus oberrant, concisos scorpionum plagis utilissimè imponi, in confesso est: si inassatos infantes ederint, oris saliuam exiccari promittunt.

**D**omestici sunt, syluestres, & montani mures, sunt & terrestres & marini, de domesticis tamen loquitur Dioscorides. Murium adeps retractos nervos & iuncturas remollit.

## Lac. CAP. LXII.

## NOMENCLATURA.

Græ. γάλα. Lat. Lac. Ita. Latte.

Gal. Laiēt.

m

4

Lac,



**L**ac generatim omne boni succi est, corpus alit, aluum emol-  
lit, stomachum & intestina inflatione uexat, uernum ta-  
men dilutius aestiuo habetur, & e uiridi pabulo aluum magis  
emollit. Probatum autem candidum, equali crassitudine, quod  
ungui instillatum cogitur. Aluum minus tentat Caprinum, quo-  
niam pecus hoc adstringentibus pabulis, Robore, Lentisco, &  
oleaginis frondibus, & Terebintho magna parte uestitur, in-  
de stomacho accommodissimum reddi solet. Ouilum autem dul-  
ce, crassum, & prae pingue, non usq; adeo utile stomacho, Bubi-  
lum tamen, Asininum, & Equinum, uentri magis idonea, sed  
ipsum turbant. Quibus in locis pecora Scammoniam, Veratrum,  
Clematidem, aut Mercurialem pascuntur, lac omne uentre &  
stomachum subuertit: quale in Iustinis montibus esse a nobis pro-  
ditum est. Siquidem Caprae quibus candidum ueratrum pabulo  
fuerit primo foliorum partu euomunt & eorum lac haustum nau-  
seam creat, & stomachum in uomitiones effundit. Ventrem ad-  
stringit lac omne decoctum, praecipueq; candentibus calculis ma-  
rinis exustum: & in summa, omnibus auxiliatur internis exul-  
cerationibus, praesertim faucium, pulmonis, interiecorum, uesi-  
cae & renum: foris uero contra pruritum cutis, eruptiones papu-  
larum, & uitiatos corporis succos: recens cum melle crudo, addi-  
to sale, datur exigua aqua dilutum. Minus inflat quodcunque se-  
mel seruifacitum: decoctum cum calculis marinis ad dimidias, ul-  
cerosas uentris fluxiones adiuuat. Lac quodcunque serum conti-  
net implicitum, quod ubi discessit a lacte, multo potentissimum  
ad purgationes redditur: datur quibus sine acrimonia uolumus  
deiectionem moliri, ut melancholicis, comitialibus, lepris elepha-  
ntijs, & erumpentibus toto corpore papulis. Ex omni lacte fit,  
quod Schistum, id est, scissile, appellat. Lac autem fictili nouo ser-  
uet, ramoq; ficulneo receti mouetur, inspersis, postquam bis aut  
ter efferbuerit, totidem aceti mulci cyathis, quot sunt heminae  
lactis



lactis. Ita enim ferescens liquidum ab eo diuiditur quod in caseū concreuit: sed cum feruet, ne superfundatur, conueniet spongia ex frigida continuo fictilis labrum detergere, sextariūq; argenteum frigida aqua plenum demittere. Bibitur heminis per interualla singulis, usque ad quinas, ita ut intercedentibus spacijs potantes ambulet. Lac autē recēs efficax est cōtra rosiones, ustioesq; ab exitiālibus medicamentis factas ut à Cantharidibus, aut Salamandra, Bupreste, aut pinorum Eruca, Hyascyamo, Dorycnio, Aconito, aut Ephemero: præsertim Bubulum ad id eximie confert: gargarizatur autem exulceratis faucibus, tonsillisq;. Asininum peculiariter collutos dentes gingiuasq; stabilis. Fluxiones alui, si ulcera sentiantur, tenesmosq;, ouillum, bubulum aut caprinum cum marinis lapillis decoctum, sistit: per se autem & cum hordeacea Ptisana, aut Halicaceo cremore infusum magnoperè intestinorum rosiones mitigat: exulceratæ uulvæ immittitur. Humanum lac dulcissimum est, & maximè alit: māmīs autem exuctū, prodest tabi, & stomachi rosionibus: cōtra haustum Lepi marinum præsidio est: oculis cruore ex ictu suffusis, cum auris polline instillatur: podagricis utile est cum Meconio & cerato illitum. Lac omne respuendum splenicis, Hepaticis, comitialibus, uertiginosis, & neruorum uitio laborantibus: febriculosis, & capite dolentibus: nisi si quis interdum purgationis gratia, ut ostendimus, Schistum præbeat. Primiparæ canis lacte perunctos narrant glabrescere: potum contra uenena, antidoti uicem obtinet abortus, mortuos expellit.

**Q**uo nunc utimur Lac aut humanum est, aut Caprinum, aut Pecorinū, aut Vaccinū aut Bufalinū, aut Asininū antiqui etiā equino & camellino utebatur. Est Lac humanum omnibus præstantius, quod in tribus suis qualitatibus temperatum sit. Porro omne Lac est sanguis bis coctus, è caseo compositus, butyro, & sero. Caprinum sequitur in omni sua substantia temperatum. Spissius est pecorinum, & præ alijs minus habet feri, plus casei. Vaccinum & Bufalinum tum spissum,



rum ceteris grassius est. Asininum plus habet seri, minus crassi. Lactis bonitas colore, odore, sapore, & substantia dignoscitur. Colore summè albo, splendido, claro, & non livido. Odore sincero, aromatico, non horribili. Sapore dulci, non acerbo, non aceroso, non amaro, non falso. Substantia media inter spissum & tenuem, sic ut ungui gutta superposita, non spargatur, sed in se coacta permaneat. Eximium quod istiusmodi est, optimum sanguinem: his destitutum dotibus, pessimos humores generat, corpus & stomachum sursum deorsum voluit. Optimum lac constantis ætatis hominibus convenit, qui natura frigidi non sunt, colericis, eclicis, extenuatis, & in summa ubi stomachus mundus est à pravis humoribus. Et è diverso febribus nocet, dolori capitis, male affectis oculis, paralysia, spasmo, defluxionibus, lapillis, oppilationi, dentibus, gingivis, iuvenibus, flegmaticis, & in totum, qui id à cibo sumpserint, & eo plus nocet, quo spissius est substantia. Præter hæc quo profit Lac, huic indendum modicum Zucchari aut mellis, quod non coaguletur in stomacho. Non offeratur potui aut cibo, cum piscibus, rebus acetosis, nec in tanta quantitate, ut digerere aut euomere stomachus non queat. Ieiuno etiam bibendum, nec alius sumendus cibus hoc non percocto. Sumentem quietum stare oportet, non dormire, non bibere à vino: quodque dentibus & gingivis noceat, ab eius potu, vino aut aqua mellata os colluendum. A cibo sumptum, multis in rebus nocet. Optimum lac cerebrum auget. Humeat & incrassat corpus. Pectus lenit, & antiquam tussim. Venerem excitat, multiplicato spermate. Prodest ardori vrine, corpora macilentia restaurat, generat probum sanguinem & alimentum. Emollit & colorat corpus. Statim conuertitur in sanguinem, & carnem adauget.

## Caseus. CAP. LXIII.

### NOMENCLATURA.

Græ. τυρός. Lat. Caseus. Ita. Cascio.

Gal. Fourmage.

**C**aseus recens sine sale sumptus alit, stomacho utilis est, et facile in membra delegatur, corpus auget, aluum modicè emollit: alius tamen alio præstantior, pro natura lactis à quo cōfici



ficitur. Decoctus autem & expressus, deinde inassatus, aluum sistit: illitus, oculorum inflammationibus & sugillatis prodest. Qui uerò recens salitus est, minus alimenti præbet, corpus aptè minuit, stomacho aduersatur, negotium uentri interaneisq; exhibet: uetustiore sistitur aluus. Sero quod à caseo manauit, quam optimè canes aluntur. Quod Hippacen uocant, Caseus est equinus: ea uirus redolet, magnoperè alit, bubuloq; proportionè respondet. Nec desunt qui Hippacen, equinum coagulum appellarent.

**C**aseus laudatur recens, non enim nocet stomacho, & alijs citius digeritur. Vetus, quod linguam pungat, quibusdam est gratus, est tamen omnium pessimus, sanguinem incendit, sitim inducit, difficulter digeritur, lapillos in renibus & vesica generat, iecur opillat, restringit corpus, colicam generat, & melancolicos humores, & maximè in corporibus qui superfluo calore abundant. Et quāuis caliditatis ratione extenuandis humoribus conueniat, ea tamen postea sequuntur incommoda, ut plus duplo noceat, quàm iuuat. Caseus mediæ ætatis, non probatus ducitur, quamuis minus noceat, quam vetus. Ceteris præstantior est, pecorinus. Vaccinus crassior, & maioris est nutrimenti, at difficilior digeritur. Caprinus recens, probus: vetus, omnium pessimus.

## Butyrum, & eius fuligo.

### C A P. L X I I I.

#### N O M E N C L A T V R A.

Gr. Βούτυρον. Lat. Butyrum. Ita. Boturo.

Gal. Beurre. Ger. Butter.

**E**lacte pinguisimo probatum fit Butyrum, quale Ouilum est: fit & ex Caprino, agitato in uasis lacte, donec pingue separetur. Butyrum natura oleosum est, & emolliens: unde largius epotum, uentrem resoluit: prodest, ubi oleum non adfuerit, contra uenena. Cum melle si insricetur, dentitiones adiuuat: gingiuarum pruritus, & oris ulcera infantibus emendat.



dat. Illitum foris capaciora alimentorum facit corpora, & ab albidis pustulis per summa scatentibus asserit. Contra inflammationes & duritias uulvæ, quod nec uirus resipit, nec uetustatem sentit. Butyrum efficax est: dysentericis, & coli exulcerationibus infunditur: in medicamenta addi solet quæ pus mouent, utile præsertim cum nerui, aut cerebri membrana, uesicæ ceruix, uulnera acceperint. Id autem purgat, replet, carnem creat, ab aspidē percussis utilissimè imponitur. Recens obsonijs additum olei uicem pensat, & adipis uice fungitur in bellarijs. Colligendæ ex eo fuliginis ratio hæc est: Butyrum in lucernam nouam ingestum accenditur, fictiliq; operculato quod supernè in siphunculi speciem desinat, & infima parte cuniculos clibani modo habeat, crematur, & subinde aliud in absumpti locum sufficitur, dum coaceruetur fuliginis modus, quem facere institueris: penna post deraditur ad usus. Eius effectus est in medicamentis oculorum, exiccare & adstringere: fluxiones cohibet, & ulcera celeriter ad cicatricem perducit.

**B**utyrum maturat & digerit in his tantum corporibus, quæ mediant inter molle & durum, & ideo non maturat abscessus, qui sunt in corporibus duris. Per os sumptum, confert pulmoni, difficultati anhelitus, & alijs pectoris morbis. Solum manducatum plus maturat, cum melle verò & amygdalis amaris valentius sputum educit, & excellentius emundat.

## Medicina lanarum. CAP. LXV.

### NOMENCLATURA.

Græ. Ἐρία δισυπτήρα ἔρια κεκαίμενα. Lat. Succida lanæ. Lanæ crematæ. Ita. Lana succida, lana brusciata. Gal. Laine surge.

Laine bruslee.

**S**uccida lanæ molles, è collo fœminibusq; laudatissimæ habentur. Subueniunt inter initia uulneribus, percussis, desquamatis



matris, liuidis, ossibus fractis, aceto, oleo aut uino imbutæ: siquidem facile succos combibunt quibus immergunt: & ob pecudum sordem, sic enim *oesypum* uocant, emolliunt: capitis, stomachi, aliarumque partium doloribus, cum aceto & Rosaceo efficaciter imponuntur. Crematarum lanarum cinis, crustas obducit, excrescentias in carne cohibet, & ulcera ad cicatricem perducit. Munda autem & carptæ, in fictili crudo, cæterorum more, uruntur. Nec secus simbriati marinarum Purpurarum flocculi cremari solent. Aliqui cum sordibus lanas carpunt, & melle irrigant, eodemque modo urunt. Alij in fictili oris patuli, uerucula inter se distantia componunt, & conceptas carminatasque lanas oleo ita suffusas, ut ne stillare quidem possint, assulis tedæ subiectis, & eisdem, lanisque permutatim interstratis, leuiter succendunt, et uistas tollunt. Quod si è Teda pix, pinguitudine ulla profluxit, collecta reconditur. Lauatur ad oculorum medicamenta. Cinerem in labellis, aqua addita, manibus confricant, & considerare patiuntur, idque sæpius, mutant aquam donec linguam adstringat, nec mordeat.

## Oesypum. CAP. LXVI.

### NOMENCLATURA.

Gr. *οἶσυνπος*. Lat. *Oesypum*. Ita. Sordida grassella della lana. Gal. La gresse de la laine surge.

**O**esypum uocant Græci, succidarum lanarum pinguitudinem: Cuius parandi ratio hæc est, Succidæ molles, radicu la non curatæ, calida aqua lauantur, & quibuscunque sordibus expressis, & in labellum oris ampli coniectis, aqua infunditur, magnoque impetu ligula, uti respumet, agitur, aut lignea rude ualidiusculè conturbatur, quò largius sordida spuma colligi possit, deinde marina respergitur: & considere pingui quod supernatabat, collectoque in altero fictili uase, denuò aqua in labellum  
fusa



fusa agitur: spuma iterum mari perfunditur, & demum eximitur. Hoc tantisper fieri solet, dum consumpta pinguitudine nihil prorsus spumæ extet. Collectum Oesypum manibus emollitur, & si qua insedit spurcitia, confestim demitur: exclusaq; sensim omni aqua, recentiq; affusa, manibus misceatur, donec admotum linguae Oesypum, astringat leuiter, nec mordeat, atque pingue candidumq; spectetur, tum in fictili uase conditur. Verū omnia feruido sole fiant. Nonnulli excolatum pingue frigida aqua eluunt, & manibus, non secus atque ceratum mulieres, confricant: ita enim candidius redditur. Alij elotis lanis & sordibus quibuscunque exemptis, ac lento igni in aeneo uase ex aqua decoctis, pingue quod supernatat collectum, aqua, ut diximus, lauant: colatumq; in fictilem patellam, quæ calidam aquam contineat, linteo operiunt, atque soli mandant, donec candidum fiat, & satis crassum. Alij bidui spacio aquam effundunt, nouamq; adijciunt. Melius est laue, radícula non curatum, quod succidarum uirus oleat, & si manu in concha fricetur cum aqua frigida, albescat, nihil in se duri aut concreti habens, ueluti quod cerato aut adipe adulteratur. Oesypum excalfacit, explet ulcera, & emollit, præsertim sedis ac uulvæ, cum meliloto & butyro: in uellere appositum, menses & partus euocat, ulcera non aurium modo sanat, sed & genitalium cum anserino adipe: contra erosos angulos oculorum, scabiososq; genas quæ occalluerunt, & ciliorū deflunia, efficax est. In testa noua torretur, donec redactū in cinerem pinguitudinē amittat. Ex eo etiam fuligo colligitur, uti demonstrauimus, q̄ in oculorū medicamēta comode addi solet.

**L**ana Succida, quæ & Oesipus, & quem hodie, Ysopum humidum officina vocant, quò ab Hissopo, quam pari corruptela Ysopum, distinguant, planissimè à Dioscoride descripta, nihil adijci postulat.

## Coagulum. CAP. LXVII.

### NOMENCLATURA.

Græc.



Gr.  $\pi\iota\tau\upsilon\alpha$ . Lat. Coagulum. Ita. Caglio.

Gal. Presseure. Ger. Kymni.

**L**eporis coagulum tribus obolis ex uino, uenenatorum mor-  
sibus, celiacis, dysentericis, & foeminis fluxione uulua la-  
borantibus, ac reiectionibus à pectore, auxiliatur: sanguinem in-  
grumos concretum discutit. Post menstruas purgationes apposi-  
tum uulua cum Butyro, praestat mulieribus ut concipiant: potum ue-  
ro partus enecat, et à puerperio, pariendi spem adimit. Equi co-  
agulum, quàm Hippacem aliqui uocant, priuatim celiacis dysenteri-  
cisq; conuenit. Haedi, Agni, Hinnuli, Capreae laticornis, & Dor-  
ci, Apri, Cerui, Vituli, Bubaliq; coagula similes naturas sortiun-  
tur: contra aconiti potum, in uino, & concretum lac, in aceto, conueni-  
ter assumuntur. Hinnuli priuatim triduo à purgationibus admo-  
tum, partus spe intercipit. Vituli marini, Castorei uires repraesentat,  
comitialibus, stragulatis uuluis, potu conferre existimat. Sed  
si sit Vituli marini, hoc experimentum est: aqua inspergit, qua paulisper  
cum alterius animatis, tum praecipue Agni coagulum, madue-  
rit: nam si erit sincerum, statim liquefit in aqua: sin minus, consimile  
permanet. Excipitur autem catulis, qui nondum natari possunt.  
In summa, coagulum omne dissipata cogit, & coacta dissoluit.

Adeps. CAP. LXVIII.

NOMENCLATURA.

Græ.  $\Sigma\tau\epsilon\alpha\gamma$ . Lat. Adeps. Ita. Grasso.

Gal. Gresse. Ger. Fests.

**A**deps. Anserinus aut Gallinaceus recens & sine sale co-  
ditus, ad uulua uitia proficit: sale inueteratus, & qui tem-  
poris spacio acrimonia conceptus, uulua inimicus est. Reces exem-  
ptis membranis in fictilem ollam demissus, quæ altero tantope-  
re capax sit, quantus sit modus adipis, quem curare institue-  
ris, obstructo diligenter uase, fragrantissimo soli exponitur,  
eli-



eliquescent inde humor in fictile alterum excolatur, donec adeps omnis absumatur, mox loco uehementer frigido reconditur, & ad usus digeritur. Alij fictile fulciunt super aquam calidam, aut tenuem & elanguidam prunam, quæ solis uicē penset. Est & alia curandi ratio: Exemptis membranis teritur, cōiectusq; in ollam eliquatur, adiecto minuti salis momento, mox lineo colo transfusus reponitur. Vtiliter in medicamenta additur, quæ lassitudines & fatigationes leuant. Suillus adeps & Ursinus hoc curantur modo: Recens, præpinguis, renibus potissimum detractus, in largiore aqua cœlesti & quàm frigidissima, exemptis tunicis, diligentissimè manibus confricatur, & exprimendo fermè siccatur, subindeq; noua aqua abluitur: cæterum fictili capacitatis duplæ inditus, in aquam demergitur, & subditis leuibus prunis spatula mouetur, eliquatusq; colo transfunditur in aquam: ubi uerò refrixit, & guttatim aquam omnem exclusit, in prælotum fictile demittitur, & infusa aqua leniter eliquari debet, & manu deprimi, quò facilius sæculentum uirus pessum e at: postea in pilam spongia madefactam transfunditur: ubi coire cœpit, residens in imo sordes eximitur: tertio citra aqua eliquatur, repurgatusq; fictili bene operculato, per quàm frigidis locis reponitur. Hircinum seuum, Ouillum, ceruinumq; ita curato: Elotum ex his quodcunque, tunicis, (ut in suilli mentione dictum est) exemptis, pilæ emolliendum tradito, ac manibus fricato, affusa paulatim aqua, donec ne amplius quidem cruentum uirus excernatur, aut pingue aliquod innatet, sed nitida spectetur. Deinde in ollam fictilem conycito, & adiecta aqua ut superemineat, leui pruna liquefacito, & moueto, atque in aquam colato: cumq; refrixerit, iterum in loto fictili eliquato, & quæ antè diximus facito: tertio sine aqua liquefactum, in persusam liquore pilam colato, refrigeratumq; ut in suilli ratione diximus, recodito. Bubulum autem seuum, renibus maximè detractum



tractum, exemptis membranis, aqua marina ex alto petita eluē-  
dum est, mox in pila tundendum diligenter, affusa maris aqua:  
cum uerò dissolutum fuerit, in fictilem ollam conijciendum, &  
marina aqua, quæ non minus dodrante superemineat, proluen-  
dum: decoquendū donec omnis aboleatur odor, additis ad singu-  
las seui Atticas minas, quaternis Tyrrhenicæ ceræ drachmis ex-  
colatumq̃, detractis quæ pessum ierant sordibus, in nouo fictili  
reponendum: opertumq̃, soli interdū credendum, ut ad cando-  
rem reducatur, & odoris uirus euanescat. Priuatim Taurorum  
pingue sic curari debet: Renibus euulsum pingue profluente am-  
nis aqua abluito, detractisq̃ tunicis, fictili nouo postquā exi-  
guum salem insperseris, liquesacito, dein in nitentem aquam ex-  
colato, & ubi concrecere cœpit, manibus iterum confricando  
uehementer lauato, aqua sæpius infusa, refusaq̃, donec quamo-  
ptimè elotum uideatur. Rursus in olla cum pari modo uini odo-  
rati decoquito, & cum iterum efferbuerit, dempto ab igni ua-  
se, ibidem finito pernoctare: postridie si grauiter adhuc oleat,  
noua olla repetitum, uino odorato perfundatur: eadē quæ prius  
fiant, dum omne uirus euanescat. Colliquatur & sine sale, præ-  
sertim affectionum earum causa, quibus sal aduersari solet, sed  
ita paratum non magnoperè albescit. Eodem modo pardorum  
ac leonum pingua curari oportet. Taurinum autem & Vitu-  
linum pingue, necnon Ceruinum, atque etiam huius animalis  
medulla, odoramentis imbuitur hac ratione: Pingue quod odo-  
ratum reddi debet, demptis, quo diximus modo, mēbranis, elo-  
tum & uino quā odoratissimo, nulla maris aqua diluto, fer-  
uefactum, pernoctare sinitur: alterum id genus uinum eadem  
mensura infunditur, colliquatur, & exquisitè colatur, nouemq̃  
eius heminis, Iunci Arabici septem drachmæ adijciuntur. Quod  
si ipsum edoris fragrantioris fieri uoles, quadraginta floris eius-  
dem drachmæ, cum paribus Palmæ, Calami, & Casiæ modis  
n addun



adduntur, & Xylobalsami, Aspalathi singula drachmae, Cinnamonomi, Cardamomi, & Nardi, singula uncia: omnia exactius tunduntur, & affuso uino odorato, in uase operto, quod supra carbones firmiter collocatum sit. Ter efferuescunt, & semoto ab igni uase inibi pernoctant. Postridie uinum effunditur, aliudq; generis eiusdem adycitur Ter similimodo bene conferuescat. Deinde matutinis exempto adipe uinum effundatur, & abluto uase, si quid imo subsedens haesit, detergatur: postremo eliquatum pingue & excolatum, ad usus reconditur. Hoc autem modo odoramentis imbuitur, quod antea curatum est, uerum ante dicta prius inspissari solent, quod facilius sibi odoramentorum uires adsciscant. Itaque assumens quodcunque horum uoles, cum uino feruesfacito, impositis una Myrti ramulis, Serpyllo, Cypero, item Aspalatho plenius tuso. Aliqui tamen ad hunc asum, uno duntaxat horum contenti sunt: cum autem ter efferbuit, exemptum leniter, & linteo colatum, aromatis, uti expositum est, imbuitur. Adipibus spissamenta sic fiunt (quemcunque acceperis, oportet ut recens tundatur) Syncerus & sanguinis expers adeps, reliquas habens notas, quas saepe retulimus, in ollam nouam demittitur, infuso uino albo, uetere, odorato, quod semipedis altitudinem superet: lento igni feruescat dum uernaculus odor aboleatur, planeq; uinum redoleat: ac ubi deposito uase refrixit, duae adipis minae in ollam mittuntur, & duo uini eiusdem sextary, & seminis Loti eius inquam, cuius è ligno ludicrae tibiae faciliuntur, tusi minae quatuor adijciuntur, lento igni subinde miscendo decoquuntur, cumq; odoris uirus euanuerit: excolatusq; adeps refrixerit, una contusi Aspalathi mina, cum Amaracini floris minis quatuor, & uetere uino subigitur: nocte una haec odorem rapiunt, combibuntue: postridie in fictilem ollam tricongiale ea omnia cum adipe inie-

Eta



Ela, additis sextarijs tribus uini unà feruescunt, quousque & uim & odorem spissamentorum adeps ipse contraxerit, qui eliquescent colatur, & reponitur. Quod si maiorem odoris fragrantiam efflagites, drachmas octo quam pinguisimæ Myrrhæ uino macerata, quod multos in annos asseruatum est, misceto. Gallinaceus Anserinusq; sic odoribus imbui solent: Cuiusuis eorum percurati sextarij duo fictili olla excipiuntur, Erysisceptri, Xylobalсами, Palmae elata, & Calami planè contusi, singulorum sesquuncia admiscetur: uini Lesbij ueteris cyathus unus adijcitur, ea ter efferuescunt prunis, mox uase sublato ab igne, die noctuq; refrigerantur: postridie liquata per linteum crassum, mundum in uas excolantur. Vbi uerò adeps coierit, concha excipitur, fictiliq; nouo densius aperto perfrigidis locis reponitur. Hyberno tempore id instituere oportet, æstate siquidem pingua non coguntur. Nec desunt qui Tyrrhenicæ ceræ momentum adijciant, quò facilius in unum corpus omnia coalescant. Eadem ratione Suillus adeps & Ursinus, cæteri q; id genus, odoramentis imbuuntur. Verum Sampsuchi odorem adeps ipse representabit hoc modo: Curati quamoptimè adipis, præsertim Taurini, mina una, tempestiuq; Sampsuchi exquisitè confracti sesquimina miscentur, & insperso largiore uino digeruntur in offas, quæ in uase cooperto nocte quiescunt: matutinis in fictili olla leuisculo igni, affusa aqua, leuiter coquantur, dumque suum adeps odorem exuerit, defecatus ac bene opertus, nocte tota permanet: postero die deterfa sorde quæ pessum ierat, Sampsuchi, ut dictum est, contusi iterum sesquimina priori pastillo adijcitur, eodemq; modo in offas cogitur: alijs quæ diximus peractis decoquitur, & colatur, & si qua fundo hæsit spurcitia, deraditur, & frigido loco recondi-



tur. Si quis tamen incuratum adipem Anserinum, Gallinaceū, aut Vitulinum, à putredine tueri uelit, ita faciendum est: Quem uis adipem diligenter elotum & siccatum in umbra super cribrum, per lintea munda manibus uehementer exprimat linoq; consutum umbroso in loco suspendat, & post multos dies noua charta inuolutum, frigido loco recondat. Pinguia autem indito melle uindicantur à putredinis uitio. Vis omnium est excalfacere, mollire, rarefacere. Taurinus adeps, bubulus & uitulinus aliquantum adstringunt. ~~Eurynotus uinum campocarpum, non confertur cum uino, sed per se solum.~~ Ceruino, Elephantinoq; perunctos, serpentes fugiūt. Adstringentior est Caprinus, qua ex causa decoctus cum polenta, Rhoe & Caseo, dysentericis datur, & cum Ptisanæ succo infunditur. Ius decocti phthisicis in sorbitionibus prodest. Datur quoque utiliter ijs, qui Cantharidum uenena hauserunt. Hircinus, ut ualidissime discutiat, podagricis auxiliatur, cum fimo capræ & Croco impositus. Huic proportionem respondet Ouillus. Suillus uero contra uulnæ & sedis uitia idoneus est, ambustis igni medetur: è sue uetustissimus quisque sale conditus excalfacit, & emollit, elotus uino pleuriticis pdest: cinere aut calce exceptus inflammationibus, fistulis, ac tumoribus succurrit. Asininum tradunt cicatrices corpori concolores reddere. Anserinus Gallinaceusq; conueniunt muliebribus malis, & ad labiorum rimas, ad mangonizandam faciem, & contra aurium dolores. Prsinum constat raptos uitio alopecie capillos restituere, perionibus subuenire. Vulpinus medetur aurium doloribus. Fluiuatilium piscium pinguia, perunctis oculis claritatem asserunt, si in sole liquecant, & melli admisceantur. Viperæ adeps contra oculorum hebetudines suffusionèsque efficax est, addita Cedria, Melle Attico, & pari oleo uetere: pillos alis euulsos perunctis radicibus recens & per se illitus obliterat, atque renasci non patitur.

Adeps



**A**deps omnis in vniuersum humectat & excalfacit in corporibus humanis (plus aut minus) put natura est animalium & ob id adeps porci plus humectat, nō tamē excalfacit, vt oleum: humano enim in caliditate sua simile est. Taurinus adeps calidior & siccior porcino. Vitellinus inferior est caliditate taurino & capri adeps cedit adipi capra: caprae adeps, hircino: taurinus, leonino. Potētius enim est, & validius digerit, quotquot sunt adipibus animalium quadrupedū, vt potē admodū calidus & tenuis, & ideō cōuenit abscessibus, vteribus nodosis, & induratis, & æquē retractis neruis. Taurinus æquidistat à Leonino & porcino, vt enim hunc caliditate superat, ita vicissim ab illo superatur. Et ob id medicamentis veterū abscessuum indi non aliter quā leoninus potest: itē dē in medicamentis tetrapharmacō, qui sūt è cera, resina, pice, & adipe, nihil refert, vtrū taurinū, vitellinū, hircinū, caprinū, an porcīnū imponas: at porcīnus magis cōueniet infantibus, fœminis, & ijs qui molli sūt carnes: taurinus rusticis, & quibus dura est caro, aut quod ita nati sint, aut quod ē viuendi ratione id sibi cōquisierint. Omnis adeps quo vetustior, eō calidior, tenuior, & plus desiccet. Hic summopere aduertēdum, cū dicit Dioscorides caprinū adipē magis astringere porcino, nō de astringēte pari qua Rhoe, intelligendū, sed fortiorē & acutiorē porcino. Vocat alias & saporē astringētorū, Piperis Pyrethri, Emphorbi, Cepe, Alij cū acre dicere debuerit, & astringētorius propriē sit in Gallis, Balaustijs, Rhoe, & Hypocisthe. Effectum viperini adipis quē noster actor profert, in oblitterādis radicibus subalariū pilorū, & curāda suffusione, improbat Galenus, experiētia affirmans nō ita esse. Porcīnus adeps omnibus alijs humidius, itē plus mollit & maturat, & ea causa est cur inferatur flegmonū emplastris: in ijs vero qui erodentē & mordacē dolorem sentiāt in intestino sedis, aut colo, caprino in clysteribus potius quā porcino vtemur: non quod magis reperiatur, & valentius mordacitatem restinguat porcino (ē sui enim natura porcīnū) sed ideō quod cum spissū sit caprinū, statim cōgelatur, & adglutinatur patiēti loco: at porcīnū, nempe liquidum, foras prodit, vt oleū: idq; applicatur in dysenteria & tenesmo. Atenim quæpiā tenuis substantia ratione, plus reperiunt quā spissa, & vbi malū altius est infixū in profundo corporis: liquidū duro plus penetrat, aptiusq; corrodētī humori miscetur. Ea de re in erosionibus, quæ erunt in alto corporis, plus reperiunt adeps anserinus quāuis calidior porcino, quos intermediat adeps gallinaceus Mariū adeps semper fœminino calidior est: castratorum minus calidus & siccus quod castrati fœminarum naturam referant. Adeps animalium in cibo sumptus, languidum reddit stomachum, oppilat, augmentat flegma,



paruum nutrit, deprauatum sanguinem generat, infirmat vim retentricem stomachi, dysentericos & quosuis alios fluxus in corpore, excitat, satiat non sumpto legitimo cibo, sensus & intellectum obtundit, somnolentiam prouocat, & calidum stomachum in bilem & vapores conuertit.

## Medulla. CAP. LXIX.

### NOMENCLATURA.

Græ. Μυελῶ. Lat. Medula. It. Midolla.

Gal. Moelle. Ger. Marck.

**L**audatissima est Ceruina, mox Vitulina, post hanc Taurina, dein Caprina, & Ouilla. Colliguntur æstatis exitu, cum appetit autumnus: quippe cum alijs anni temporibus concrementum sanguinis, & ueluti caro friabilis, in ossibus inueniatur, nec facile cognosci potest, ni quis eam ossibus extrahat & recondat. Omnes medulla molliunt, calfaciunt, rarefaciunt, ulcera explent: Ceruina perunctos uenenata fugiunt. Curantur recētes, adipis modo, aqua respersa subacta, selectisq; ossibus tantisper elota, & in linteum expressa, donec aqua syncera emanet: & deteresa sorde penna, si qua innatet, liquata in duplicato uase in pilam exprimuntur, & ubi coiere, omni fece, quæ ad ima fidit, derafa, fidelili nouo reponuntur. Quod si libet incuratas reponere, facito omnia, quæ de Anserum & Gallinarum adipe demonstrauius.

**M**edulla animalium duritiem omnino emollit, in musculis, tendinibus, fibris, & interioribus. Præstantissima est ceruina, ab hac boi iuuenum, & vitulina. Hircina, taurina, robustior est, mordacior, & siccior, Qui fit ut duritias nodosas non emolliat. E ceruina & vitellina pessi fiunt ad emolliendas matricis duritias, vnguntur & muliebres loci ad eundem effectum. Medulla est spina itidem ut ex ossibus animalium extrahitur, quamuis quæ est spina educitur, durior sit & siccior. Galenus quo est muco & situ integras Medullas asseruaret, sub veris initium inter Lauri frondes siccis in adibus reponebat: Instante æstate aditis locis, frigidiusculis, & quo Aquilo non peruaderet, fenestellis in diurnum & nocturnum euri spiramentum apertis. Calidis enim locis putrescit, & situm



fitum contrahit: in humidis verò & terræ propinquis, mucum. Quæ editur è spina medulla, flegma generat & spissos humores, difficulter digerit, nocet stomacho, nauseam prouocat, si tamē valentem digestionī stomachum repperit, non improbatē nutrit. Quæ ex ossibus educitur, licet & ipsa in cibo nauseam proritet, & flegma generet, attamen si digeratur probè, nutrit & gustui gravior, quàm spinalis est.

## Fel. CAP. LXX.

### NOMENCLATURA.

Græ. χολή. Lat. Fel. Ita. Fiele.

Gal. Fiel.

**F**el omne curatur hoc modo: Recens præligato ore folliculi lino tandiu demissum in feruentem aquam, dum quis spacium trium stadiorum percurset, mox exemptum siccatur umbroso loco, asperginem non redolente. Sed quod ad oculorum medicamenta adijci solet, ligatum lino in vitreum uas, quod mel habeat, immittitur, circumuoluto ad os uasis lini principio, & operto uase reconditur. Est enim uis omnium acris & excalfaciens. Intensius tamen & remissius uiribus differunt. Siquidem præstantius in effectu esse uidetur Fel marini Scorpionis, & piscis qui Callionymus appellatur, marinæ Testudinis, Hyænæq; item Perdices, Aquillæ, gallinæ candidæ, & syluestris Capræ, quod priuatim prodest contra suffusiones incipientes, & oculorum caligines, argemas, & genarū scabritias. Ouillo, Suillo, Hircino, atque Ursino, Taurinum multò efficacius. Felle omni perfacilem, præsertim infantibus, deiectionem quis molietur, si intinctū eo tomētū aut fimbriā fedi subiciat. Priuatim Taurino anginæ cū melle perunguntur: sedis ulcera sanat, & ad cicatricē vsq; perducit. Idē auribus fractis & purulētis cū muliebri lacte aut Caprino instillatum medetur, & sibilo earundem ex porri succo. Admisceri insuevit, uulnerarijs emplastris & circum-

n 4 lini



linitionibus, quæ contra uenenata parantur, phagedænicis ulceribus, colicis & scroti doloribus, ex melle prodest: lepras, furfures cum nitro & terra cimolia quàm optimè purgat. Ouillum & Vrsinum contra eadem pollent, uerùm inefficacius hæc præstant. Vrsinum eclegmate comitiales adiuuat. Fel testudinū anginis, & in ore infantium nomis, prodest: naribus inditum comitiales erigit. Syluestrium Caprarum felle peculiariter peruncti lusciosi sanantur. Hircinum idem obit munus: thymia abolet & luxuriantes elephantorum extuberationes illitu reprimunt. Suillum autem contra aurium ulcera, reliquaq; omnia, magno usu assumitur.

**F**el ipsissima animalium est bilis, & humorum quos in se continent calidissimum. Cuiusuis animalis natura, sel plus minúsue calidum efficit. Fel quò liquidius, & magis in pallorem deurgēs, eò minus calidum, illo qui spissius est, & coloratus. Habet taurus in felle lapidē, qui potius vesica lapidē frāgit. Is tritus & naribus afflatus, visum expedit, & aquæ in oculos descensum inhibet, cum dilatantur tunice. In puluerem lentis pondere reductus, & naribus attractus cum succo Betæ, prodest malo caduco. Fel Auratæ piscis, Lucij, Perdicis, & Galli mire in Venere fæminas oblectant.

## Sanguis. CAP. LXXI.

### NOMENCLATURA.

Græ. Αἷμα. Lat. Sanguis. Ita. Il Sangue.

Gal. Le sang.

**S**anguis Anseris, Anatis & Hædi, utilissimè in antidota miscentur. Palumbi autē, Turturis & Columbæ, necnon Perdicis, oculis cruore suffusis, & recētibus eorum uulneribus, lusciosisq; illinuntur: peculiariter Columbæ sanguis, cruorē membranis cerebri erumpentē inhibet. Hirci, Capræ, Cerui & Leporis sanguis inassatus sartagine, dysenterias & cæliacorum profluvia sistit: in uino potuscōtra toxica efficax est. Leporinus sanguis ita ut tepet illitus, uitia cutis in facie, lentiginesq; emaculat. Canin



ninus commodè ab his bibitur, quos efferata in rabiem bestia momorderit: contra epotum toxicum auxilio est. Testudinis terrestres sanguinem epotum tradunt prodesse comitialibus: marinæ autem Testudinis cum uino & Leporis coagulo Cuminog<sup>3</sup> contra serpentium morsus, & hausta rubetæ uenena, conuenienter bibitur. Taurinus cum polenta illitus, duritias discutit, emolliq<sup>3</sup>. Sanguis equarum quæ admissuram expertæ sunt, in medicameta additur quæ erodunt, septica uocant. Sanguine Chamæleonis genarum palpebras euelli creditum est. Hoc enim uiridiū Ranarum sanguine præstatur. Menstrua sanguis fœminarum, circumlitu conceptum inhibere existimatur: aut si omnino mulier menstrua supergrediatur. Leuat podagræ dolores, & igne sacrum illitus.

**I**mprobat Galenus totū hoc caput de sanguine, & ne multis morer, dicit se experta nunquā remedia reliquisse, ut eis uteretur, quibus nullus utetur qui se circumuentum non sentiat. Ipsa nos docet experientia recentem columbæ sanguinē caligini oculorum prodesse, & Tauri sanguine multos in historijs legimus suffocatos. Matthiolus è Galeno Dioscoridis caput hoc emendat, & ubi habetur, Ranarum sanguine genarum palpebras euelli, legendum putat, Vnctis ranarum sanguine genis, quæ deciderint palpebras non renasci. Itidem, ubi legitur, equarum sanguis, legendum, emissariorum sanguis.

## Fimum. CAP. LXXII.

### NOMENCLATURA.

Græ. ΑΠΟΠΑ[Q]. lat. Fimum. Ita. Lo Sterco.

Gal. La Fiente.

**A**rmentariæ Bovis fimum si recens admoueat, uulnerū inflammationes mitigat, folijs autem inuoluitur, & calfactum cinere feruenti superponitur: coxendicis cruciatus fotu cōpescit. Illitum ex aceto duritias, panos & strumas discutit. Priuatim suffitu fimi, quod à masculo Boue redditum est, procidentes uulnæ reprimuntur, accensi nidore culices abiguntur. Fimum

n s Ca



Caprarum, præsertim in montibus degentium, potum in uino, regium morbum emendat: menses cit cum odoramentis haustu & partus euocat. Tritum in farinam, & impositum lanis cum Thure, fæminarum profluvia sistit: cæterosq; sanguinis impetus ex aceto cohibet. Medetur alopecijs exustum, & cum aceto aut oximelite illitum: cum axungia uero impositum, his qui podagra tentantur, auxilio est. Caprillum in aceto decoctum imponitur serpentium morsibus, ulceribus quæ serpunt, igni sacro, & parotidibus. Vtilem ischiadici uestionem hunc in modum accipiunt: in eo interstitio ubi pollex brachiali committitur, caua ueluti lacuna subsidet, in qua lana oleo imbuta substernitur, deinde sigillatim feruentes stercoreis Caprini pillulæ imponuntur, dū uapor per brachium ad coxam sentiatur peruenire, & coxendicis dolorem mitigare: adustio id genus Arabica appellatur. Ouillum illitum sanat epinyctidis, clauos, pensiles uerrucas, thymos & ambusta igni, rosaceo cerato exceptum, Fimum suis syluestris aridum, in aqua aut uino potum, reiectiones sanguinis sistit: uetustum lateris dolorem mulcet: adrupta & conuulsa ex aceto bibitur: luxatis cū cerato rosaceo medetur. Tam Asinorū quā Equorum fimū siue crudum siue crematū, addito aceto, sanguinis eruptiones cohibet. Armentarij, qui herba pascitur, siccum fimum liquatum in uino, mox potum, contra scorpionum ictus magnopere auxiliatur. Columbinum uehementius & excalfacit & urit: cum hordeacea farina mixtum strumas ex aceto discutit carbunculos emarginat, tritū cum melle, lini semine & oleo, ambustis igni medetur. Gallinaceum uero omnia eadem, sed efficacius præstat: priuatim tamen contra uenena fungorū, & coli cruciatus ex aceto aut uino bibitur. Ciconiæ fimum, si ex aqua hauriatur, comitialibus prodesse credunt. Vulturini fimi nidore partus excuti produntur. Murinum detritum cum aceto, & illitum, alopecijs medetur: cum Thure

&



Et mulso calculos expellit: subdita infantibus muscerda, alui deiectionem promouent. Caninum quod flagrantissimo canis sydere fuerit exceptum, cum uino aut aqua potum, sistit aluum. Humanum stercus illitum, uulnera ab inflammatione uindicat, et obiter intumescere non patitur, sed ea statim glutinat: sicco ex Melle anginae perungi commodissime traduntur. Terrestris Crocodilli finum, Crocodilea uocant, quae mulieribus colorem nutrit in facie, nitoremque seruat. Optima est candidissima et friabilis, Amyli modo, minime ponderosa, in humore statim eliquescent, quae cum teritur, fermenti acorem quadantenus refert. Adulterant eam sturnorum fimo, quos captos Oriza pascunt, ipsumque non dissimile uendunt. Alij Amylum aut Cymoliam miscent, et adscito Anchusae colore per rarum cribrum paulatim exprimunt, ut se contrahat in uermiculorum speciem: qui siccati pro Crocodilea ueneunt. Inter omnes conuenire inuenio, humanum stercus caninumque gutturi impositum, anginis auxiliari.

Inter animantium stercora laudat Galenus bouinum, caprinum, crocodilinum, caninum, et huius mirabile effectum recitat, si arte et modo educetur. Aqua est stercore humano per alembicum extracta, valet ad fistulas, ad erodentia ulcera, et quae difficulter coagulantur, ad ulcera capitis manantia, ad albuginem oculorum, ad canculos, extra applicatum. Oleum quod, ab aqua, aucto circa alembicum igni, distillat, valentior est ad iam dicta.

## Vrina. CAP. LXXIII.

### NOMENCLATURA.

Græ. Ούρον. Lat. *Vrina*. Ita. *Orina*.

Gal. *l'Vrine*.

**H**umanam urinam suam cuique bibere, contra Viperæ morsus, ac uenena, incipientemque aquam intercutem proderit.

Secr-



Scorpionis, Viperæ marinorum, Draconisq; morsus ea conuenientissimè fouentur. Canina ad perfundendos canis morsus idonea est, pruritus & lepras nitro addito expurgat: sed uetus, ulcera capitis manantia, surfures, psoras, & feruidas eruptiones, multò magis abstergit: nomas, & præcipuè genitalium, cohibet: auribus infusa manas pus supprimit: decocta q; in calyce mali punici, earum uermiculos abigit. Pueri impubis resorpta urina, orthopnoicis auxiliatur: decocta in æreo uase cū melle emendat cicatrices, & argema, caliginesq; ex ea & cupro idoneum auri ferrumen conficiunt. Quod in urina subsidit, illitu ignem sacrum mitigat: feruefactum cum Cyprino, inditumq; uulua dolores mulcet, strangulatus leuat, genas deterget, oculorum cicatrices expurgat. Taurina, si cum Myrrha instilletur, aurium dolores lenit. Aprina uiribus eisdem prædita est: priuatim comminuit uesicæ calculos, & potu expellit. Caprina ad aquā quæ cutem subiit, cum Nardi spica quotidie binis cyathis cum aqua bibitur: urinamq; per aluum extrahit, aurium doloribus instillata medetur. Asinina traditur renum uitij mederi. Lyncis urinā, quā Lyncuriū appellant, simulac excernitur, glaciari coireū in calculi duritiā, uulgò creditum est: quare quod de ea proditum est, uanum esse conuincitur. Est enim quod à nonnullis uocatur Succinum Pterygophoron, ideo dictum quod pennas ad se alliciat. Id potum ex aqua, stomacho aluòq; fluxione laboranti conuenit.

**A** Nimaliū vrina, ut eorū natura, plus minus ue calida est. Omnium debilior, & minus calida, est humana, hui proxima porcina. Apri acris est. Ex hac Thusci mixta cum oleo, ac in sua uesica relictā, cū ad sumum appenderint, quousq; spissitudinem mellis contrahat, ad uermes infantium utuntur, perungentes ea nares & carpum, ac inde mirabilis sequitur effectus. Galenus Dioscoridis sententiā non astipulatur, Urinā infantium iuuare astmaticos, & quibus strictum est pectus. Verū Lyncuriū species est Succini quæ paleas attrahit & plumas, nō ex urina Lyncis in terra condensata, concretus lapis. Lapis Lyncis quam officinis

nis



nis impostores videntur, nec est Lyncurium Succini, nec vlla vi ad prouocandam vrinam, nec ad lapides in renibus aut vesica comminuendos, vt stolidè quidam opinantur.

## Mel. CAP. LXXIIII.

### NOMENCLATURA.

Græ. μέλι. Lat. Mel. Ita. Mela.

Gal. Miel. Ger. Harzig.

**P**Rincipem locum obtinet Mel, quod Atticæ regionis est, præcipue ex Hymetto, mox Cycladibus insulis, & è Sicilia, cognomine Hybleum. Magis probatur dulcius & acre, odoratiùs, subflauum, nec humectum, graue, & minimè stuxum. quod ob sequacè lentitiã non faciliè abrumpitur tractumq; resilit in digitos. Mel abstergendi vim habet, ora uenarum aperit, humores euocat, qua ratione in sordida ulcera sinusq; commodissimè infunditur. Decoctum atque impositum, abscedentẽ carnem glutinat. Medetur impetigini coctum cum liquido alumine, & illitum: item aurium sonitui & dolori, cum fossili sale trito, tepidum instillatur: lendes & fœda capitis animalia illitum necat: nudã glandem recutitis operit, præsertim quæ circumsione aperta nõ est, si Melle præputiũ à balineo triginta diebus emolliatur: oculorum caliginẽ discutit, faucibus, tonsillis, anginae collutum gargarizatumue medetur, urinam ciet, auxiliatur tussi, & à serpente percussis: contra haustum Meconium, cum Rosa-ceo calidum assumitur: aduersus uenena Fungorum, & rabiosi canis morsus linctum aut potum proficit: crudum tamen aluum inflat, tussim laceßit, & ea de re despumati usus aptior est. Primatum tenet in mellis genere uernum, deinde æstiuum, hybernum uerò, ut potè quod crassius constet, deterrimum reputatur, ceraginis halitum expirat. Quod in Sardinia gignitur. Mel, amarum est, quoniam apes inibi absinthio uescantur: quo uitia



tia cutis in facie & macula aptissime perunguntur. Heraclia in Ponto quibusdam anni temporibus, propria quorundam florum dote, mel coëstat, quod qui edere, mente abalienantur, ac sudore diffluunt. Remedio sunt, esitata Ruta, & Salsamenta, aut epotum mulsum, resumpta. quoties uomitione reijciuntur, acre autem est, & olfactu sternutamenta mouet. Quod cum costo illitum, feminarum cutem emendat, & cum sale sugillationes rapit. Est aliud concreti Mellis genus, quod Saccharon nominatur. In India uero & felici Arabia in arundinibus inuenitur: salis modo coactum est, dentibus. ut sal, fragile, aluo idoneum, & stomacho utile, si aqua dilutum bibatur: uexata uesica renibusque auxiliatur, illitum ea discutit, quæ tenebras oculorum pupillis offundunt.

**M**EL liquor eximius, dulcoris & noticiæ euulgatissima, satis superque expressum à Dioscoride. Duo præcipue nocentioris Mellis genera veteres recensuere. Vnum Sardon, quod in ibi ex Absinthio & quapiam Ranunculi specie apes pascantur. Alterum Ponticum, primo nocentius, quod Aconito & Nerij floribus eo loci nutriatur. Ingens inter recentes medicos est controversia, sit ne id Saccharum quod sub mellis specie Dioscorides & Galenus describunt nasci in India, & Arabia felice, idem cum nostro Saccharo, & ab eadem ne planta prodeunt, è qua nostro sæculo è Medera, fortunatis insulis, & alijs multis locis in frusta condensatur. Et sanè antiquorum Saccharum est ipsarummet plantarum liquor extra cannam, ut gummi ex arboribus, erumpens, ac per poros resudans, & postea è sole supra condensatus. Nec enim Dioscorides aut Galenus id mel in ramos vel fronds deciduum è cælo faciunt, sed canis insidens. Accedit ad hæc quod cum Dioscorides, Galenus & Plinius id Saccharum album salis in more, clarum, friabile describant, satis declarant non esse ex rore concretum, sed quod (ut potè viscosum) adhereret canis, ubi postea à sole coagmentaretur, eo artificio quo à nobis igne decoquitur, ut istud sit Saccharum factum à natura, nostrum arte & igne preparatum. Et quod ad Paulum Aeginetam & Auincennam attinet, qui sal Indum laudant ad scabrâ & siccâ linguam in acutissimis febribus, postquam spes lucri quotannis plantas hæc incidere docuit, impedita est ab operatione sua natura, & sicque deperit antiquorum Saccharum, in cuius locum recentibus medicis successit quod Candicū vocamus, arte coëctum. Scabrâ enim è siccitate linguæ multum prodest, & asperciat



tudini pectoris, maximè si æstate in vasis iulebi violati conficiatur: Aqua siquidem, & violarum infusio, vim humectandi leniendiq; auget.

Cera.

CAP. LXXV.

NOMENCLATURA.

Græ. Κηρός. Lat. Cera. Ita. La Cera.

Gal. Cire. Ger. Wachs.

**C**era optima est subfulua, subpinguis, pura, odorata, & halitū quadā tenus melleū referens, natione Pontica, aut Cretica: secundū locū obtinet candicans, & suapte natura pinguis, Candida fit hoc modo: Ex ea radunt albū syncerūq; atq; transfundūt in uas, quod satis habeat marinæ ex alto petitiæ, inspersoq; nitri momento decoquunt: cūq; iterū tertionē inferbuit, separatū uas refrigerant, ac Cera pastillū eximunt, deterfa sorde, si qua forte adhæsit: tum denuo indita noua maris aqua feruet, uti retulimus: & uase dempto ex igne, fundum ollulæ nouæ aqua frigida madafactum, in Cera summā suspensa manu intingunt, quò celerius concreseat, & quàm minima portio extrahatur. suscepto primo Cera orbiculo, iterū uasisimū aqua refrigeratū, tantisper in cera immitti debet, dum tota excipiat. Orbiculi lino cōsuti, interuacante, spacio, suspendūtur, & interdiu, cōtinuo sub sole, noctu sub luna aspergūtur, usq; dū perfectè albescāt: uerū si eximius ille candor desideretur, eadē faciliari, & idē tidē recoqui operæ pratiū est. Nec desunt qui pro marina, in muria quā acerrima semel aut iterū excoquāt, dein lagūcula tenui, rotūda, ansam habēte, extrahūt postea orbiculos, sub strato affatim cespite herbofo, insolāt, donec candorē summū cōtraxerit. Præcipiūt hoc obeundū munus uere, cū sol remissa uehemētia humorē pariat, ut nō facile liquetur. Cera omnis molli, calfacit, modicè explet corpora. Datur in sorbitione dysentericis: ac Mily magnitudine, decem grana Cerae hausta, lac in nutricibus non patiuntur coagulari.

Cera



**C**era Galeno mediat inter calida, frigida, humida, & sica. Substantia est spissa, & quadatenus viscosa. Et ob id non desiccatur tantum sed etiam fortuita quapiam operatione humectat corpora, pororum transpirationem inhibens. Attamen Cera magis utimur medicamentis calidis & frigidis inserta, quam ipsa sola, quod modice digeratur: intus sumpta, paucillum habet virtutis calidae digestoriae, quae ei a Melle, quod illa abundat, superest.

## Propolis. CAP. LXXVI.

### NOMENCLATURA.

Græ. πρόπολις. Lat. Propolis. Ita. Propoli.

Gal. & Off. nomine latino utuntur. Ger. Wbortstesz.

**P**ropolis eligi debet flava, odorata, Styracem referens, in uehementi ariditate mollis, & Mastiches more ductilis. Magnopere calfacit & euocat: aculeos & omnia infixam corpori extrahit: in uetere tussi suffita proficit, impetigines admodum tollit: ea in alueariorum foribus cerose naturae inuenitur.

**P**ropolis Dioscoridi & M. Varroni præ foribus alueariorum reperitur, seu ut planius dicam, præ spiraculis è quibus intrant & exeunt apes. Plinius crustam craßioris iam materiae additis floribus, nondum tamen Cera, sed fauorum stabilimentum, quæ omnes frigoris aut iniuriæ aditus obstruuntur, odore etiamnum graui, ut quæ plerique pro Galbano utantur. Populi ferunt in folijs guttam, ex qua apes Propolim faciunt. At enim Metys quam crustam facit saporis amari, primum eadem est, in apibus, operis fundamentum. Secundum. Pissoceros, quæ supra eam ueniat, picantium modo, seu dilutior. Tertium Propolis. Valentinus aspergit Propolis, quam attrahat. Substantia constat tenui, & ob id excalfacit in fine secundi gradus, aut tertij principio.

## Triticum. CAP. LXXVII.


### NOMENCLATURA.

Græ. τρυγός. Lat. Triticum. Ita. Grano.


Gal. Froment. Ger. Weysfen.

Opti





Trimestre .



Triticum.

**O**ptima è Tritici generibus ad secundæ ualitudinis usus habentur, quæ recentia & iam perfecte adulta, colorem luteum referunt: dein sequuntur trimestria, quæ nonnullis Sitania nominantur. Itaque cruda in cibis teretes tineas gignunt, canum morsibus prosunt, mansa & imposita. Confectus eorum similitudine panis, plus alit quam cibarius. E trimestrium farina panis leuiorem cibum præbet, & qui facile in membra demandetur. Farina eorum cum Hyoscyami succo illinitur aduersus neruorum fluxiones, quas Græci rheumatismos uocant. Item contra intera neorum inflationes, lentigines ex aceto mulso tollit. Furfures autem in acri aceto decocti, turgentes mammas sedant: Viperarum ictibus auxiliatur, & torminosi prosunt. Farinaceum fermentum calfaciendi extrahendiq; uim habet: priuatim callos pedum, cla

o

uosq;



uosq; extenuat, & cetera tubercula furunculosq; ex sale concoquit, & aperit. Sitamiorum farina contra uenenatos ictus cum aceto aut uino commodissime illinitur. Eadem si decocta in glutini modum delingatur, cruentis excreationibus, proderit: contra tussim & exasperatas arterias, cum Mentha & butyro decocta, efficax est. Tritici pollen, si ex aqua mulsa, aut hydreleo decoquatur, omnem discutit inflammationem. Panis & crudus & coctus cum aqua mulsa inflammationes omnes illitu mulcet: cum emolliat, & quadantenus refringeret: sed herbis succisue huic rei accommodatis admisceatur. Vetus panis aridus, adiectis conuenientibus, citam aluum cohibet: recens, muria maceratus, illitu uetustas impetigines sanat. Glutinum ex similagine & polline, quo charta glutinantur, sanguinem excreantibus prodest, si liquidum ac tepidum cochlearis mensura detur sorbendum.

**T**riticum, quod granum ob excellentiam vocamus & frumentum, omnibus notum est: Id in Lolium pluua & admodum frigidam anni tempestate degenerat. fit è Tritico inter duas laminas modice ignitas stricto oleum, quod fistulis conuenit, cutia spera, & fissuris quae ex frigore proueniunt. Triticum extrinsecus applicatum excalfacit primo gradu, & quamuis nec defecet nec infrigidet, quadantenus tamen viscosum est, & opillatorium. Idem si coctum manducetur, grauat stomachum, caput vento & vapore complet.

## Hordeum. CAP. LXXVIII.

### NOMENCLATURA.

Græ. κριθή, Lat. Hordeum, Ita. Orzo.

Gal. Orge. Ger. Grosz geist.

**H**ordeum optimum est candidum purumq; id minus quam triticum alit. Ptisana tamen ob cremorem in decoctione redditum,





Hordeum.

redditum, plus alimenti præbet, quàm polëta ex Hordeo facta. Contra acrimonias atque gutturis scabritias, exulcerationesq<sup>3</sup> pollet: quibus etiam triticea ptisana præsidio est, sed plus alit, magisq<sup>3</sup> urinam mouet: lac abunde supeditat, si cum Fœniculi semine decocta sorbeatur. Hordeum abstergit, urinam ciet, inflationem parit, stomacho aduersatur, tumores concoquit. Farina hordeaca decoquitur in mulsâ aqua cum fico, ut inflammationes collectionesq<sup>3</sup> discutiat: duritias cū

resina & fimo columbarum concoquit: cū Meliloto autē & Papaueris calyce dolores finit, qui latus excruciant. Aduersus intestinorum inflationes cum Lini semine, Fœnogræco, & Ruta illini iuuat, strumas cum pice liquida, cera, oleo, & impubis pueri urina, ad concoctionem perducit: & cum Myrto aut uino, aut Malicorio, aut syluestribus Pyris, aut rubo, alui profluvia sistit: podagricis inflammationibus, cum cotoneis aut aceto prodest. Decocta in acri aceto, modo quo hordeaceum cataplasma, & calida imposita, lepris medetur. Cremor uerò farinæ ex aqua, atque cū pice & oleo decoctus, puri mouendo est: cum aceto subactus itidem, & cum pice: contra articulorum fluxiones prodest. Farina ex his aluum cohibet, inflammationesq<sup>3</sup> mitigat.



**M**ultæ Hordei sunt species, vt è granis patet & spicis. Grana quibusdam rotunda, parua, & in se contracta, in alijs longa & maiora. Spicarum aliæ granorum ordines duos habent, aliæ tres, aliæ quatuor, & postremum aliæ quinque, & sex. Ad hæc spicarum quæpiam longa sunt & rara, quadam breues & granis refertæ: quadam altius à folijs protensa, aliæ humiliores & folijs propinquæ. Est & granis suū discrimen, siquidem alba & rubra sunt, ex quibus maior farinæ copia, quam ex albis colligitur. In Francia habetur Hord n̄ mundum, quod cribro excussum mundum exeat. Vertitur in Lolium iisdem de causis, quibus Triticum. Hordeum frigidum & sicum in primo ordine, & ali quantum absterforium. Paratum quouis pacto Hordeum nihilum magis exaltat: desiccat amplius, si primum torreatur ex eoque polenta fiat. humectat cum eo fit Ptisana. Recentes medici cum Ptisana è Galeni & antiquorum præscripto rationem inire non possent, Hordeum optimè decoquere docuere, & deindè in vasc lapideo contritum, setaceo (vt dicunt) panno traducere, strobilosque sacharum, ac amygdalarum lac, aut papaueris semen adiungere. Panis Hordeaceus stomachum onerat, frigidos & crassos humores gignit, modicè nutrit, ventum precreat, sunt tamen qui dicant podagra prodesse.

Zitum. C A P.

LXXIX.

NOMENCLATURA.

Græ. Ζῖθος, Lat. Zytum. Ita. Zitho,  
Gal. Biere. Ger. Byer.

**E**X Hordeo potus fit, cui Zytho nomen est: is urinam cit, renes & nervos tentat: membranis, præsertim cerebrium uestientibus, officit, inflationem parit, vitiosum succum creat, elephantiasin gignit. Perfusum Zytho ebur, obsequiosum & operi tractabile redditur.

Curmi.



## Curmi. CAP. LXXX.

## NOMENCLATURA.

Græ. κοῦρμι Lat. Curmi.

Gal. Ceruoise.

**F**it & ex hordeo potus, quem Curmi nominant, eoque sæpè potu pro uino utuntur. uerum dolo rem capitis mouet, malum succum gignit, neruis nocet. Consimilia etiam potus genera ex Tritico fieri solent, in Iberia, quæ occidentem spectat, & Britannia.

**Z**ytum & Curmi apud veteres uisitata quibusdā regionibus potacula fuere, quæ tamen differunt à ceruisia & Biera nostratibus.


Zea, seu semen.

## CAP. LXXXI.

## NOMENCLATURA.

Græ. Zea. Lat. Zea, seu semen. Ita, Spelta.

Gal. Espeautre. Ger. Blitren.



Curmi.

**Z**ea duorum generum est: una simplex, altera in geminis putaminibus graminibus incla gerit, ob id Diuoccos appellatur: plus quam hordeum alit: ori grata, digeritur in panificia, minus quam triticum alens.

•

3

Zea



**Z**ea ipsissima est Spelta, & ex ea in ligneo mortario contusa & trita fiebat antiquis halica. Zea, Galeno, medium tenet locum inter Triticum & Hordeum.

### Craſſior farina.

## C A P. LXXXII.

### NOMENCLATURA.

Græ. κριμνον. Lat. Crimnon. It. Crimno.

Gal. Res non satis nota. Ger. Krietz.

**C**rimnon craſſior eſt ex zea triticoꝝ farina, ex qua pulvẽ faciunt. Abundẽ alit, facile conficitur: aluum uehementius astringit, ſi zea, ex qua fit, prius torreatur.

**C**rimnus craſſior zea, aut Tritici craſſior farina eſt, qua ad pulvẽ conficiendam antiquitus utebatur, & diu locum panis tenuit.

## Siligo. C A P. LXXXIII.

### NOMENCLATURA.

Gr. ὀλυρα. Lat. Olyra. Ita. Olira

Gal. Espece d'Espeautre.

**E**idem generi Siligo adſcribitur, ſed minus aliquanto nutrit: in panes, ut zea, cogitur. Fit quoq; è Siligine craſſior farina, quam Græci Crimnon uocitant.

**O**lyra zea ſpecies mediꝝ temperamenti inter Triticum & Hordeũ, non eſt noſtrum Secale, ſiquidem ex Olyra dulciſſimus fit panis, è Secali amarus & inſpidus, & ſameliciꝝ tantum utilis: Nec itidem antiquorum ſiligo, è qua antiquitus fieret candidiſſimus & leviſſimus panis, & ex Olyra, dulcis. Quin & ipſi Galeno, vox hæc, Σιλιγνις, quæ Latinis ſiligo dicitur, græca non eſt dictio, nec ullam Græci habent, quæ

Latinum



Latium nomen exprimant. Quod profecto dicturus non fuerat, si Olyra Siliginem reddidisset. Ex his apparet Olyram, Siliginem, Secale, frumenti species esse diuersissimas.

## Athera.


## CAP. LXXXIIII.

## NOMENCLATURA.

Græ. Ἀθήρα. Lat. & Ita. Athera.

Gal. res ignota. Ger.

Reindersapp.



Tragus

Athera ex ea fit tenuis  
sime molita. Est autem  
forbitio, quasi liquida pulicu  
la, infantibus conueniens, &  
cataplasmatibus efficax.

Athera forbitiuncula secun  
dum diuersos authores, ex  
Tritico, Hordeo & Amydo fieri  
potest. Id pultis genus germani  
edendum panis vice, non lactanti  
bus tantum apponunt, sed in ipsas  
etiam mensas euocant. Id eis fit  
farina, lacte & butyro.

## Tragos. CAP.

## LXXXV.

NOMENCLA  
TVRA.

Græ. Τράγος. Lat. Tragus cerealis.

Ita. Trago. Gal. Ble Turguet. Ger.

Hamelhorn.

•

4

Tragos



**T**ragos quandam Halicæ frugis figuram gerit: multò minus quam zea nutrit, quod multū aceris habeat: quare ægrius conficitur, aluumq; magis emollit.

**T**ragus peregrinum & Orientale frumentum, nobis edacitate tēporum deperit, itidem vt alia multa plantarum genera quæ reteribus Romano florente imperio ex Oriente afferebantur, quæ postliminio quopiam in terras indigenas rediere.

## Auena. CAP. LXXXVI.

### NOMENCLATURA.

Gr. Βρώμη & . Lat. Avena. Ital. la Vena.

Gal. Auoine. Ger. Wberß; Haser.



Auena.

aceto. Panis Auenaceus cum oleo rosarum & aqua illitus, emollit abscessus, & cum aqua mellata duritias.

**A**vena genicula quædam habet: folio & stipula triticum imitatur & in cacuminibus dependentes paruulas ueluti locustas bipedes gerit, in quibus semen continetur, utile ad cataplasma ta uti hordeum. Pulte huius lauis sistitur, prodest tussientibus in sorbitione succus.

**E**st Avena frumenti species: Est Avena sterilis. Vim eandem cum hordeo habet, indita emplastris digerit, aliquantum astrictoria, vt laxum corpus restringat. Galeno cōmodo tempore Avena editur cum uino dulci sapa aut uino melato. Nauos tollit farina Auenacea illita cum

Oriza



## Oryza. CAP. LXXXVII.

## NOMENCLATURA.

Gr. ὄρυζα. Lat. Oryza. Ital.

Riso. Gal. du Ris.

**O**ryza frugū generis est, in palustribus riguisq; nascens. Mediocriter alit, sed aluum suprimat.

**O**ryza cui temperatum barbaries Rixi nomine indidit modice corpus astringit maximè si ut Halica coquatur, difficilius tamen digeritur, & minus nutrit, atque adeò i pso gustu insuauior est.

## Halica. CAP.

## LXXXVIII.

## NOMENCLATURA.

Gr. Χόνδρος. Lat. &amp; Ital. Halica.

Gal. &amp; Off. res nō perinde nota.

**H**alica fit ex zea quam Dicoccon appellauimus: plus alit quàm Oryza, aluum magis cohibet, stomacho longè utilior. Decocta in aceto illitaq; lepras tollit, unguium scabritias extricat, incipientibus agilopys medetur. Decoctum dysentericis, quos excruciat dolor: infusum, idoneum est.

**P**linius quo pacto antiquitus Halica fieret, docuit. Tundebatur in pila lignea donec granum à tunicis secerneretur: tundebatur rursus, sic tusa cribro secernebatur, pars subtilis à media, media à crassiori, atque ad eum modum tres Halicæ species fiebant, atque huic postremum creta alba miscebatur, quæ teneriuscula & candidiuscula è Puteolis afferebatur, addebatur & gypsum. Nec tamen putandum est non expurgatā prius à creta & gypso Alicā, aut manducasse veteres aut in vsus medicinæ sumpsisse. Siquidē manducatū gypsum, vias spirituum opilat & suffocat. Proinde veteres Alicam lauabāt, & hodie fit in gimbere, quod è terra rubra, qua illitum ut duret, eluitur. Halica Galeno frumeti species est validissima, viscosi naturæ humoris, ut aqua cum vino mellato incoquatur, aut cū vino dulci, aut austero, aut oleo, aut sale. Hac ut decet concocta, colata, & condita, eis prodest qui punctiones



sentiunt in intestinis, aut ob humores biliosos, aut quavis alia de causa. Hæc scripsi non inscius Alicam diuersis apud antiquos frumenti speciebus fieri, sed hæc enumerare, cum ea vti desierimus, superuacaneum fuerit, ratus satis ipsam apertius deliniasse, quando apud authores eius frequens fit mentio.

# Milium. CAP. LXXXIX.

## NOMENCLATURA.

Gra. Κέϋχος. Lat. Milium. Ita. Miglio.

Gal. Millet. Offi. nomine Latino utuntur. Ger. Hyrsen.



Sorgi.



Milium.

**M**ilium in panes coactum, minus cæteris frugibus alit, sistit pulte sua aluum. Vrinam cit. Torretur Milium, feruensq; in sacco ponitur, ut torminibus, reliquisq; doloribus, si foueatur,




ueatur, auxilio sit.

**M**ilium Harundineis folijs & iuba, frigidum est primo ordine, & siccum tertio, aut in fine secundi. Minus nutrit quouis alio frumenti genere, desiccatur & astringit corpus, calidum extrinsecus in sacculis applicatum, morbos discutit, qui mordacibus medicamentis non egeant. Desiccatur illitum emplastri modo: at enim adeo detrita & sicca farina, ut difficulter liquoribus misceatur. E Milio panis aridus est & friabilis, arena & cineri similis, siquidem crassum est Milium, & aliquantulum viscosum. Rustici antiquitus edebant Milij farinam lacti permixtam. Et nostro hoc seculo carbonarij in valle Anania tantum se (ut faciunt) laborem ferre non posse Matthiolo nullo alio cibo affirmarunt, quam eo quod est Milij farina & lacte conficitur.

## Panicum. CAP. XC.

### NOMENCLATURA.



Panicum.

Græ. Ελυμος. Lat. Panicum. Ita. Panico. Gal. Paniz. Ger. Pfemch.

**P**anicum frumētaceis seminibus annumeratur, Milio simile. Eodemque modo in panes subigitur, eosdem habet usus, minus tamen & nutrit & stringit.

**N**on ignotum est Panicum Milio simile, & quod ad eius facultatem attinet, modice nutrit & desiccatur. Fluxus corporis sistit, ut Milium, et extrinsecus applicatum, refrigerat et desiccatur.

Græ.



## Sesama. CAP. XC I.

## NOMENCLATURA.

Gr. Σησαμου. Lat. &amp; Offi. Sesamum. Ita.

Sisamo. Gal. de la lugliome. Ger.

Leindotter.

**S**esama stomacho inutilis cibus: halitus gravitatem facit, quoties inter mandendum commissuris dentium inhaesit, nervorum crassitiem illitu discutit: medetur auribus fractis, ambustis, inflammationibus, coli doloribus, & cerastæ moribus: capitis dolores, qui aestuatione concitantur, ex rosaceo lenit: eadē efficit herba decocta in uino: praesertim inflammationibus oculorum doloribusq; prodest. Ex ea fit oleum, quo Aegyptij utuntur.

**S**esami semen notum est officinis, & non perinde ipsa planta, nec in Italia feritur, quod terras admodum macilentiores reddat: è Græcia affertur & Peloponneso. Quidam frumenti, quidam leguminum generi adnumerant, culmo est farulaceo, folijs sanguineis, semine candido, quod vasculis ut papauer continetur, radice simplici & alba. Aestiva Sesama quadraginta diebus maturatur à flore. Sesami semen prae pingue, ideoq; conditium oleosam contrahit naturam, quapropter vescentes confestim implet, & redundantiam parit, stomachūque in vomitiones effundit, tardè conquoquitur, pingue ministrās alimentum: nec ventrem firmat, nec roborat, & cum crasso constet succo, nec descendit facile, nec permeat rarus solius usus. Melli tamen crudo permiscetur, ut in placentas concreseat, quæ Græcis Sesamides appellantur. Calida præditum est natura, quam ob causam siti mandentes excruciat. Epiphoris oculorum & doloribus illinitur decocta in vino herba.

## Lolium. CAP. XC II.

## NOMENCLATURA.

Græ. Αἰφα. Lat. Lolium. Ita. Gioglio.

Gal. yuroye.

Lolium



**L**olium quod inter segetes nascitur, molitum, illitu nomas, putrescentia ulcera, gangranasq; emarginat. Sanat cū Raphanis, sale & aceto feros lichenas: & ex aceto & sulphure uiuo, lepras: strumas quoque discutit, cum fimo columbino & Lini semine decoctum in uiuo rumpit quæ ægrius ad coctionem perducuntur. Decoctum ex aqua mulsa utilissimè ischiadicis illinitur: si cum polenta, Thure, Myrrha, aut Croco suffiatur, conceptionem adiuvat.

**L**olium, Latinis degenerans frumentum, Dioscoridi inter hordeacea & triticea sata nascitur, terra humidior, aut vere pluuiis & frigido. Pseudomelanthium, Lolium non esse ex capite de Phœnice quarto libro apparet. Ibi dicit Dioscorides, Phœnicem spicam proferre Lolio similem, quæ claret Lolium spicam, non caput, aut calycem proferre, ut Pseudomelanthium, Papauer, & similia. Lolium ebrietatem & somnolentiam inducit. Calidum est tertij ordinis initio, & siccum in fine secundi.

## Amylum. CAP. XCIII.

### NOMENCLATURA.

Græ. Ἀμυλον. Lat. Amydum. Ita. Amydo.  
Gal. Amydum.

**A**mylum ex eo appellatum est, quod sine mola fiat. Optimum ex trimestri, natione Creticum aut Aegyptium. Ratio faciendi Amyli hæc est: Purgatum trimestre triticum madescit quinquies die, & si fieri potest, nocte: cum emollitum fuerit, effunditur sensim, sine agitatione, aqua, quo minus cremor utilis unà excludatur; ubi molliissimum esse uidetur, mutata aqua pedibus calcari oportet: rursus infusa, teri: tum demum enatantes ibi surfures incerniculo eximendi, reliquumq; quallo sportisq;



sportisq; siccatum tegulis nouis confestim torreatur flagrantissimo in sole: namque si paulisper udu maneat, acorem concipit. Contra fluxiones oculorum, pustulas, cana q; ulcera efficax est: sanguinis reiectiones potu cohibet. Exasperatas fauces lenit, lacti atque obsonijs admiscetur. Fit etiam Amylum ex Zea, quæ maceratur ac eluitur uno aut altero die, & subacta farina modo manibus subigitur, pressaq; feruentissimo in sole, ut antè retulimus, exiccatur: nullius in medicina usus, ad alia tamen conueniens.

**S**electum Amylum (quod Amydum officina vocant) probatur leuitate, leuore, atque ut recens sit. Plinius eius inuentionem Chio insula tribuit. Fit ex omni tritico & siligine, & maximè trimestri. Amylum Galenus ex tritico confici tradit, viribus partes exasperatas lenigandi pollere, quod ab arida constringente acrique proficitur corpulētia, ad quod obeundum opus, diluta quædam facultas quaritur omnis qualitatibus expers. Amylum similem elotis panibus naturam sibi vendicat, in alendo maiori tenuitate præditum: nec tamē apertè calfacit, sicut nec elotus panis, quod tamen alijs est donatum panificijs. Amylum & ex Zea fit, macerata aqua die vel biduo, & axungie instar manibus impresso, nec non accerrimo in sole resiccato. Est & placentæ genus Amylum, sed hoc nihil ad Dioscoridem. Amylum membrorum aspretudines leuigat, sistit aluum, & sanguinolentam excretionem. Datur in doloribus vesicæ aliquantum calidum, dimidiata vnciæ pondere, cum ovo & vna passa.

## Fœnumgræcū. CAP. XCIIII.

### NOMENCLATURA.

Græ. τριγλῖς. Lat. & Offi. Fœnumgræcum. It.

Fœnograeco. Gal. Senegré. Ger.

fœnigrec.

**F**œnigræci farina uim habet emolliendi discutiendiq; in aqua mulsæ decocta aduersus tam internas, quàm externas inflammationes efficaciter illinitur: lienem cum aceto & nitro extenuat. Succus decocti eius fœminarum malis subuenit: & sine





Fœnumgræcum.

sive tumor, sive præclusio sit  
uulvæ, fouentur, & insidēt.  
Fœnigræci in aqua decocti  
cremor expressus, capillos,  
furfures, & manantia capi-  
tis ulcera purgat: locos dila-  
tat & emollit, si cum anseri-  
no adipe pessi uice subijcia-  
tur. Viride cum aceto utilis-  
simum imbecillibus locis, et  
ulcera sentientibus. Decoctū  
eius prodest aduersus tenes-  
mos fœtidamq; dysenterico-  
rum proluuię. Oleū quod ex  
eo exprimitur, & Myrto,  
capillos & genitalium cica-  
trices abstergit.

**V**ulgare & notum officinis Fœnigræci semen. Fœnumgræcum cali-  
dum est secundo ordine, & siccum primò, ideòque abscessibus cali-  
dis illitum, amplius incendit. Eò fit vt minus calidis & durioribus con-  
ueniat.

## Linum. CAP. XCV.

## NOMENCLATURA.

Græ. λίνον. Lat. Linum. Ita. Lino.

Gal. Lin. Ger. Lein.

**L**inum uulgo notum est, cuius semē easdē quas Fœnumgræ-  
cum uires habet. Discutit et emollit omnem intus forisq;  
inflammationē, cū Melle, oleo, exiguaq; aqua decoctū, aut Melle  
cocto





Linum.

cocto exceptū: vitia cutis in fa-  
cie uarosq; crudū tollit. Illitū  
cum Nitro & ficulneo cine-  
re, parotidas duritiasq; discu-  
tit: ulcera quæ serpunt, fa-  
uosq;, cum uino decoctum ex-  
purgat: ungues scabros exi-  
mit, cum pari modo Nastur-  
tij & mellis: vitia pectoris  
extrahit, si ex melle in ecle-  
gmatis uicem substituatur:  
tussim lenit, uenerem stimu-  
lat, si farina Piperis & Mel-  
le exceptum, pro placēta lar-  
gius adsumatur. Huius deco-  
ctum interaneorum uulnūq;  
erosionibus immittitur, alui  
excremēta euocat: ad uulnū

inflammationes in desseſsionibus perquā utile.

**O**leum seminis Lini mirabilis est effectus in spasmus. Valet ad e-  
molliendas neruorum & iuncturarum duritias, confert omnibus  
sedis malis, & duros foeminarum locos mollit. Elotum cum aqua Rosa-  
rum aut Nenupharis, admodum prodest ambustis, & ad cauterij crustas  
emarginandas. Sunt qui in lateris dolore bibendum præbeant, triū aut  
quattuor dragmarum pondere, mirabili effectū, præcipuē cum recens da-  
tur, & ineunte morbo. Semen Lini calidū est fere primo ordine, & me-  
dium inter siccum & humidum.


Cicer. CAP. XCVI.

NOMENCLATURA.

Græ. Εγέβινθος. Lat. Cicer. Ita. Ceci,  
Gal. Ciche. Ger. Rieſern.

Cicer.





Cicer.

**C**icer satium aluo idoneum est, urinam ciet, instationem parit, colorem commendat, menses ac partus expellit, lac auget. Cum Eruo decoctum illinitur ad inflammationes testium, uerrucosas informicationes, ad scabiem, ulcera capitis manantia, impetiginesq<sup>3</sup>. Contra carcinomata, & ulcera quæ ca-coethe uocantur, cū melle & hordeo prodest. Alterum genus Arietinum nominatur: utrūque cit urinas, dato, cum Rore marino, hydropicis aut regio morbo laborantibus, eorum decocto. Ladunt ea

exulceratum uesicam, & renes: ~~in uesica & rene~~  
~~perflum ggerum primum huiusmodi ggerum fagula uingit~~  
~~aggrum huiusmodi ggerum huiusmodi ggerum huiusmodi ggerum~~  
~~huiusmodi ggerum huiusmodi ggerum huiusmodi ggerum huiusmodi ggerum~~  
 Syluestre Cicer folijs satiuo simile est, odore acri, sed semine discrepat: idem quod satium præstat.

**E**st Cicer candidum, cui etiam Columbino nomen est. Est rufum, quod Venerium dicitur, & ideo excitanda veneri quibusdā aptū uidetur. Est nigrum & paruum, quod ab Arietini capitis similitudine Arietinum dicitur. Id genus absterforiæ facultatis sunt, & fabis potentes, renales lapillos rumpunt & comminuunt. Syluestre Cicer manducatum luxat ventrem, sed ventum procreat, & int<sup>3</sup>stinorum dolorem. Cicer legumen ventosum satis nutrit, & commodat corpori, urinam euocat & menstrua, lac & sperma copiose generat. Orobinī attrahunt, discutunt, incidunt, & abstergunt. Eapropter iecur splenem, re-

p

nes



nes, scabiem, & impetiginem emundant. Discutiunt qui sub auribus enascuntur abscessus, in duritias testium atque adeo in vlcera maligna potentes sunt.


## Faba. CAP. XCVII.

### NOMENCLATURA.

Græ. Κύαμος. Lat. Faba. Ita. La Fava.

Gal. Feues.

Ger. Bon.



Faba.

**F**aba inflationem excitat, egrè concoquitur, tumultuosa somnia facit tuſſi confert, carnem gignit, media calidi frigidiq; natura. Decocta in poſca, & cum ſuo cortice eſitata, dyſenterias & celiacorum profluua ſiſtit: contra uomitiones conuenienter manditur. Inflatio leuior contrahitur, ſi aqua prior inter coquendum abijciatur, uiridis plus negotij ſtomacho exhibet, maioremq; flatum parit. Lomentum eius & per ſe, & cum polenta illitum, inflammationes quas uulnus excitauit, mitigat, cicatrices cōcolores facit, turgentes grumoso lacte mamas, etiā ſi inflammatione tententur, adiuuat, lac reſtinguit, ſurunculos, ſugillata, parotidasq; cum Fænigræci farina & melle diſc



discutit: cum Rosa autem Thure & oui candido, procidentes oculos, tumores, uuasq; reprimat. subactum uino, suffusiones & ictus oculorum recreat. Manducata sine cortice Faba, ad auertendas fluxiones fronti illinitur, Decocta in uino testium collectiones sanat, quò tardius pubes erumpat, pueris imò uentri illinitur, uiriliginem purgat. Fabarum cortice illiti capilli, qui post euulsionem renascuntur, gracilescunt, & minus alimenti capessunt: cū polenta, scisso Alumine, & uetere oleo impositi cortices, strumas discutunt: decocto earum lanæ inficiuntur. Faba dempto cortice in illas partes diuisa, in quas suapte natura scinditur, imponi solet sanguinis defluxionibus ab hirudine concitatis: nanque eas suppressit, si semisecla apprimatur.

**F**aba non multum absunt à temperamento desiccatorio & infri-  
gidante. Pulpa absterforiæ quadantenus est facultatis, tunica aliquantum astrictoriæ sunt participes. Quantumuis Fabæ coquantur, flatuosam tamē (ut ptisana) qualitatem non exuunt. Fabarum substantia nec densa est nec grauis, at fungosa & leuis, & ideo absterforiam aliquantum ut ptisana, vim habent, sordibusque cutis eluendis, poliendis & mundandis corporibus, seu virorum, seu sæminarum, parem usum & gradum obtinet, quem Nitrum, spuma Nitri, & absterforia quæuis alia res. Illitæ faciei itidem ut ptisana, lentigines, maculas è sole contractas, & omne genus pustulas tollunt. Tali facultate Fabæ præditæ, tamen ubi nutriendi ratio habetur, non tardè transeunt, quod in viscosis & densis contingit, in quæ nihil absterforiæ virtutis inest, cuiusmodi sunt Tragum, Alica, Amylum, & similia. Frixæ Fabæ ut flatum amittunt, non perinde faciliè digeruntur. Tarde è stomacho exeunt, & toto corpori grossum nutrimentum gignunt. Quæ recentes & immaturæ eduntur, multum humidi nutrimenti procreant, & ob id maiorem superfluitatum copiam, non in vijs tantum alimentarium & interiorum membrorum, sed in toto generatim corpore. Eò fit ut minus nutriant, & celerius pertranscant. Porro non ignorandum flatuosos omnes cibos cum his corrigendos rebus quæ excalfactoriæ & desiccatoriæ sunt facultatis.



## Faba Aegyptia. CAP. XC VIII.

## NOMENCLATURA.

Gr. Αἰγυπτία &amp; κνᾶμ. Lat. Faba Aegyptia.

Ital. Fava d'Egitto. Gal. res non satis nota.

**A**egyptia faba, quam aliqui Ponticam uocant, in Aegypto plerumque prouenit, in Asia etiam Ciliciae lacubus inuenitur. Folia habet ampla, etiam si ad arborum frondes comparentur: caulem cubitalem, digiti crassitudine: florem roseum, dupla Papaueris amplitudine, & ubi flore exurit, fert folliculos uesparrum fauis similes, in quibus Faba supra operculum, bullantis ampullae modo, prominet. Ciborion ideo nominant, id est, arculam, quoniam seratur ipsa, humenti glebae mandata, & ita in aquam demissa. Radice firmatur harundine crassiore, quae cruda coctae estur, ei Colocasie nomen est. Faba uirens manditur, & exiccata nigrescit, uulgarem magnitudine superat. Adstringendi facultatem obtinet, & stomacho utilem. Dysentericis, coeliacisq; prodest, insperso, polentae uice, lomento: datur quoque in pulte. Cortices in uino mulso decocti, si terni inde cyathi bibantur, magis proficiunt. Facit ad aurium dolorem, quod in earum medio uiride spectatur, gustu amarum, si tritum & cum Rosaceo coctum instilletur.

**F**aba Aegyptia nihil nostratis Fabae praeter nomen referens, Colocasia Aegyptijs ubi ab inundatione Nili nascitur, & Dioscoridi in Asia & Ciliciae lacubus, prouenit referente Matthiolo in quibusdam apud Venetias, & Neapolitanis hortis, quo loci uiuere videtur etiam aquae non implata. Fabae Aegyptiae, Galeno, ut nostratibus maiores itidem & humidiores, & magis superfluis humoribus replent corpus.

## Lens. CAP. XC IX.

## NOMENCLATURA.

Gr. πᾶν. Lat. Lens. Ital. Lenticchie.

Gal. Lentilles. Ger. Linsen.

Lens





Lens

**L**ens frequenti cibo  
 aciem oculorum ob-  
 tundit, ægrè concoquitur,  
 stomachum malè habet,  
 eumq; & intestina inflat,  
 sed aluum cum cortice co-  
 cta sistit. Præstat in cibo  
 quæ facillimè coquitur, ni-  
 hil atri in maceratione red-  
 dens: uim habet adstringē-  
 di, qua ex caussa aluum cohi-  
 bet, si detractō antea cortice  
 discoquatur acuratè, primaq;  
 aqua inter coquendum effun-  
 datur (quippe primum id de-  
 coctum uentrem resoluit) so-  
 mnia tumultuosa excitat: ca-  
 piti, neruis, ac pulmōni inutilis: melius suo fungetur munere cō-  
 tra alui fluxiones, addito cū aceto Intybo, aut Portulaca, aut Be-  
 ta nigra, aut baccis Myrti, aut putamine Punici, aut aridis Ro-  
 sis, aut Mespilis, Sorbisue, Pyris Thebanis, aut malis Cotoneis,  
 aut Cichorio, aut Plantagine, cū t Gallis integris, quæ post deco-  
 ctionē abijciuntur, uel unarum Rhois, quæ obsonijs inspargūtur:  
 uerum acetum cum eo diligenter percoqui debet, alias aluū con-  
 turbat. Cōtra subuersionem stomachi, triginta grana lentis de-  
 librata deuorari proderit. Decocta cum polenta, & illita, po-  
 dagras lenit, sinus cum Melle glutinat, crustas rūpit, ulcera pur-  
 gat. Decocta in aceto duritias & strumas discutit. Cum Coto-  
 neo aut Meliloto medetur inflammationibus oculorum, sedisq;  
 addito Rosaceo: sed in amplo sinu aut inflammationibus sedis,  
 quæ maius remediū exigunt, cū putamine punici, ac siccis Rosis,



adiecto Melle, decoquitur: nomis quæ in gangranam euaserunt, adiuncta maris aqua, pustulis, & his quæ serpunt, igni sacro pernionibusq; ut antea dictum est: contra mammas in quibus lac in grumos coit, & præ nimia sui copia profunditur, cocta in aqua maris, & illita auxiliatur.

**L**entes temperamento sunt frigidum inter & calidum, & desiccant secundo ordine. Hic Dioscoridi Galenus non concinit. Cum enim ea Dioscoridis verba sint, Vim habet astringendi: quæ ex causa aluum cohibet, si detracto antea cortice discoquatur accuratè primaq; aqua inter coquendum effundatur, quippè primum illud decoctum ventrem resoluit. At Galenus. Cortex (inquit) Lentiū vehemēter astringit, carnea tenuiter substantia, quæ & crassi succi & terrestris est. Succus porro Lētis astringenti est contrarius. Quocirca si elixa in aqua in sculum sale, garo, oleoq; conditum bibatur, aluum deiciet. At quod ex his decocta Lente ferculum apparatur, contrariam succo vim obtinet. Nam, quæ ventri obueniunt fluxiones, desiccant, os ventriculi, intestina, & totum deniq; ventrem corroborās. Quāobrem celiacis & dysentericis accommodatus est cibus. Lens vero decorticata, ut illam astringendi vehementiam, cumq; hac, alia videlicet omnia quæ consequuntur amittit: ita alibilior quam integra illa efficitur, crassum prauumq; succum gignens, tardè cōmeans alui tamen fluores haud desiccant, uti ea quæ cortice nō est spoliata. Hæc sibi ex diametro cum pugnent, tamen ex Galeni sententia standum est, quem & doctrina clarum, & experientia eximium reddit. Porro quod ad Lentis cibum attinet, ipsa tantum Galeni verba describam. Solis quibus viciosa est habitudo, ob aquam in carne diffusam, Lens cibo utiliter prebetur, cen aridis & squallentibus admodum damnosè. Eādem ob causam visum integrū & inculpatum hebetat, immoderatè exiccās. Ei vero qui contrario modo se habet, humidiori videlicet, opitulatur. Hæc cum scribat Galenus, qui Lentis edulium temerè sumpserit, quis nō Lenticule vnguentum credere dixerit? His enim nemo sana mentis vte tur, nisi cui è mala habitudine competet.

## Phasioli. CAP. C.

### NOMENCLATURA.

Gr. φασιόλι. Lat. Phasioli. Ital.

Fagioli. Gal. Phaseoles.

Phasio





Phasioli.

**P**hasioli inflāt, spiritus  
cient, agrē coquuntur,  
uirides cibo aluum emolliūt,  
ad uomitiones idonei.

**S**unt Phasioli in Italia vul-  
gares, & diuersarum specie-  
rum. Sunt enim candidi, rubescē-  
tes, fului, & è diuersis coloribus  
variegati. Candidi quibus grae-  
num reliquis pusillius est, semi-  
nantur leguminū more. At ru-  
bescētes, flauī, & variegati se-  
runtur in hortis, alijsve locis ubi  
vmbra aestiua aucupanda est.  
Nam prater id quod peculiarem  
suum fructum reddunt, suis etiā  
inuolucris, ac sequaci capreolorū  
reptat, cameras, domunculas,  
pergulas opacant, ac radios sola-  
res inhibent, non aliter quam vi-  
tes, Lupuli, Bryonia, Periclyme-

ni, plantaque aliae, quae arboribus & sepibus sese contorquent & in-  
uoluunt. Id Phaseolorum genus censent. Matthiolus Smilacem esse hor-  
tensem, Smilacēque eundem hortensem, Dolichos esse scriptos à Theo-  
phrasto, iiij. Cap. viij. Lib. de Plantarum historia, & à Galeno primo  
de facultate alimentorum, libro, & primo itidem Pauli libro. Non sunt  
enim Dolichi id Pisellorum, vt ita loquar, genus, quod in Mediolanēsi  
territorio Roniglione, & alibi, Arabeia, quā sub Ocri nomine descri-  
bit Galenus, vt claret eo quem modo citauimus loco. Porro hoc capite  
Dioscorides de candidis Phaselis aut Phaseolis loquitur, qui verē Pha-  
seli sunt. Siquidem alijs distincti coloribus, Dolichi & Smilaces leues si-  
ne satina doctis habentur, & eorum siliquae Lobi.

Eruum.

CAP. CI.

NOMENCLATURA.

P 4

Gra.



Græ. Οροβό. Lat. Eruum. Ita. Orobo.  
Gal. Ers.



Eruum.

**E**Ruum parvus frutex omnibus eognitus, angusto folio, tenuis, semina in ualuulis habens, è quibus farina fit, nomine Eruina, ad medendi usus conueniens. Eruum capiti onerosum est, aluum esu turbat, sanguinem per urinam extrahit: elixo boues saginantur. Paranda farina ratio hæc est: vberiora grana candidaq; deliguntur, permiscendoque aqua resperguntur, donec sufficienter combibant: postea torrentur, usque dum hians cortex disrumpatur: molitaq; farinario cribro incernuntur: postremo farina recoditur. Hæc aluo utilis est, urinam ciet, meliorem colorem efficit, sanguinem per uesicam aut aluum cum torminibus elicit, si largius in cibo aut potu assumatur, ulcera cum melle purgat: lentigines & uitia cutis in facie, & maculas, totumq; corpus emendat: nomas, gangranas, duritiasq; serpere non patitur: mammarum duritias emollit: atra ulcera quæ Therio mata uocant, fauosq; emarginat: carbunculos rumpit: cum uino subacta illitu morsibus uiperarum, canum, hominūq; medetur: urinae difficultates, tensesmosq; ex aceto mitigat. Eruum tabidis, qui alimentum non sentiunt, tostum, & ad nucis magnitudinem melle exceptum, sumptumq; conuenit. Eius cremor per



perniones, & pruritus in toto corpore, sanat fouendo.

**E**X Alexandria Venetias adfertur Orobi semen Vicia simile, sed id proculdubio nō est verū Orobi semen. Eruum non illa est, quæ Italis (vt diximus) Rouiglione dicitur, quā Galenus, Theophrastus, & Paulus Ocrum vocant, nulla nempe in ea sentitur amaritudo, nec quātumuis manducata, sanguinem per vrinā extrahit, quæ in Orobo verò requirunt Dioscorides & Galenus. Orobus inter frumenta nascitur, sed à paucis noscitur. Dioscorides farinam ex Erui candidis granis eligit, at Galenus candidos in medicina, ruffis & pallidis inferiores facit. Orobus primo ordine excalfacit, & desiccet in fine secundi, & è sua amaritudine abstergit, incidit, & aperit. Sumptus cum melle à flegmate & grossis humoribus pectus & pulmonem emundat.

## Lupini. CAP. CII.

### NOMENCLATURA.

Græ. Αἴγυϑ. Lat. Ita. & Off. Lupini.

Gal. Lupins.

**S**atius lupinus notus est. Cuius farina cū Melle delinēlu, aut potu, ventris animalia expellit: ipsi quoque macerati, & cum sua amaritudine esitati, eadem efficiunt. Decoctum eorum idem munus præstat, cum Ruta & Pipere potum: quare lienosis prodest. Eodem ulcera tetra, quæ Theriomata uocant, gangrænas, incipientem scabiem, eruptiones pustularum, ulcera in capite manantia, vitiligines, maculasq; fouere utilissimum: menses & partus extrahit, cum Myrrha & Melle subditum in uellere. Eorum farina cutem liuoresq; corrigit: inflammationes cum polenta & aqua mitigat: tubercula, & coxendicum cruciatus ex aceto lenit: strumas in aceto cocta illitaq; dissipat, carbunculos rumpit. Decocti cœlesti aqua, donec in cremorem lentescant, faciem abstergunt: medentur pecorum scabiei, cum radice nigri Chamæleontis, ita ut tepente decocto abluantur.

P S

Cit





Lupini.

Cit urinam radix cum aqua cocta. Lupini triti, ubi maceratu dulcescere ceperint, cū aceto poti, fastidium detrahunt, & cibi auaritatem faciunt. Gignuntur & sylvestres Lupini, satiuus similes, sed omnino minores, qui eadem quæ satiuus possunt.

**L**upini notum legumē apud Dioscoride descriptum, nihil amplioris annotationis requirit, præterquam quod eorum farina omnes decoctionis effectus reddit.

Rapum.

CAP. CIII.

NOMENCLATURA.

Græ. ρογγύλη. Lat. Rapum. Ita. Le Rape.

Gal. Naueaux.

Ger. Rueben.

**D**Ecocta Rapi radix alit, inflationem parit, humentem ac fluxam carnem creat, uenerem stimulat: decocto podagra, pernionesq; fouentur: contritoq; Rapo atque imposito iuantur: si excauata radici Rosaceum ceratum adigatur, & feruenti cinere eliquescat, exulceratis pernionibus proficiet. Cymæ eius decocta manduntur, & urinam ciunt. Semen antidotis & theriacis, præsertim quæ sensum doloris auferunt, anodyna uocant, idoneum est: potum contra uenena salutare est. Venerem concitat. Rapum muria conditum, minus alimenti sufficit,





Rapum satium.



Rapum sylvestris.

cit, sed multò magis apertentiam recreat. Sylvestre Rapum in ar-  
uís nascitur, fruticosum, in cubiti altitudinem assurgens, ramo-  
sum, laue: in cacumine folia fert læuia, digitali latitudine, aut  
maiora: & fructum in siliquis calyculatis: cumq; eorum inuolu-  
cra aperiuntur, alia intus siliqua spectatur, quæ quandam capi-  
tis speciem præbet, in qua semina paruula concipiuntur, foris ni-  
gra, intus alba. Additur in medicamenta quibus ad detergen-  
dam cutē in facie, totoq; corpore utimur, præsertim quæ ex Lu-  
pini aut Erui, Tritici aut Lolij farina, fieri solent.

**R**apa domestica triū sunt generū, prassa lōga, rotūda. Quæ astate  
seruntur immunia redduntur à bruchorū & erodentiū animalcu-  
lorū iniuria, cōmixta sationis tēpore semini fuligine, aut macerato per  
noctē in succo Aix oi semine. Columella id vt rē expertā asserit: hic obser-  
uādū Rapū sylvestre fructicosius esse Raphano sylvestri, & multas alas  
ramu



ramulosque ad latera spargere, in quibus lutei flores, nasci in arvis pinguibus, radice pollicem crassa: At Raphanum sylvestrem pallidioribus constare, & parua radice.

# Napum. . CAP. CIIII.

## NOMENCLATURA.

Græ. Βουβίς. Lat. *Napus*. Ita. *Nagoni*.  
Gal. Raues.



*Napum.*



*Radix*

**C**oëta Napi radix inflat, modicum alit. Semen eius potum  
uenenorum vires hebetat: antidotis admiscetur. Condi-  
tur sale radix.

*Napo*



**N**aporum Theophrastus & Plinius plura faciunt genera, cum nostro tempore candidi tantum & crocei reperiuntur. Crocei crassiores licet, & oculis magis adblandiantur, insuauiores tamen gustu sunt candidis. Aegyptij è Naporum semine oleum conficiunt.

**Radix. CAP. CV.**

**NOMENCLATURA.**

*Græ. ῥάφαν & . La. & Off. Radix, Rhabbanus.*

*Ita. Radice. Gal. Refort.*

*Ger. Raeticg.*



*Raphanus.*



*Raphanus sylvestris.*

**R**adix, quæ Græcis Rhabbanus dicitur, excalfacit, flatus gignit, ori suavis est, sed stomacho aduersatur, ructus ciēt, urinam pellit aluo aptior, summo tamen cibo sumi debet, quò magis eius distributionem adiuuet: cum autem præsumitur, cibum suspendit, quare uomituris commodissimè datur ante cibum



bum. Sensuum aciem excitat: decocta contra ueterem tuſſim,  
 & pituita craſſitiem in pectore, efficax eſt. Cortex ex aceto  
 mulſo, celerius uomitiones mouet: hydropicis commodiſſimè il-  
 linitur, lienosis utilis ſugillata cum Melle rapit, & nomas amo-  
 litur: contra uiperarum ictus auxiliatur, alopecias ad pilum re-  
 ducit: lentigines cum Loliacea farina emendat: his qui fungis  
 ſtrangulantur, tam cibo quàm potu ſalutaris eſt. Semen uom-  
 itiones facit, urinam mouet, menſes cit, lienē extenuat, cum ace-  
 to illitum gangrenas ualidiſſimè emarginat, coctum cum ace-  
 to mulſo, anginis per quā utiliter gargarizatur. Contra Cera-  
 ſtis morſus, potū ex uino, auxilio eſt. Sylueſtris Rhaphani, quā  
 Romani Amoracia uocāt, folia ſatiuo ſimilia, ſed magis Lam-  
 pſanam imitantur: radix gracilis, tenera, ſubacris. Tam folium  
 quàm radix in olera recipitur. Sed hæc excalfacit, urinam  
 concitat, æſtuoſa eſt.

**R**haphanus qui & radix, & Radicula Latinis, diſtinguendus ab  
 herba lanaria radicula, quæ etiam Radicula ſimpliciter dicitur,  
 Græcis ſtruthion, à Rhaphano diuerſiſſima. Eſt Rhaphanus ſatiuus,  
 eſt ſylueſtris, qui Armoracia Latinis nuncupatur. Rhaphanus ſatiuus  
 calidus eſt tertio ordine, ſucus ſecundo: Armoracia in his duabus qua-  
 litatibus ſupereminet. Semen tota planta potentiſſe eſt. Digerit, ob idq;  
 limidis & cōtuſis conuenit. Acres ne ſint Radicula è folijs agnoſcitur, nā  
 earū lauer etiam nō guſtata radice, minorem eius acrimoniam denotat.

Sifer.

CAP.

CVI.

NOMENCLATURA.

Græ. Σίσαρον. Lat. Sifer. Ita. Sifaro.

Gal. Cheruy.

**S**ifer uulgo cognitum, cuius radix decocta ori grata eſt, &  
 ſtomacho utilis, urinam ciet, & appetentiam inuitat.

Sifer



*Sifer satium.**Sifer sylvestre.*

**S**ifer omnium radicum quae edēdo sunt saluberrima. Hanc Tyberius princeps flagitabat omnibus annis à Germania: nonnihil amaritudinis cum astrictione pauca resipit. Radix grata stomacho. Urinā proritat. Galeno secundi est excoficientium ordinis. Paulus in tertium asserit. Sentit & semen tenuium esse partium, & discutiendi naturae constare, ac ideo singultientibus & torminosis ex vino dari.

## Lapathum, siue rumex.

CAP. CVII.

NOMENCLATURA.


Græ. ῥάπαθον. Lat. Lapathum. Ita. Rombice.

Gal. Ozeille. Ger. Meugel.

**E**x generibus rumicis, Oxylapathū uocant, quod in acutū tendit, prædura habēs extrema, nō nisi palustribus nascēs.

Al.





*Lapatum acutum.*

aut uino utiliter bibitur cōtra dysenterias, & celiacorum affe-  
ctus, stomachi fastidia, scorpionum ictus: quod si quis in potu  
præsumat, nihil molesti ex ictu patietur. Radices ex aceto co-  
cta aut illita cruda, lepras, impetigines, & scabrosos ungues per-  
sanant: sed antea locus aceto & Nitro in sole perfricandus est.  
Pruritus corporis decoctum earum sedat, si foueatur, aut in so-  
lis balnearum confricetur. Cocta in uino & instillata, aurium  
dentiumq; dolorem mulcent, strumas parotidasq; discutunt:  
lienem cum aceto extenuant: Aliqui amoliendis strumis ra-  
dicum gestamine utuntur, eas collo appendentes: trita & ad-  
motæ fœminarum profluvia sistunt: cum uino autem potæ,  
regio morbo medentur, calculos uesicæ comminuunt, men-  
ses cient, scorpionum ictibus auxiliantur. Hippolapathon  
olus



olus est magnum, in paludibus nascens: easdem habet vires, quas supradicta rumicis genera.

**R**umicis seu Lapati multa produntur genera. Oxylapathum in palustris nascens, in cacumine acutiora duraque folia habet, ob id nostrates officinae Lapatiū acutū nuncupant. Alterū genus hortensis, illi dissimile. Tertium sylvestre, paruum, Plantaginis figura, molle, humiliter fructicans, Acidula aut minuta Oxalis vulgo dictū. Quartū genus alij Oxalidē, alij Anaxaridē, alij Rumicē syluaticū appellāt. Huius folia sylvestri & exiguo similia sunt, caulis teres, sesquicubitū altus, semine rubro in mucronem acuminato, quod foliaceo vestitur inuolucro, sapore acri, è scapo adnascētibz cauliculis erumpente. Id partim feritur, partim sponte in incultis prouenit. Omnibus exploratum, quod plerunque iuribus incoctum valet, & in acetarijs crudum singularem habeat gratiam. Quintum, carnibus intingendus succi viridis accrementum subministrat, nec aliud in obsonijs maiorem sibi vendicauit auctoritatem. Omnes ferē, quod gratum acorem palato representet, Acetosam cœperunt appellare. Gallicū vulgus oxalim adhuc imitatione græca nuncupat, aliqui oxellam, alij vinetam. Huius semen rubrum in mucronem emissum desinit, cateraque Dioscoridis pictura suffragantur, quare nemo Rumicem acetosum id esse genus, ibi inficias. Est & Hypolapathum olus magnum, officinae grandem oxillam, vulgus parellam vocant, paludibus familiare. Lapathum discussoria facultate præditum est. Oxilapathum mixtas sibi vires vendicauit. Nanque discutiendi & repellendi natura donatum est. Sed omnium semen, tum maximè Oxilapathi manifeste constringit, ita vt dysenteriae & alui profluuiū medeatur.

## Lampsana. CAP. CVIII.

### NOMENCLATURA.

Gr. λαμψάνη. La. Lampsana. Ita. Lasana.

Gal. Sanues blanches. Ger.

W. Bisd. Koel.

**L**ampsana sylvestre olus est: plus alit quàm Rumex, & stomacho utilis. Cuius folia caulesq; coquuntur in cibo.

**L**ampsana, Plinio, olus sylvestre est, pedalis altitudinis, trium foliorum Napi simillimorum, nisi candidiore essent flore. hac se apud Dyrachium vixisse milites Iulio Casari, in triumpho, iocis militaribus exprobauerunt. Rura hanc sanuas albas vocant, quasi sylvestres napos.

q

Vulgares



Vulgares Lampane flores amicissimos apibus creant, & fauorum ce-  
tas exuberant. In cibo noxium humorem creant. Illita detergendi di-  
scutiendique naturant habent.

## Bunium. CAP. CIX.

### NOMENCLATURA.

Græ. Βούβιον. Lat. Bunium. It. Bunio.

Gel. Herbe à charpentier. Ger.

Barbren.

**B**unium caulem emittit quadrangulum, & in eo foliosos  
ramulos, tenues, pratenuibus foliis & flosculis scaten-  
tes, longitudine digitali: folia propter radicem, Apio similia, sed  
multo tenuiora, & quæ modo quodam folia Tribuli imiten-  
tur. flores Anethi semen odoratu, minus Hyoscyamo. Excalfa-  
cit bunium, urinam ciet, secundas detrahut, lieni, renibus & ue-  
sicæ utile. Eo humenti aridoue utuntur, exempto radice & cau-  
libus succo, ex aqua mulsæ.

**B**unium vulneraria herba est, & vulgò carpentariâ dicitur, quod  
vulneribus è securi & dolabra acceptis subito medeatur.

## Blitum. CAP. CX.

### NOMENCLATURA.

Græ. Βλῆττον. Lat. Blitum. It. Biedoni.

Gal. Porree rouge. Off. idem cum beta faciunt.


Ger. Mayer.

**B**litum estur oleris modo, alio utile est: nullius in medici-  
na usus.

**B**litum rubes est & album, vtrunque notum, iners olus, ac sine sa-  
pore & acrimonia vlla, nullo in medicina momento, leuiusculam  
quidem alui deiectionem moliri potest, nullum tamen acrementum in-  
trosum



nitrosum ve possidet ingenium,  
quo valeat intestina ad iustam  
excretionem laceßere.



Blitum.

## Malua. CAP.

## CXI.

## NOMENCLATVRA.

Gr. μαλάχη. Lat. & It.

Malua. Gal. Malue.

Ger. Moennsch


Bappel.

**M**alua satina esui lon-  
gè aptior sylvestri,  
stomacho aduersatur, aluum iuuat: sed multo magis cau-  
les, interaneis & uesicæ utilis. Cruda folia cum salis exi-  
guo manducata, ægilopas ex melle sonant: nerum cum cica-  
tricem trahere cœperint, ea demum citra salem utendum est.  
Contra aculeatos apium uesparumque ictus, illita efficax est:  
eadem cruda cum oleo trita peruncti, non feriuntur. Vlcera  
manantia in capite, fursurèque cum urina sanat: sacris igni-  
bus & ambustis decocta folia, tritaque, utilissimè ex oleo im-  
ponuntur. Eius decoctum uuluas in seßione mollit: prodest ero-  
sionibus uesicæ, & intestinorum, uulvæ, sedisq; clystere insu-  
sum. Ius decoctæ cum radice sua, contra omnia uenena au-  
xiliatur, si continuò à bibentibus reuomatur. Contra Pha-  
langiorum morsus remedio est, lac euocat. Semen in uino

q 2

potum



*Malva vulgaris.**Malva sativa.*

potum, addito Loti sylvestris semine, vesicae cruciatus lenit.

**M**Alva hortensis est & sylvestris. Est etiam Rosam referens Malua, nostro tempore in hortis frequentissima. Malua, quam veteres hortensē vocarunt, penē nullibi nostra incuria colitur. Galeno Malua hortenses sylvestribus humidiores, proinde viscosum quippiam in se continent Malua hortenses. Eadem manifesta non infrigidant, nimirū repida caliditate praeclata. Conditae cum oleo & sale citius descendunt, cum aliis tamen non tardent.

## Atriplex. CAP. CXII.

### NOMENCLATURA.

Græ. Ατρίπλις. Lat. Atriplex. Ita. Atriplice.

Gal. Arrouches. Ger.

Scherfj mastet.

*Atriplicem*





Satiuus.



Syluestris

**A** Triplicem aliqui Chrsolachanon uocant, cognitum olus est. Duo eius genera: Syluestre & Satiuum. Coctum est ut olus. Alium mollit, panos discutit, siue crudum, siue coctum illinatur. Semen cum aqua mulsa potum, regium morbum sanat.

**A** Triplex vulgatum olus humidū in secundi ordinis medio, & frigidum in primo, & quod fluidum corpus faciat, permeat celeriter. Absterforium est Atriplicis semen, ac ideo regio morbo conueniet, quem flegmatis oppillatio, procrearit, Vomitus euocat, & soluit corpus.

Brassica. CAP. CXIII.

NOMENCLATURA.

Græ. κρᾶμβη. Lat. Brassica. It. Cauolo.

1

3

Gal.



Gal. Choux. Ger. Brey-  
ter. Roel.




*Brassica primum genus.*

*Secundum.*

**B** *Rassica sativa* alio est idonea, si modo leuiter feruefacta  
edatur (nam percocta alium sistit: sed multo magis bis co-  
cta, aut quæ in lixiuio coquitur) stomachum autem male ha-  
bet: acrior est aestiua. In Aegypto propter amaritudinem non  
estur. Cacutientibus & tremulis esse prodest: summo cibo sum-  
pta crapulam discutit, & vini uoxam restinguit. Melior stoma-  
cho cyma: sed acrior, & ad ciendam urinam ualidior. Ea con-  
dita stomacho inimica est, alium conturbat. Crudus succus cum  
Nitro & Iri deuoratus, alium emollit: cū uino quoque epotus  
uiperarum





Tertium



Quartum

uiperarum morsibus auxiliatur, cum Fœnigræci farina, podagris & articulorum uitijs illinitur. Prodest & sordidis ulceribus, & netustis, illitus, caput purgat naribus infusus, menses extrahit, cum Loliacea farina inditus. Folia per sese illita, aut cum polenta trita, conferunt inflammationibus: tumoribusque. Epinyclidas, igne sacrum, lepræque sanant: carbunculos ex sale rumpunt, fluentes capillos retinent, cocti. addito melle, aduersus depascentia ulcera, gangrænasque ualent: lienosisque ex aceto cruda prosunt. Mansa, deuorato succo, retusam uocem instaurant. Decoctum eius potu, aluum & menses ciet. Flos post conceptionem in pessa subditus, partum abortu uiuat. Semen eius, præsertim quæ in Aegypto

9 4

gypto



gypto nascitur, potum tinea repellit. in antidota theriaca additur, faciei cutem lentiginesq, expurgat. Virentes cauliculi cum radice cremati, & adipe porci uetusto excepti, diuturnos laterū dolores mitigant.

### Brassica sylvestris. C A P.

#### CXIII.

#### NOMENCLATURA.

Gr. Κράμβη ἀγρία. Lat. Brassica sylvestris.

Ital. Cauolo saluatico. Gal. Choux fauages.

**S**ylvestris Brassica, maritimis praeuptisq, locis magna ex parte gignitur, satiuæ similis, sed candidior, hirsutiorq, amara. Cuius cyma in lixiua cocta, ori non insuavis. Folia illitu uul- uera conglutinant, & inflammationes tumoresq, discutiunt.

### Brassica marina.

#### C A P. CXV.

#### NOMENCLATURA.

Græ. Κράμβη θαλασσία. Lat. Brassica

marina. Ita. Cauolo marino. Gal. & Off.

Soldanella. Ger. Meer Roel.

**M**arina Brassica à satiuæ prorsus abhorret, quod folia ferat rotundæ Aristolochiæ, prælonga, tenuia: singula à ramulis rubentibus exeunt, singulari, ut Hedera, pediculo: albo succo prædita est, sed paucos, salso gustu, & aliquantum amaro, pingui concretu. Herba in totum stomacho inimica, acris: uehementissimè aluum ciet, in cibo cocta. Coquitur propter acrimoniam cum pingui carne.

**B**rassica quæ & Caulis, Crambe græcis, multorū est generū. Est vul- garis, est crispa, quæ Appiana Catoni dicitur, est capitata & sessilis. Est cuius caulis inter folia Rapi in morē subinde crassecat, & mūdatus edēdo est ut rapū. Cræbe Plinio speciali nomine coma est laui parua, rotū-  
da, ra-



da, ramis folijsq; permultis cōdita, satina cādidior, succo aspero & instar medicamēti amaro. Brassica cibovēl exterius applicata quantūvis nō ad modū acris, desiccatur, ac quiddā abstersoria facultatis continet. Succus suus quapiā vi expurgat nec aliā ratiōe tota eius substantia ē siccitate sua restringit, & ob id cū laxādū brassica corpus, aquæ paucillū immergēdum modice incocta, probè cū oleo & sale cōdita, edēda: cū vero fluēs alius restringēdus, cocta ad secundā ebullitiōē, proiecta priore aqua, calidam oportet superinijcere, & ad eum decoquere modum vsque dum tenerescat. Brassica marina ea est, quam Soldanellam officina vocant.

## Beta. CAP. CXVI.

## NOMENCLATURA.

Gr. τεῦτλον. Lat. Beta. Ital. Bietola.

Gal. Porree. Ger. Korter mangolt.



Beta.



Beta nigra.

**B**eta duorum generum est, ē quibus nigra coquitur cum Lenticula, ut ventrem sistat, quod magis radice eius præstatur



statum. Candida aluo utilis est. Vtraque tamen propter nitrosum humorem, quem habet in se, noxij succi est. Vnde succus earum cum melle naribus inditus, caput purgat, aurium doloribus auxiliatur. Decoctum radices & foliorum, surfures lentesq; detegit, perniones fotu mitigat. Crudis folijs utiligines, nitro ante perfrictas: alopeciarum inanitates, scalpello prius exasperatas, atque depascentia ulcera, illini prodest. Eruptionibus papularum, igni sacro, ambustisq; cocta medetur.

**E**st Beta nigricantibus è Purpura folijs. Hæc nigra vocatur Latinis. eius radices Rapis magnitudine & forma similes sunt. Candida præterquam colore, quem folia eius in candido viridem habent, nigra similis. Est & quædam ruffa radice, Pastinaca non absimilis. Nitro se qualitatibus est Beta, & ideo discutit & abstergit, candida magis quàm nigra, sed eo cocta priuatur, siquidem nigra astringit, maxime radice. E Liene malè affectis, medicina potius est, quàm cubus.

## Portulaca. CAP. CXVII.

### NOMENCLATURA.

Græ. Αὐτὸ γὰρ κνν. Lat. Portulaca. Ita. Procacchia.  
Gal. Pourpier. Ger. Buttzelen.

**P**ortulaca uis astringit: capitis doloribus, inflammationibus oculorum, cæterisque, cum polenta imponitur: ardoribus stomachi, sacro igni, uesicæ doloribus, auxilio est. Commanducata, dentium stupores sedat: stomachi & intestinorum æstuationem, fluxionesq; mulcet: renes & uesicam adiuuat, etiam si erosionem sentiant: ueneris impetus exoluit. Succus epotus simili effectu prodest, in febribus ualens. Contra teretes uentris tineas, cruentam excreationem, dysenteriam, hæmorrhoidas, & proflua sanguinis, percocta efficax est. Item contra sepius morsus. Ocularibus medicamentis utilissime commiscetur: interaneis fluxione



*Portulaca sylvestris.**Portulaca sativa.*

xione laborantibus, atque uulnarum erosionibus infunditur. Contra dolores, quos aestus excitauit, caput ex Rosaceo & oleo fouetur: eruptiones papularum in capite, cum uino emendat: uulneribus quæ ad syderationem spectant ex polenta illinitur.

**P**ortulacæ, notæ herbæ. temperamentum, frigidum & aqueum est, pauxillum de austero participans. Fluxus restringit & præcipuè biliosos & calidos, siquidem tertij est infrigidantium ordinis, & humectantium secundi. Parum nutrit in cibus, ut potè humida, frigida, & viscosa. Stuporem dentium sedat, quod viscosa, non pungat.

## Asparagi. CAP. CXVIII.

### NOMENCLATURA.

Græ. Ασπαράγος. Lat. Asparagus. Ita.

Aspa-



## Asparago. Gal. Asparge.



## Asparagi.

tusis, atque defossis: quod, quantum equidem sentio, planè à ueritate abhorret. Atilis autem Asparagus multis ramis fruticat, folijs Fœniculi, longis, numerosis: radice rotunda, grandi, spongiam habente. Huius teneri cauliculi triti in uino albo, rennum dolores sedant. Assus autem coctusue, urinæ stillicidium, difficultatemq̃, ac dysenterias mitigat. Radix cum uino aut aceto cocta, luxatos artus mulcet. Decocta cum ficis aut ciceribus, sumpta, regium morbum sanat: coxendicis cruciatus stranguriamq̃ leuat. Alligata radix, aut haustum eius decoctum, conceptum adimit, & sterilitatem adfert.

**A**sparagus hortēsis, Galeno, Regius dicitur: palustris & syluestris, Helius. Abstergunt Asparagi non protensa tamen manifesta calidita

**C**orruda siue Syluestris Asparagus uulgaris est notitia. Huius cauliculi in cibo cocti uentrem emolliunt, urinam cient. Radicis decoctum contra urinæ difficultatem, regium morbum, rennuitia, & coxendicum cruciatus, in potu proficit: cum uino autem, phalangiorum moribus auxiliatur. Si decocti succus super dente contineatur, eius dolori medetur. Semen potum ad eadem ualeat. Canes, ut aiunt, si decoctum bibant, emoriuntur.

Asparagum etiam nasci prodiderunt, arietis cornibus cō



lidity aut frigiditate. Grati sunt stomacho, vrinam proritant, & quāvis paruum prestant alimentum, plus tamen nutriunt, quā quāvis alia herbarum cyma.

## Plantago. CAP. CXIX.

## NOMENCLATURA.

Græ. Ἀρνόγλωσσον. Lat. Plantago. Ita. Pian-  
tagine. Gal. Plantain.



Maior.



Minor.

**D**uo Plantaginis genera: minor folia habet angustiora, minora, molliora, leuiora, & tenuiora: caule anguloso, in terra sessili: floribus pallidis: semine summis caulibus emicante. Altera maior, latior, uirentiorq<sup>ue</sup>, latis constans fo'ly, oleracei





Aquatica.



Media.

cei generis: cuius caulis cubiti altitudinem petit, angulosus, sub-  
 ruber, à medio ad uerticem tenui semine circumdatus, radicibus  
 nititur teneris, hirsutis, candidis, digitum crassitudine æ quanti-  
 bus. Nascitur in lacunosis, sepibus & locis humidis. Multò uti-  
 lior magna est. Vim habent folia exiccatoriam, cōstringentem:  
 quare omnibus malignis ulceribus, & fluxioni opportunis atq;  
 elephantice, sordidisq; illita prosunt: profluvia sanguinis, ulcera  
 quæ serpunt, epinyctidas, carbunculos, nomasq; cohibent: uetera  
 ulcera & inæqualia cicatrice obducunt, chironia sanant, sinus  
 conglutinant: morsibus canis, ambustis igni, inflammationibus,  
 panis, parotidibus, strumis, ægilopys, illita cum sale prosunt. Co-  
 ctum cum aceto & sale olus, dysentericis, cæliacisq; sumptum  
 subuenit, Datur & in locum Betæ cum Lenticula coctum, Et  
 ad



ad aquam intercutem, cui leucophlegmatia nomen est, datur et herba decocta post aridas epulas, sic ut media antecedit: comitia libus & suspiriosis data proficit. Foliorum succus, colluta subinde oris ulcera, purgat: cum Cimolia aut Cerusa igni sacro medetur: fistulis infusus prodest, lippitudinibus & aurium doloribus idem succus instillatur. Additur quoque in oculorum collyria. Gingiuis cruore suffusis, & sanguinis reiectionibus, potu confert: clystere dysentericis infunditur, contra tabem datur in potu: aduersus strangulationes uulue, in uellere subicitur, etiam si uulua fluxione laboret. Semen ex uino potum alui fluxiones & sanguinis excreationes sistit. Decocta radix & manducata, & collutione, dentium dolores sedat: eadem cum folijs, ulceribus renum & uesicæ in passo datur. Ferunt treis radices cum tribus uini cyathis, & pari aquæ modo, tertianis auxiliari: & quatuor, quartanis. Sunt qui radices gestamine, discutiendis strumis utantur.

**E**st Plantago latifolia, quam vulgus herbariorum maiorem vocat. Est angustifolia, quæ minor. Tertia Latifolia similis, præterquam quod folijs constat longe minoribus & leniter hirsutis. Plantago mixta conflata est temperamento: aqueum enim quiddam, et frigidum, atque aded austerum obtinet. Quandoquidem terrestri est, frigida, & sicca substantia, ob idque in frigidantis & desiccantis nature ordinem tertium usurpat. Porro quæ una in frigidant & astringunt, vlcibus malignis, dysenteria, & omnigenis vlcibus & fistulis prosunt. Et in eo principem locum tenet Plantago. Nam è sui temperamenti proportionem, desiccans, non mordicat: in frigidans, non stupefacit.

Lauer, seu Sium.

CAP. CXX.

NOMENCLATURA.

Græ. Σίον. Lat. Lauer. Ita. Sio.

Gal. Berle.

Sion



**S**ion in aquis inuenitur, frutice pingui, recto, folijs latis, Olusatro similibus, sed minoribus, & odoratis. Quæ cruda coctaq, esu calculos rumpunt, atque excernunt: urinas cient, menses & partus extrahunt: dysentericis in cibo auxiliatur. De Sio Crateuas tradit, herbam esse fruticis specie, pauca folia ferentem rotunda, maiora quàm Mentha, nigra, & ad Erucā accedentia.

**N**ascitur Sium fontibus æstate frigidis, hyeme calidis: Plinio, Sium Apij est similitudine, glareosis & perennibus riuis provenit, coquiturque ut Olus atrum magna vesica utilitate. Crescionis herba (ita vulgo vocata) folium, cum primum emicat rotundum, & simul atque adoleuit in Erucā folium laciniatum, quod ab Apij folio dissidet, satis indicat, Sium Crescionem non esse. Sium Galeno quatenus nonnihil aromatis gustui respicit, eatenus excalfaciendi naturam sortitur. Discutit autem, urinam cient, renum calculos terit, remoratos menses pellit.



Sium.

Sysimbrium.


CAP. CXXI.

NOMENCLATURA.

Græ. Σισύμβριον. Lat. Sisymbrium. Ita. Menta Romana Gal. Mente aquatique. Offi. Menta rubra.

**S**ysimbrium, alij Serpyllum sylvestre uocant, in solo inculto nascitur, Mentha hortensis similitudine, odoratius, latiore



\* *Sisymbrium*

ret. Folia primū rotunda prodeunt, adulta Erucæ modo finduntur. Id ex calfacit, urinas mouet, crudum estur, purgat lentiginēs, cutisq; uitiat in facie, noctibus impositum, matutinisque detractum.

**S**isymbrium hortensē Matthiolo, Balsamita est officinarum, & ea quam Mentham Romanam vocant, tum quod delineationes respondeant, tum quod facillimè non artificio ex culta in Mentham degeneret: Atque adeò Dioscoridis Sisymbriū quod in incultis nasci prodidit, & hortensē Sisymbrium vnā & eandem esse plantam. Et perinde Dioscoridis Sisymbrium, non eum esse quem pingit Theophrastus. Nam si vna res essent: degenerante, non ex culto Sisymbrio, in campatribus, non aliter quā in Mentham permutatum, repperiretur, cum eo loci nullus sit qui colat. Sisymbriūq; aquaticū non aliud esse à Crescione vulgari, acris sapore, qui simul cum Sio in aquis nascatur, folijs primū rotundis, & deinde in Erucæ formam laciniatis, parūque & sapore & odore à nasturtio dissentiat. Id à Plinij opinione non discrepat.

r

*Sisymbrium*

tiore folio. Inseritur coronis: calfaciendi uim habet. Contra stillicidia urinae, calculosq; semen ex uino bibitur: tormina & singultus sedat. Folia in capitis dolore, fronti aut temporibus illinuntur. Item contra uesperum apiumq; ictus: uomitiones potu cohibet. Alterum Sisymbrij genus, quod aliqui Cardaminam, alij Sion appellant: ea herba riguis gaudet, & eisdem in locis, quibus Sion, prouenit. quæ ideo nonnullis Cardamina nominatur, quod gustu Cardamū, id est, Nasturtium, repræsen-



*Sisymbrium tertij est inter desiccantia & excalsfacientia ordinis, idque in singultu & torminibus bibendum præbetur cum vino. Nasturcium, nempe quod Nasturcium referat, calidum est & siccum tertio ordine, & viride etiam secundum non excedit.*

## Crithmum. CAP. CXXII.

### NOMENCLATURA.

*Græ. κριθμῶν. Lat. Crithmum. Ita. Finocchio marino. Gal. Fenoil marin. Off. Creta marina.*

**C**rithmum, seu potius, ut aliqui, Crithamon, fruticosa & undique foliosa herbula est, cubiti altitudinē fere petens. Nascitur in maritimis, & petrosis: folijs pinguibus, numerosis, albicantibus, ueluti Portulacæ, latioribus & longioribus, salso gustu: flores candidi sunt, & semen, ceu Roris marini, odoratum, molle, rotundum, quod siccatur rumpitur, habet intus tritici modo nucleum: radices digiti crassitudine, tres aut quatuor: grati odoris & iucundi. Radix, semen & folia incocta uino, potu urinae difficultati & regio morbo auxiliantur: menses cient. Estur crudum coctumue in olere, seruatur etiam in muria.

**C**rythmon & Latinis Batis, duplex est. Vna marina, quæ fruticosa est herbula, cubitum vnum alta. Nascitur in maritimis, & petrosis. Hæc cretha marina vulgo dicitur. Altera Batis hortensiana, quam Plinius Asparagum Gallicum quibusdam dici tradit. hæc ab olitoribus ad quotidianos vsus confita nonnusquam spectatur comprehensio. Vulgus bacillas quasi baticulas ab Italis vocari didicit. Matthiolo apud Italos Finocchio marino nuncupatur. In hortos traducta, Herba di san Pietro. Batis empetron non est, bilem enim aut flegma non discutit, sed nec hydropinorum aquam, quod in Empetro requirit Dioscorides. Batis herba falso gustu, & quadantenus amaro, quandoquidem desiccatoria & absterforia est facultatis. Hanc tamen depresso rem habet, quàm alia quæ in amararum genus transeunt.

Coron



## Coronopus. C A P.

## CXXIII.

## NOMENCLATURA.

Græ. κορωνόπος. Lat. Coronopus. Ita. Serpentina. Gal. Corne de Cerf.

Ger. Traynnen.



Coronopus.

**C**oronopus oblonga herbula est, per terram repens, fissis folijs: coquitur in olerere: radicem habet tenuem, adstringentem, quæ in cibo cæliacis facit. Prouenit in aggeribus, & locis incultis, & secus uias.

**C**oronopus, patrum nostrorum memoria, Ranunculi species: habita est. Nunc verò cognosci in acetarium olus, & sericæpit. Herba stella ab Italis nuncupatur. Foliorum figura apud quosdam Cornu ceruini nomen dedit.

## Sonchus C A P.

## CXXIIII.

## NOMENCLATURA.

Gr. σόυχες. Lat. Sonchus. Ita Cicerbita.

Gal. Laceron. Ger. merkhödueye.

**S**onchi duo genera: syluestrior quidam est, & magis spinis horret: alter teneritate quadam mollescit, cibis expetitus, anguloso caule, inani, interdum rubente: folijs in ambitu per interualla dissectis. Vtriusque uis refrigerat, modicè adstringit,

r

z

git,



*Sonchus aspera.**Sonchus non aspera.*

git, unde aestuanti stomacho & inflammationibus illiti prosunt. Succus eorum stomachi rosiones sorbitione mitigat, lac elicit: in uellere appositus, sedis ac uuluae collectionibus opitulatur. Tam herba quam radix illita uibratis à scorpione ictibus subuenit. Alter Sonchus tenerior, arboris instar, latis constans folijs: caulem in ramos exeuntem folia distinguunt: sed ad eadem pollet. **S**onchus, Italis acetarium è folijs & radicibus olus, siquidem teneritudo & dulcor gratum gustui præbet.

### Seris, siue Intybus. CAP. CXXV.

#### NOMENCLATURA.

Græ. σέγισ. Lat. Seris. Ita. Endiuia.

Gal. Endiuie. Ger.

hærnsoel.

*Seris*





Seris sylvestris.



Seris sativa.

**S**eris duum generum est: altera sylvestris, quæ Picris & Cichorion uocatur: altera sativa, latioribus folijs constat, stomacho quàm hortensis utilior. Quæ iterum in duas species digeritur, una folio latiore prodit, Lactucarum simillima, altera angustiore est folio, & gustu amara. Viraque refrigerat, & astringit, stomacho utilissima: aluum sistit cocta, si cum aceto adsumatur. Sylvestres stomacho meliores, quandoquidem æstuantem ipsum & quem imbecillitas uexet, cibo leniunt: cardiacis per se, aut cum polenta, utiliter illinuntur: podagris, & oculorum inflammationibus auxilio sunt. Herba cum radice illita, percussis à scorpione subuenit: igni sacro cum polenta medetur. Succus cum Cerusa & aceto, ualet ad illitus eorum, quæ refrigerationem desiderant.

r

β

Est Inti



**E**st Intybus satiuus, est syluestris. Satiuus nostro etiā tēpore Endi-  
ui adicitur Italis, syluestri præter folia quæ teneriora & latiora sunt  
similis. Syluestris qui Cichoreum, Picris, Amarago Gase nuncupatur,  
Cichorea pharmacopolis, floribus est cœruleis, quæ sese in solis sydus cir-  
cum agunt, quæ è re Heliotropij apud quosdam nomen accepit, cum He-  
liotropium diuersum sit herbae genus.

## Condrilla. CAP. CXXVI.

### NOMENCLATURA.

Gr. κούριλλαν. Lat. & Ita. Condrilla.

Gal. Espece de Cichoree.

**C**ondrilla, quam aliqui Cichorion, alij Serin appellant, cau-  
tem, flores & folia habet Cichorio similia: qua ex causa  
nonnulli syluestris Intubi speciem esse pronunciarunt, uerum te-  
nuior tota est: in cuius ramulis, gummi Mastiches simillimum,  
tuberculo Fabæ inueniri solet: quod cum Myrrha tritum, &  
lintheo appositum, instar oliuæ, scæminarum menses trahit. Tusa  
cum radicibus herba, adiecto melle, diuiditur in pastillos, qui  
Nitro admisti uutiligines emaculant. Gummi inordinatos pilos  
replicat: quod item tenera radix efficit, si intincta succo acus, pi-  
lis admoueatur. Contra uiperas in uino potu proficit. Succus de-  
coctus, in uino, aut per sese potus, aluum sistit. Aliud habetur Cō-  
drilla genus, folium ferens oblongum, circum rosum, humi spar-  
sum, caulem succo madentem lacteo: radice tenui, rotunda, leui,  
uegera, flauescente, succosa, Cuius & caulis & folia concoquē-  
di uim habent. Succus incommodos palpebrarum pilos reflectit.  
Nascitur in latis & cultis.

**C**ondrilla Intybacci generis in solido & gypso solo nascens, Ci-  
choreo tenerior & minor, flore in aliquibus cœruleo, in alijs can-  
dido. Altera Condrilla species luteo flore, pinguem & lutosum agrum,  
& præcipuè hordeaceum campum amat.

Cucurbita.



## Cucurbita. CAP. CXXVII.


## NOMENCLATURA.

Græ. κολοκυνθα. Lat. Cucurbita. Ita.

zucca. Gal. Courge. off. Latinum nomen habent.



Rotunda.



Longa.

**C**ucurbita esui apta: cruda, trita illitu tumores, & abscessu mitigat. Ramenta eius infantibus contra capitis ardorem, quam Syriasi in uocant, in sincipite illinuntur: oculorum inflammationes podagrasq; refrigerant. Succus e ramentis tuis per se, aut cum Rosaceo infusus, aurium doloribus auxiliatur: adustiones cutis in ardenti febre illitu adiuvat: totius feruescentiae & expressae succus, cum melle exiguo & nitro potus, aluum leniter resoluit. Vinum in Cucurbitam recentem excauatam infusum, si mistum sub diuo teneatur, potu aluum lenigabit.

r 4

Cucurbitæ




**C**ucurbita semen medicinale est, fructus quāvis multorum sint specie-  
rum, tamen ut plurimum aut longi sunt, aut lati & sessiles. Nas-  
citur sine semine, quæ perendie quā terra mādentur, oleo sesamino im-  
maduerint.

**Cucumer satiuus. C A P. CXXVIII.**

**NOMENCLATURA.**

*Græ. Σίκυς ἡμερῶ. Lat. Cucumer satiuus. Ital.*  
*Cocomero domestico. Gal. Concombre.*



*Citrullus.*

*Cucumis marinus.*


**S**atiuus Cucumis aluo & stomacho perquā utilis habe-  
tur, refrigerat, corruptionem non sentit, uesica prodest, olfa-  
ctu reuocat, quos animus liquerit. Semen modicè urinam mo-  
uet: cum lacte aut passo, uesica exulcerationibus subuenit. Illita

*CXXX*





Cucumis sativus.



Pepo.

cum uino folia, morsus canum sanant, & epinyelidas, cum melle. Peponis caro in cibis, urinam cit, inflammationes oculorum illita sedat. Ramenta eius contra adustionem infantium, quam Syriasin uocant, sincipiti imponuntur: fronti admota, oculorum fluxiones auertunt. Succus cum semine, adiecta farina, siccatus in sole cogitur in smegmata, quæ faciem repurgant, & nitorem afferunt. Radix sicca, & ex hydromelite pota drachmæ pondere, uomitionem mouet. Si quisquam moderate secundum cœnā uomere cupiat, geminis obolis sit contentus. Sanat quoque illita cum melle ulcera concreta in modum faui, quæ ceria uocant.

**P**Eponis nomine Græci & Cucumeres & Mellones & Citrios intelligunt. Est Italis Auguria Cucumeris genus, antiquis Græcis (ut Matthiæ putat) incognitum.

r s

Lactu




## Lactucæ. CAP. CXXIX.

## NOMENCLATURA.

Græ. θρίδαξ ἡμερος. Lat. *Lactuca sativa*. Off. Itidem.  
Ita. *Lattuga domestica*. Gal. *Laiētue*.



Crispa.



Capitata.

**L**actuca sativa, quibus natura refrigeratrix inest, stomacho grata habentur, somnum conciliant, aluum emolliunt, lac euocant: verum decocta magis alunt, stomachicis illotas esse prodest. Epotum semen, assiduas libidinum imaginationes in somno compescit, & ueneri refragatur. Ipsa uero frequentiores in cibo, claritati oculorum officiunt: inflammationibus & ignibus sacris opitulantur, muria condiuntur. Cum in caulem exierunt



runt, uim quandam nanciscuntur, succo aut lacti syluestris Lactu-  
ce similem.

## Lactuca syluestris. CAP. CXXX.

### NOMENCLATURA.

Græ. Ἀγρίδαργία. Lat. Lactuca syluestris. Ita.

Lattuga saluatica. Gal. Laiētue sauua-  
ge. Off. Endiuia.



Syluestris.

Syluestris Lactuca sati-  
ua similis est, sed longior  
caulis, & candidiora folia,  
graciliora, & asperiora: a-  
maro gustu est, & uiribus  
aliquantum Papaueri simi-  
lis, unde lacteum eius succum  
aliqui Meconio permiscue-  
runt. Aquam per aluum eli-  
cit, potus in aceto mulso suc-  
cus ad duos obolos argema  
caliginemq; repurgat. Contra  
adustiones efficaciter illini-  
tur cum lacte mulierum. In  
summa somnum allicit, dolo-  
ris leuamentū præstat, men-  
ses trahit, contra scorpionum  
& phalangiorum ictus bibitur. Semen, non aliter quam satua,  
libidinum imaginationes in somno amolitur, ac uenerem arcet.  
Succus ad eadem ualet, sed uiribus infirmior. Reponitur in ficti-  
li nouo lac eius, antea, ut in alijs liquaminibus moris est, inso-  
latum.

Est




**E**st sativa, est sylvestris Lactuca, quæ Serriola siue Scariola Italis, quod folij pars exterior, serræ in morem, aspera sit. In totum, sola teneritudine, lenore, & candore distant.

## Gingidium. CAP. CXXXI.

### NOMENCLATURA.

Græ. γιγγιδιον. Lat. Gingidium. Ita. Gingidio. Gal. & Off. Cerefolium, sed falso.



\* *Gingidium.*

ita pridem q̄s è locis cœpit adferri. Hoc quibusdam Carui de Syria dicitur.

**G**ingidium, aliqui Lepidion, in Syria & Cilicia plerunque nascitur: herbula sylvestri Pastinacæ similis, tenuior, & amarior: radice parua, candicante, sub amara. Olus hoc crudum, coctum, conditumue estur magna stomachi utilitate, urinã cit. Decoctum ex uino potũ uesicæ prodest.

**C**erefolium in Italia hortis nascens, non est Gingidium, non enim gustatum amaritudinem gustui representat, at acrimoniam potius, & aromaticum odorem. Cilicia & Syria peculiaris hæc herba est, nec

Scam



## Scandix. CAP. CXXXII.

## NOMENCLATURA.

Græ. Σκάνδιξ. Lat. Scandix. Ita. Scandice.

Gal. non perinde nota. Off. Dauci  
genus, sed falso. Ger.

Wißd moron.



\* Scandix.

Scandix, sylvestre olus  
est amarum, subacre,  
quod crudum coctumue mā-  
ditur, stomacho & uentri  
utile. Decoctum in potu, ue-  
sicae, renibus, & iecinori  
confert.

Scandix Galeno, sapore est a-  
maro, & aliquantum acris,  
vt in fine sit secundi exalfacien-  
tium & desiccantium ordinis,  
aut in tertij principio. At cum  
talis non sit, quæ pro Scandice  
profertur, sequitur Scandicem  
non esse geminam.

## Caucalis. CAP. CXXXIII.

## NOMENCLATURA.

Græ. καυκαλῖς. Lat. Caucalis. Ita. Petrosello

saluatico. Off. Pimpinella hirsuta.

Gal. Persil sau-  
uage.

CAUCA





Caucalis.

**C**aucalis, quā alij ſt  
ueſtre Daucum uocāt,  
cauliculo eſt dodrantali, aut  
maiore, ſubhirsuto: folijs A-  
pio ſimilibus, Fœniculi modo  
per extrema multifidis, hiſpi  
diſq̃, candida in cacumine  
umbella, ſuauius olēte. Cru-  
dum coctū mē olus eſtur, uri-  
nam mouet.

**F**requens apud Thuſcos Cau-  
calis, nihilum abſimilis ab  
ea quā pingit Dioſcorides.  
Hanc vernacula diſtione, Petro-  
ſello ſaluatico nominant, quod  
adiacētia terræ folia multum  
ad Apium hortens, Petroſeli-  
linum, accedat, editioribus cun-  
ctis fœniculi modo inciſis. Flos  
albus & odoratus non alius,  
quā Dauc.

## Eruca. CAP. CXXXIIII.

## NOMENCLATURA.

Græ. Εὐρωμα. Lat. Eruca. Ita. Ruchetta.  
Gal. Roquette.

**C**Ruda Eruca uenerem largiore cibo concitat. Semen eodē  
eſſectu prodeſt: urinam cit, concoctioni prodeſt, aluo per-  
quā commodata. Semine ad condimenta utuntur, quod, ut  
in longum tempus aſſeruetur, adiecto lacte aut aceto, digerunt  
in paſtillos. Gignitur etiamnum ſylueſtris Eruca, maxime in  
Iberia,





Sativa.



Sylvestris.

*Iberia, quæ occidentem spectat, cuius semine pro Sinapi incolæ utuntur. Vrinam uehementius pellit, multò satina acrior.*

**E** Ruca acetarijs Italicis, & satina & sylvestris omnibus notissima. Medicinalem eius usum abundè docet Dioscorides.

## Ocimum. CAP. CXXXV.

## NOMENCLATURA.

Græ. Οκίμω. Lat. Ocimum. Ita. Basilico.

Gal. Basilic.

**O**cimum uulgo cognitum. Id copiosiore cibo oculorum aciem hebetat, aluum mollit, spiritū mouet, urinā pellit, lac euocat, ægrè tamen conficitur. Illitū cū polline polentæ, ace-

to



*Ocimum mediocre.**Ocimum maius.*

to & Rosaceo, pulmonum inflammationibus auxilio est. Draconis marini & scorpionis ictibus per se prodest: & cum uino Chio oculorum doloribus. Succus uisus caliginem abstergit. Destillationes exiccat. Semen potum conuenit atram bilem gignentibus, difficili urina, inflatisq; naribus haustum, subinde mouet sternutamenta: quod idem herba efficit: sed oculos premi necessum est, cum sternutamentum urget. Sunt qui in cibis abdicandum censeant, quandoquidem manducatum, & in sole positum, vermiculos creat. Aphri autem adijciunt, si feriantur à scorpione, qui Ocimum ederint, nullo confictari dolore.

**E**st Ocimū, siue Oximū, pro ratione foliorū, maius & minus, et sub Basilici nomine, satis cognitū. Herba stomacho inimica, ideo in cibis dānatur, cōuenientius quo maturet, & discutiat, exterius applicabitur.

*Siqui-*



Siquidem in secundo est ex calfacientium ordine, & superfluum, in se continet humiditatem.

# Orobanche. CAP. CXXXVI.

## NOMENCLATURA.

Græ. οροβανχη. Lat. & Ita. Orobanche.

Gal. Tigne.



\* Orobanche.

**O**robanche cauliculus est sesquipellalis, & interdum maior, subruher, hirsutus, tener, sine folio, pinguis: flore subalbido, & in luteum uergente: radice digiti crassitudine, & cum ariditate flaccescit caulis, fistulosa. Hanc inter quædam legumina nasci constat, & ea strangulare, unde Orobanche sibi cognomentum usurpauit. Estur, ut olus, cruda, & in patinis, asparagi modo, decocta. Legumentis addita, coctionem accelerare creditur.

**O**robanche, quam quod Eruum strangulet, Theodorus in Theophrasto, Eruegam nominauit, caulem profert sine folijs, & cymam paulo crassiore, ut non iniuria Plinio, Cynomorion, quasi simile quiddam genitali canis nominetur.

# Barbula hirci.

## CAP.

## CXXXVII.

## NOMENCLATURA.

s

Græ



Græ. Τραγοπωγόν. Lat. *Barbula hirci*.

Ita. Barba di becco. Gal. Barbe de Bouc.

Ger. Hockhs bart.

**B**arbula hirci, quæ ab alijs Come uocatur, breui est caule: folijs Croci: radice longa, dulci, supina magno super caulem calyce, è cuius summo semen nigrum dependet, unde nomen inditum est. Herba esui apta est.

## Ornithogalum. CAP. CXXXVIII.

### NOMENCLATURA.

Græ. Ορνιθόγαλον. Lat. *Ornithogalum*.

Ita. Ornithogalo.

Gal. Churles.

**O**rnithogalum cauliculus est tener, candicans, tenuis, sesquipedalis, tribus aut quatuor in cacumine mollibus adnatis: à quibus, flores prodeunt, foris herbacei, & cum hiantes se pandunt, lactei uisuntur: inter quos dissectum, cachryos modo, capitulum emicat. Coquitur cum pane, ut Melanthium. Radix bulbosa, cruda & cocta manditur.

**R**adix Barbe Hirci acetarijs, quod dulcis fit & gustu grata, inditur. Ipsa herba folia habet, Croci largiora tamen & longiora, florem luteum. Aqua per alembicum ex ea educta, recentes in carne plagas mirabiliter adglutinat. Ornithogalum pueris etiam cognitum, quod Churles vocant, nam huius radicem vomere eruptam colligunt, multo castaneis suauiore in cibis: cruda & cineribus incocta rusticis edendo est, ut quæ Tuberibus nihil cedat.

## Tubera. CAP. CXXXIX.

### NOMENCLATURA.

Græ. ὄσβα. Lat. *Tubera*. Ita. Tartuffi.

Gal. Truffles. Off. Cerui boleti.

**T**ubera rotundæ radices sunt, sine folijs, flavescentes: uere fodiuntur, cruda & cocta eduntur.

Th



**T**Vbera secreta quapiam vi terre agglomerantur in cibum: Gale-  
no, humores generant crassos & melancholicos omni plus alio ci-  
bo, atq; adeò paralytici apoplexiam, egre digeruntur, & grauant sto-  
machum. Nā de terrestri magis, quā de aquea substantia participant.

## Smilax hortensis. CAP. CXL.

### NOMENCLATURA.

Græ. Σμίλαξ κηπαία. Lat. Smilax hortensis.  
Ita. Smilace de gli horti. Gal. Faseoles. Off. Faseoli.

**H**ortensis Smilax, frutex, cuius semen à nonnullis Lobia  
uocatur: folia habet Hederæ, molliora tamen: tenues cau-  
les, & capreolos uicinis fructibus circumuolutos, qui tantū ado-  
lescunt, ut topiorias scenas representare uideantur: siliquas Fœ-  
nigræci profert, longiores & torosiores. in quibus semina re-  
num similia, sed inæquali colore recluduntur: quæ quadam ex  
parte fuluescunt. Siliqua cocta cū semine in oleribus, Asparagi  
modo, estur. Urinam ciet, & tumultuosa somnia facit.

Smilacem hortensem iam superius diximus esse Dolichum, eum Ita-  
lia vocat Fagiuolo Turchesco, nempe qui etiam Phasiolus dicitur,  
ut differat à Phaseolo.

## Medica. CAP. CXLI.

### NOMENCLATURA.

Græ. Μηδική. Lat. & Ita. Medica.

Gal. Foin de bourgoine.

Gal. Medisch Kraut.

**M**edica cū recenter prodijt, folijs & caule Trifolio  
pratensi similis est: procedens uero folia contrahit, cau-  
les ædens Trifolij, & siliquas corniculorum modo intortas,  
in quibus semen Lentis magnitudine dependet. Id sicca-  
tum, iucundi saporis gratia, conditaneo sali admiscetur. Vi-  
ride, quibus refrigeratione opus est, illitu suffragatur.

s 2 Her



*Herba tota pro gramine utuntur, qui pecora alunt.*

**M**edica, Persarum bello in è Media in Græciā, & post è Græcia in Italiam translata, in iumentorum olim pabulum serebatur, nunc rara est in Italia: in Gallia, per Ruellium frequens, & à rusticis Trisolum maius appellatur.

## Aphaca. CAP. CXLII.

### NOMENCLATURA.

Græ. Αφάκη. Lat. Aphaca. Ita. l' Aphaca.  
Gal. Vesse.



**A**phaca in arvis nascitur, altior Lente, tenuibus folijs siliquas Lenticula maiores fert, in quibus terna quaternaue semina nigra, Lente minora, continentur: quæ adstringendi vim habent: quare torrefacta, stomachi aluiq; fluxiones sistunt, si fresca lentis more decoquantur.

**A**phace Matthiolo non est vitia, verum legumen folijs Vitæ similibus, maioribus tamē & crassioribus. Hanc rustici Vitiam sylvestrem vocant. Theophrastus inter intybacea

\* Aphaca.

genera Aphacen reponit, quæ nihil adnostram Aphacen.

## Porrum capitatum.

## CAP. CXLIII.

### NOMENCLATURA.


Græ



Græ. πρᾶσου κεφαλῶτος. Lat. *Porrum capitatum*.

Ita. *Porro capitato*.

Gal. *Porreau*.



*Porrum capitatum.*



*Porrum sectinum.*

**C**apitatum Porrum inflationem facit, noxium succum creat tumultuosum somnum parit, urinam ciet, aluo accommodatur, extenuat, oculorum aciem hebetat, menses pellit. sed lædit exulceratam uesicam, renesq, cum ptisana uero coctum, esu pectoris uitia extrahit: coma eius in aqua maris & aceto cocta, in deseseionibus, ad præclusiones uulue & duritias, utilis habetur. Porrum bis aqua mutata coctum, tum frigida maceratum, dulcescit, & multò minus inflat. Semen acrius est,



Et quandam adstrictoriam vim habet. Quare succus cum aceto, addito Thure aut Manna, sanguinis profluvia sistit, maxime si naribus erumpat: uenerem stimulat, contra omnia thoracis uitia tabemq<sup>3</sup>, pro delinctu efficax est, arteriam esu purgat: sed si assidue estur, uisus obscuritatem inducit, stomacho aduersatur. Succus ex melle potus, aut illitus, contra bestiarum morsus auxilio est. Ipsum quoque cum aceto aut Thuris polline, lacte, aut Rosaceo, utiliter aurium doloribus, et sonitui instillatur. Varos tollunt folia illita cum uua Rhois, qua ad obsonia utuntur: epinyetidi medetur, crustas ex sale illita rumpunt, ueteres sanguinis reiectiones cohibet, si binis drachmis, et aequali baccarum Myrti pondere bibantur. Ampeloprasum stomacho magis aduersatur, et plus Porro excalfacit. Urinam et menses uehementius ciet. Id contra serpentium morsus esse conuenit.

## Cepa. CAP. CXLIIII.

### NOMENCLATURA.

Græ. Κρόμμυον. Lat. Cepa. Ita. Le Cipolle.

Gal. Oignons.

Cepa longa acrior est quam rotunda, item flaua quam candida, et sicca quam uiridis, et cruda quam cocta, aut sale condita. Omnes tamen mordent, flatus gignunt, appetentiam inuitant, sitim mouent, et extenuant, fastidium pariunt, et expurgant, aluo utiles sunt. Ea detractis purgamentis in oleum coniecta, hæmorrhoidas, reliquosq<sup>3</sup> excreationum exitus referant, subdita pro balanis. Succus cum Melle illitus, oculorum hebetudinibus, argemis, nubeculis, et incipientibus suffusionibus auxiliatur, angina eodem perunguntur, suppressos menses pellit, caput purgat, naribus infusus, canis moribus cum aceto, Ruta, et Melle illinitur: cum aceto autem perunctas

in fo



in sole uirilignes sanat, & cum pari spodio, scabras lippitudines sedat, uaros cum sale reprimat: contra calceamentorum attritus, cum gallinaceo adipe utilis est, citæ aluo prodest. In auribus sonitum ac grauitatem emendat: ad purulentas aureis, & eliciendam earundem aquam, ualet: alopecia earum succo perfricantur, qui celerius quam Alcioniū pilos euocat. Largiore cibo Cepa capitis dolores ciet, coctaq; uehementius urinā pellit. Eos lethargicos efficit, qui ualitudinibus aduersis, ea etiam cocta, plus æquo uescantur, elixa, & cum passis uuis & Fico illita, tubercula concoquit, & celerrimè rumpit.

## Allium. CAP. CXLV.

## NOMENCLATURA.

Græ. Σκόροδος. Lat. Allium. Ita. Aglio.  
Gal. Ail.

Allium quoddam satium atque hortense habetur, quod in Aegypto, singulari, ut Porrum, capite constat, dulce, in purpureum uergens, paruum: reliqua uerò magna & candida, ex pluribus coagmentatur nucleis, quos aglitas, id est, spicas, Græci nominant. Aliud est syluestre, quod Ophioscorodon, id est, Anguinum, uocant. Vis Ally acris est, excalfacit, mordet, excernit, aluum turbat, inflationes facit, stomachum exiccat, sitim gignit, flatum permouet, summam corporis cutem exulcerat, aciem oculorum esu hebetat. Eosdem effectus præbet Anguinum, quod & Elaphoboscorodon dicitur, latas uentris tineas in cibo sumptum abigit, urinas detrahit, contra uiperatum ictus, & priuatim hæmorrhoi, prodest, ita ut non aliud magis, si cum uino iugiter assumatur, aut tritū in eodem ebibatur: contra rabiosorū morsus & illitu & cibo ualet: magna &



*Allium hortense.**Sylvestre.*

*Allio utilitates contra aquarum murationes, uocem clarificat, ueterem tuſſim crudum coctum uel lenit, potum autem cum Origani decocto, pediculos & lendes enecat. Cremati cinis illitus ſugillationibus cum melle, & alopecijs cum Nardino unguine, medetur: eruptiones papularum cum oleo & ſale ſanat, uitilignes, lichenas, lentigines, ulcera capitis manantia, lepras, & furfures, cum melle eximit. Cum Thure & Teda decoctum, dentium dolorem leuat, ſi in ore contineatur. Contra uenentos muris aranei morſus, cum ficulneis frondibus & Cumino illinitur. Ferueſacta coma ius, ſcæminarum deſeſſionibus additum, menſes & ſecundas partus extrahit. Alliu eiusdem gratia ſuffitur. Factum ex eo & nigra oliua intritum, quod Mytoto*





Sylvestre.



Vrfinum.

toton uocant, esu cit urinam, ora uenarum patefacit, hydropicis utile. Scorodoprasum magnitudine Porrum æquat, qualitatum Porri & Allij particeps: unde promiscuas sibi uires ex utroque uendicauit, effectus Allij & Porri præbens, inefficacius tamen. Coctum, porri modo, dulcescit, & in olerum uicem transit.

**P**orrum & eius species omnibus nota, nam sub eodem genere continetur, Vlpicum, Scorodoprasum, Ampeloprasum, Alliu, Ophioscorodon, Porrum, Gathyum, & similia, Ampeloprasum copiosè in vineis prouenit, unde & nomen accepit. Ceba nota est. Non ignotum est Allium domesticum. Sylvestre spicā non habet, minor est domestico, ceterū sapore & odore simili, astrictis folijs, caule subtili, è cuius cyma flos rubens, unde nigrum semen profilit. Scorodoprason nō est Scordium (nam

s s id sui



id sui generis herba est) at illud ex Allio & Porro latifolio, sic arte & cultura prodijt: Siquidem figura & temperamento inter utrūque medium est.

# Sinapi. CAP. CXLVI.

## NOMENCLATURA.

Græ. Σίνπι. Lat. Sinapi. Ita. Senape.

Gal. Seneue.



Sinapi.

**S**inapi hortense, aliqui Napi uocant. Eligi debet adultum, ualde rufum, non magnopere siccum, sed quod fractum internè uirescat, & ueluti quodam succo madeat, cæsum colore: siquidē recens id genus, tempestiuū habetur. Ad calfaciendum, extenuandum, extrahendum, efficax est: ad eliciendam capitis pituitam manditur. Contra præduros tonsillarum tumores, ac ueterem callosamq; arteriæ scabritiem, succus ex aqua & Melle conuenienter gargarizatur: sternutameta ciet,

tritum & naribus admotum: comitialibus quoque auxiliatur: scæminas uulvæ strangulatu oppressas excitat. Lethargicis, de-raso capite, illinitur, cum ficis admistum, donec rubescat locus: & ad coxendicum cruciatus impositum, ad lienes, & omne

genus,



genus dolores confert, cum permutanda valetudinis causa, ex alto vitia extrahenda sunt. Alopecij illitum medetur, faciem purgat, sugillata cum Melle, adipe aut cerato rapit: fera impetigines & lepra, eo cum aceto perunguntur. Contra febrium circuitus aridum bibitur, aut potui, polenta modo, inspargitur: extrahentibus emplastris, scabiemq; extenuantibus, utiliter admisceri solet. Tritum, grauitati aurium & sonitui, cum fico impositum prodest. Succus ad hebetudines oculorum, & genarum scabritias magna utilitate illinitur. Expressus recenti semine succus, in sole siccatur.

**S**inapi Plinio, trium est generum. Vnum gracile, alterum Rapitiæ formam exprimit, tertium in Erucae folium laciniatur. Est Gallis Sanella vel Senella: est Mustarda blancha & nigra. Quod Erucae folium refert, musto quod nondum ebullierit inditum, dulcedinem in longum tempus prorogat.

## Nasturtium. CAP. CXLVII.

### NOMENCLATURA.

Græ. Κρόδαμω. Lat. Nasturtium. Ita. Agretto.  
Gal. Cresson de iardin. Off. Latino nomine  
vtuntur.

**N**asturtium optimum constat esse Babylonicum. Omnium semen est acre, excalfacit, stomacho aduersatur, aluum turbat, tineas excutit, lienem imminuit, partus exanimat, menses cit, uenerem stimulat, Sinapis & Erucae simile intelligitur. Lepras & impetigines absterget. Illitum cum melle, lienem extenuat, fauos expurgat, pulmonum vitia extrahit, sorbitionibus incoctum. Serpentium uenenis potum resistit, atque eas suffitu fugat: capillorum defluuia cohibet: carbunculos ad suppurationem perducit, & rumpit: coxendicibus cum polenta

com





Nasturtium hortense.



Sylvestre.

cōmodè ex aceto illinitur, tumores collectionesq; discutit, emit-  
tit furunculos, illitum cum muria. Herba ad omnia eadem effe-  
ctus, licet minor.

**N**asturtium Crescio hortensianus seu mauiis Alenoyssus satis co-  
gnitus, medicina patent e Dioscoride, Galeno, & Plinio.

Thlaspi. CAP. CXLVIII.  
NOMENCLATURA.

Græ. Θλάσι. Lat. Thlaspi. Ita. Haud aliter.  
Gal. Rasle. Off. incognita.

**T**hlaspi, herbula angustis folijs, digitali longitudine, in ter-  
ram uersis, subpinguib; in cacumine diuisis: binum do-  
dran



\* *Latifolium.**Augustifolium.*

drantum cauliculo, tenui, non sine adnascentibus ramis: fructu circa ipsum totum, ab extremo in latius se pendente semine Nasturtij incluso, lenticulae uasis effigie, nisi quod infringitur unde nomen accepit: flos albicat. Nasctur in semitis, & sepibus, fossisq;. Semen asperi gustus, excalfaciens: bilem utrinque extrahit: potum acetabuli mensura: prodest ischiadicis, infusum, sanguinem potu educit: internas suppurationes rumpit: menses ciet: sed partus enecat. Alterum Thlaspi tradit Cratenas, quod aliqui Persicon Sinapi uocat, latis folijs, radicibus magnis, utile ischiadicorum infusioni.

**Q**ui Thlaspi Bursam pastoris existimant perperam iudicasse conuincuntur, tum foliorum habitu, tum gustato semine, & eius animaduersa figura. Hanc herbarij Nasturtium rectiorum, & vulgus, Sinapi rusticum vocant.

Dra



## Draba. CAP. CXLIX.

## NOMENCLATURA.

Græ. Δράβη. Lat. Draba. Ita. Draba.

Gal. Draue. Off. &amp; Ger. incognita.

**D** Raba herba ad cubiti altitudinem assurgit, tenues spargens ramos, & ex utroque latere folia ceu Lepidy, sed molliora, & candidiora: in cacumine uero Sambuci umbellam gerit, candidos flores habentem. Herba hæc cum ptisana coquitur, in Cappadocia maxime. Semen aridum pro Pipere obsonijs admiscetur.

**S** Erapium, Araba, Orientale facit Nasturtium, acris saporis semine, quod non reperiens in planta quam in valle Anania legit Matthiolus similem Araba, ut ipse de illa dubitat, sit necne vera Dioscoridis Araba, ita incertos nos esse cogit, utrum nascatur in Gallijs, ut Ruellius existimat.

## Irio. CAP. CL.

## NOMENCLATURA.

Græ. Εγώριμον. Lat. Irio. Ita. Irione.

Gal. Tortelle. Off. &amp; Ger. proprium nomen non habet.

**E** Rysimon, Latini Irionem uocant, iuxta urbes, rudera, hortosq; nascitur, folijs Erucæ sylvestris: cauliculis in lori modum lentis & obsequiosis: floribus luteis, siliquis in cacumine gracilibus, ut Fœnograeco, corniculatis: semine Nasturtij, exiguo, urentis gustus. Contra thoracis fluxiones efficax est, & si purulenta extussumuntur: regio morbo & coxendicibus prodest: contra uenena in delinctu cum melle datur. Illinitur ex aqua aut melle utiliter cæcis carcinomatibus, parotidibus, duritijs mammarum, & testium inflammationibus: in totum extenuat, & calfacit. Mitius multo ad clysteres fiet: si aqua madescat atq; torreatur, uel linteo illigatum pinsita farina oblitum perassetur.

Irio



**I**Rio Theophrasto frumenti est genus, Sesamo simile. Plinius huic opinionioni accedit 7. & 10. cap. lib. 28. Et 25. capite. 22. lib. ab historia Discoridis describit. Nec aliter facit Galenus qui libro de facultate simplicium 6. inter acres herbas ut Nasturtium & Sinapi connumerat. Et de alimentorum facultate primo, huic locum assignat inter frumenta. Attamen frumentarius, non ea est herba, quam Itali Formentone nuncupant, non enim respondet Plinij in Erysimi descriptioni, quod formentone, rubente sit caule, non folijs: & cum eo non multum animalium genus pascatur, clarum est nihilum Sisamum referre. Matthiolus Irionem herbam, siquidem apud Italos nascatur, eam esse putat quæ in locis & vijs publicis nascitur, Eruca folijs, floribus paruis & luteis, siliquis in cacumine gracilibus, duris, & corniculatis, in quæis semen acris saporis.

## Piper. CAP. CLI.

### NOMENCLATURA.

Gr.  $\pi\epsilon\pi\epsilon\rho\iota$ . Lat. Piper. Ital. Pepe.

Gal. Poyure. Off. Latinum  
nomen retentum est.

**P**iper in India nasci, breui arbore traditur: quæ inter initia, prælongum fructum, ueluti siliquam promit, quod longum Piper est: habet intus aliquid tenui Milio simile, quod tandem in perfectum Piper euadit: id autem suis temporibus dehiscens, pandensq; sese racemos emittit, grana ferentes qualia uidemus: Ea acerba, candidum Piper faciunt, aptum ocularibus remedijs antidotis & medicaminibus, quæ contra uenenata parantur: theriaca uocant. Longum uero uehementius mordet: & quoniam prius quam ematurescat decerptum est, subamarum relinquit antidotis & theriacis medicaminibus expetitum. Nigrum uero, ut potè quæ tepestina maturitate collectum sit, odoratum esse constat candido suauius, acrius, & ori gratius, necnon ad condimenta utilius. Sed candidum, & adhuc in acerbum uergens, ante dictis infirmis



firmius est. Eligi oportet grauissimum, plenum, nigrum, sine multis rugis, recens, minimè fursurosum, Inueniuntur etiamnū in genere nigri semina nutrimento defecta, cassa, inania, minimiq; ponderis, quod uocant Brasma. Vis omnium exalfacit, urinam ciet, concoquit, extrahit, discutit, absterget caliginem, quæ oculis obseruatur. Piper febrium horroribus circuitu repentibus siue potu, siue illitu, subuenit, serpentium moribus auxiliatur, partus extrahit, conceptum adimere creditur, statim à concubitu suppositum: tussi, omnibusq; pectoris uitys: siue eclegmate, siue potu, succurrit, anginae co & melle conuenienter perunguntur. Potum cum recentibus Lauri folijs, tormina discutit: cū uua passa manducatum pituitam à capite elicit, ualetudinem tuetur, dolores finit, appetentiam mouet: concoctionem adiuuat, ad intinctus esculentorum additum: strumas cum pice discutit, uitilignes ex nitro emaculat. Fictili nouo, ut Lenticula, motum torretur. Non est huius arboris radix Gingiber, ut aliqui existimaue re, sicuti, paulò post ostendemus. Nanque Piperis radix Costo similis est, ora gustantium accendit, saliuam ciet: hæc lienem reprimat, cum aceto illita, aut pota: caput etiam purgat, manducata cum semine Pedicularis herbae, quàm Staphidem agriam uocant.

**Q**ui mare Athlanticum, Oriëtem, & Meridianum enauigarunt, planas nobis reddidere frutices Piperis effigies. Vnum, alba uiti quæ sepibus prorepat similem, racemoso fructu, primum viridi, & ut in ligustro coacternato. Hoc rotundum, quod nigrum, & album est Piper. colliguntur, expansis sub sole palmeis tegetibus, bacca, antequam plane nigrescant, mihi relicta donec solis æstu corrugentur. Alterum, qui cōpactiles callos racematim coeuntes producat, parum nucis ponticae inlo forma. Sunt Neapoli Piperis frutices, sunt in alijs Italiae locis. Est & in eadem regione frutex qui Piper racematim ferat, similis plantæ quam vulgus Ribes putat, nempe Venetijs in horto Maphai à Maphæo Medici clarissimi, fructu Piperis & odorem & saporem exprimente.

Gin



## Gingiberis CAP. CLII.

## NOMENCLATURA.

Græ. γιγγίβρις. Lat. *Gingiber*. Ita. *Gengeuo*.  
Gal. *Gingenbre*.

**G**ingiberis sui generis planta est, in Troglodytica Arabia magna ex parte nascent: qua uirente, ad multa, perinde atque nos Ruta, utuntur, & primis potibus & edulys admiscunt. Huius radices, Cyperi modo, parue sunt, candicantes, & odorata, atque Piper sapore imitantur. Eligi debent quæ teredines non nouerunt. A multis tamen ob id condiuntur, quod celeriter cariem sentiant. Fictilibus in Italiam asportantur. *Gingiberis* cibo conueniens est, & cuius condimento assumitur. Ex calsa et oriam uim & excoquentem habet: aluum leniter emollit, stomacho utilis est: efficax aduersus ea, quæ oculis caliginem offundunt. In antidota addi solet. In summa, Piperis uiribus respondet.

**G**ingiber radix est gramine in totum adsimilis, geniculatis serpens internodijs, è quibus nouas subinde radices, & ex acumine dispergit. Arundinacea folia bis tẽr uel in anno progerminat, exilitate tamen & fastigio breuiori. Ad nos ex Arabia & Aegypto adfertur siccum, & conditum viride. Conditur & siccum Venetijs, & alijs in Italia locis, pretij minoris.

## Hydropiper. CAP. CLIII.

## NOMENCLATURA.

Græ. υδροπέρρις. Lat. *Hydropiper*. Ita.  
Pepe acquatico. Gal. *Poyure*  
de riuiere.

**H**Ydropiper apud aquas nascitur, quæ stagnant, aut in pigro lapsu repunt: caulem ædit geniculatum, prædurum, multis alis concavum: folia *Meuthæ*, maiora, molliora, cãdidioraque





\* *Hydropiper.*

gari, nulla habet quæ appareant internodia, semen non profert racemolum, ipsumque amarum est, nõ acre. Hydropiper si vspiciam nascatur, illa est Persicaria species, quæ in alterius discrimen, nigra nota insignitur, Nam folijs est Mentha, non disparibus notis, quas Hydropiperi assignat Dioscorides.

radix gustu Piperis, acris, citra tamen ullam odoris gratiam: fructum acrem, in surculis parvis, prope folia racematim coherentem. Folia cum semine illita, tumores ueteresque duritias discutunt, sugillata delent: quæ postquam inaruerunt, tusa pro Pipere in obsonijs admiscuntur. Radix parua, nullius in medicina momenti.

**H**Ydropiper Pseudeupatorium non esse his apparet argumentis. Pseudeupatorium folijs est cannabinis, duris, pilosis, gustu amaris, & non ut Piperis acris: Odore est non vul-

**Ptarmica C A P. CLIIII.**

**NOMENCLATURA.**

Græc. πταρμίκη. Lat. Ptarmica. It. Oliuella.

Gal. Herba esternuer. Ger.

Mieskrant.

**P**tarmica frutex est, surculos habens paruos, multos & rotundos, Abrotono non dissimiles: & circa eos folia Oleæ, longa,



longa, multa, & in cacumine capitulum, uti *Anthemidis*, paruum, rotundum, quod suo acri odore sternutamentum excitat, unde nomen accepit. Folia cum floribus illita, sugillationes rapiunt. Flores sternutamenta efficacissimè movent. Nascitur in montibus & petrosis.

**E**ptarmica, quā Oliellam Italivocant scopæ fiunt, nec huius apud eos alius est vsus. Temperamento est calido & sicco. Viridis calida, secundo, & sicca ordine tertio.

## Radícula, seu lanaria herba.

### CAP. CLV.



*Struthium.*

#### NOMENCLATVRA.

Græ. στρουθιον. *La.*  
*Struthium.* *Ita.* Ra-  
dicetta.

Gal. Herbe a foulon.  
Off. Saponaria. Ger.  
Seiffenkrant.

**S**truthium herba vulgo nota, qua purgandis laniis utuntur, qui eas eluunt. Huius radix est acris, urinam ciet, prodest tussi, iocinorosis, orthopnææ ex melle sumpta, cochlearis mēsurā, aluū soluit. Eadē cū panace et Capparis radice

t 2 cal



calculos frangit, & cum urina exturbat, duritiem lienis absū-  
mit, menses imposita trahit, partus efficaciter enecat. Cum po-  
lenta autem & aceto illita, lepras tollit, tubercula discutit, cum  
farina hordeacea, & uino decocta. Miscetur & malagmatis,  
& ocularibus collyrijs, claritatis causa. Sernutamenta mouet,  
per os purgat, trita cum Melle, & naribus infusa.

**H**erba Lanaria ob frequentem eius in eluendis Lanis vsum an ti-  
quis cognitissima, hoc abolito, & vna eius cognoscendi iudicium  
deceßit. Arabum sctarij Condisi nominant. Matthiolus hanc in Italia  
nasci non audet affirmare, sed nec è pharmacopolis promi, cum sa penu-  
mero in præscriptiones medicas, quas receptas vocant, addatur. Quin-  
etiam Saponariam non esse: nam hæc folia fert plantaginis leuia: Ra-  
dicula, olea, caulem leuem internodijs distinctum, & non lanuginosum,  
sapore pene insipido.

### Cyclaminus. CAP. CLVI.

#### NOMENCLATURA.

Græ. Κυκλάμινος. Lat. Cyclaminus. It.

Pan. porcino. Gal. Pain de porceau.

Ger. Seebör. Ger.

**C**yclaminus folia habet Hederae, purpurea, uaria, in qui-  
bus supra infraq, d albicant macula: caule nudo, quater-  
nos digitos æquante: floribus in eo purpureis, Rosarū effigie: radi-  
ce nigra, & aliquantiū lata, ut Rapum uideri possit. Quæ cum  
hydromelite pota, pituitam aquamq, detrahit: menses potu appo-  
sitiue ciet. Tradunt, si prægnas radicem transgrediatur, abor-  
tum fieri. Partum appensa accelerat: contra uenena, præsertim  
leporis marini, ex uino bibitur. Illita contra serpentium iclus, re-  
medio est: immista uino inebriat, regium morbum discutit, tri-  
bus drachmis pota, cum passo aut diluto mulso. Sed oportet eum  
qui ebibit, multis uestibus contectum, loco calido, & à perfri-  
ctionibus tuto recumbere, quò facilius exudet: eiectionibus autem sudo-  
res fellei colore inueniuntur. Succus eius ad purgandum caput,  
naribus





Cyclaminus.

per se aut cum Melle medetur: lienem absomit, uitia cutis in facie, & alopecias emendat. Eius decocto luxata, podagras, & capitis ulcuscula, pernionesq; foueri congruum est: ipsaq; in oleo uetere feruesacta, illito oleo, ulcera ad cicatricem perducit. Canata radix oleo expletur, & cinere feruenti imponitur, adiecto interdum Tyrrhenica cera momento, ut strigmenti crassitudinem unguentum contrahat, cum primis utile pernionibus. Radix, Scilla modo, concisa reponitur. ~~maxime in umbrosis~~ ~~maxime in umbrosis~~. Nascitur in umbrosis, maxime sub arboribus.

Altera Cyclaminus. CAP.

CLV II.

NOMENCLATURA.

1 3

Gra.



Græ. Κυλάμινος ἑτσα. La. Cyclaminus altera.

Ita. Pan porcino minore. Gal. Seau de nostre dame. Off. Sigillum Marię.

**E**st & altera Cyclaminus, quam Cissanhemon aut Cissophyllon uocant: folijs Hederæ, sed minoribus: geniculis caulibus, crassisq; circa uicinas arbores, capreolorum modo, se uoluentibus: flore candido, odorato: acinis Hederæ mollibus, lenti gustus, aliquantulum acris: radice superuacua: nascitur in asperis. Huius acini, drachmæ unius pondere poti, cū uini albi cyathis duobus, quadraginta diebus, linem per urinam & alium absument. Ad orthopnœam bibitur. Reliquias à partu purgat.

**C**yclaminus quem Panẽ porciniũ uocant, nota & vulgaris est planta, Alterius Cyclamini, vsus, & cognosci desyt. Minorem, Mesue, Panem porcinum, uidit Matthiolus copiosum in valle Anania radice Auellana.

## Dracunculus. CAP.

### CLVIII.

#### NOMENCLATURA.

Græ. δρακόντιον. Lat. Dracunculus.

Ita. Dragontea. Gal. Serpentine.

Off. Serpentaria.

**D**racunculus folio constat Hederaceo, magno, candidis notis insigni: caule recto, bicubitali, uersicolore, maculis resperso purpureis, ita ut anguem planè referat, baculi crassitudine, fructus summo caule racematim cohæret, colore primum herbaceo, & cū ematuruit, croceo, gustu feruens, mordaxq; radice aliquantulum rotunda, bulbosa, Aro non absimili, tenui obducta cortice. Nascitur in sepibus umbrosis. Seminis succus cum oleo instillatus, aurium dolorem mitigat, naribus etiam ex lana





Dracunculi. 1. species.

Dracunculi. 2. species.

ex lana impositus, polypum absomit: carcinomata illitu sistit: tri-  
 ginta eius grana, si in posca bibantur, abortus inferunt. Odorem  
 aiunt postea quàm flaccidi flores emarcuerunt, conceptus adhuc  
 teneros enecare. Radix excalfacit, orthopnœis, ruptis, uulsis,  
 tussi, destillationibus auxiliatur: humores pectoris excreatu fa-  
 ciles reddit, siue cocta tostaq; cum melle, aut per sese edatur, siue  
 farina eius ex melle delingatur: urinam pellit, uenerem excitat,  
 cum uino pota: phagedænas ulcerum, & quæ cacoëthe uocan-  
 tur, trita cum melle & Bryonia alba expurgat, & ad cicatri-  
 cem perducit. Collyria ex ipsa ad fistulas & eyciendos par-  
 tus fieri solent. Qui radice suas manus perfrucuerunt, à  
 uiperis feriri negantur. Illita ex aceto, uutiligines emaculat.

Folia.



Folia recentibus uulneribus lignamentorum uice, conuenienter imponuntur. Decocta in uino pernionibus apposuisse prodest. *Ca* sens folijs inuolutus, à putredine defenditur. Succus radicis ad nubeculas, albugines, & oculorum caligines, conuenit. Radix cruda coctane, ad sanorum usus pro olere recipitur. Id Gymnesis insulis, quæ Baleares uocantur, coctâ radicem cum melle multo, in conuiujs placentarum loco offerunt. Radix mensibus effoditur, lota q̃, frustatim cōciditur: ligno traiecta siccatur in umbra, & ita reconditur.

**M**aior & Minor Dracunculus sedulis & peritis herba nota sunt, ambâsque species uidit Matthiolus. Enimvero Bistorta, Dracunculus esse non potest, cum hæc frigido, illa calido constat tēperamento.

### Arum. C A P. CLIX.

#### NOMENCLATURA.



Arum.

Gr. Αρουν. Lat. Arum.  
Ital. Gigaro. Gal. Vid de  
Chiē. Off. Pes Vituli. Ger.  
Pfaffenpindt.

**A**ron, apud Syros Lu-  
pha uocatum, folia  
emittit Dracunculi, sed lon-  
giora, & paucioribus distin-  
cta maculis: caulem subpur-  
pureum, dodrantalem, pistil-  
li specie, e quo croceum semē  
exit, radice Dracūculi alba,  
quæ decocta estur, ut potē  
cum minus acris sit. Folia ad  
esum condiuntur, & arida  
per se decocta, manduntur  
Radix



Radix, semen & folia, Dracūculi vires habēt. Priuatim radix ex simo bubulo podagris illinitur, & Dracunculi more reponitur. In totum, ob mitiorem eius acrimoniam, in cibum expetitur.

## Arisarum. CAP. CLX.

### NOMENCLATURA.

Gr. Ἀρίσαρον. Lat. *Arisarum*. Ital.

*Arisaro*. Herba non perinde nota

Gal. offic. & Ger.

**A**risarum exigua herbula est, cuius radix oleæ magnitudinem implet, longè maioris quàm Aro acrimonie: unde illitu nomas sistit. Fiunt collyria ex ea, ad fistulas efficacia. Illitu radice, genitale animalis cuiuscunq; in perniciem agitur.

**F**it ex Aro nota planta mulieribus aqua & lexiuium magni estimanda, queis erugatam & candidam fecum reddant. Siquidem mixtio quam Itala Gerfa vocant, mirum in modum carni splendorem & candorē conciliat. Arisaron Matthiolo ostendit Venetijs Franciscus Pati pharmacopola. Et Aluigus Romanus herbarius hoc in negotio peritissimus, huic sæpius affirmavit se in consiniis Romæ copiosum Arisaron reperiisse.

## Hastula regia. CAP. CLXI.

### NOMENCLATURA.

Gr. Ἀσφοδέλλω. Lat. *Hastula regia*.

Ital. *Amphodillo*. Gal. *Aphrodiles*.

officin. *Aphrodili*.

**H**astula regia vulgaris notitiæ est, folijs maioris Porri: caule læui, ferente in cucumine florem, quem anthericon appellant: radices subiacēt oblongæ, rotundæ, glandibus similes, gustu acres, quæ excalfaciunt. Urinas & menses epotæ ciunt, lateris doloribus, ruptis, conuulsis & tussibus, drachmæ pondere potæ ex uino, medentur. Ea uerò uomitiones adiuuat, ludicri tali magnitudine commanducata: à serpente demorsis datur aptissime

1 5

simè



simè, uerùm trium drachmarum pondere, folijs, floribus & radice ex uino, morsus illinire oportet. Item ulcera sordida & depascentia, mammarum quoque & testium inflammationes, tubercula, furunculosq; decoctis in facie uini bulbis: recentibus inflammationibus ex polenta auxiliatur. Radicis succus adiecto uetere uino dulci, Myrrha & Croco decoquitur, fitq; perquam utile oculis medicamentum: ad purulentas aureis per se, cum Thure, melle, uino & Myrrha tritus, prodest: in contrariam aurem infusus, dentium dolorem mitigat. Cinis è radice illitus, alopecias ad pilum reducit. Oleum in excauatis radicibus igni decoctum illitu exulceratis, perniomibus, & ambustis igni, conducit: surditati, instillatum in aurem, auxiliatur. Candidam uiriliginem, linteo antea præfrictam in sole, illita radix emendat. Semen floresq; in uino poti, scolopendræ & scorpionum uenenis mirum in modum resistunt: aluum purgant.

**V**ulgaris Italiae Asphodelus, & numerosa radice, Liliū conuallium seu Græcorum Hemerocallis non est, cum Asphodelus Pæonia sit radicibus, & Hemerocallis Lilij, quæ nullam cum Pæonia affinitatē habent.

## Bulbus esculentus.


### CAP. CLXII.

#### NOMENCLATURA.

Græ. Βολβὸς ἐσθλῆμος. Lat. *Bulbus esculentus*.  
Ita. Bulbo che si mangia. Gal. Eschalotte.

**E**sculentus Bulbus uulgo cognitus, à nobis estur, stomacho & aluo utilis, rufus, qui & ex Aphrica defertur: amarus uerò & Scillinus, stomacho aptior est, & concoctionem adiuvat. Bulbi omnes acrimoniam habent, excalfaciunt, uenerem stimulant, linguam tonsillasq; exasperant, multum alimēti præbent,



*Bulbus esculentus.*

unguibusq<sup>3</sup>, ex polenta medentur. Iidem calidis cineribus torrefacti, tollunt ficus: item cum cinere e manarum capitibus, impositi. Cremati uerò & cum Alcyonio misti, uitia cutis in facie, atrasq<sup>3</sup> cicatrices in sole illiti, emaculant. Faciunt adrupta, si cū aceto cocti edantur. Sed copiosiore eorum cibo abstinendum, quoniam nervos tentant.

bent, carnes creant, inflationem pariunt, luxatis, fractis, articulorum doloribus efficaciter illinuntur, spicula extrahunt, gangranas & podagras ex melle aut per sese, hydropicorum tumores, & canum morsus cum melle et piperis polline illiti cohibent, sudores compescunt, stomachi dolores mitigant, furfures & ulcera, quæ in capite manant, cum tosto Nitro abstergunt: sugillata uarosq<sup>3</sup> per se aut ex oui luteo, & lentiginibus cum melle uel aceto, emendant: fractis auriculis

*Bulbus vomitorius.*

## CAP. CLXIII.

## NOMENCLATURA.

Græ. Βόλβος ἐμετικός. Lat. *Bulbus vomitorius.*

Ita. Bulbo che fa uomitare.

Bul



**B**ulbus quem uomitorium uocāt, folia habet lentiora multo & longiora, quā Bulbus esculentus: radicem similem, cortice nigro. Ea radix mansa, aut decoctum eius potum, uesica malis medetur: uomitiones mouet.

**Q**uemadmodum qui edendo est Bulbus, & Vomitorius Dioscoridi & veteribus fuisse cognitissimi, a quē hodie recentibus medicis & quotquot rem herbariam tractant, sunt ignotissimi.

**Scilla. CAP. CLXIII.**  
NOMENCLATURA.

Gra. Σκίλλα. Lat. Scilla. Ita. & Off. Squilla.  
Gal. Oignon marin.



Scilla.

quod maximè est medium, direptis uiuotenus tunicis: quod frustatim confectum coquitur, mutata sæpius aqua, donec ipsa nec  
amari



amaritudinem, nec acrimoniam habeat, traiecta q<sup>3</sup> lino frusta  
 siccantur in umbra, ita ut ne ulla quidem parte se contingant.  
 His Scilla segminibus ad oleum, unum, aut acetum scillinum uti  
 mur. Ad rimas pedum, interna pars crudæ Scillæ in oleo feruefa  
 cta, aut cum resina liquefacta, imponitur. Decocta in aceto de-  
 morsis à uipera cataplasma est: ad singulas assæ parteis, adiectis  
 octonis tosti salis: cochlear unum aut alterum damus ieiunis, ad  
 emolliendam aluum. In potu autem & odoratis medicamini-  
 bus, & quibus urinam ciere uolumus, hydropicis q<sup>3</sup> & stoma-  
 chicis, quibus innatat cibus, regio morbo, torminibus, in tussi ue-  
 tere, suspiriosis, & ore reycientibus tres obolos, in delinctu ex  
 Melle sumpsisse satis est. Coquitur cum Melle, & estur eorundē  
 gratia, maxime ut concoctionem adiuvet. Strigmenta per aluū  
 extrahit. Cocta et simili sumpta modo, eosdem præbet effectus.  
 Sed cauedæ Scillæ usus his, qui intestinū sentiūt ulcus. Ad pēsiles  
 uerrucas & perniones, tosta efficaciter illinitur. Tritum semen,  
 & in Garica aut Melle deuoratum, aluum emollit. ~~Scilla minor~~  
~~in aqua scilla minoris, in aqua scilla minoris, in aqua scilla minoris~~

## De Pancratis. CAP. CLXV.

## NOMENCLATURA.

Græ. πᾶνκράτιον. Lat. Pancratium. Ita.

Squilla minore. Gal. Squille bastarde.

Off. Scilla minor.

**P**ancratium, quod aliqui Scillam appellant, radice est ma-  
 gni Bulbi, subrufo colore aut subpurpureo, gustu amaro  
 ac feruente: folijs Lily, sed longioribus. Scillæ uires & præpara-  
 tionem habet, eodemq<sup>3</sup> pondere in morbis efficaciter assumitur:  
 cui tamen mitior quam Scillæ facultas inest. Radicis succus cum  
 Erui farina digeritur in pastillos, qui hydropicis splenicisq<sup>3</sup> cum  
 hydro



hydromelite, commodissimè dantur.

**V**tilis medicinis Scilla, nempe sine qua bona & vera Theriaca confici non possit. Pancratio vti nostro hoc tempore desitum est, atque adeò quidnam sit animaduerti, fieri enim potest vt in Appulia, vbi & Scilla nascatur. Huius planta neglectum parit frequens illis in locis Scyllae prouentus: vt pote quæ candida sit & nigra, quas Pancratij loco substituant. Nostra ætatis medici in cerebri & nervorum infirmitatibus frigidis, Scillam crudam, in minuta frusta concisam, in vas vitreum melle plenum injiciunt, ac tota æstate vase soli exposito, tum summa cum diligentia percolato, morbi caduci remedium faciunt excellentissimū. Alia fuit Galeno operandi ratio.

## Capparis. CAP. CLXVI.

### NOMENCLATURA.

Græ. Καππαρίς. Lat. Capparis. Ita. Capparo.  
Gal. Cappres.

**C**apparis aculeatus frutex est, qui in terra stratus, magis in orbem euagatur: spinas, ut Rubus, habet, in hami modum aduncas: folia mali Coroneæ rotunda: fructum Oleæ similem, qui cum dehiscens panditur, florem candidum promit: quo excusso, nonnihil glandis oblongæ figura inuenitur, quod apertum grana acinis Punicorum similia ostendit, parua, rubicunda: radices lignosas spargit, grandes numerosasq;. Tenui solo, asperisq; locis, in insulis & iuxta rudera nascitur. Caulis & fructus, cibi gratia condiuntur: aluum turbat, stomacho aduersatur, sitim gignit: cocta tamen stomacho quàm cruda utilior est. Fructus drachmis duabus in uino potus, quadraginta diebus, lienem absomit, & urinam cruentumq; excrementum emittit, bibitur utilissimè in coxarum doloribus, & nervorum resolutione, item ruptis & conuulsis: menses ciet, caput purgat. Dentium dolorem sedat semen ex aceto decoctum, colluto inde ore. Aridus



duo radice cortex ad eadem proficit: ulcera omnia uetera, & sordida: & quæ occalluerunt, expurgat: lienosis cum farina hordei illinitur: dente demorsa, dolori eius auxiliatur: cum aceto trita, vitiliginis albas absterget. Radix foliaq; intrita, strumas ac duritias discutit. Aurium uermiculos infusus succus enecat. Aphrica, & præsertim Marmarica Capparis, uehementer inflat. Apula uomitus facit, & quæ à Libyco, & quæ rubro mari defertur, mirum in modum acris est: siquidem in ore pustulas excitat, gingiuasq; osse tenus exest: quare in cibis non ab re damnatur.

**A**lexandrini Cappares, nostratibus magis oculis adblandiuntur, & gustu gratiores sunt. Sale conditi ad nos adferuntur. Eloti sic ut omnis salis sapor abeat, cum paucissimo sint nutrimento, fiunt corporibus cibus & medicina. Siquidem morantem appetitum reuocant, dūq; flegma lateribus stomachi impactum eijciunt, obstructionibus hepatis & lienis profunt, modo præponantur omni cibo acetariorum more, cum oleo et aceto, vel cum oxymelite.

## Lepidium. CAP. CLXVII.

### NOMENCLATURA.

Græ. λεπίδιον. Lat. Lepidium. Ita. Lepidio.  
Gal. & Off. Piperitis.

**L**epidium aliqui Gingidium uocant, herbula uulgo nota: muria cum lacte seruatur. Vis foliorum acris & exulcerans: quapropter ischiadicis trita, præsentissimum est auxilium, si cum Helenij radice, quarta parte horæ, illinatur: lienosis simili modo prodest: lepras eximit. Radix appensa collo, dolore dentium liberare existimatur.

**L**epidium & Iberis una & eadem planta sunt, Matthiolo Dioscoridis Lepidium Italie ignota: Plinij Lepidium, Piperitis, quam uocant, & Piperella.

Ranum



## Ranunculū. CAP. CLXVIII.

## NOMENCLATURA.

Gra. Βάτρυχοι. Lat. *Ranunculus*. Ita. Pie Corui  
no. Gal. Bacines. Off. *Pes corui*.  
Ger. Froschsteffer.



Primum genus Ranunculi.

Secundum genus.

**C**omplura Ranunculi genera, uis tamē omnibus una, acris,  
et uehementer exulcerans. Nam unum Coriandri folijs  
constat, latioribus, subalbidis, pinguibus, flore luteo, interdum  
purpureo: caule gracili, cubitum alto: radice alba, exigua, ama-  
rāque, multis capillamentis, Hellebori modo fibrata: nascitur in  
limitibus humidis. Alterum lanuginosius, longiori caule, plu-  
ribus





\* Prima species.



Secunda species.

ribus foliorum incisuris, plerunque in Sardinia proueniens, quā acerrimum, quod syluestre Apium appellant. Tertium minimum, odore graui, flore aureo. Quartum huic simile, flore lacteo. Folia, flores & cauliculi recentes, illitu exulcerant, & crustas non sine dolore gignunt: quare ungues scabros extricant, scabiem eximunt, stigmata delent, formicantes verrucas, & pensiles aleopeciasq̃, paulisper illita, tollunt. Tepente decocto per niones fouentur. Sicca radix, tritaq̃, sternutamenta ciet, naribus admota: dentium dolorem appensa leuat, ipsos tamen frangit.

**P**lures Ranunculi sunt species, quā hoc capite describat Dioscorides. Omnes sub flammula nomen cadunt. Nimirum id illis nomen indidit ignea, quae eis inest, acrimonia.

Anemone. CAP.

CLXIX.

v

Nomenclatura



## NOMENCLATVRA.

Græ. Ανεμώνη. Lat. &amp;

Ita. Anemone

Gal. Coquelordes. Off.  
Herba venti.

## \* Anemone.

Vo. Anemones genera, Vñ sylvestre, alterum in cultis nascens. Cuius multæ species, una phœniceū florem profert, altera candidantem, aut lacteum, aut purpureum: harum folia Coriandro similia, tenuioribus prope terram diuisuris: caules lanuginosi, tenues, in quibus flores ut Papaueris, & in medio capitula nigra, aut cœrulea: radix oleæ magnitudine, aut amplius paulo grandescit, fermeq; geniculis quibusdā cingitur. Sylvestri amplitudo prorsus maior, latioraq; folia, & duriora: oblongius caput: flore puniceo, tenuibus & multis radicum capillamentis. Acrior est quæ nigra habet folia. Vis utriusque acris: ea de causa succus naribus infusus, purgat caput. Commanducata radix pituitam trahit: decocta in passo & illita, medetur oculorum inflammationibus: cicatrices eorundem & hebetudines emendat, sordida ulcera abstergit. Folia & caules si cum ptisana decocti edantur, copiam lactis præbent, menstrua ciunt, uellere apposita. Illita quoque lepras eximunt. Sunt qui errore ducti, Argemonem nominari Eupatorium putent: quoniam à sylvestri Anemone, Argemonen, &



nem, & Papauer, quod Rhœada appellant (de quo inter Papaueris genera referemus) propter colorum cognationem in floribus, distinguere non possunt. Verum Papauer & Argemone colore minus saturato spectantur, & utraque tardius floret. Quinetiam Argemone croceum succum, gustu admodum acrem, reddit: Rhœas uerò candidorem & acrem. Insuper Anemone & Rhœadi capitula sylvestris Papaueris similia insunt: sed in Anemone superne crassiusculum, in Rhœade subangustius. Anemones genera nec succum remittunt, nec calyces habent, sed quasi Asparagi cacumen. In aruis illa sæpius enascuntur.

**A** Nemone Papaueris sylvestris formam quampiam refert, sed non ideo eadem plantæ sunt. Diuersis enim capitibus de his à Dioscoride tractatum est.

Argemone. C A P.

C L X X.

NOMENCLATURA.

Gr. Ἀργεμόνη. Lat. Argemone. It.

non aliter. Gal. & Off. non bene nota.

**A** rgemone in totum sylvestri Papaueri similis est: folia habet Anemones, diuisa: florem puniceum: caput in cauliculo Papaueris Rhœadis, oblongius, & summis partibus latum: radicem rotundam, succum croci colore, acrem, dimittit. Argemone & nubeculas expurgat. Folia illitu inflammationes compescunt.

**A** rgemone nullo non loco in cæpestribus Thuscie nascitur, cum his ipsis notis quas ei attribuit Dioscorides. Quæ medicorum & spectiariorum ignorantia est, qui hæcenus Argemones loco Eupatorium usurparunt, quod Agrimoniam vocant.

v 2

Anag



## Anagallis. CLXXI.

## NOMENCLATURA.

Græ. ἀνάγallis. Lat. Anagallis. Ita.  
 Anagallide. Gal. Morgelline. Off.  
 Morsus gallinæ.



Anagallis mas.

Fœmina.

**D**uo Anagallidis genera, quæ tantum flore distāt. Nam  
 quæ cæruleo flore est, fœmina dicitur: mas quæ phæniceo  
 Frutices sunt parui, in terra iacentes, folijs in quadrangulo cau-  
 le pusillis, subrotundis, ad Helxinæ folia accedentibus: semine ro-  
 tundo. Vtraque mitigandi uim habet, inflammationem arcet,  
 adactos corpori aculeos extrahit, nomas cohibet. Succus caput  
 gargarizatu purgat, & naribus infusus, dolorem dentium le-  
 nit,



nit, si in aduersam narem injiciatur: argema cum melle Attico emendat, retusa oculorum aciei auxiliatur. Contra uiperarum morsus, iocinoris & renum uitia, si ex uino bibatur, prodest. Tradunt eam, quæ cœruleum edit florem, prociduum sedem reprimere: quæ uerò phœniceum, illitu euocare.

**A** Nagallis qui & Morsus Gallinæ, mas & fœmina nota sunt, sub classẽ tamen auricula muris nõ cadunt, nec cum ea confundẽda.

## Hedera. C A P.

## CLXXII.

## NOMENCLATURA.



Hedera nigra.

Helix.

Græ. Κίσσος. Lat. Hedera. Itidem It.

Gal. Lierre.

γ 3

Hedera



**H**edera differentias multas in specie sortitur, summas autem genere treis. Nam quædam candida est, altera nigra, tertia helix. Candida, fructum fert candidum, Nigra, nigrum, aut Croci æmulum, quam vulgus Dionisiam uocat. Helix fructum non gignit, sed albas habet uiticulas, & folia parua, angulosa, & concinniora. Hedera omnis acris est, & adstringens, nervos tentat. Flos trium digitorum carptu, facit ad dysentëricos, in uino bis die potus: ambustus cum ceratò tritus illinitur. Recentia folia ex aceto cocta, aut cruda cum pane detrita, lienes sanant. Foliorum & corymborum succus, cum Irino unguento, Melle aut Nitro, naribus infunditur: & contra ueteres capitis dolores, caput eo cum aceto & Rosaceo perfundi utile est: purulentis auribus, aut dolentibus, cum oleo medetur. Nigra Hedera succus, aut epoti corymbi, corpus infirmant, mentemq; turbant largius sumpti. Acini quinque triti, calfactique in Punici mali cortice cum Rosaceo, si instillentur à contraria aure, dolorem dentium mitigant: denigrant capillum, illiti corymbi. Folia in uino decocta, illinuntur omnium ulcerum generi, etiam si cacoëthe sint: uitia cutis in facie & ambusta sanant, uti antea diximus, decocta: mouent menses triti & subditi corymbi. Idem poti, post purgationes sæminarum, drachmæ pondere, concipiendi spem adimunt. Pediculus foliorum Melle irrigatus, ac uulua inditus, menstrua & partus extrahit. Instillatus succus putrida tedia narium, graueolentiamq; emendat, & sanitati restituit. Lachryma Hedera Psilothrum est: illitu pediculos enecat. Succus radicum in aceto potus, contra phalangia prodest.

Hedera nota est, & eius vires abundè describit Dioscorides.

Chelidonium. CAP.

CLXXIII.

Momenclæ



## NOMENCLATURA.

Græ. χελιδωνιον μεγα. La. *Chelidonium*  
*maius*. Ita. *C helidonia*. Id nomen  
 etiam off. Gal.  
 Esclere.



*Chelidonium.*

**C** *Helidoniū maius*, cau-  
 le est gracili, cubitali  
 aut altiore, adnatis foliosis:  
 folijs *Ranunculi*, multis, mol-  
 lioribus tamen, & colore  
 cæsis: flore *Viola* albæ, secun-  
 dum singula folia prodeunte:  
 in eo succus *Croci* mordax,  
 acris, & aliquantulum sub-  
 amarus, grauiter olens: ra-  
 dix superne singularis, infer-  
 ne in multa crocea cappilla-  
 menta fibratur: siliqua, cen-  
 corniculati *Papaueris*, tenuis,  
 in metæ figuram longa: in  
 qua semen *Papauere maius*  
 recluditur. Succus in æreo

uase, cum *Melle prunis* decoctus, oculis claritatem adfert. Fo-  
 lijs, caule, radice, succus exprimitur ineunte æstate, & sic-  
 catus in umbra digeritur in pastillos. Radix cum *Aniso* & ui-  
 no albo pota, medetur regio morbo, ulceribus quæ serpunt: im-  
 posita cum uino aut manducata, dentium dolorem sedat. Hoc  
 nomē sibi uidetur uēdicasse, quod aduentu hirūdinū exoriatur,

v

4

&amp; discessu



Et discessu emarcescat. Sunt qui narrant, hirundines matres ex cecatis pullis, admota herba visum restituere.

## Chelidonium minus. C A P.

### CLXXIIII.

#### NOMENCLATURA.

Gr. Χελιδόνιον μικρόν. Lat. Chelidonium minus. Ita. Fauescelo. Gal. La petite Esclere.

Offic. Scrofularia minor.

**C**helidonium minus, quod Triticū sylvestre aliqui uuncu parunt, herbula pediculis ab radice pendens, sine caule: folijs Herderæ, multo rotundioribus & minoribus, teneris, & subpinguibus: radices habet ex eodem callo complures, pusillas, in granorum Triticum modum acervatim congestas: quarum tres aut quatuor in longitudinem exeunt. Iuxta aquas & lacus nascitur. Vis ei acris, & Anemones modo, summā cutem exulcerat, psoras & scabros unguis eximit. Succus radicibus expressus ad purgandum caput, naribus infunditur. Decoctum eius cum melle gargarizatum, magnificè id præstat, & omnia pectoris vitia extrahit.

**C**helidonium quod sub aduentum hirundinum erumpat, & quod ea hirundines deperditum pullis visum restituant, nomen accepit. Maius Chelidonium ubique nascitur, & notum est. Minus locis aquaticis provenit. Mira huius in sanandis scrofulis virtus, Scrofulariæ nomen imposuit.

## Othonna. C A P. CLXXV.

#### NOMENCLATURA.

Gr. Ὀθοννα. Lat. & Ital. Othonna. Res nobis & Officinis non comperta.

**O**thonnam aliqui maioris Chelidoniæ succum esse aiunt: quidam Glaucij. Alij succum floribus corniculati Papæ



ueris expressum. Alij permistos cœruleæ Anagallidis, Hyoscyami, & Papaueris succos, esse contendunt. Alij Troglodytica cuiusdam herbe succum, quæ Othonna uocatur, nasci quædam in eo Arabiæ tractu, qui ad Aegyptum spectat. Othonna folijs Erucae, perforatis cribri modo, & ueluti à tineâ derosis, squalore obfitis, paucis: flore Croci, latifolio, quare quidam Anemones speciem esse putauerunt. Extractus succus oculorum medicamentis adijcitur, ubi expurgare est opus. Mordet enim & abstergit omnem caliginem, quæ oculis offunditur. Tradunt humorem quendam ex herba emanare, qui elotus, semotis calculis, in pastillos ad eadem digeritur. Aliqui tamen affirmant, lapidem esse Aegyptium, in Thebaide nascentem, exigua magnitudine, aereo colore, gustu cum feruore quodâ & adstrictione mordaci.



Auricula muris.

O Othonna non minus antiquis fuit incognita, quam nunc est nobis.

Auricula muris.

CAP. CLX.

XVI.

NOMENCLATVRA.

Græ. Μυὸς ὤτια. Lat.

Auricula muris. Ital.

Orecchia di topo. Galice

Mourron.

γ δ

Muris



**M**uris auricula, quam *Myosotida* uocant, herba est caulibus pluribus, ab una radice, aliquatenus ab imo rubentibus, & concavis: folijs angustis, oblongis, dorso acuto, elato, nigricantibus, per intervalla assidue geminatis, atque in mucronem desinentibus, & tenuibus cauliculis ex alarum sinu prodeuntibus: flore, ut *Anagallidis*, cœruleo: radix digitali crassitudine, multis capillamentis fibrata. Radix illita ægilopia sanat. Sunt qui *Alsinen*, muris auriculam uocitent.

**E**xemplariorum varietas hic probè à doctis viris distincta est, & nullibi non nascitur Auricula muris, & perinde à peritis noscitur.

## Glastum. CAP. CLXXVII.

### NOMENCLATURA.

Græ. ἰσῆσις. Lat. *Glastum*. Ita. *Guado*.  
Gal. *Guesde*. Off. *Indicum*.

**S**atium *Glastum*, quo insectores lanarum utuntur, folium habet *Plantagini* simile, uerum pinguius nigriusq̃, cuius caulis duum cubitorum altitudinem excedit. Illita folia tumores omnes discutiunt, cruenta uulnera glutinant, sanguinis profluvia sistunt, ignem sacrum, phagedænas, putrescentia ulcera, & quæ serpunt, sanant. Sylvestre *Glastum* satiuo simile est. Folia fert maiora, lactucaceis proxima, caules prætenues multifidos, quadantenus rubentes: in quorum cacumine folliculi multi dependent, quandam linguarum effigiem referentes, in quibus semen, flore tenui, luteo. Eadem quæ & suprà dicta præstat: potu & illitu lienosis auxiliatur.

Isa





sylvestre Glastum.

Glastum.

**I**satis satina Gallia cognita Narbonensi, & alijs Galliarum tractibus (Nam sylvestris sola cultura ab alia differt) viuos in tingendis lanis colores omnes quibus miscetur asseruat. Quid in medicina possit Dioscorides & Galenus expediunt.

## Telephiũ. CAP. CLXXVIII.

## NOMENCLATURA.

Græ. Τηλεφίου. Lat. Telephium. Ita. Fava grassa.  
Gal. La petite loubarbe. Off. Illecebra minor.

**T**elephium herba Portulacæ similis & caule & folijs, habens gemina tubercula, à singulis radicum geniculis enascentia: à quibus rami seni septennue fruticant, à radice refertis

cæru





\*Telephium album.



Purpurascens.

cæruleis folijs, crassis, lentis, carnosis: flore luteo, aut candido. Nascitur, & locis cultis uere inter uites. Folia senis horis illita albam uiriliginem sanant: sed postea hordeacea farina illini debet: perunctam ex aceto etiam in sole uiriliginem tollunt: sed ubi inaruerunt, absterguntur.

**T**elephium quidam esse putant, quam fabam inuersam seu fabam crassam, herbarij vocant, cum tamen gustui nullam representet qualitatem, qua siccum & abstersorium indicari possit, quod in Telephio requirit Galenus, & folia Portulaca longè maiora producat, his rationibus Fabariam non esse Telephium contendunt. Hoc, si ita est, nobis ignotum istud erit Telephium. Siquidem quod in Αἰζοι minoris capite lib. 4. recenset, diuersum ab isto est.

Finis Libri Secundi.



# PEDANI DIO

SCORIDIS ANAZAR-

bei de medicinali materia, Li-

ber tertius, Ioanne Ruel-

lio Suefsionensi

interprete.

*Ad puncta annotationes doctæ & com-  
pendiosæ.*

## PRAEFATIO.



VPERIORIBVS, charissime Aree,  
commentarijs, tradidimus de aromatibus, un-  
guentis, oleis, arboribus, earum fructibus &  
lachrymis: ite de animalibus, cerealibus, ole-  
raceis, & herbis acrimonia præditis. In hoc  
autem tertio radices, succos, semina, herbas, & quæ uerna-  
cula & inter se cognata censentur, quæq; pluribus scatent reme-  
dijs, prosequemur.

Agaricum.

CAP. I.

## NOMENCLATURA.

Græ. Αραγινοϋ. Lat. & Off. Agaricum. Ita.

Agarico. Gal. Agaric.

**A**garicum radix fertur Laserpitij similis, sed facie summa  
solutior, & rariore, fungosoq; tota contextu. Duo eius  
genera: scæmina, quæ præfertur, rectis intus uenarû discursibus  
constat





Agaricum.

constat. mas rotundus est, et undique compactior. Viri- gustus in initio dulcis, mox in amaritudinē transit. Gignitur in Sarmatia regione, quæ Agaria dicitur. Sunt qui radicem esse plantæ affirmant: alij ut fungos nasci in arborum caudicibus, quadā putredine: Gignitur in Galatia Asia, & Cilicia, in Cedris, sed friabile & infirmū. Adstringendi calfaciendiq; naturam habet. Efficax est contra tormina, cruditates, & rupta: prodest itidem cōtusis, & ab alto deuolutis: datur duobus obolis in uino

mulso, febrim non sentientibus: febriculosis uero, in aqua mulsa. Arquatis quoque, suspiriosis, iocinoris renumq; uitio laborantibus, dysentericis: item si urina agrē reddatur, si uulua strangu- latus urgeat, si pallor membra decoloret, drachma una dari so- let: si tabes infestat, ex passo: si lien negocium exhibet, ex aceto mulso: si dissolutio stomachi est, ita ut cibi tenax non sit, mandi- tur, & sine ulla humoris sorbitione deuoratur: simili modo aci- da ructantibus propinatur. Sanguinis reiectiones sistit, tribus obolis ex aqua sumptum. Facit ad coxendicum, & articularū dolores, & comitiales morbos, si cum aceto mulso, pari pondere assumatur: menses ciet, fœminis quas inflatio uulua uexat, utili- ter æquali modo datur: horrores soluit datum ante febrim ac- cessio



cessiones: aluum purgat drachma una aut altera, si cum aqua mulsa bibatur. Venenorum antidotum est denarij instar, cum diluta potione sumptum: si serpentes ictum uibrarunt, morsumq; subfixerunt, tribus obolis ex uino potum mire auxiliatur. In summa, internis omnibus uitijs conuenit, pro uiribus & etate datum, nunc ex aqua, nunc ex uino, ijs ex aceto mulso, alijs ex aqua mulsa.

**A**garicum Fungi genus, non in Larice tantum prouenit, sed in omnibus etiam glandiferis arboribus. Aerea & Terrea substantia est, quam caliditas exilem reddiderit.

## Rhaponticum. CAP. II.

### NOMENCLATURA.

Græ. Ρῶ. Lat. Rha ponticum. Ita. Rhapontico.  
off. & Gal. ignotum.

**R**Ha, aliqui Rheum, latini Rhaponticum uocant, prouenit in ijs quæ supra Bosphorum sunt regionibus, ex quibus affertur. Radix nigra, Centaurio magno similis, sed minor & rufior, fungosa, aliquantum leuis, sine odore. Optimum habetur, quod teredines non sensit, si gustatu cum remissa adstrictione lente scat, manducatumq; colorem reddat pallidum, aut ad Crocum inclinantem. Id epotum facit ad inflationes, stomachi imbecillitatem, & omne genus dolores, ad conuulsa, lienosos, hepaticos, tormina, ad renum, uesicæ, & pectoris uitia: aduersus intentæ præcordia, & uulua mala, coxendicum dolores, sanguinis excreationes, suspiria, singultus, dysenterias, & cæliacorum affectus, contra febrium circuitus, & uenenatorum morsus. Datur in singulis ualetudinibus eodem quo Agaricum potere, & cum eisdem liquoribus: si febris careant, in mulso: sin aliter, ex aqua mulsa: si tabem experiuntur, ex passo: si lienis exercet, in aceto mulso, si dissolutio est stomachi, id est, cum cibi  
tenax



tenax non est, manditur, & sine sorbitione ulla deuoratur: li-  
uentia lichenasq; tollit, cum aceto illitum: inflammationes om-  
neis ueteres ex aqua oblutum dissipat: summa eius uis adstrin-  
gens, cum aliquanto calore.

**R**haponticum, quod Rheupoticum officina vocant, à Rha Ponti  
fluuio cuius in ripis copiosè nascitur, nomen sortitum est. Paucis  
ab hinc annis cepit verum asportari, superiori siquidem tempore Rha-  
pontici loco, Centaurea maioris radix usurpata est, quod etiamnum ho-  
die fit, à medicis & spetiarijs quibus nondum veri Rhapontici noticia  
patuit. Alius itidem probatæ fidei & doctrinæ medicos error incescit,  
qui putarint (nempe ob non adhuc visum suo tempore Rhaponticum)  
• Rheubarbarum, Dioscoridis esse Rhaponticum. Quo viso à pristina di-  
scessere sententia. E quorum numero eximius ille & singularis eruditio-  
nis medicus Manardus extitit, quemadmodum eius epistola 6. lib. secun-  
da: & 5. vltima testantur. Matthiolus ipse Venetys non rarò verum  
Rhaponticum coemit, nihil à Dioscoridis deliniatione dissidens. A tenim  
cum Galenus & veteres Græci nullam Rheubarbari nostri (illis incogni-  
ti) rationem habuerint, Arabes confusane Rheubarbarum, ipso nomi-  
ne & viribus cum Rhapontico confundunt. Eò fit vt in eis legendis ad-  
hibenda sit cautio, nullibique non perpendendum, qua de re, & Græcis  
ne perspecta, scribant. Rheubarbarum nostrum Paulus agnouit, 7. lib.  
22. cap. in compositionibus, Diacorallion, Antidoti Agapeti, & Antido-  
ti Atactos: sed per nebulam, siquidem id solutiuum facit, nec aliud a  
Rhapontico existimat. Nam primi libri. 43. ca. cum dicit Terebinthinā  
Faba magnitudine dormituri exhibitam, corpus soluere, quod si am-  
plius laxandum est, pauxillum adijciendum è radice Pontica, per eam  
Rheubarbarum solutiuum intelligens. A tenim eorum opinionem qui  
præfractè idem esse Rheubarbarum & Rhaponticum contendunt, nec  
aliò distare, quam Pontici cœli ratione, quod Aquilonare, odorem in  
Rhapontico aufert, qui in Rheubarbaro gratus percipitur, ita infri-  
git Matthiolus. Si ita res habet, planta natura odorifera, quæ in Se-  
ptentrione peraeque vt in Oriente & Meridie proueniunt, nullum Se-  
ptentrionalibus spirarint odorem. Quod sanè falsum est. Nam et si eius-  
modi plantæ, quæ in Septentrione nascuntur, ob climatis frigiditatem  
imbecillius & remissius aspirent, & vigeant, non tamen intantum suis  
dotibus à frigore nudantur, vt in totum earum & noticia & vsus eua-  
nescant, alioqui regionum frigiditas vniuersam earum qualitatem ab-  
sumeret, immutaret species, nec quæ essent agnoscerentur. Spica Celtica  
quæ



quæ è Germania adfertur: Acorus, quo hodie pro Calamo odorato vtuntur, & è Lituania, Tartaria, & Ponto exportatur, viuum quidem illum & manifestum odorem, quæ Ligustica vel Istrica Spica Celtica, aut Acorus Orientalis non aspirant, ab illo tamen quodam suo & naturali odore non depereunt. Qui fit vt Rhaponticum non ob regionis frigus, sed quod a Rheubarbaro diuersa planta sit, odore priuetur. Accidit ad hæc radice in istarum dispar facultas. Soluit Rheubarbarum, densum est substantia, colore est admodum croceo, gustu amaro & desiccante, ponderosum. At Rhaponticum nullo est odore, corpus stringit, tantum abest vt soluat, nec amarum, nec aridum, at mucilaginosum: graue non est, sed leuissimum. Rhaponticum temperatura est mixta è frigido & terrestri, cui quippiam caliditatis adiunctum est, & quæ de aerea & subtili substantia participet. Astringitorium esse ostendit iuuamen præstitum sputo sanguinis, fluxibus stomachalibus & dysentericis. Rheubarbari nota & vires à Mesue petendæ, nã hic ea persequi de quibus auctor non tractarit, in animo non est.

## Gentiana. CAP. III.

## NOMENCLATURA.

Græ. γέντιανη. Lat. Ita. Off. Gentiana.

Gal. Gentianne. Ger. Acreutzdorn

**I**nuentio Gentiana prima assignatur Gentio Illyriorum regi, a quo cognomentum habuit. Folijs partim proximè radicem, iuglandi Plantagine similibus, subrubris, partim à medio caule, & præsertim iuxta cacumen, paulum dissectis: caule cauo, & leui, digiti crassitudine, geniculato, & ex interuallis maioribus foliato, binum sæpe cubitorum: semine in calycibus lato sine pondere, acetoso, satis ad sphondylii semen accedente: radice longa Aristolochiæ, crassa, amara. Nasitur in sublimibus montium iugis, umbrosis locis, aquosisq;. Vis radice excofactoria, & adstringens: contra morsus serpentium, duabus drachmis, cum Pipere, Ruta & uino pota, auxiliatur. Extra-cti succi drachma, laterum doloribus, & ex sublimi deturba-

x

tis,





Gentiana

Gentiana species

tis, ruptis & conuulsis, prodest: hepaticis & stomachicis, pot a cum aqua subuenit. Radix collyrij modo subdita, partus eijcit: imposita, ut Lycium, uulneraria est, & ulcerum cuniculatim depascentium medela. Succus præcipue eodem effectu prodest, oculis inflammatione laborantibus illinitur: pro Meconio collyrijs acribus immiscetur. Radix uutiliginem absterget. Succu extrahendi ratio hæc est: Contusa radix quinq; diebus aqua maceratur: postea in eadem tantisper decoquitur, dum extent radices: & ubi refrixit aqua, linteo excolatur: mox discoquitur, dum mellis crassitudo fiat, fictiliq; reconditur.

**G**entiana planta vulgaris notitiæ. Hæc temperatioribus Gallie locis nascitur, & altioribus iuxta Tridentum montibus, è queis valli Anania adiacentibus radices extrahuntur, hominis brachio crass



crassiores. Ex his radicibus per balneum Mariæ (quod vocant) aqua elicitur, quæ miro quopiam genio febres sanat, quæ ab oppilatione procedant, vermes in puerorum corporibus conficit, cunctasque faciei maculas, si ea colluatur, abstergit. Cruciata non ignota herbarijs, altera esse potest Gentianæ species. Valet in pestem & venena, demorsus & punctiones venenatorum animalium. Emplastri modo illita, puerorum corpori vermes occidit, & scrofulas sanat superposita.

## Aristolochia. CAP. IIII.

### NOMENCLATURA.


Græ. Αρισολοχία. Lat. Aristolochia. Ita. & Offici.  
Aristologia. Gal. Aristologie.

**A**ristolochia nomē ex eo sibi adoptauit, quod existimetur optime puerperis opitulari. Tria eius genera traduntur. Rotunda, quæ fœmina vocatur, folijs hederaceis, præstanti odore, cum acrimonia, mollibus, subrotundis, multis ab una radice germinibus, prælongisq; palmitibus, floribus candidis, pilei similitudine, in quibus quod rubrum est, grauius olet. Longa, mascula appellatur, nonnullis Dactylis, longiore quàm rotunda folio, tenuibus ramulis, dodrantalibus: flore purpureo, grauius olente, qui marcescens in Pyri similitudinem turbinatur. Radix rotunda, in orbem conglobata, Rapi modo. Longa uerò radix digiti crassitudinem, & dodrantis longitudinem implet, nonnunquam paulo maiorem. Ambæ colore intus buxæo, gustu amaro & graui. Est etiamnum tertia longa, quæ Clematidis vocatur, ramulos habēs tenuēs, refertos folijs subrotundis minori Semperuino similibus: flores Rutæ: radices longiores, tenuēs, crasso cortice odoratoq; uestitas, priuatim unguentorum spissamentis conuenientes. Rotunda cæteris uenenis resistit.

x 2

Lon



*Aristolochia longa.**Aristolochia rotunda uera.*


Longa uerò aduersus angues & uenena, drachmæ pondere ex uino bibitur, & illinitur. Pota cum Pipere & Myrrha, menses, partus, & omnia uuluarum onera eicit: eadem efficit subdita in pello. Rotunda ad eadem pollet: in super singultibus, suspirijs, horroribus, lieni, conuulsis, laterum doloribus, pota cum aqua, singulariter auxiliatur: aculeos & spicula extrahit: ossium squamas illitu adimit: ulcera putrida exest, & sordida expurgat, caua cum Iri & melle explet: gingiuas & dentes extergit. Clematidis ad eadem pollere creditur, uiribus tamen inferior est.

Arist



**A**ristolochia, longa, & rotunda Matthiolo in Italia notissima, quantumvis copiosior in Goritiano comitatu notanda reperitur. Ibidem longa & rotunda à flore fructum emittunt cauli viridi incumbentem, nuci viridi immatura ad similem, pari in ambabus forma, nisi quod longa, longior est: & rotunda, magis orbiculatus. Clematis Aristolochia folijs Semperuiui minoris, & Ruta floribus, eidem apud recentes medicos non est vsitata, quandoquidem nullus est qui eam in Italia ostendat. Hanc tamē valerius Cordus simpliciter lōgam, vocari scribit. nempè radice, sarmenti vitis, more, longissima. Mirum si Cordo validum & in solidum pene sententiam è germanicis nominibus asserenti, tres Aristolochia species patuerint, & vna (nempè Clematis) Matthiolum perspicacem & sedulum hominem, præter hæc & Italum, la-  
tuerit.

Dulcis radix. CAP. V.  
NOMENCLATURA.



Dulcis radix.

Græ. γλυκύριζα.  
Lat. Dulcis radix.  
Ita. Rogolitia.

Gal. Raygalisse.  
Ger. Pechkritz.

**D**ulcis radix plurima  
gignitur in Cappa-  
docia & Ponto: fruticosa  
est, ramis binum cubitorum  
altitudine assurgentibus: fo-  
lijs Lentisci, densis, pingui-  
bus, tactuq<sub>3</sub> gummosis: flore  
x 3 Hyac



*Hyacinthi: fructu pilularum Platani magnitudinis, asperiore, qui siliquas Lentium modo habet rufas & paruas: radicibus longis, ut Gentianæ, coloris buxæ, subacerbis & dulcibus, quæ densantur in succum, Lycij exemplo. Is in arteriæ scabritia efficax habetur: uerum oportet ut lingua subditus eliquescat. Aestuanti stomacho, thoraci, ac iocinori conuenit: sanat uesicæ scabiem, & renum dolores, cum passo potus. Idem eliquatus sitim sedat. Vulneribus illitus accommodatur: commanducatus ori prodest: recentis radice decoctum ad eadem conuenit. Eiusdem farina pterygijs commodissime inspargitur.*

**D** Vlcis radice viua planta, quæ multis in locis hodie feritur, manifestus fit error Plinij, qui Glycirrhizæ, echinatis, seu aculeatis folijs prodidit, falsus literarum in corrupto Dioscoridis codice metatthesi, mutato. σ in ι. qui legerit ξιϖω, pro σιϖω, quo Lentiscum signauit Dioscorides, cuius folijs similia sunt Glycirrhizæ folia.

## Centaurium magnum.

### CAP. VI.

#### NOMENCLATURA.

*Græ. Κενταύριον μέγα. Lat. Centaurium magnum.*

*Ita. Centaurea maggiore. Gal. erronee, Reupontic.*

*Off. perperam, Rheu ponticum.*

**C**entaurium magnum folia habet iuglandis, oblonga, viridi Brassicarum colore, serrata in ambitu: caulem, ceu Rumicis, binum aut ternum cubitorum, multis ab radice adnatis, in quibus capita, ceu Papauerum, in rotunditate oblonga: flos cæruleus: semen Cnico simile, ceu laneis floccis quibusdam inuolutum: radix crassa, grauis, solida, tripedalis, succo prægnans, cum adstrictione aliqua & dulcedine acris, & rubescens. Amat solum pingue & apricum, ac syluas & colles. Copiosissima est in Lycia & Peloponneso, in Archadia, Helide & Messe



Messenia, pluribusq; locis circa Pholoen, Lyciā, & Smyrnam. Radix conuenit ruptis, conuulsis, pleuriticis, spirandi difficultati, ueteri tussi: sanguinem expuentibus, drachmis duabus tritatur, si febris sit, in aqua: ceteris, in uino. Item ad tormina, & uulua dolores. Ramenta eius in collyrij formam uulua subdita, menses atque partus extrahunt: succus eadem præstat: uulneribus prodest: nam recens tusa, aut arida antè madefacta, ea glutinat & coniungit. Carnes coalescunt, si tusa simul decoquatur. In Lycia succum exprimunt, quo pro Lycio utuntur.

**C**entaurium maius, nihil plane aliud est, quā illustris illa radix, quam antiqui erroris sectarij, Rheuponticum vocant. Nascitur Centaurium maius in monte Apuliæ Gargano (S. Angeli vocitant) cum notis omnibus quas ei attribuit Dioscorides. Prouenit & in monte Baldo, supra Lacum quem vulgo Garda vocant, verum non æquē ut in Apulia maturescit. Cauendum tamen est, ne huius loco accipiat, planta caule cubitum alto, è quo bina per ordinem folia procedunt, supra viridia, subter candicantia, salicinis similia, flore uiuido & rubro, quod totum à Dioscoridis Centaurio maiore alienum est, & Lysimachiae conuenientibus. Confundunt maius & minus Centaurium Mesue & Auicenna, ideo cum iudicio legendi. Et per æquē Serapium, qui minoris virtutes maiori attribuit. Plinius utrasque plantas dulces simul & amaras facit, cum amaritudo solius sit Centaurij minoris.

## Centaurium minus. CAP. VII.

### NOMENCLATURA.

Græ. Κενταύριον μίνον. Lat. Centaurium minus.

Ita. Biondella. Gal. Fiel de terre. Off. Latinum nomen seruetur. Ger. Aurin.

**C**entaurium, Limneson aliqui uocauere, quoniam rigua amet loca: herba Origani aut Hyperici similis, caule anguloso, palmum excedente: flore Lichnidis, è puniceo in purpuram uergente: folijs Rutæ, prælongis & paruis: fructu tritico simili: radice pusilla, leui, & supernacua, quæ gustanti amaritudinem adfert. Herba recens tusa, suo illitu





Centaurium minus.

uulnera conglutinat: uetera  
ulcera purgat, & cicatrice  
obducit, bilem crassosq; hu-  
mores per aluum exigit, si de  
cocta deuoretur: Ius deco-  
cti ischiadicis conuenientissi-  
me infunditur: trahit enim  
sanguinem & dolorem le-  
uat. Succus oculorum medi-  
camentis perquam utilis: si-  
quidem cum melle caliginem  
oculorum expurgat: in uelle-  
re appositus, menses & par-  
tus extrahit: epotus peculiari-  
ter neruorum uitij succurrit.  
Succi extrahendi ratio: Legi-  
tur herba semine prægnans,  
& diebus quinque made-

facta, decoquitur donec superemineat aqua: mox ubi refri-  
xit, linteolo exprimitur, & eiecta herba, iterum decoqui-  
tur, usque dum mellis crassitudinem habeat. Nonnulli eam re-  
centem grauidamq; contundunt, atque succum fictili non picato  
exprimunt, & in sole, lignea rude assidue mouentes, inspissant:  
quod si quid concretum faucibus uasis adhærescat, deradunt,  
reliquoq; humori permiscent: noctu diligenter operiunt, namq;  
ros nocturnus liquores coalescere non sinit. Quæ autem siccis ra-  
dicibus aut herbis liquameta exprimuntur, decocta, ut in Gen-  
tiana mentione retulimus, præparantur, sed quæ ex corticibus  
humidis, aut contusis herbis factitantur, in sole, uti antè dictum  
est, coguntur: sic è Thapsia: sic è Mandragora, reliquisq; simili-  
bus succus: sic ex acerbis uinis melligo elicitur. Lycium tamen,

¶



& Absinthium, Hypocistis & consimilia, decocta, eo quo dimus modo, coguntur.

**C**entaurium minus, Biondella Italis dicitur, quod eius decoctio foeminarum flavescentes reddat capillos. De hac Papiæ peculiare tractatum scripsit Galenus. hoc corpus laxat, non maius, ut Arabum seclarij somniant.

## Chamæleon albus. CAP.

### VIII.

#### NOMENCLATURA.

Græ. χαμαιλέων λευκός. Lat. & Off. Chamæleon albus. Ita. Carlina.

Gal. Carline.

**C**hamæleon albus Ixia ideo aliquibus uocatur, quod quibusdā in locis uiscum circa radicem eius inueniatur, quo pro Mastiche utuntur mulieres. Folia habet Silybo aut Carduo similia, asperiora, acutiora, nigroq. Chamæleone ualidiora: caulem non promit, uerum ex medio spinas, echini marini, aut Cinaræ modo, erigit: flores purpureos, ueluti papporum lanugines emittit: semē Cnici simile: radicem in latis collibus crassam, in montosis uerò graciliorem, in profundo albam aliquatenus aromaticam, graui odore, dulcem. Quæ pota acetabuli mensura, latus interaneorum tineas pellit, Bibitur autem in uino austero, cum Origani feruesacti succo: hydropicis commodissime drachma in uino datur, etenim eos extenuat. Contra difficultatem urinae decoctum propinatur. Hausta in uino, serpentium uenenis resistit: occidit canes & sues: mures item necat, subacta cū polenta aut aqua, & oleo madefacta.

**C**hamæleonem album Carlinam Itali uocant, quod Carolo magno (ut aiunt) in pestis remedium ostensa sit, quæ causa est, ut quibusdam in id pernitiei summopere ualere credatur. Quidā Marianum Carduum autumnant, sed falso. Siquidē destituitur Chamæleon

x

5

albus



*albus, hic sua proceritate hominem non raro superat, praterea nullo sensili odore, qui in Chamæleone grauis est.*

## Chamæleon niger.


### CAP. IX.

#### NOMENCLATURA.

*Græ. χαμαιλέων μελας. Lat. Chamæleon niger.*

*Ita. Chameleone nero.*

*Gal. Chardonnette. Off. Cardopatium.*



*Chamæleon niger.*

*Hamæleon niger, folijs Scolymo similis esset, nisi minora, tenuioraq, ac rubro distincta uiderentur: caulem emittit dodrantalem, crassitudine digitali, subrubrum: & in umbella flores spinosos, tenues, Hyacinthi æmulos, uersicolores, radice crassa, nigra, densa, interdum exesa, quæ desecta flauescit, commanducata mordet. Prouenit in campestribus, siccis: & cliuosis tractibus, & maritimis. Radix trita, addito attramenti sutoriij exiguo, cedrino oleo, & axungia, scabiem abigit. Eadem, cum sibi sulphur & bitum*



bitumen asciuit, & cocta in aceto illinitur, impetigines absterget. Decoctum collutione dentium dolorem mitigat. Cum pari Pipere & cera oblita radix, dolenti denti auxiliatur: radice concisa, & in aceto decocta, dentes fouentur: eos quoque frangit, si scriptorio stylo feruens admoueatur. Vitia cutis in facie, uiliginesq; cum sulphure emendat: erodentibus medicamentis admiscetur: phagedenas, tretraq; ulcera illitu sanat. Quare Chamaleo uocetur, a uarietate foliorum euenit: mutant enim cū terrā colorē: hic uiridia, illic albicantia, aliubi cærulea, nonnusquam rubra inueniuntur.

**C**hamaleon niger per totam Italiam reperitur & in montibus & collibus vallis Anania, cum notis omnibus quas ei assignat Dioscorides. Si Galeno credimus, Chamaleon hic niger esui, potuiue in medicina offerri non debet, siquidem mortiferum quippiam eius radicem habere existimat. Probè miscetur medicinis quæ digerunt & emolliunt. Calidus est secundo ordine, siccus tertio, Arabum sectarij Chamaleon cum Chamalea (hæc Mezereon est) confundūt. Ixia nō in Chamaleonte tantum albo, sed etiam in nigro reperitur, quod in Candia clarescit, ubi plurima in utroque ad arcum vsus colligitur, ceterum mortiferum esui venenum.

## Crocodilium. CAP. X.

### NOMENCLATURA.

Græ. Κροκοδείλιον. Lat. Crocodilion.

Ita. Crocodilio.

Gal. Falso, Carline.

**C**rocodilion Chamaleonis nigri figurā habet. Nascitur in syluosis, radice longa, læui, aliquantum lata, odore, ut Nasturtij, acuto. Feruescēta in aqua & pota radix, sanguinē copiosum per nareis pellit. Dat lienosis, eos euidenter adiuuas. Semē ei rotundū inest, duplex uti scutum, quod suapte uiurinam ciet.

**C**rocodiliū licet aliqui cū Chamaleone cōfundant, doctorū tamen hominum iudicio planta est nobis adhuc ignota.

Dipsa




## Dipsacum, siue Labrum Veneris.

## CAP. XI.

## NOMENCLATURA.

Græ. Δίψανϑ. Lat. *Dipsacus*. Ita. Labro di venere.

Gal. Chardon à carder.



*Dipsacū siue labrū veneris.*

Sanat rimas sedis, fistulasq̃, si tusa & decocta in uino radix, usque dum sit crassitudo ceræ, immittatur. Medicamentum area pyxide recondendum. Ciunt fornicationibus, uerucisq̃ pensilibus remedio esse. Vermiculi capitulorum in folliculo alligati, collo aut brachio appensi, produntur quartanis febribus remedio esse.

**D**ipsacum aculeatarum generis est: caulem habet altum, spinis horridum, folijs Lactuca, spinosis, binis genicula singula complectentibus, praelongis, ceu quasdam bullas intus & extra aculeatas, in dorso medio habentibus, concauo alarum sinu, in quo imber aut ros asseruetur: unde Dipsaci, quasi sitientis, nomen traxit. In cacumine caulis, singula surculis capitula insunt, oblonga, echinata spinis, quæ arefacta, candida spectantur, dissectaq̃ medullatenus, uermiculos ostendunt.

Not



**N**otum est Labrum Veneris, seu satium, quo in vellicandis pan-  
nis Veneris Fullonum ars vitur, & sylvestre quod passim pro-  
uenit. Atenim quamuis seplasis vocetur Virga pastoris maior, Sera-  
pion tamen & Auicenna pro Polygonio accipiunt, & ob id non ex  
Arahibus, sed à se id nuncupationis comenti sunt. Dipsaci radix desic-  
cat secundo ordine, & aliquantum absterforia est.

## Spina alba. CAP. XII.

### NOMENCLATURA.

Gr. Ἀκάνθα λευκή. Lat. Spina alba. It. Spina bianca.  
Gal. Eine blanche. Off. Bedegnar.



Spina alba.

**S**pina alba nascitur in  
montibus & syluosis:  
folia fert albi Chamaleonis  
angustiora, & candidiora,  
aliquatū hispida, & acu-  
leata: caulem suprà bina cu-  
bita altum, pollicari aut am-  
pliore crassitudine, albican-  
tem, intus cauum: in cacumi-  
ne capitulū inest spinosum,  
ecbini marini æmulum, sed  
minus, & oblongum, flores  
purpurei, in quibus semen  
eū Cnicum, sed rotundius.  
Huius radix pota, cœliacis,  
stomachicis, & ijs qui cru-  
enta extussumt, efficax est:  
urinam cit: tumoribus illi-  
nitur. Decocto eius dentes



in dolore collui prodest. Epotum semen conuulsis infantibus, & a serpente demorsis auxiliatur: gestatum pro amuleto, serpentes abigere traditur.

**S**pinam albam quam Bedegar Arabes vocant, quidam Carduum Benedictum, alij Carlinam, alij Carduum illum quo ad coagulum lactis vtuntur Tusci, alij aliam Cardui sylvestris speciem putant, quorum nullus est, qui impingens non aberret à ianua. Sunt qui certius esse putent Carduum illum sylvestrem, quem vulgus, Carduum Mariæ, & Itali, herba del latte, quod crebra macula superiori foliorum parte aspersa decidui lactis notas preferant. Enimvero hic Carduus in planis & campestribus, vt aduertenti videre licet: & spina alba, Dioscoridi in montibus & syluosis nascitur. Adde his quod folia producit duplo maiora, nedum minora Chamaleone albo. Huic cœsuræ præest Matthioli iudicium, qui in altioribus vallis Ananiæ montibus vidit & legit Spinam albam omnibus insignitam notis, quæ ab ea hoc ex capite requiruntur. Nunc seplasiarum muneris erit, iam non in planis, sed in montibus Spinam albâ studiosè perquirere, nempe pari futuro successu. Quod autem Spina alba, Italarum Carduus quem Presuram vacant, non sit, hinc patet: Presura feritur in hortis, folia habet albo Chamaleoni maiora huiusque capitula Echino longe ampliora sunt. Spinæ albæ radix desiccatur, & aliquantum astringit. Semen subtili est substantia, & facultate calidum. Potu conuulsis conuenit.

## Spina Arabica. CAP. XIII.

### NOMENCLATURA.

Græ. Ακάρδα Αράβικη. Lat. Spina Arabica.

Ital. eodem nomine. Gal. Off. & Ger. ignota.

**A**rabicam spinam natura albæ spinæ similem esse constat: ipsa siquidem stringit. Ad sanguinis reiectiones: mensium abundantiam, ceterasq; fluxiones radix etiamnum ualet. Prouenit in asperis.

**I**d moris habet Dioscorides vt re eandem non sæpius repetat, nec herbis arbores immisceat: eò manifestum per Spinam Aegyptiæ Acaciæ hoc capite non designatâ, quæ (nimirum arbor) nihil ad spinam albam, quæ herba est similitudinè accedit, præcipue cum ismet diuersa de vtriusq; tradat. Gaïeno Arabica hæc spina astringit & desiccatur, cum eadē, sed valētiori quā spina



*spina alba facultate. Enimuerò quando hanc ex Orientalibus nostro saeculo non habemus, huius vice spina alba substituenda.*

## Carduus. CAP. XIII.

### NOMENCLATURA.

Græ. Σκόλιμϑ. Lat. *Carduus*.

Ita. *Cardo*.

Gal. *Artichault*.

Offic. *Articocalus*.



*Carduus.*

**C**arduus, Græci Scolymon uocant, folia Chamæleonis habet, aut albae spinæ, nigriora, crassiora: caulem longum ædit foliosum, capite spinoso: radice nigra & crassa, quæ illita, graueolentiam alarum totiusq; corporis emendat: item si decocta in uino bibatur: copiosam autem urinam fætidamq; expellit. Herba cum reces tenerescit, in olera, Asparagi modo, transit.

*Cardui*



**C**Ardui sylvestris plures & diuersæ sunt species, quamuis Plinius duas tantum enumeret. At domesticorum & hortensium, qui magna hodie diligentia excoluntur, quos Carduos peculiari nomine, & Itali Cardoni vocant, primariū locū tenent. Hi singulari artificio albi & nigri fiūt, & magna ex parte bellarij loco cū Pipere & sale in postremū cœnarū ferculum offeruntur. Carduus quem Græci Cacton vocāt, hodie ad Thuscōs è Neapoli & Sicilia deportatur. Succedunt quos Articocos vocamus, & Itali Carcioffie horū quidam aculeati compressi, & aperti: alij non aculeati, rotundi, longi, aperti, & clausi, sunt inter hos qui pineas nuces referant. Nascuntur sine pinis Scolymi, si seminum acumina priusquam terræ mandentur, lapidis attritu retundantur. Idem fiet, si delibrata radice Lactuce, & in tenues particulas dissecta, singula semina singulis indita segminibus obruantur. Semine per tridū rosarū succo, aut alio quopiam suauiter olēte madefacto eundē odorē adultā plāta referet, quē liquor à semine absorbtus. Ficulneus cinis, suillū stercus, lana radicibus obuoluta, mures à radicum erosione, quas summopere appetunt, expedit. Scolymi sub secundum desinentem ordinem, aut tertij initio excalfaciunt, & secundo desiccant. Alimentum præbent non probum, nempe melancholicum.

## Poterium. C A P. XV.

### NOMENCLATURA.

Græ. ποτήριον. Lat. Poterium. Ital.

Poterio. Gal. & Off. Ignotum.

**P**oterium, Iones Neurada uocant, largè fruticat, cortice obductum tenui, spinis horridum, lanugine spissa, ramulis longis, mollibus, lentis, tenuibus, Tragacanthæ proximis, folijs paruis, rotundis: flore exiguo, candidi coloris: semine nullius usus, sed gustu acuto & odorato. Nascitur in aquosis, & collibus. Radices demittit binum ternūque cubitorum, nervosas & firmas: quæ proxime terram recisæ, dant succum gummi similem: tussæ, præcisus neruis & uulneribus glutinandis illinuntur, decoctum quoque eius neruorum affectibus prodest.

Poterium





Poterium.

**P**oterium nullus est qui in medium producat, ne in Italia quidem, nec nisi a quo iure inter ignotas plantas reponetur, cum in plana Dioscoridis historia, nullus sit qui non mire implicatus, scitè se ab hoc extricet.

## Acanthiũ. CAP.

## XVI.

## NOMENCLATURA.

Græ. Ἀκάνθιον. La.  
Acanthium. Ita. Acan-  
thio. Gal. Chardon  
benist. Off. Car-  
duus benedictus.

**A**canthium alba spinæ simile, folijs aculeatis per extremitates, & lanugine araneosa obductis, ex qua collecta & neta uestes bombycinis similes texunt. Folia uel radices ad remedia opisthotoni bibuntur.

**E**x Cardui quem Benedictum vocant, lanugine collecta & neta, vestes bombycinis similes ut texi non posse clarum est, & peræquè Acanthium, Carduum Benedictum non esse. Nec secus, cum nostro hoc sæculo, planta fertili intantum Lanugine nulla obducatur, fateri cogimur ignotum nobis Acanthium.

## Acanthus. CAP.

## XVII.


## NOMENCLATURA.

Græ. Ἀκάνθα. Lat. Acanthium. Ita,

J

Acantho.



\* *Acanthus hortensis*.*Sylvestris*.

*Acantho. Gal. Branche vrsine. Offic. Brancha vrsina. Ger. Berempoot.*

**A**canthus, Romani Paderotamuocant, nascitur in hortis petrosis, & riguis: folia habet multo lactucaceis latiora, & longiora, Erucæ diuisura, nigricantia, pingua, leuia: caulem binum cubitorum, digitali crassitudine, lauem, prope uerticem ex interuallis circumdatum foliolis, ceu nucamenta quædam oblonga referentibus, spinosis, è quibus flos prodit albus: semen oblongum, luteum: caput thyrsi specie. Radicibus nititur longis, mucosis, rubris, & glutinosis: quæ ustis igni & luxatis artubus illi



illita subueniunt. Potæ urinam ciunt, sed aluum cohibent. Ruptis, conuulsis, tabem sentientibus, mirè prosunt. Nasctur & Syluestris Acanthus, Scolymo similis, aculeatus, breuior quàm satius, & is qui in hortis prouenit: cuius radix ad eadem ad quæ superior efficax.

**A** Canthum esse Brancam vrsinam cum ex alijs notis apparet, tum quòd quæ humi procubunt amplissima folia, arearum puluillos inuestiant, atque adeò ei insit facultas omnis quam Acantho attribuit Dioscorides. Porro de Branca vrsina intelligendum, quæ Romana dicitur, non de umbellifera herba, quam Nicander & Plinius Bupleuron, veteres Græci Buprestim appellarunt. Agrestis Acanthus non perindè cognitus. Folia modicè digerunt, radix desiccatoria & incisoria est, è tenuibus partibus composita.



*Anonis.*

Anonis C A P.

XVIII.

NOMENCLATVRA.

Gr. Ανωνίς. Lat. Anon-  
nis. Ita. Bonaga. Gal.  
Bugraues. Off.  
Acutella.

**A** Nonis, quam aliqui Onomida apellant, ramos habet fruticosos, dorante maiores, frequentibus geniculis cinctos, cauis alarum multis, capitibus rotundis, folijs Lenticula pusillis, ad

γ 2

Rutæ



Ruta aut pratensis spoti folia accendentibus, subhirsutis, odoratis non iniucudè olentibus. Muria conditur antè quàm spinosa fiat, cibis gratissima. Rami acutioribus spinis, & ueluti spiculis firmitioribus horrent. Radicem mittit candidam, quæ excalfacit, & extenuat. Huius cortex ex uino potus urinam ciet, calculos comminuit, margines ulcerum erodit. Radix cum decoquitur in posca, dolorem dentium collutione mitigat. Decoctum eius potu hamorrhoidas sanare creditur.

**N** Ascitur Onotis in cultis & inculcis, eque ramis & radice sese aratro implicantibus, aculeatisq; spinis, quæ boues pungit, Restæ bouis dicitur. florem, Ononis profert croceum, ut plurimum verò purpureum & candicantem, pisellis similem, licet minorem. huius radix arenulas renum per urinam potenter attrahit, atque adeo comminuit quæ illius vias obstruant. Puluis cum vino epotus par remedium in plerisque conficit. Nec defuit qui ab hernia carnosæ magnitudinis non mediocris, desperantibus medicis nisi ferro posse curari, huius ope sanatus sit. Ononidis radix excalfacit tertio ordine, abstergit, incidit, urinam proritat, renum lapillos effringit. Decoctum colluto inde ore, dolorem dentium sedat.

## Leucacantha. C A P. X I X.

### NOMENCLATURA.

Græ. λευκακανθα, Lat. Leucacantha. Ita.

Bianca spina. Gal. Off.

Ger. ishora.

**L** eucacantha prædita est radice Cyperi, ualida & amara: quæ manducata dolorem dentium sedat: ueteri laterum dolori, atque ischiadicis prodest, decocto cyathis tribus ex uino poto. Eadem ruptis conuulsis medetur. Radicis epotus succus eodem præbet effectus.

*Leucacantha*



**L** Eucacantha & Spina alba de qua superius tractatum, non eadem sunt planta. Nempè præter id quod separatim eas Dioscorides & Galenus describunt, secretas etiam ab invicem facultates assignant. At enim non deliniatis nec à Dioscoride nec à Plinio, folijs, caule, flore, semine Leucacantha, hanc facile sit indicare quæ hodie planta sit Leucacantha, Matthiolus licet hæsitās, hanc Carduum Mariæ dici posse existimat, ut cui insidentes prægrandibus folijs lactea macula Leucacantha nomen inderè potuerunt, & quod valida sit & amara radice. Leucacantha radix amara est & incisoria. In desiccantium est ordine tertio, & excalfacientium secundo.

## Tragacantha. C A P. XX.

### NOMENCLATURA.

Græ. Τραγῶκαλον. Lat. Tragacantha. Ita.

Gomma draganti. Gal. & Off.

Dragantum gummi.

**T** Ragacantha radix lata & lignosa, summo cespite nititur, unde surculos humiles, robustos, latissimè fundit, in quibus minuta folia, multa, nonnunquam tenuia exoriuntur, quæ sub se spinas albas, rectas & firmas occulunt. Est etiam nū Tragacantha lachryma, quæ uulnerata radice manans concrevit. Præstat pellucens, gracilis, levis, sincera & subdulcis. Cutis spiracula, ut gummi, obstruit. Huius increbuit usus ad oculorum medicamenta, ad tussim, exasperatas fauces, retusas uoces, ceterasq; destillationes, cū melle in delinctu: subdita quoque lingue liquefit: & in passo madefacta, drachmæ pondere bibitur contra renum dolorem, & uesticæ rosiones, mixto cornu cerui usto & eloto, aut scissi aluminis momento.

**P** Lanta Hirci spina, è qua ferro incisa gummi distillat, quod Gūmi Dragāti vocant, copiosè in Candia, Achaia, Morea, & quibusdam Asia partibus nascitur. Quā habemus, è Candia ad nos exportatur & Gracia. Tragacantha similem gummi vim habet, & pari modo desiccatur, licet non eadem acrimonia.

J

3

Eryngium.




## Eryngium. CAP.

## XXI.

## NOMENCLATURA.

Græ. ἑρίγγιον. Lat. Eryngium. Ita. Tringo.  
Gal. Panicault.



## \* Eryngium.

odorata. Nascitur in asperis & campestribus. Vim habet calfa-  
etoriam. Pota menses & urinas pellit, tormina inflationesq; di-  
scutit: contra iocinorum vitia. serpentium morsus, & hausta ue-  
nena: cum uino prodest. Bibitur aduersus plurima, cum seminis  
Pastinacæ drachma una. Appensa illitæne, tubercula discutere  
proditur.



proditur. Pota cum hydromelite radix, opisthotonicis & comitialibus.

**E**ryngium spectanda foliorum forma, & capitulorum situ, candida, pallida, & carulea conspiciuntur, carduorum omnium bellissimum, radices habet quæ siccata saccharo condiuntur. Ad nascitur una Eyrngij species marinis littoribus, folijs montano maioribus, huius radices teneriores & longiores, ad condiendum magis idoneæ sunt. Hæc idem duo quod maritimi istius Eryngij nullam Dioscorides mentionem faciat. Hic submonendi Arabum sectarij, ne Serapionis aliorumue Mauritanorum Secacul (plantâ Græcis incognitam) Eryngium esse putent. Nusquam enim Serapio è Dioscoride & Galeno mutuatur, ubi non illorum pariter nomen apponat, nec paribus viribus describantur. Proinde non probè agunt qui Eryngij radices cum Saccharo melle conditas, ad vehementius incitandam venerè offerunt, quod Serapio Secacul, suo nobis ignoto, attribuit. Eryngium paululum caliditate à temperatura secedit, subtilis tamen eius substantia, non parvam siccitatem habet.

## Aloë. CAP. XXII.

### NOMENCLATURA.

Græ. Αλον. Lat. & Ita. Aloe.


Gal. Aloes. Perroquet.

Off. Alē hepaticum  
Succotrinum.

**A**loes folium Scillæ similitudinem habet, crassum, pingue, modicè latum, rotundum, retrorsus pandum: folia utrinque gerit ex obliquo spinosa, rariusculè striata, brevia & curta: caulis emittitur non dissimilis Antherico: flos albus: fructus hastulæ regie cognatus:

3 4 grans





Aloë.

ni odoris, syncera, quæ nihil doli sensit, nitida, calculorum expers, rufi coloris, friabilis ac iecinoris modo cocta, facile liqueſcens eximia amaritudinis. improbatur nigra, & fractu contumax. Gummi eam adulterant: quod deprehenditur gustu, amaritudine, & ualido odore: eoq; argumento, quod digitis friata non ad minima usque frustra resoluitur. Noc desunt qui Acaciam immisceant, Natura eius est spissare, exiccare, somnũ allicere & corpora densare, aluum resolvere. Stomachum repurgat binum cochlearium mensura, in aqua frigida aut egelida pota. Sanguinis reiectiones sistit: regium morbum purgat, tribus obolis ex aqua, aut drachmæ pondere in potu. Deuorata cum resina, aut cum aqua uel melle cocto sumpta, aluum soluit. Purgationis perfectæ causa, tribus drachmis sumitur, alijs purgatorijs medicaminibus admixta, præstat ut minus stomachum infestent. Sic-  
ca glu



ca glutinandis ulneribus inspargitur: uulcera ad cicatricem perducit, cohibetque: eadem peculiariter exulceratis genitalibus medetur: disrupta puerorum præputia iungit: condylomata, rimasque sedis ex passo sanat: hæmorrhoidum abundantiam & sanguinis erumptionses sistit: pterygia ad cicatricem ducit: liuores & insignita, ex melle tollit: priuatim scabras lippitudines, pruriginésque angulorum permulcet: dolorem capitis sedat, temporibus & fronti illita ex aceto & Rosaceo: capillum fluentem continet, cum uino: tonsillis, gingiuis, & omnibus oris ulceribus, cum melle & uino proficit, oculorum medicamentis torretus, in munda & candenti testa, pennaque subinde uersatur, ut possit æqualiter torreri. Lauatur, ut quod sit arenosissimum, tanquam inutile subsidat, & leue ac pinguisimum assumatur.

**I**N Aloe diligenda adhibendus est delectus, siquidem magna ex parte adulterata reperitur. Plætæ Aloes nomine, in Italia notissimæ sunt. Aloe desiccantium est ordinis tertij: & sub desinentem ex calfacientiū primū, aut secundi initio. Repercutit simul & digerit. Aliquantum abstersoria est, sed modicè, & t vulneribus nihilum molestā sit.

## Absointhium. C A P. XXIII.

### NOMENCLATURA.

Gr. Αψίνθιον. Lat. Absinthium.

Ital. Assanzo. Gal. Aluyne

Absince. Off. Latino

nomine.

2 5

Absinthi





Absinthium.

**A**bsinthium, aliqui *Ba*  
*thypicron*, herba uul-  
 gò cognita. Præstantius in  
 Ponto & Cappadocia, in  
 monte Tauro nascitur. Vim  
 habet calfaciendi & astrin-  
 gendi: bilem expurgat, quæ  
 & stomacho & uentri in-  
 hæsit: urinam cit, & crapu-  
 lam præsumptum arcet. Ad  
 inflationes uentris, & sto-  
 machi dolores prodest, cum  
 seseli et Nardo gallico potũ:  
 fastidia discutit, et arquatos  
 sanat madefacti dilutũ, aut  
 decocti ius, quotidie tribus  
 cyathis haustum: menses cit  
 potum, aut cum melle appositum. Contra fungorum strangula-  
 tiones conuenienter ex aceto bibitur. Aduersatur Ixiæ uenenis  
 cum uino, item Cicutæ, & muris aranei morsibus, & draconi  
 marino. Anginæ eo cum melle & Nitro perunguntur, & epi-  
 nyctides ex aqua. Ad sugillata & oculorũ caligines ex melle  
 illinitur: item auribus, si manat sanies. Dentium auriumq; dolo-  
 res decoctum uaporis suffitu compescit. Decoctum in passo do-  
 lentibus oculis oblinitur: item præcordijs & iocinori, tritum cũ  
 cerato Cyprino: stomacho quoque longa uoletudine laboranti,  
 cum Rosaceo: cum ficis autem, aceto & loliacea farina, aquæ  
 inter cutem lienosisq; subuenit. Vinum ex eo fit, quod Absin-  
 thiten uocāt, præsertim in Propontide & Thracia quo ad antè  
 dicta utuntur, cum febri carent: alioquin in æstate propināt, &  
 acceptam huic uino incolumitatem reserunt. Inparsum arcis  
 Absinthium,



*Absinthium*, uestes ab erodentium iniuria vindicat: culices ex oleo perunctum abigit, & à corpore arcet: atramentum librarium diluto eius temperatum, literas à murium erosione tuetur. Existimatur liquamentum eosdem præstare effectus. Attamen potionibus improbat, quoniam stomachum malè habet, & capitis ciet dolorem. Sunt qui cocta amurca, liquamentum adulterant.

## Marinum Absinthium.

### CAP. XXIII.

#### NOMENCLATURA.

Græ. Αψίνθιον θαλάσσιον. Lat. *Absinthium marinum*. Ita. Assenzo marino. Gal. Barbotine.  
Off. Barbotina. Mors uermium. Ger.  
Hypercruyt.

**A**bsinthium marinum, quod aliqui Seriphum uocant, copiosissimum in Tauro monte, iuxta Cappadociam, & in Taphorisi Aegypti gignitur, quo Isiaci pro oliuæ ramo utuntur. Herba est tenuis, Abrotoni parui similitudine, referta minutulis seminibus, subamara, stomacho inimica. Ea grauius olet, & cum quadam calfactione adstringit: per sese aut cum Oryza cocta, interaneorum animalia, teretesq; tineas, adiecto melle, enecat, alium leuigat: cum edulio autem uel Lenticula decocta, eadem præstare pot. Pecora maxime pinguescunt hoc pabulo. Tertium genus Absinthio assignatur, quo Gallia alpibus finitima scatet: id patrio nomine Santonicum uocant, regionis in qua



qua nascitur cognomento, Absinthio non dissimile, uerum sub-  
amarum est, non adeo seminis fecundum. Eadem quæ Serip-  
hium potest.

**T**Ria Absinthij genera facit Dioscorides, Vulgare, Seriphium, &  
Santonicum, quod in Gallia cisalpina nascitur. Præcipuum est  
Ponticum, secundum Santonicum, tertium Seriphium. Abrotonum al-  
bum, non est Ponticum Absinthium: sicut nec Cypressus herba, marinū  
est Absinthium. Seriphium siue marinum à Seripho insula nomen acce-  
pit. Eius semen à spetiarijs Alexandrinum semen vocatur. Semen san-  
ctum, Italis Semenxina, & Seme santo, quod conditum cum Zuccharo  
pueris vtendum datur ad conficiendos vermes, marini Absinthij (nēpe  
exilius) semen non est, sed herba quæ in monte Gargano nascitur, &  
Absinthio nostro vulgari similis est. Marinum Absinthium in Italia  
pluribus maritimis locis prouenit. Absinthium simul amarum est, astri-  
ctorium, & acre, & per æquē excalfacit, abstergit, roborat, & desiccet.  
Calidum est primo ordine, siccum tertio: & succus herba calidior.

## Abrotonum. CAP. XXV.

### NOMENCLATURA.

Græ. Ἀβρότονον. La. Abrotonum. Ita. Abrotano.  
Gal. Auronne. Off. Latino nomine.  
Ger. Strabbuttz.

**A**Brotonum duorum est generum. Fœmina quadam arbo-  
ris specie fruticans, candicat, circum ramulos folijs, seriphi-  
modo, minutim incis: floribus referta est, comantibus in sum-  
mo, fulgore auri, corymbis: quod per æstatem prodijt, suaui-  
olet, cum grauitate quadam, & amaro gustu. Id genus Siculū  
esse constat. Alterum mas uocatur, sarmentosum, gracilibus ra-  
mulis uti Absinthium. Plurimum in Cappadocia gignitur, &  
Galatia Asiatica, atque in Syriæ Hierapoli. Crudum semen tri-  
tum & feruesfactum ex aqua, in potu auxiliatur orthopnoicis,  
conuulsis, ruptis, coxædicibus, urinæ angustijs, mensibus suppres-  
sis



*Abrotonum.*

**A**brotonum mas vulgaris est noticia, & itidē Abrotonum scæmina, id Itali vt nos, Cipresso, & Santolina vocant. Abrotonum tertij est desiccantium & excalfacientium ordinis. Terrenæ est substantiæ, quæ è multo calore subtilis euasit. Digerit & incidit plus Absinthio, ob minorem nimirum acerbicatem, quæ gustu deprehenditur: & quod stomacho inimicum est, vt Seriphium: cum è diuerso Absinthij gratum, amicum, & nihil noceat stomacho. Amarus etenim sapor solus stomacho in totum incommodat: Contra amicusissimus austerus, acerbus, & astrictorius, Porro in diuersa qualitalis planta, ea vincet quæ potentior fuerit.


*Hyssopum. CAP. XXVI.*

## NOMENCLATURA.

Græ. ὕσσωπος. Lat. *Hyssopum*. Ita. *Hissopo*.  
Gal. *Hissope*. Off. Latino nomine.

*Hyssop*





Hyssopum.

hementius, addita Iri, Cardamomo, aut Irione, deijcit: colorem in corpore fouet: lieni, & aquæ inter cutem, cum Fico Nitrog, inflammationibus quoque ex uino illinitur: cum feruente aqua impositum, sugillata discutit: cum decocto ficorum, optimè anginis gargariatur. Decoctum cum aceto, dentium dolorem in collutione sedat: inflationes auricularum uaporis suffitu discutit.

**N**Equicquam dubitandum Hyssopum nostrum vulgarem, Dioscoridis esse Hyssopum, ut non in Hyssopum montanum ea ducenda est, quem herbarij Gratia dei, & Itali, Stanca cauallio nominant. Humidis & paludosis nascitur, palmo pauxillum altior, latis ut in Hyssopo folijs, flore albo aut purpurascente, qui inter folia per totum pene caulem  
emi




emicat. Summa in gustando amaritudinis, qua cum stipticum quippiã sentitur. Manducata aut pota choleram & flegma soluit innocuè. Redacta in puluerem, plagas (inspersa) breui tempore coagmentat. Hyssopus tertio ordine excalfacit & desiccet, & tenuium est partium.

## Stœchas. CAP.

## XXVII.

## NOMENCLATURA.



Stœchas.

Græ. Στίχας. Lat.


Stœchas. Ita. Stecha.

Gal. &amp; Off.

Sticha-  
dos.

**S**tœchas, iuxta Galliam  
in insulis eiusdem nomi-  
nis è regione Massilia gi-  
gnitur, unde cognomentum  
accepit. Herba tenuibus sur-  
culis, coma Thymi, lon-  
giore folio, subamara gu-  
stu, & aliquantum acris.  
Cuius decoctum, Hyssopi  
modo, ad pectoris uitia ef-  
ficax est. Antidotis mi-  
scetur





\* Spica.



Lauendula.

scetur. Viscera omnia, & uniuersum animantis habitum extenuat, ab obstructionibus & farctu liberat.

**S**tichas in Narbonensi prouincia, & Stichadibus insulis quæ ex aduerso Massilia sitæ sunt, & in Arabia nascitur, vnde maxima ex parte cum Alexandrinis mercibus Venetijs importatur, Nascitur & in Gargano Apulia monte, Narbonensi tamen & Arabica inferior. Stichas gustu amara est, & modicè astringit. Terrena substantia, frigida, astrictoriam: alia terrena, subtilis reddita, & densior, amaram efficit.

## Origanum. CAP. XXVIII.

### NOMENCLATURA.

Græ. *Opīrævos*. *ONITIS*. *Aspiopīrævos*. Lat. *Origanum*. *Onitis*. *Origanum sylvestre*. Ita. *Origano*.

Onite



Onite. Origano saluatico. Gal. Origan.

Off. nomine  
Latino.

Origanum.

**O**rganum Heracleoticum, quod & Cunilam uocant, folium habet Hyssopo non dissimile, umbellamq; non in rotæ speciem orbiculatam, sed ueluti multifidam, semine in summis uirgis haudquaquam denso. Excalfacit: unde decoctum cum uinopotum, demorsis à serpente conuenit. Si Cicutam aut Meconion hauserunt, ex passo: si Gypsum aut Ephemerum, ex aceto mulso propinatur. Ruptis, conuulsis, hydropicis, cum fico esui datur. Ari-

dum acetabuli mensura potum in aqua mulsa, atros humores per aluum extrahit: menses ciet, & tussi cum melle linctum medetur: ad pruriginem, psoras, regiumq; morbum, decocti ius in balneis prodest. Succus uirentis tonsillas, uuam, & oris ulcera sanat: & per nares, ex oleo Irino infusum, trahit: aurium dolores cum lacte mulcet, Conficitur ex eo, & Cepis, & Rhois frutice, quo ad obsonia utuntur, uomitorium medicamentum, & his omnibus in cupreo uase per dies his nicos insolatis, dum canicula sydus flagrat. Herbae autem

z      substratu



substratu serpentes fugantur. Quæ Onitis appellatur, candidiore est folio, & Hyssopo similior. Semen ueluti coniunctos corymbos habet. Vis ei Origani Heraclei, sed multò inefficacior. Syluestre Origanum, aliqui Panaces Heraction, alij Cunilam uocant, ex quibus est Nicander Colophonius: Folijs est Origani, ramis tenuibus, dodrantem altis, in quibus umbellæ. Anethi insunt, flores candidi: radix tenuis, superuacua. Peculiariter percussis à serpente, folia & stores ex uino poti auxiliantur.

## Tragoriganum. CAP.

### XXIX.

#### NOMENCLATURA.

Græ. τράγοριγανος. Lat. Tragoriganum.

It. Tragorigano. Gal. Mastic. Off.

herba Masticina. Ger.

ignota.

**T**ragoriganum tenuis frutex est, syluestri Serpyllo aut Origano similis, folio & ramulis. Quibusdam in locis latius uirentiusq; inuenitur, & latioribus folijs, satis glutinosum. Alterum exilibus surculis, ac tenuibus folijs, quod aliqui Prasium uocauere. Optimum est Cilicium, & Cretense, & Smyrneum, & in Chio Chooq; proveniens. Omnia excalfacient, urinam cient, aluo accomodantur, decocto potu bilem deiciunt, lienosis ex aceto bibere prodest, contra pota ixiæ uenena in uino bibuntur, menses trahunt: peripneumonicis, tussietibus, ex melle in eclegmate dantur. Grata acmitis eorum potio est: quare cibum fastidientibus & stomacho acida ructanti, imbecilloq; traditur. Item si à marina iactatione nausea, & æstus præ



astus praecordiorum excitetur: tumores uerò cum polenta illita discutiunt.

**O** Riganum! Heracleoticum & Onite in Italia non nascitur, forsitan nec in alijs Europa locis. Quod autem vulgo Origanum dicitur, sylvestre est Origanum, nempe quod in syluis, non satum, proueniat. E Candia siccum Origanum affertur, flore albo, acerrimi & odorati gustus. Ad Tragoriganum duci potest, quantumuis pro vero Origano in seplasijs venundetur. Siquidem scribit Dioscorides Tragoriganum in Cilicia, Choo, Chio, Candia, & Smyrna nasci. Quod non perinde de Heracleotico ducit. Origani desiccant, inidunt, & excalsaciunt tertio ordine. Praterèa Tragoriganum adstrictorium est. Italico Origano, in aliorum omnium vicem, è Matthiolo uti possumus.

## Pulegium. CAP. XXX.



Pulegium.

### NOMENCLATURA.

Græ. γλῆχων. Lat. Pulegium. Ita. Pulegio. Gal. Poulior. Off. Latino nomine. Ger. Poley.

**P**ulegium herba vulgaris notitiæ. Externuat, calfacit, decoquit: mēstrua, secundas ac partus eicit, pulmonis vitia ex melle & Aloe potum extrahit, & conuulsis auxiliatur, nauseas stomachique

z z inter



intercisiones, ex posca permulcet: atram bilem per aluum exigit. Bibitur in uino utilissimè contra serpentium morsus. Defectos animo recreat, cum aceto naribus obiectum: gingiuas arefacti cinere corroborat: illitum cum polenta inflammationes omnes sedat: podagris per se subuenit, impositum usque dum rubescat locus: cum cerato uaros extinguit: lienosis cum sale utiliter illinitur. Decoctum eius ablutas pruriges mitigat, conuersas uulnas corrigit, contra inflationes duritiasq; uulue, in desefiones conuenienter adijcitur. Vocant aliqui Blechona, quoniam dum floret gustatum a pecoribus, balatum concitat.

**E**st Pulegium mas flore albo, femina rubeo. Nascitur in Italia, & Gallijs, sed præcipua laus ei qui in Prouincia Romana prouenit. Est ubi mas tantū repperiatur. In valle Anania, & propinquis Germania locis in hortis feritur, cum acris alijs herbis. Folia habet Neptæ similia: acris gustu est & amariuscule. Ad hæc potissimè excalfacit & desiccet.

## Dictamnium. C A P. XXXI.

### NOMENCLATURA.

Græ. δίκταμος. Lat. Dictamnium. Ita, Dittamo,  
Gal. Gimembre de iardin. Off.  
Diptamum.

**D**ictamnium, aliquibus syluestre Pulegium uocatur, Cretensis herba est, acris, læuis, Pulegio similis, sed maioribus folijs, quæ tomento quodam spissaq; lanugine pubescunt. Florem nullum aut semen profert. Præstat omnia quæ satium Pulegium, sed efficacius multo, non potum modo, sed appositum quoque aut suffitum, defunctos partus eicit. Produunt in Creta capras sagittis percussas, huius herbæ pastu eas excutere. Purgandi uim habet succus, illitus, aut cum polenta tritus. Herba  
impactos



impactos pedibus reliquoue corpori aculeos, illitu refigit. Ad  
 lienis dolorem efficac habetur: siquidem ipsum imminuit. Me-  
 tunt æstate & autumno. Radix eius gustu calfacit, partus ac-  
 celerat. Succus cum uino potus, contra serpentium morsus præ-  
 sidio est. Tanta herbe facultas est, ut olfacta abigat bestias, quæ  
 uenenato ictu sæuiant, appensaq; contactu exanimet. Vulneri-  
 bus ferro illatis, & uenenatis morsibus, infusus succus præsen-  
 taneo est remedio, si etiã ab instillatione statim in potu assuma-  
 tur. Quod Pseudodictamnium uocant, multis in terris nascitur,  
 ante dicto simile, sed minus quàm illud acre. Eosdem effectus  
 præbet, sed inefficacius multo. Defertur à creta alterum Dicta-  
 mni genus, folijs Sisymbrij, ramis maioribus: in quibus flores  
 sylvestris Origani, nigri, molles: odor foliorum inter Sisymbriũ  
 & saluiam iucundissimus. Efficax ad eadem, sed minus na-  
 res ferit. Miscetur emplastris & medicaminibus, quæ aduersus  
 serpentium iniurias confinguntur, Theriaca uocant.

**H**abet vera Dictamnus Pulegij folia, de sa vtrunque lanugine  
 vestita, quibus solus medicinam facit, lignosas radices quarũ ra-  
 rus est vsus. At quæ vulgo in seplasijs Dictamnus habetur, fraxineis est  
 folijs, glabris, solis radicibus medicatur. Quod apparet nos verã Di-  
 ctamno carere. Cum tamen constet veram Dictamnium è Creta Vene-  
 tias afferri, hic eniti summopere debent pharmacopole, vt non ex alio-  
 rum sermone, sed ò proprijs notis deprehensum & cœmant, & in suas  
 officinas inuehant. Dictamnus Italica, quam albam vocant, & quidã  
 à fraxini foliorum similitudine, Frassinello, flores habet flagrantissimi  
 odoris, leues & vagos: radicem amaram, & ideo intestinorum vermes  
 conficit. Medetur hæc venenis & venenatis quorumvis animalium  
 morsibus. Stomacho prodest, & quæis strictum est pectus. Aqua quæ è  
 flore, in Maria balneo conficitur, absque eo quod odoris est eximij, nari-  
 bus attracta, antiquæ capitis frigiditati admodum prodest. Dictamnus  
 subtiliore quàm Pulegium est substantia, cætera similis. Pseudodicta-  
 mnus, & alia Cretensis Dictamnus ad nos non afferuntur, licet sint qui  
 dicant hanc postremam, vulgarem nostrum esse Dictamnium.

℞ 3

Salvia.



DIOSCORIDIS  
Salvia. CAP.

XXXII.

NOMENCLATURA.

Græ. ελελίσφακος. Lat. & Ita. Salvia.

Gal. Saulge. Off. Latinonominine. Ger. Salbey.



Salvia maior.



Salvia minor.

**S**alvia siue Elelispacon frutex est ramosus: longus, uirgas habens quadrangulas, & canas: folia mali Cotonei effigie, sed longiora, asperiora, crassiora, & quæ sensim attritarum quasi uestium scabritiem referant, hirsuta, subalbida, perquam iucundo odore, sed graui: semen summis in caulibus syluestri Ormino simile gerit. In asperis nascitur. Menses cit & urin as




urinas, decoctum foliorum ramorumq; potum: partus extrahit: Pastinacæ marinæ ictibus auxiliatur. Capillos denigrat, uuln-  
rum sanguinem cohibet, tetra ulcera purgat. Testium pruritus  
sedant rami foliaque, si decocto eorum foveantur.

**S**aluia nota est planta, domestica quam francam vocant, & sylue-  
stris quæ candidior est, & in totum hispidior. Nec tamen illa est, ne  
quis fallatur, quam officinæ Centrum galli vocant. In Candia & ali-  
quot regni Neapolitani locis, fructum Salvia producit colore cæsis, gal-  
le quercinæ similitudine. Salvia manifestè excalfacit, & leniter  
adstringit.

## Mentha. CAP. XXXIII.



*Mentha sativa.*



*Mentha sativa altera.*

### NOMENCLATURA.

Græ. *κδ'βοσμος*. Lat. *Mentha*. Ita. *Menta*.

Gal. *Mente*. Off. Latino nomine.

Σ

4

*Mentha,*



**M**entha, cognita herba est. Calfaciendi, adstringendi, atque exiccandi uim habet. Sistit sanguinem, potio ex aceto succo, tineas in uentre teretes enecat, uenerem stimulat, singultus, uomitiones, cholerasque sedant terni ramuli cum acidi granati succo poti. Suppurationes discutit, si cum polenta illinatur. Imposita fronti, capitis dolores mulcet: mammæ, si tendantur, aut lacte turgeant compefcit: cum sale canum morfibz illinitur: aurium doloribus cum aqua mulsa subuenit: uulua ante coitum admota, cōceptioni resistit: lingua scabritiem conficta leuigat: coire lac, densarique in caseum non patitur, si folia potionibus lactis immergantur. In summa, stomacho utilis est, & in condimentis peculiarem gratiam habet. Syluestris Mentha, Latini Mēthastrū uocat, hirsutior est folio, & prorsus maiore, quam Sisymbrij, grauiori odore: quare minus ad sanorū usus expetit.

**M**entha & Mentastrum nota sunt plantæ, Galeno & Dioscoridi ad accendendam Venerē validae, Acrēs & calidæ tertio ordine, quāuis cultura humidiorē domesticā reddat. Mentha amara, & aliquātum acerba, & subtilissimis constat partibus.

### Calamintha. C A P.

### XXXIII.

#### NOMENCLATURA.

Gr. Καλαμίνθη. Lat. Offic. & Ital. Calamintha.

Gal. Calament. Ger. Fich mintz.

**E**X Calaminthæ generibus quedam montibus familiaris, folia Ocimi habens incana, surculos aridos, & caules angulosos, purpureum florem. Altera Pulegio similis est, sed maior: quam syluestre Pulegiū ideo appellarunt, quod odore ipsum æmuletur, Mepetam Latini uocitant. Tertia Mēthastro cognata est, folijs oblongioribus, caule & ramis maioribus quā superioris, sed uiribus inefficacior. Omnium folia gustu impense feruentia & acria: radix superuacua. Nasctur in campestribus  
aspe





\*

*Calamintha.*

gant: nigris cicatricibus candorem reddunt, in uino cocta, & illita, sugillata tollunt. *Calamintha* ischiadicis imponitur, ut ex alto humores euocet, summā cutem exurens. Vermes necat succus auribus instillatus.

**M**atthiolus in altissimis vallis Anania montibus *Nepeta montanam* frequenter collegit, folijs *Ocymo* similibus & incanis, surculis angulosis, flore purpureo, & in ipsa valle, tertium genus *Mentastro* cognatum, sed acrius, & magis incanum. Idem *caltariam* herbam, quæ *Italica*, *Herba gatta*, secundum sed nec tertium. *Nepeta* genus non esse contendit, quod *herba cattaria* folijs cōstet in totum *Vrtica* & *Melisso* phylli, & non, *Pulegi* sylvestris. Latina vox est *Nepeta*, Græca *Calamintha*. Videant *Herbarij* & *pharmacopola* ut has *Nepeta* vel *Calamintha*

Z S

mentha



mētha species, probè & è Dioscoride discernāt. Nepeta subtilis substātia,  
 sicca & calida est tertio ordine, gustu acri, & aliquantum amaro. Mon-  
 tana reliquis valentior.

# Thymum. C A P.

X X X V.

## NOMENCLATURA.

Græ. Θύμος. Lat. & Off. Thymus. Ita. Thimo.  
 Gal. Mariolaine d'Angleterre.  
 Thym. Ger. Thymim.



Thymum.

cretum sanguinem dissoluit: uerrucas Thymi colorem reddentes,

**T**hymum ab omnibus  
 cognoscitur, surculosus  
 frutex, exilibus folijs multis  
 & angustis circumdatus: ca-  
 pitulis in cacumine, flore pur-  
 pureo refertis. Gracili solo et  
 petroso prouenit. Vim habet  
 hanc, ut cum sale & aceto po-  
 tum, pituitam per aluum de-  
 trahat. Decocti uis prodest  
 orthopnoicis, & anhelatori-  
 bus: tineas uētris exigit: men-  
 ses, partus, & secundas pel-  
 lit: urinas ciet: cum melle &  
 eclegmate: faciles facit ex-  
 creationes: recentes tumores  
 discutit, cum aceto illitū: con-




tes, pensilesq<sup>3</sup> tollit, ischiadicis cum uino & polenta impositum subuenit: hebetibus oculis in cibo prodest. Perquam utile pro condimento, duntaxat ad usus eorum qui recte ualent.

**T**hymum duarum est specierum. Selectum, quod flore est purpureo, nec hoc viribus inferius, quod album florem profert. Itali Apulum summopere aestimant. Candianum spicatis est capitulis, & odore fragrantissimo. Thymum aromaticum seplasia vocant. Thymum potenter calidum & incisorium est.

## Satureia. C A P.

## XXXVI.

## NOMENCLATURA.



Satureia.

Græ. *ὄμβρα*. Lat. *Satureia*. Ita. *Coniella*. Gal. *Sarriete*. Ger. *Satnrey*.

**S**atureia triuialis notitia est: gignitur in asperis locis, & tenui solo, Thymo similis, minor tamen & tenerior. Desert spicam florum plenam, coloris herbaei. Eadem potest quæ Thymum, si modo consimili sumptitur. Aptus sanis usus. Est etiamnum quædam satua, syluestri prorsus minor, quæ propter mitiorem acrimoniam, commodius in cibos recepta est.

Quam



**Q**uam Græci Thymbram, Latini Cunilam vocant. hæc domestica est, & sylvestris. Domestica tantum, Satureia dicitur. Sylvestris odoratior est, gustu acrior, Thymoq; proprio effectu validior: Satureia verò imbecillior, sed cibus aptior.

## Serpyllum. C A P.

### XXXVII.

#### NOMENCLATURA.

Græ. Ερπυμος. Lat. & Offic. Serpillum.

Ita. Serpillo. Gal. Serpouller.



Serpyllum.

**S**erpyllum duorum generum est. Hortense odore Sampsuchum imitatur, atque in coronas addi solet, cui à serpendo nomen inditum est: quoniam si qua eius particula terram attingat, inibi radices demittet. Folia & ramulos Origani habet, sed candidiores: in maceris multò procerius assurgit. Sylvestre, Zygis appellatum, non serpit, sed in altitudinem increfcit, ramulos ædens tenues, surculosos, folijs refertos longioribus quàm Ruta, & duriori



rigribus, angustis: flores iucunde olent, gustanti acres: radicis nullus usus. Nascitur in petris, satiuo efficacius, atque magis excalfaciens, & ad medendi usum aptius. Menses trahit, urinam potu ciet, torminibus ruptis, uulsis, & iocinoris inflammationibus auxiliatur, & aduersus serpentes potu illitiue. Capitis dolores mulcet coctum, adiecto Rosaceo, & madesactum in aceto: maxime uero phreniticis & lethargicis conuenit. Cruentos uomitus sedat succus, drachmis quatuor ex aceto potus.

**I**psa experientia docet satiuum Serpillum non serpere, sed è Plinio in palmi altitudinem sese subrigere. Est syluestre Serpillum nulli non notum, id serpit. Eò fit ut inuersus Dioscoridis textus esse videatur. Calidum est & acre Serpyllum. Satiui ingens est apud Thuscis copia, & ea de causa errant, qui id Pulegium nostrum esse putant.

## Sampsuchū. CAP. XXXVIII.

### NOMENCLATURA.

Græ. Σάμψυχον. Lat. Sampsuchum. Ita. & Off.

Maiorana. Gal. Mariolaine.

Ger. Meyeron.

**S**ampsuchum in Cypro & Cyziceno laudatissimum: secundum sibi locum uendicauit Aegyptium. Amaracum gens Sicula & Cyzicena appellat. Herba est ramosa, per terram repens, folijs eius Calaminthæ, quæ tenui folio constat, Leptophyllos appellatur, hirsutis & rotundis. Suauissimum odorem spirat, ideo coronis inseritur. Vis eius excalfaciens. Succus decocti potus, conuenit incipientibus hydropicis, & ijs quos urinae difficultas, aut tormina excruciant. Illita ex melle arida folia, sugillata tollunt: menses subdita in pecto trahunt: contra scorpionis ictum ex aceto et sale illinunt: luxatis tumoribusq; cerato excepta imponunt.



imponuntur: aduersus oculorum inflammationes, tumoresq<sup>3</sup> cū polline polente illini prodest. Acopis malagmatisq<sup>3</sup> calfaciendi gratia, commiscetur.

**S**ampsuchus & Amaracus idem sunt. Nam quod de his diuersis capitibus à Galeno & Paulo tractatur, ea causa est quod per Amaracum, Marum intelligunt, simile quidem Sampsucho, nisi quod amarius est et odoratus: & Cizici Marum, Amaracus vocabatur. Sampsuchus tenuium est partium, tertia classe digerit, desiccatur, & excalfacit. Porro Amaracus, Galeno & Paulo, non aliunde Marum est, quam è codicum corruptela, (vt doctorum iudicium est) in quibus aliqua Amaracus inscriptus, ubi Marum esse debuerat.

## Melilotos, siue sertula Campana.

### C A P. XXXIX.

#### NOMENCLATURA.

Græ. μελιλωτος. Lat. Sertula campana. Ita. Sertola campana. Gal. Coronne de Roy. Off. Melilotus. Ger. Claurren.

**S**ertula Campana laudatissima in Attica, & Cyzico, & Chalcedone nata: cuius odor uicinus est Croco, boni odoris. Nasceitur & in Campania circa Nolam, colore in luteum languescente, odore infirmo. Vim habet adstrictoriam. Inflammationem omnem emollit, præsertim quæ in oculis, uulua, sede, aut testibus erumpat, si ex passo cocta illinatur: interdum autem addito oui luteo assato, aut Fœnigræci farina, Lini semine, aut polline, capitulis Papaueris, Intybœue. Recentes meliceridas per se cum aqua, & ulcera manantia in capite, illita cum creta Chia, uino aut Galla sanat. Stomachi dolores & cruda & cocta cum aliquo ex antè dictis leuat: doloribus aurium mitigandis cruda

ex



*Melilotus.**Melilotus Italica.*

*ex passo instillatur: in aceto aut rosaceo madefacta, capitis dolorem lenit.*

**O**fficinarum Melilotus, vera est (quam quarto libro describit Dioscorides) Lotus urbana, Præcellens Melilotus in regni Neapolitani Campania multis in locis nascitur, indeq; semen & flos in alias regiones cæperunt exportari. Mixta est facultatis, cum aliquanta astringitione, digerit tamen & maturat, siquidem calida in eo substantia, frigida valentior est. Huius semen Serapioni in usum medicinae cedit.

**Marum. CAP. XL.**

**NOMENCLATURA.**

*Græ. Μαροϋ. Lat. Marum. Ita. Maro.*

*Gal. Proprium & certum nomen non habet. Off. Lat.*

*nomine.*

*Marum*



**M**arum herba cognita uulgò, surculosa, flore Origani, folijs multo longioribus, flore odoratiore. Vim habet Symbrio consimilem. Substringit enim & modicè calfacit: quae de causa illitu serpentia ulcera sistit, & in calidas illitiones additur. Iuxta Magnesiam & Tralleis copiosissima gignitur.

**M**arum Galeno & Plinio peregrina herba, huic Aegyptia, illi Asiatice & Cizicina: hoc quidam Maioranam nostram gentilem seu minutam putant, verum cum Plinius inter peregrina odora menta recenset, ut hanc non in Europa nasci credamus, facit. Porro, Marum, ut iam dixi, Amaraco amarius & odoratius est. Attamen Mari vicem, Amaracum nostrum minutum, supplere sine noxia poterit.



Acinos.

Acinos.

CAP. XLI.

NOMENCLATVRA.

Græ. Ακινος. Lat. Acino. Ita. Acino. Gal. Basilic menu. Off. ignota. Ger. Klein Basilien.

**A**cinus aut Aconos à Græcis dicitur, tenui siccoq; ramulo herba, Ocimo similis, odorata, sed hirsutior, qua coronæ faciuntur: à nonnullis olitoribus colitur. Menses & aluum pota sistit. Illita panos



panos ignemq<sup>3</sup> sacrum sanat.

**A**cinos Ocymum Caryophyllatum esset, ni Plinius diceret, Acinon nullum florem producere, at nostrum hoc Ocymum floret sub autumnii initium. Adde his, Acinos, ramulis & folijs hirsutior, & odore Ocymo inferior est. Manardus & Matthiolus in illustranda medicina praestantes viri, (Si quidem Acinos in Italia nascatur) herbulam esse opinantur, quæ in agrorum limitibus & semitis nascatur, hirsutam, & aliquantum odoratam, cui à quibusdam Basilici sylvestris nomen inditum est.

## Baccharis. C A P.

### XLII.

#### NOMENCLATURA.

Gr. Βάκχαρις. Lat. Baccharis. Ital.

Bacchara. Gal. Gant de nostre

Dame. Off. ignota.

**B**accharis herba fruticosa, quæ in coronas additur: cuius folia aspera sunt, media Violæ & Verbasci magnitudine: caulis angulosus, cubiti altitudinem petēs, aliquantulum asper, non sine appendicibus adnatis: flore purpureo, subalbicante, odorato: radicibus Veratro nigro similibus, quibus odor inest Cinnamonomo proximus. Asperum squalidumq<sup>3</sup> solum amat. Radix in aqua decocta ruptis, uulsis, ex alto præcipitatis, spirandi difficultati, salutaris. Item diurnæ tussis, & urinæ difficili: menses pellit: contra serpentium morsus utilissimè datur in uino. Recens radix apposita, partum extrahit. Puerperis eius decoctum in desensionibus prodest. In diapsmata utiliter inseritur, incundi odoris gratia. Folia ut potè quæ adstringant, capitis doloribus illitu profunt: oculorum inflammationibus, mammis tumentibus à partu, egilopijs incipientibus, ignibusq<sup>3</sup> sacris auxiliatur. Odor somnum gignit.

**B**accharis, viuida & potēs, nō est Asarum, cuius hætenus vice Baccharis vsus increbruit. Ruellius, Dina Maria chirothecas (nam herba est



ba est hoc apud Gallos nomine) esse putat. Matthiolus eorum. opinio-  
nem improbat, qui Baccharem Caprifolium existimant, herbam quæ  
Officinis Matrisylva, & Italis Scarleggia domestica vocatur, nepe ra-  
dicibus non ea quam requirit Dioscorides similitudine ad Veratrum ni-  
grum accedentibus: & odore nihilum Cinnamomo propinquo. Si-  
quidem radicibus constat raris, candicantibus, gracilibus, & inodoris.  
Et eo conjici difficile esse, Baccharem in Italia reperiri. Quid de Gallijs  
sperandum, quæ magis ad septentrionem vergunt, eam ne herbam pro-  
ducere, quam Galenus dicat odore Cinnamomo simili, coronariam, &  
acrem? Conferant, qui limato sunt iudicio, ac sententiam ferant.

## Ruta. CAP. XLIII.

### NOMENCLATURA.

Græ. ῥύανον. Lat. Ita. & Off.. Ruta. Gal. Rue.



Ruta.

bo potius extinguit: cum Anetho sicco decocta, tormina sedat.  
Facit ad pectoris laterumq; dolores: difficultate spirandi, tusses, pul-  
monis

**R**uta montana sylue-  
strisq; sativa & hor-  
tensi acrior est, & in cibis  
damnata: sativa uero quæ  
sub Ficu arbore enascitur,  
magis in cibos admittitur.  
Vtraque urit, calfacit, exul-  
cerat: urinam ciet, menstrua  
pellit, alium sistit potu cibone:  
letalium medicamentorum  
antidotum est, si semen ex  
uino, acetabuli mensura, ebi-  
batur. Folia per se præsum-  
pta, aut cum nuce iuglande,  
aridisq; ficis, inefficaces ue-  
nenorum vires reddunt: con-  
tra serpentes simili modo su-  
mere conuenit: geniturâ ci-



monis inflammationē, coxēdicū articularūq; cruciatus & horro-  
res febriū circuitu repetētes, pota ut antē dictū est. Itē ad infla-  
tiones coli, uulua, rectiq; intestini, cū oleo decocta & infusa. Fæ-  
minas uulua strangulatu liberat, si à genitali sedetenus cū melle  
subijciatur. Feruefacta ex oleo, & pota, uentris tineas excutit:  
articularijs doloribus ex Melle, aqua inter cutē cū ficis illinitur.  
Eisdē in potu auxiliatur, decocta in uino ad dimidias partes, &  
oblita. Cruda cōditaq; cibo, uisus acie excitat: dolores oculorum  
illita cū polēta lenit, doloribus capitis cū Rosaceo & aceto illita  
auxiliatur: profluētē naribus sanguinē sistit, trita & indita: te-  
stū inflammationibus cū laureis folijs imposita, & eruptionibus  
papularū cū Myrto & cerato prodest. Cū pipere autē, uino &  
Nitro affricta, albæ utiligini medet. Cū eisdē illita, formicatio-  
nes tollit, & uerrucas quæ Thimi florē repræsentāt: cōtra impe-  
tignes cū alumine & Melle utilissimē imponit. Succus in mali  
Punici calyce calfactus, aurīū dolori efficaciter infundit: hebetu-  
dinē oculi qui sensere, Ruta cū Fœniculi succo ac Melle peructi in-  
uātur: ignē sacrū, ulcera quæ serpūt, aut in capite manāt cū aceto  
Rosaceo & Cerusa persanat. Māsa alliorū ceparūq; acrimoniā  
domat. Mōtana si copiosius estur, interficit. Dū florē promit, &  
ad murias colligitur, cutē inflat: & rubore quodā inficit, cū prū-  
ritu ac uehemētī inflammatione. Oportet itaq; eā unctis antea ma-  
nibus & facie colligere. Tradūt succū gallinaceis pullis in spar-  
sum feles arcere. Adijciūt eā quæ in Macedonia circa Haliacmō  
amnē prodeat, comedētes interimere. Montosus autē is locus, ui-  
peris scatet. Semē eius potū, cōtra intestina uitia efficax est: in an-  
tidota cōmodē addit: cōtra incōtinētiā urinæ tostū, semē septenis  
diebus potui datur. Radix huius montanū Moly uocatur. Sylue-  
stris Ruta satiuæ similis est. Prodest comitialibus & coxēdicū  
doloribus: mēstrua mouet, partus enecat. Acrior est uiribus quā  
hortensis, & ualidior. Syluestris, utpotē noxia, cibis abdicatur.

A 2

Sylue



## Syluestris ruta. CAP. XLIIII.

## NOMENCLATURA.

Græ. ῥήγαμον ἄγριον. Lat. Syluestris ruta

Ita. Ruta saluatica.

Gal. Rue sauuage. Off. Harmela.

**V**ocant etiamnum Syluestrem Rutam, quod in Cappadocia & Galatia Asia finitima Moly dicitur. Frutex est qui ab una radice multos emittit cauliculos: folijs multò quàm alterius Rutæ longioribus, tenerioribusq̃, odore graui: flore candido: capitulis in cacumine paulò maioribus, quàm satiuæ Rutæ, quæ tribus maximè partibus constat: in quibus triangulum semen, subrusum, gustu amarum recluditur, cuius est usus. Semen autumnò maturescit: quod cum melle uino, Croco & Fœniculi succo, ac gallinaceo felle, teritur contra retusam oculorum aciem. Sunt qui eam Harmalam uocent, Syri, Besasan. Qui Cappadociam incolunt, Moly, quoniam quandam cum Moly seruet similitudinem: radice nigra, flore candido. In collibus, & læto solo prouenit.

## Moli. CAP. XLV.

## NOMENCLATURA.

Græ. μῶλυ. Lat. Moly.

Ita. Moli.

Gal. Off. &amp; Ger. ignota.

**M**oly folia habet Graminis latiora, humi sparsa: florem albæ Violæ similem, sed minorem, lactei coloris: caulem



lem candidum, quaternum cubitorum, in cuius cacumine inest aliquid quod *Ally* speciem referat. Radix parua, bulbosa, quæ mirum in modum ualet ad aperiendas uuluas, si trita cum Irino unguento, in pesso subijciatur.

**R**uta & hortensis & syluestris notæ cuius sunt planta. Syluestris (non de hac loquor cui 44. Cap. peculiare fecit Dioscorides) in campestribus nascitur, & montibus iuxta Montem Pessulanum, & alijs calidioribus Galliarum locis. Italia in montibus Diui Valentini, & Gargano, & Goritiano comitatu. Domestica similis est, nisi quod acrior & odoris grauior. Ruta syluestris in excoficientium est ordine quarto, domestica tertio. Herba non acres tantum, sed etiã amara. Digerunt, & potenter desiccant. Ruta in venena virtutem nouere Mustella, hac siquidem se præparant cum serpentibus dimicatura. At Ruta syluestris qua de separatim tractat Dioscorides, cuiusque natales peregrinos facit, differt à Ruta syluestri, cuius præcedenti capite mentione facit. Galeno, radice est nigra, flore lacteo. Reperitur in Gallia Narbonensi cum omnibus notis, quas ab ea Dioscorides ex postulat. Præter has tres Ruta species, est etiam Ruta capraria, quem Itali Galega vocant, & Thusci, Lauanese. Nascitur in ipsis fossarum summitatibus, Fœnogræco similis. Huic mirandam vim in pestem attribuunt, in venena, & maximè serpentium, cibo sumpta, seu illita morsui. Pota semiuncia ponderet, pueros sanat epilepticos, Attamè hæc Ruta capraria, nō est Polemonia. Moly Homero, ad excutiendas fascinationes valentissimum, inuentori Mercurio tribuitur, radice rotunda nigraque, magnitudine Cephæ, Folio Scyllæ, flore candido, Gracis alijs luteo. Plinius Moly sibi allati meminit, in Campania agrè inter difficultates saxæas effossi, radice triginta pedes longa, ac nec sic quidem solida, sed abrupta. Moly nostro tempore ignotum, nec est, qui è locus ubi nascitur, proferat.

## Panaces. CAP. XLVI.

### NOMENCLATURA.

Græ. πανακες ἡρακλειου. Lat. Panaces heracleum.

Ita. Panace heracleo.

Gal. Off. Ger. ignotum.

Α 3

Pana



**P**anaces nonnullis Heracleum dicitur, ex quo Opopanax colligi solet. Plurimum in Bæotia & in Phocide Arcadiæ nascitur: ibiq; compendij & quæstus, qui ex eo liquore facilitatur, gratia studiose colitur. Folijs est asperis: in terra iacentibus, herbacei coloris, multum ad ficulnea accedentibus, in ambitu quinque partito diuisis: caule, ut Ferula, altissimo, qui lanugine quadam incanescit, folijs etiam minutioribus obsitus, muscarijs, ceu Anethi, in cacumine: flore luteo, & semine odorato feruenteg; radices habet multas ab origine una, candidas, graneolentes, crassi corticis, & subamari gustus. Nascitur in Cyrene Libyæ, & Macedonia. Excipitur succus incisa radice, recenti caulium pullulatu: ea candidum succum emittit, qui siccatus, in summa cute croceum colorem contrahit. Effluentem autem succum excipiunt, folijs excauato solo stratis, quæ siccata tolluntur. Simili modo caule mesibus inciso, profluentem succum eximunt. Meliores ex radicibus, albæ, rigentes, distentæq; siccæ, quæ cariem non sentiant, aromaticæ, feruentes gustu. Fructus ex media ferula cibo idoneus est: sed ex agnatis stolonibus, ab usu cibario abhorret. Maxime in hoc succi genere probatur quam amarissimus, interne albus, aut subfuluus, foris ad Croci colorem inclinans, leuis, pinguis, friabilis, tener, statim in aqua eliquescent, graui odore. Niger improbatur, ac mollis. Adulteratur Ammoniaco aut cera. Sed Snceri experimentum est, si digitis in aqua friatus resoluitur, & lactescat. Excalcificat, mollit, extenuat: horroribus febrium circuitibusq; uulsis, ruptis, laterum dolori, torminibus, stillicidio urinæ conuenit. Contra uesicæ scabiem ex aqua mulsa aut uino bibitur: menses trahit, fætum enecat, inflationes quæ uuluam male habent, duritiasq; ex melle dilutus, discutit. Ischiadicis illinitur, acopis & capitis medicaminibus admiscetur, carbunculos rumpit, podagricis cum uua passa illitus subuenit, dolore dentium liberat, canis inditus, oculorum aciem



aciem illitu excitat. Ex eo & pice optimum fit emplastrum, cōtra bestiarū morsus, quæ in rabie efferantur. Radix in ramēta conscissa, uulnæ admota, partus extrahit: ad uetera ulcera efficax est, nudata ossa, corpore operit, si trita cum melle illinatur. Semen cum Absinthio sumptum, menses pellit: cum Aristolochia prodest aduersus animalia, quæ uenenum ei aculantur. Et contra uulnæ strangulatus in uino bibitur.

## Panaces Asclepij. CAP.

### XLVII.

#### NOMENCLATURA.

Græ. πάνακες ἀσκληπιῶν. Lat. Panaces Asclepij.

Ita. Panace d' Asclepio.

Gal. Off. Ger. ignotum.

**P**anaces Asclepij, caulē à solo emittit tenuē, cubitalē, geniculatū, circa quem folia Fœniculi fundūtur, sed maiora tamē hirsutioraq̃, odorata: in cacumine umbella, ubi flores emicāt aurei, odorati & acris gustus: radix parua est & tenuis. Auxiliariē uim habēt flores & semina, contra ulcera, phagedanas, & tubercula, si trita cū Melle imponantur. Aduersus serpentes ex uino bibuntur, & cū oleo illinuntur. Aliqui Panaces syluestre Origanum uocant: alij Cunilam: de qua in Origani mentione diximus.

## Chironium Panaces. CAP.

### XLVIII.

#### NOMENCLATURA.

Græ. πάνακες χειρῶνιον. Lat. Chironium Panaces.

Ita. Panace Chironio.

Gal. Off. Ger. ignotum.

4

Chiro



**C** Hironium Panaces in Pelio monte maximè provenit. Folium eius Amaraco simile: flos aureus: radix parua, quæ non altè demittitur, gustu acris. Pota radix serpentium ueneno resistit. Illita coma, eadem præstat.

**P**anaces ab inuentoribus agnomen sortitum, nempe primum ab Hercule, secundum ab Aesculapio, tertium à Chirone, ipso suo nomine morborum omnium remedium pollicetur. Panaces Herculeum spontè in Italia provenit, maximè in Apulia, in Apennini iugis, & in monte quem sibi proximum Senenses, Argentæo vocant. Seritur & pluribus in hortis, ostentationis & publici spectaculi gratia. Atenim in nullo Italia loco extrahitur is liquor, quem Opopanacem vocant. Hic Venetijs ex Alexandria assertur, magna ex parte adulteratus, reperitur tamen quandoq; singularis, nitidus, & sincerus. Semen & radix Panacis ad nos hodiè non afferuntur, quantumvis hæc sanè necessaria. Ideò diligentes Chirurgici ad inducenda quæ carne nudata sunt ossa, radicum fragmenta magna sedulitate inter condensatum gummi perquirunt, quæ puluerem in id remedium efficiant. Opopanax qui incisa sit radice, vel caule Panacis Herculei, excalfacit, emollit, & digerit, tertioque excalfacientium est ordine, & desiccantium secundo. Radicis cortex calida & sicca est, minus tamen succo, ut quæ aliquantum absterforia sit. Panaces Asclepium & Chironium nemo est qui ostendat, aut in Europam afferat.

## Ligusticum. CAP. XLIX.


### NOMENCLATURA.

Græ. Λιγυστικου. Lat. Ligusticum. Ita. Ligustico.

Gal. Liuesche. Off. Leuisticum.

**L**igusticum, quod alij Panaceam, alij Panaces uocant, plurimum in Liguria nascitur, in monte Apennino, Alpibus contermino, unde nomen traxit. Panaces incolæ non ab re appellant, quoniam & radice & caule, Heracleotico Panaci simile sit: & uiribus eisdem præditum. Gignitur in altissimis asperisq; montibus, ac umbrosis, maximè iuxta fluentia. Cauliculum fert Anethi, geniculatum, tenuem, & in circuitu folia sertula campanæ, molliora, odorata, prope uerticem graciliora



\* *Ligusticum.*

lora, & longè magis di-  
uisa: in cacumine muscariū,  
in quo semen dependet ni-  
grum, solidum & oblon-  
gum, fœniculo proximum,  
gustanti acre, & aroma  
olens: radix candida, Hera-  
cleotici Panacis similis, odo-  
rata. Radicis seminisq; uis  
excalfactoria, cōcoques. Pro-  
dest ad intestinos dolores,  
tumores, concoctiones. Item  
ad inflationes, præsertim  
quibus stomachus turgeat:  
& cōtra serpentium iētus:  
urinas & menses potu tra-  
hit. Eosdem præstat effectus  
apposita radix. Semen cum  
radice oxyporis & medi-

camentis decoquentibus admiscetur: ori perquàm utile: quare  
pro Pipere utuntur eo indigenæ ad obsonia. Adulteratur semi-  
ne quodam simili, quod facile gustu discernitur: amarum enim  
est. Alij semen Fœniculi aut Seselis admiscentes Ligusticum  
dolo utiant.

**L**igusticum, à Liguria ubi plurimum nascitur, Galeno Libysticum,  
non est Leuisticum vulgare. Siquidem Leuisticum non nisi in hor-  
tis provenit. Caulem facit altissimum, concavum, & crassum, & non  
tenuem, ut de suo narrat Dioscorides. Folia nihil ad Sertulam campa-  
nam accedunt, at ut Apij incisa, crassiora tamen & maiuscula. Semen  
licet Fœniculo proximum, tamen solidum non est, nec aroma olens, sed  
friabile, & squamosum. Porro cum verum Ligusticum Genuæ & per  
totam Liguriam copiosè nascatur, & inibi semen in ciborum condi-



mentum veniat, publice tamen in alias Italiae partes non exportatur.  
Eius etiam summa abundantia est in altissimis vallis Anania & Go-  
ritiani comitatus montibus.

# Pastinaca. CAP. L.

## NOMENCLATURA.

Græ. Σταφυλίν & ἄγρι &.

Lat. Pastinaca sylvestris.

Ita. Pastinaca saluatica.

Gal. Carrotes sauages. Off. Latino nomine.

Ger. Wüß Pasteney.



*Pastinaca domestica.*



*Sylvestris.*

Pasti



**P**astinaca sylvestris folia Gingidij habet, latiora, subamarā caulem rectum, scabrum: umbellam similem Anethi, in qua flores insunt candidi, & in medio purpureum quiddam, ferme croceum: radix digiti crassitudine, dodrantalis, odorata, quæ cocta manditur. Semen potum uel impositum, menstrua mouet. Iis conuenit in potione, quos urinæ difficultas torquet, aut lateralis dolor excruciat, aut si aqua cutem subiit. Serpentium morsibus ietibusq; prodest. Præsumentes id nulla affici iniuria à serpentibus traduntur: conceptus adiuuat. Radix urinam pellit, uenerem stimulat, partus apposita eicit. Folia trita, & cum Melle imposita, phagedenas ulcerum purgant. Satina ad eadem pollet, inefficacior tamen, & cibo aptior.

**P**astinaca domestica & sylvestris, utraque nostro tempore in hortiensi re nota est. Nec tamen Pastinaca domestica Carota est, nimirum quod nullus vnquam scripserit, Pastinacam domesticam, radice purpurea & sanguinea. Eodem in errore versantur, qui pro Dauco, syluestris Pastinacæ semen accipiunt, de illa loquor quæ in umbellæ medio paruum florem & purpureum producit. Et quamuis Dauci & Pastinacæ sylvestris sic vires conueniant, ut vnum pro altero usurpari queat, non ideo sequitur idem esse Daucum & Pastinacam sylvestrem. Hæc in totum domestica valentior, præcipue semen & radix, & absterforium in se quiddam continet.

## Sefeli. CAP. LI.

## NOMENCLATURA.


Gr. Σεσέλι μασσάλεωτικόν. Lat. Sefeli

Massiliense. Ital. eodem nomine. Gal.

Ser mōtain. Off. Siler montanū.

**S**efeli Massiliense folia Fœniculi habet crassiora: caulem uergentem: umbellam Anethi, in qua semen oblongum, angulosum, degustanti statim acre: radix longa est, iucundi odoris. Semē & radix excalfaciēdi uim habet, potu stranguriæ & ortho





*Massiliense Sefeli.*

longa: frutex nigricat, palmitibus in bina cubita extensis, ramis sesquipedalibus, capitulo Anethi, semine in tritici morem denso, nigro, amaro, Massiliensi odoratiore, & acriore, multū suavi. Peloponnense folia habet Cicutæ, latiora, & crassiora: caulem supra Massiliensis magnitudinem, ferulaceum, & latam in cacumine umbellam, in qua semen latius, odoratum, & carnosum pendet. Eisdem uiribus præditum est. Nasitur in asperis, riguis & collibus, inuenitur etiamnum in insulis.

*Creticum seseli.* CAP. LII.

NOMENCLATURA.

Græ. Τορδύλιον. Lat. Tordilium. Ita. Tordilio.

Gal. Off. Ger. non satis cognitum.

Tor



\* *Creticum seseli.*

**T**ordyliū, quod aliqui Creticū Seseli uocāt, iuxta Ciliciā in Amano mōte nascit, herbula surculosa, semine duplici, rotūdo, scutuli effigie, odorato, subacri. Cōtra urinæ difficultatē bibitur, potu cit mēses. Succo seminis caulisq; uirentis, ternis obolis ex passo decē diebus hausto, renes sanantur. Efficax est radix ad ciēdas pectoris excreationes, in delinctu cum melle.

**S**eseli Masiliense tum in vicinis Masiliæ locis, tum in omnibus Tridentinis montibus enascitur, & speciarie quāuis quādoq; probatū, habēt tamen

non rarò, quod delineationi Dioscoridis nō respondeat, in quo nihil præter amaritudinē & cimiū odorē sentiatur. Seseli Aethiopicū, Peloponnesiacum, & Creticum ad nos non afferuntur, ac proinde eorum notitia deperijt. Ceruæ à partu Seseli se purgant.

## Sison. CAP. LIII.

### NOMENCLATURA.

Græ. Σίσων. Lat. Sison. Ita. Sifone.

Gal. nomen nō habet. Off. perperā semē Amomi.

**S**ison exiguū semen est, in Syria natū, Apio simile, nigrū, feruēs, oblogū. Cōtra lienis uitia bibitur, urinæ difficultatē potu emēdat, remoratos mēses citat. Quo in cōdimētis cū cucurbita, & aceto, indigenæ utūtur. In cacumine granula multa gerit.

**Q**uidā semen illud quod pro Amomi semine officinæ ostēdūt, eadem qua petroselini vulgaris forma, colore pullū, cū tunditur odora-  
tum



tum, gustu acri, linguamq; flagrantia vellicante, Sisonis esse semen putat. At ignota nobis planta, qui tandem de semine statuere possumus? Nec enim expeditum hisde rebus iudicium, quae de principia partes & nota depicta non sunt.

## Anisum. CAP. LIIII.

### NOMENCLATURA.

Græ. *Ανισον*. Lat. *Anisum*. Ita. *Aniso*.

Gal. *Anis*. Off. Latino nomine. Ger. *Anisz*.



*Anisum.*

**A**nisi & plāta & semē vulgaris sunt notitia. hoc vtile admodum est, acre, & amarum, & natura ad exurentia accedens, tertia calidorum & siccorum classis.

## Carum. CAP. LV.

### NOMENCLATURA.

Græ. *Κάρο*. Lat. *Carum*. Ita. *Caro*.

Gal.



Gal. & Off. Carui. Ger. *Wöl Comtin.*

**C**arum, semen est vulgaris notitiæ. Excalfacit, urinam concitat, stomacho utile, os commendat, cōcoctionē adiuuat, utiliter miscetur antidotis & oxyporis, Anisi uicem præbet. Radix cocta, Pastinacæ modo manditur.

**C**arum pratensis herba cum semine nota est. Id Germani panibus immittūt, eoq; in ciborum cōdimentum vtuntur, vt nos Aniso. Tertio fere ordine excalfacit, & desiccāt, & modicā acrimoniā respicit.

## Anethum. CAP. LVI.

## NOMENCLATURA.

Græ. *Ανέθον*. Lat. *Anethum*. Ita. *Anetho*.Gal. *Anet*. Off. Latino nomine.*Anethum.*

**A**ridi Anethi comæ seminisq; decoctum, potu lac euocat, inflationes, & tormina sedat, aluū, uomitionesq; sistit, urinas ciet, singultus lenit, oculorū acie hebetat, geniturā restinguit, assidue potum. Fæminis uulua malo opportunis, ad deſeſiones utile. Condylomata illitus eius cinis tollit.

**A**nethi planta fœniculo adſimilis, latius tamen ſemē. Calidum eſt Anethum ſub finē ſecundi gradus, aut ineunte tertio. Vſum calidum & ſiccum eſt tertio ordine.

*Cumin*



## Cuminum satium. CAP. LVII.

## NOMENCLATURA.

Græ. Κύμινον σίμερον. Lat. Cuminum satium. Ita. Cimino domestico. Gal. Cumin. Off. Cuminū romanū.

**C**uminū satium ori gratū est: sed multo magis Aethiopicū quod Hippocrates regiū appellauit. Secundum locū tenet Aegyptiū, reliqua sequuntur. Prouenit in Galatia, in Asia, Cilicia, & Teretia, & plerisq; alijs tractibus. Excalfacit, adstringit, exiccat. Ad tormina inflationesq; cōuenit, coctum & cum oleo inditū, aut cū hordeacea Farina illitū. Orthopnoicis datur in posca: demorsis à serpēte, in uino. Testiū collectionibus auxiliatur, impositū cū uua passa, aut Loly farina ceratōne. Mensiū abundantia inibet. Cōtritū autē in aceto, & naribus obiectū, sanguinis profluvia sistit. Colorem bibentium, aut perunctorū, mutat in pallorem.


## Syluestre Cuminum. CAP. LVIII.

## NOMENCLATURA.

Græ. Κύμινον ἄγριον. Lat. Syluestre Cuminum. Ita. Cimino saluatico. Ga. Cornuete. off. Cōsolida regalis.

**S**yluestre Cuminū, plurimū efficaciusq; in Lycia, & Galatia Asia, atq; Carthagine Hispania gignitur: frutice paruo dodrātali caule, ac tenui, quaternis aut quinis folijs tenuibus, ueluti serratis, & Gingidij diuisura. In cacumine capitula quina, aut sena habet, mollia, rotunda, in quibus est semen acerosum, gustu satiuo acriore. Nasctur in collibus. Bibitur semē ex aqua aduersus tormina inflationesq; itē cōtra uenenatas bestias, ex uino: singultus ex aceto sedat: stomacho utile, quē humor uexat, sugillata tollit, si manducatū cū Melle & uua passa illinatur. Testiū inflammationibus, adiectis eisdē illitū medetur. Est & aliud Syluestris Cumini genus, satiuo nō dissimile, quod à singulis





Ammi.

lis floribus pensilia promit  
cornicula, in quibus semē est  
Melanthio simile: quod po-  
tum omnium serpentū mor-  
sibus praesidio est. Calculosis  
& ijs qui urinae stillicidio ue-  
xantur, aut concretum san-  
guinem cum lotio reddunt,  
auxiliatur: sed Apij semen  
feruefactum postea biben-  
dum est.

**C**yminum sativum folijs  
est fœniculi, caule unico, è  
quo plures ramuli prodeunt: flo-  
rescit in umbellā, & ex ea copiosi-  
ssimum semen emittit. Radice  
est candida, subrotunda, quasi  
bulbosa. Nascitur in putribus

& maximè calidis locis. Ruellius & Valerius Cordus utrunque Cumi-  
ni sylvestris genus in Consolida regali, & Cornuta, noscitant. At Mat-  
thiolus neutrum in Italia reperiri scribit, quod è Licia, Galatia, & Hi-  
spania ubi summa copia nascuntur non afferantur. Cyminum excalsa-  
cientium ordinis est tertij.

## Ammi. CAP. LIX.

## NOMENCLATURA.

Græ. Αμμι. Lat. & Ita. Ammi.

Gal. & Off. Ameos. Ger.

Ammey samē.

**A**mmi Aethiopicum Cuminum appellant: plerique hoc  
natura diuersum ab illo existimant. Vulgo notum est se-  
men exi



men exile, multò minus Cumino, Origanum resipiens. Eligendum est purum, minimè fursurosū. Vis ei excelsa factoria, feruens & exiccans. Facit ad tormina, urinæ difficultatem, serpentium ictus, cum uino potum: menstrua ciet: miscetur derodentibus cantharidum medicamentis, quæ ecdoria uocant, ut inde exortis urinæ difficultatibus resistat. Sugillata cum Melle tollit, colorem potu aut illitu mutat in pallorem. Suffitum cum una passa aut resina, uulvas purgat.

**A**mmi Matthiolo ex autoritate D. Aluigij Romani herbarij, & Simpliciarij excellentissimi in Italia non nascitur, è que tot diuersis seminibus quæ Ammi nomine in seplasijs ueneunt, nullum est quod verum Ammi semen referat. Id natura calidum & siccum est, & cum subtilibus constet partibus subamarum & acre est. Calidum itaque & siccum in tertij ordinis fine.



Coriandrum.

Coriandrum.

CAP. LX.

NOMENCLATVRA.

Græ. κόριον.

Lat. Coriandrum aut Corianum. Ita. Coriandro. Gal. Coriandre. Off. latino nomine. Ger. Loriander.

Corian



**C**oriandrum aut Corianum, uulgaris est notitiæ, uim refrigeratoriam habens. Quare illitum cum pane aut polenta, ignibus sacris, & ulceribus quæ serpunt, medetur: epinyctidas cum Melle uel uua passa, testium inflammationes, carbunculosq; sanat: cum Faba fresa, strumas & tubercula discutit: tineas interaneorum expellit semen, cum passo potum, & generaturam adauget, largius tamen sumptum, mentem non sine periculo mouet: quare continuo, & copiosiore usu abstinendum. Succus cum Cerussa spumæ argenti, necnon aceto & Rosa-ceo illitus, arduentes summæ cutis inflammationes emendat.

**N**otū est Coriadrū, & eius semen quod in cōdita cedit. Herba ipsæ essentiæ amaræ habet plurimum, aquei humidi tepentis parum, & strictionis tantillum, ut ab ea refrigeret, quemadmodum ex amarore, excalfacit: deterget, digerit, & tenuium est partium.

## Hieracium. C A P.

### L X I.

#### NOMENCLATURA.

Gr. Ἱεράκιον μέγα. Lat. Hieracium magnum. Ita. Hieracio maggiore. Gal. Cichoree iaune. Off. Cichorea lutea.

**H**ieracium magnū, caulem emittit asperum, subrubrū, spinosum, caui. folia ex interuallis rariusculè diuisa, similia

B 2

Soncho





Hieracium.

impendit.

**H**ieracium Plinio ex accipitribus nomen accepit, quod eius succo vnguibus elicto, oculos à caligine expediant. Herba in totum Soncho similes, & rusticis nota: maius Cichora lutea: minus Intubi sylvestris nomine. Harum nullam Galenus aut Paulus mentionem faciunt.

Soncho per ambitum: luteos flores in oblongis capitulis. Vim refrigerandi habet, & modice substringendi. unde illitum, stomacho aestuanti, inflammationibusq; prodest. Succus erosionem stomachi sorbitione mitigat. Herba cum radice illita, uibratis à scorpione ictibus auxiliatur. Hieracium paruum, folia ex interuallis habet, diuisa in ambitu: cauliculus teneros, uirentes, in quibus lutei flores orbem circinantes, emicant. Vim suam ad eadem ad quæ superior

## Apium CAP.

## LXII.

## NOMENCLATURA.

Græ. σέλινον. Lat. Apium. Ita. Apio.

Gal.



Gal. Persil. Offic. Latino  
nomine. Ger,  
Epffich.

**H**ortensis Apij herba ad eadem ad quæ Corianum conuenit: inflammationibus oculorum, cum pane aut polenta illinitur: æstuantem stomachum mulcet: mammarum duritiam ex lacte concreto contractam reprimat: urinam ciet, siue crudum, siue coctum edatur. Decoctum eius radicisq; potum, uenorum noxa resistit, quum uomitiones excitet: aluum cohibet. Semen uehementius urinam pellit: contra serpentium uenena, aut epotam argenti spumam auxiliatur: inflationes discutit. Admiscetur medicamentis quæ dolorum leuamenta præstant, theriacis quoque, ac tussis remedijs. Eleoselinum in humidis nascitur, satino grandius, ad eadem efficax. Oreoselinum, caule est dodrantem alto, ab radice tenui exeunte: per cuius ambitum rami & capitula Cicutæ, multò tamen tenuiora: semine Cumini, oblongo, acri, & odorato, tenui. Nascitur in petrosis & montibus. Urinam ciet, semine ac radice in uino potis: menses trahit. Antidotis, necnon medicamentis urinam cientibus & excalfactorijs inseritur. Nec hallucinari nos oportet, existimantes Oreoselinum esse, quod in saxis prouenit: aliud enim est Petroselinum. Petroselinum in Macedonia prouenit, in præruptis locis, semine Ammy, odoratiore, sapore acri, aroma olente. Urinam cit ac menstrua. contra stomachi & coli inflationes, & tormina prodest: laterum, renum, & uesicæ doloribus in potu subuenit. Admiscetur antidotis urinam cientibus. Hipposelinum, Latini Olusatrum appellant, aliqui Smyrnion, quamuis aliud sit quod propriè Smyrnion dicitur,

B

3

ut pan





Apium.

da coctāne estur. Folia cum canlibus decocta manduntur, & per se aut cum piscibus præparantur, crudaq; muria condiuntur. Vim hanc habet, ut poto semine ex mulso uino, menses ciat: algentes calfacit potu aut illitu: urinæ stillicidio auxiliatur. Radix eosdem præstat effectus.

tipaulo post referemus. Est autem maius & satius Apio candidius: caule alto, cauo, molli, habente ueluti lineas: folijs latioribus, in puniceum uergentibus: coma Rorismarini, florum plena, dependentibus in cacumine corymbis, antè quàm deflorescat. Ea semine turgēt nigro, oblongo, acri, solido, aromatico. Radix dimittitur tenuis, odorata, candida, quæ os commendat. In umbrosis & palustribus enascitur. olerum generis, ut apium. Radix cru-

**M**edicorum bona pars qui lapsam in barbariam medicinam restituere, Apium domesticum antiquorum, vulgare nostrum Petroselinum esse contendunt. Porro Apium quod officina pro Apio domestico obtrudunt, Apium est palustre, domestico maius. Attamen non illud est quod Itali Macerone vocant, ut in sequenti de Smyrnio capite patebit. Nam multum inter se differunt Macerone, Apium palustre, & Hipposelinum. Montanum Apium non semel Matthiolo ostensum est.

cum no



cum notis omnibus quas ei assignant Theophrastus & Plinius, nempe Cicuta folijs, radice gracili, caule & umbella Anethi. Quod ad Petroselinum Macedonicum attinet, eo nos caremus. Et cum Petroselini semen, Ammio candido & minimo semini comparetur, Officinarum semen illud grande, & nigrum Oreoselini semen esse non potest. Atenim quod sub huius nomine sativum in hortis visitur, cultura mansuefactum, illius speciem præse fert. Hipposelinum Matthiolo Leuisticum est vulgare, nec est Macerone, quod Hipposelinum radice sit candida, & Macerone nigra. Quod autem in historia Hipposelini non sibi conveniant Theophrastus & Dioscorides videtur Theophrastus de alio quam Dioscorides Hipposelino intellexisse, nimirum de Smyrnio, maxime cum Galenus dicat, quibusdam nihilum inter se differre Hipposelinum & Smyrnum. Valerius Cordus semen quod pharmacopœia pro Petroselino Macedonico venditant, Olusatris esse contendit.

## Smyrnum. CAP.

## LXIII.

## NOMENCLATURA.

Græ. *Σμύρνιον*. Lat. *Smyrnion*. Ita, *Macerone*. Gal. *Leueche* non probe.  
Off. *Angelica*.

**S**Myrnion, quod in Cilicia Petroselinum uocant, passim in Amanio monte gignitur. Caulem habet *Apj*, & stolones multos: folia latiora, subpinguia, ad terram infracta, robusta, odore medicato, cum quadam acrimonia, iucunda, colore in luteum languescente: capitibus caulium orbiculatis, ut *Anethi*, semine *Brassicæ*, rotundo, nigro, acri, *Myrrhæ* sapore, ita ut alterum alterius loco cedat: radix quoque odorata, gustu acri, fauces mordet, succosa, mollis: cortex eius foris niger, intus viridis, aut subalbidus. Nascitur in saxosis, & collibus, atque

B 4 *Squalis*



squalidis, & limitibus terrenis. Vis radices, herba & seminis, excalfacere. Folys muria maceratis ad obsonia utuntur: aluum sistunt. Radicem contra serpentium ictus bibere conuenit, tusses & orthopnœas mitigat, urina difficultati medetur, recentes tumores, collectiones duritiasq; discutit. Illita, uulnera ad cicatricem perducit, partus abortu uitiat, si feruesacta subijciatur. Semen, lienis, renum & uesicæ uitys prodest: menses & secundas pellit, commodè datur ischiadicis in uino: inflationes stomachi lenit, sudores ciet, & ructus. Peculiariter datur hydropicis in potu, & contra febrium circuitus.

**S**Myrion Matthiolo ea herba est, quam Thusci Macerone vocant, siquidem caulem habet Apio similem, stolones multos, folia lata, subpinguia, in terram infracta, quadantenus acria, pallida, odore medicamento: caput caulium orbiculatum, ut Anethi: semen Brassicæ. Et reliqua peraque nota, & vires Dioscoridis delineationi respondet. Seris Smyrniæ cepit iam senescente Plinio, hodieq; in Italia seritur. Errant qui Hippofelinum, syluestre Smyrniū esse cõtendunt, nec minus hallucinantur, qui id esse autumant, plantam quæ vulgo Imperatoria vocatur. Valerius Cordus Smyrniū, Angelicam facit, nō illam vulgarem, sed quæ in Pomerania & Brisgoia nascitur, nigra foris radice. Nam vulgare Myrrhis quibusdam videtur, quod impugnat Matthiolus.

## Elaphoboscum. CAP.

### LXIIII.

#### NOMENCLATURA.

Gr. Ελαφοβοσκου. Lat. Elaphoboscum.

Elaphoboscho. Gal. & Off.

Gratia dei.

**E**laphobosco fœniculaceus caulis est, aut Rorimarino similis, geniculatus: folijs duum digitorum latitudine, ut Te rebinthi, pralongis, aliquantum asperis, circumfractis: adnata multa habet, ferentia umbellas Anethi similes, & semina eiusdem



dem: florem subluteum: radice ternum digitorum longitudinis  
& crassitudinis unius, candida, dulci, esui apta. Caulis tener  
pro olere manditur. Contra serpentium ictus, datur semen in ui-  
no. Fama autem est, hoc pabulo cernas serpentium morsibus re-  
sistere.

**E**laphoboscum hanc non esse herbam, quam herbarij Gratiam dei  
vocat, & è qua sui nominis unguentum conficitur, hoc cõjicitur,  
quod gratia dei, similis Hyssopo sit, & non fœniculo. Vidit Matthio-  
lus in valle Anania & in comitatu Goritiano plantam intantum Ela-  
phobosco similem, vt ouum ouo nõ magis accedat. Excalfacit Elaphobo-  
scũ vt potè è subtilibus partibus cõpositum, & desiccat secundo ordine.

## Fœniculum. CAP. LXV.

### NOMENCLA- TVRA.

Gr. μαράθρον. Lat. Fœ-  
niculum. Ital. Finocchio.  
Gal. Fenoil. Off. nomine  
latino. Ger. Fenchel.

**F**œniculum si herba eda-  
tur, aut semen cum ptisa-  
na bibatur, mammas lacte  
replet. Comæ decoctum in  
renum doloribus subditum  
proficit, quippe quòd urinam  
excitet. Contra serpentium  
ictus in uino conuenienter bi-



Fœniculum.

B §

Litur



bitur, menses ciet. In febris nauseam & stomachi feruorem, ex aqua frigida potum, sedat. Contrita radices & cum melle illita, morsibus canum medentur. Succus caule & folijs exprimitur, & in sole siccatus, in medicamenta adijcitur, quæ ad excitandam oculorum aciem commodè temperantur. Extrahitur succus ad eadem ualens, etiam semine uiridi, ramulisq; & radicibus prima germinatione incisis. In Iberia quæ ad occidentem spectat, succum reddit gummi similem. Caulem medium, dum herba floret, rustici demetunt, igniq; admouent, quò facilius ui caloris exudans gummi remittat: quod efficacius succo est, ad medicamenta oculorum.

Fœniculum erraticum, siue Hippomarathrum. CAP. LXVI.

Græ. ἵππομαραθρόν. Lat. Hippomarathrum. Ita.

Finocchio saluatico. Gal. Fenoil sauage. Off. ignotum.

**E**st & sylvestre Fœniculum, magnum: fert autem semen Cachryi simile, cuius radix iucunde olet, potaq; stranguriæ medetur, menses imposita ciet, uentrem sistit: radice aut semine poto contra serpentium morsus auxiliatur, calculos comminuit, et regium morbum expurgat, lactis abundantiam facit. Decoctum foliorum haustum, scēminas à partu purgat. Traditur aliud Hippomarathri genus, longo, exili, & angusto folio, semine Coriandri, rotundo, acri, & odorato. Excalfaciendi naturam habet, & uiribus Fœniculo respondet, sed ad omnia infirmus.

**N**ulli non notum fœniculum satium, & sylvestre. Seritur sub ueris initium aprico & modicè saxoso loco, mense februario, planta non minus condiendis cibis quàm medicinæ utilis. Fœniculum nobilitauere serpentes, dum ab eius gustu senectam exuunt, ac obtusam oculorum aciem



aciem eius succo reficiunt. Quo perspectum caliginem in hominibus dis-  
cuti. Potenter excalfacit Fœniculum, nempe tertio ordine, & desiccat  
primo. Hippomarathrum valentius quàm domesticum desiccat. Est &  
aliud Hippomarathri genus, semine acri & rotundo vt Coriandri, cum  
alio simile, sed debilioris opere.

## Daucum. CAP. LXVII.

### NOMENCLATURA.

Græ. Δαῦκος. Lat. Daucus. Ita. Dauco.

Gal. perperam, Carotes sauages.

Off. Principij errore, Caro-  
ta sylvestris.

**D**aucum aliqui Daucium uocant. Creticum folijs Fœni-  
culo simile, minoribus & tenuioribus: caule dodranta-  
li: umbella Coriandri flore albo: semine acri, candido, hirsu-  
to, suauissimi odoris in mandendo: radix digitali crassitudi-  
ne & dodrantis longitudine adolefcit. In saxosis nascitur, &  
locis sole illustratis. Aliud eius genus sylvestri Apio simile, a-  
cre, odoratum, aroma olens, feruentis gustus. Probatissimum  
Creticum. Tertium assignatur genus folijs Coriandri, floribus  
albis, capite & semine Anethi, muscario Pastinacæ, semine ob-  
longo, ceu Cumini, acri. Omnium semen excalfacit. Potum uri-  
næ, menses, & partus extrahit, torminibus liberat, ueterem  
tussim mitigat. Phalangiorum morsibus potum in uino auxilia-  
tur. Tumores illitu discutit. Seminis duntaxat in alijs generibus  
inualuit usus: in Cretico, etiam radicis, quæ maxime contra ue-  
nenatorum iniuriam in uino bibitur.

**E**tsi Daucum pro Pastinaca sylvestri, & veteres & ipse Dioscorides  
accipiant, atque adeo reuera ipsum Daucum Pastinacæ sylvestris  
sit species, non ideo tamen ipsa est Pastinaca sylvestris. Siquidem diuersis  
de ijs capitibus tractauere Dioscorides et Galenus. Creticum asportatur  
è Candia. Quod verò simile est Pastinacæ in Senensi territorio & multis  
in Thufcia locis nascitur. Tertium genus Folijs Coriandri et semine Cumini



in multis Italia locis puenit. Daucū exalfacit et desiccāt. Radix v̄eto-  
sum quid in se habet, & venerem proritās. Semen ipsa herba valentius.  
Cordo, Germania omnes Dauci species, sub Pimpinellæ nomine produ-  
cit. Ruellio, Creticum Daucum ea est herba quam, Carotam syluestram  
vocant. Secundum & tertium Dauci genera, Asinini Dauci ab herba-  
rijs nomine insigniuntur.

## Delphinium. CAP. LXVIII.

### NOMENCLATURA.

Græ. Δελφίνιον Lat. Delphinium. Ita. Delphinio.

Gal. non probatè, Trompetiere.

Off. Buccinaria.

**D**elphinium surculos emittit à radice una sesquipedales,  
aut maiores, à quibus folia exeunt parua, tenuia, diuisa,  
prælonga, quæ Delphinorum effigiem representant: unde tra-  
ctum nomen est. flos Viola albæ non dissimilis, purpureus: & se-  
men in siliquis Milio proximum, quo non aliud utilius bibi po-  
test ab scorpione percussis. Ciunt enim obiecta herba scorpiones  
resolui, atque ignauos torpescere: semota uerò ea, sese recollige-  
re. Prouenit in asperis & apricis. Alterum est Delphinium,  
quod Romani Buccinum uocant, superiori simile, sed folijs &  
ramis longè gracilius. Viribus eisdem pollet, sed non ita effica-  
cibus.

**H**oc de Delphinio caput, Matthiolo et Cordo adieclitium videtur,  
quod Galenus & Paulus nullam huius in recensione simplicium  
mentionem faciant, quos Dioscoridem imitasse nulli non compertum est.  
Adde his quod id antiqua exemplaria non habent: nec vllam Dioscoridi  
fuisse causam, cur siliquiseram, umbelliferis herbis immisceret, instituto  
suo compugnans.

## Pirethrum. CAP. LXIX.

### NOMENCLATURA.

Græ. πύρεθρον, Lat. & Off. Pyrethrum.

Gal. Pied d'Alexandre.

Pyre



\* *Pyrethrum.*

**P**yrethrum saluarem  
uocant, folia caulemq;  
emittit ut Daucum syluestre  
& Feniculum: umbellamq;  
Anethi, circinata & rotundi-  
tatis. Radix longa est, polli-  
cis craſſitudine, guſtu ferui-  
diſſimo. Pituitam elicit, ideo  
in dolore dentium, decocta  
in aceto, colluto inde ore, au-  
xiliatur. Manſa pituitam ex-  
trahit. Sudores ciet, perun-  
cto ex oleo corpore: diutur-  
nis horroribus efficax, con-  
tra perfrictiones membro-  
rum, resolutionesq; eximie  
conducit.

**P**yrethrum radice tantum pharmacopolijs cognitum, quamuis in  
quibusdam Italia montibus naſcatur, non ea tamen eſt acrimonia,  
qua id quod Venetijs ex oriente affertur. Vidit Matthiolus dum apud  
Germanos ageret, in horto D. Biagijs Sbaiger præcellentis medici, radi-  
cem & folia quæ Pyrethri descriptioni reſponderet, caule tamen in ſum-  
mo Anethi muſcario non ornato. Nec aliter de Gallico Pyrethro Ruel-  
lius prodidit, quinetiam vtrunque flores camomilla producit. Excalſa-  
cit & deſiccatur in tertio, & quibusdam in quarto abſceſſu.

**Rosmarinus. CAP. LXX.**

**NOMENCLATURA.**

*Græ. Ῥοσμάρις. Lat. & Off. Rosmarinus.*

*Gal. Espece de Rosmarin. Off.*

*Horum uſu carent.*

*Duo*



**D**uo Rosmarini genera. Vnum sæcundum frugiferumq̃, cuius semen Canchrys uocatur. Folia Fœniculi habet, crassiora & latiora, in rotæ speciem, humi sparsa, iucundè olentia, caulem cubiti altitudine, aut maiorem, multis concuum alis: in cacumine umbellam, in qua semen copiosum, candidum, Sphondylion simile, rotundum, angulosum, resinaceum, quod in mandendo linguam exurit. Radix Thus redolet, candida, prægrandis. Est & alterum omnino consimile, semen ferens latum, nigrum uti Sphondylion: odoratum, minimè exurens, radice foris nigra, intus si frangatur, alba. Verùm id quod sterile dicitur, illorum planè similitudinem refert: sed neque caulem, neque florem, neque semen promit. Nasctur in saxosis & asperis. Trita omnium herba communiter hæmorrhoidum profluuiâ sistit, sedis inflammationes & condylomata mitigat, cõcoquit strumas & abscessus, qui ad maturationem egrè perducuntur. Sicca radices, cū Melle ulcera purgant: torminibus medentur cum uino potæ: & contra serpentium morsus conueniunt: menses & urinas cient, ueteres tumores illitu discutiunt. Tam radices quàm herbe succus, adiecto Melle illitus, oculorum aciem exacuit. Potum semen ad eadem pollet: si comitiale malum sentiatur, aut uetus pectoris uitium, auxilio est: regio morbo laborantibus cum uino & pipere datur: sudores mouet, cum oleo perunctum: ruptis & conuulsis prodest: podagris, cum loliacea farina & aceto tritū, illinitur: purgat utiligines, addito aceto quàm acerrimo. Semine in potionibus utendum, eius quidem quod Canchryn non ferat, quippe illud sua acrimonia arteriam exasperat. Rosmarinū cum Erica nasci, folijs Lactucæ syluestris amara & asperioribus, candidioribusq̃, radice breui, Theophrastus autor est, potuq̃ id ipsum alterutra parte purgare. Canchrys uim habet excalescendi, & uehementer exiccandi, quare abstergentibus medicamentis inseritur. Contra oculorum fluxiones capiti illinitur, ita ut

ter



*tertio die soluatur.*

## Rosmarinum coronarium.

### CAP. LXXI.

#### NOMENCLATURA.

*Græ.* Λιβανώσις σεφανωμάσηκη. *Lat.* Rosmarinum coronariū. *Ita.* Rosmarino coronario. *Gal.* Rosmarin. *Off.* Rosmarinus.

**R**osmarinum quo coronarij utuntur, ramos mittit tenues, & circa eos folia minuta, densa, longa, exilia, subter incana, supernè uirentia, graui odore. Excalfactoria ui præditum est. Regium sanat morbum, si decoctum in aqua, ante exercitationes bibatur: & ubi laborans exercitationi se crediderit, in balnea descendat, & merum potet: acopis, glucinoq; unguento admisceri solet.

**R**osmarini primū genus Venetijs visitur in horto D. Maphæi & Maphæo medici clarissimi, omnem referens Dioscoridis effigiem, ut è visu refert Matthiolus. Et perindè se aliud genus in Italia non vidisse. Ruellio primū id genus vulgaris incensaria est. Rosmarinus seu Libanotis coronaria, vulgo iandiu hortensi mangonio (nempè topiaria) percognita. Nascitur spontè quibusdam Italiæ locis, & in Narbonensē Gallia. Rosmarini omnes vim habent absterforiam & incisoriā.

## Spondylium. CAP. LXXII.

#### NOMENCLATURA.

*Græ.* Σφονδύλιον. *Lat.* Spondylium. *Ita.* sphondilio. *Gal.* l' Austruce. *Off.* ostrutium.

*Spon*



**S**pondylium folia quadantenus Platani & Panacis habet, caules fœniculaceos, cubitali altitudine, aut amplius, assurgētes, in quorum cacumine semen duplex, Seseli simile, sed latius, candidius, & magis paleaceum, grauis odoris, flores eius albi, aut pallentes, radice Raphani, candida. Nascitur in palustribus & aquosis. Potum semen pituitam per aluum extrahit: medetur iocinoris uitijis, regio morbo, comitialibus, orthopnoicis, uuluarum strangulationi. Vternosos suffitu reuocat. Cum oleo commodè infunditur capitibus phreniticorum & lethargicorum, item capitis doloribus. Cum Ruta illitum, serpentia ulcera cohibet. Datur radix contra regium morbum, & iocinoris uitia: circumrasa eadem & iniecta, callos fistularum derodit. Recentis floris succus exulceratis auribus, purulentisq; accommodatur: qui ceterorum succorum more exprimi, dein recondi solet.

**S**pondylium, Matthiolo frequēs in pratis Anania paludosis, nascitur & eis maximè quæ montibus proximiora quàm planitie sunt. Ruellio Gallis Panaia est syluestris. Acre est Spondylium & incisorium.

## Ferula. C A P. LXXIII.

### NOMENCLATURA.

Græ. Νάρθηξ. Lat. Ferula. Ita. Ferola.

Gal. Off. & Ger. ignota.

**E**viridi Ferula medulla pota, utilis est ad cruentas excretionēs, cœliacosq;: contra uiperarum morsus in uino datur, erumpentemq; naribus sanguinem indita sistit. Semen potum torminosis auxiliatur, sudores ciet, uncto ex oleo corpore. Caules, si edantur, capitis dolores faciunt: muria condiuntur. Ferula itaque caulem profert ternum saepe cubitorum: folia Fœniculi, longè asperiora & latiora: qua ab imo caule uulnerata sagapenum efficitur.

Nasci



**N**ascitur ferula copiosissimè in Apulie campestribus, & Romano patrimonio, regiones inter, quas vernacula lingua, Corneto & Thoscanelle nominant, & in territorio Senensi. E ferulis cum primum nascuntur, medullam quamprimum pastores eliciunt, vitello oui persimile qua carta obuoluta, & cineribus incocta, gratissimus profectò est cibus, cum Pipere & sale manducata, & in venerem mirè accendit. Ferula semen excalfacit & desiccat: verum medulla astrictoria aliquantum virtutis est particeps.

## Peucedanum. CAP.

### LXXIIII.

#### NOMENCLATURA.

Græ. *πενυδάριον*. Lat. & Off. Peucedanum.

Gal. natium nomen non habet.

**P**eucedanum caulem emittit tenuem, gracilentum, Fœniculo similem: comam habet statim à terra foliosam, spissamq; flore luteo: radice nigra, crassa, plena, graui odore succosa. Gignitur in montibus opacis. Tenera radix cultello cōciditur, profluensq; è plaga succus umbræ mandatur: in sole siquidem cōfestim euanesceat. Colligitur capite prius & naribus rosaceo perfusis, ne capitis dolor premat, & uertigo sentiatur. Assationi radix inutilis fit. Tam lac quàm succus radice & caulibus extrahi solet, sicuti è Mandragora: uerum inefficacior succo lacryma habetur, & uelocius expirat. Interdum etiam concreta inuenitur lachryma, Thuris similitudine, caulibus radicibusq; ad hærens. Præfertur succus è Sardinia & Samothrace, colore rufo, odore graui, feruens gustu. Ex oleo & Rosaceo illitum Peucedanum prodest lethargicis, phreniticis, uertiginosis, comitialibus, & longis capitis doloribus, resolutis, ischiadicis, cōuulsis: omnibus in uniuersum uitijis neruorum, ex oleo & aceto illitu, prodest. Eius olfactu respirant uulua strangulatus, & ueterosi reuocantur. Incensum serpentes ambigit. Aurium doloribus con-



bus conuenienter ex Rosaceo instillatur, cauernis dentium inditum, mitigat dolorem: contra tuſſim efficacissimè ex ouo assumitur, suspirijs, torminibus & inflationibus subuenit: uentrè leniter emollit, lienem absorbit, difficiles partus mirè adiuuat. Facit ad uescicæ cruciatus, & renum distentiones potum, uulnè aperit. Radix ad eadem utilis est, sed inefficacior: eius decoctum bibitur. Farina eius sordida ulcera purgat, & uetera cicatrice obducit: squamas ossium extrahit. In cerata & calfacientia malagmata additur. Radix eligi debet recens, quæ cariem non senserit, firma, odoris plena. Succus ad potiones amaris nucibus, aut Ruta aut pane calido aut anetho resoluitur.

**R**eperit Matthiolus in pallis Ananie montibus, quos ipsissimè pucherrimorum simplicium theatrum possis dicere, Peucedanum radice crassa, grauis odoris, & succosa. At Peucedani pharmacopoliòrũ radices, præter id quod nigra extimo cortice non sunt, odorem ut debuerant grauem non referunt. Adde his quod radix illa sicca, noscitandi è se Peucedanirationem inire non queat. Qui diligentiores erunt è Sardinia petent, ubi copiosum, & Dioscoridi probatum nascitur, Valentior in Peucedano succus, radice, & liquore, hique excalfacit, concoquit, incidit, & desiccet. Herba ipsa secundæ est excalfacientium classis, & ineuntis tertiæ.

## Gith, seu Melanthiũ. C A P. L X X V.


### NOMENCLATURA.

Græ. μελανθιον. Lat. Melanthium. Ita. Nigella.

Gal. Poiurette. Nielle. Off. Nigella Romana.

**G**ith exilibus surculis fruticat, sepe binos dodrantes excens: folijs ut Senetionis minutis, sed multò tenuioribus: capitulo in cacumine tenui, paruo, ceu Papaueris, oblongo, intercurſantibus intus membranis, quibus semè includitur nigrũ, acre, odoratũ, quod panibus inspargitur. Capitis doloribus, illitũ fronti, subuenit: discutit recentes oculorum suffusiones, tritum ex Irino, & infusum naribus: tollit lepras, lētigines, duritias, tumoresq̃



\* *Melanthium sativum.**Sylvestre.*

moresq; uetustos, cum aceto illitum: circumscarificatos clauos excutit, cum uetere urina impositum: dentium doloribus, decoctum cum aceto & Teda, prodest: teretes uentris tineas expellit, peruncto ex aqua umbilico: destillatione laborantes adiuuat: tritum in linteo & olfactum, urinam & menstrua ciet, multis diebus sumptum, & lac extrahit: difficultatem spirandi cum uino potum leuat: phalangiorum morsibus ex aqua drachmæ pondere haustum auxiliatur: incenso serpentes fugantur. Tradunt largius e-  
potum enecare.

**M**elanthium domestica & hortensis herba, ea non est quæ in segetibus hirsuta & longo folio, & purpureo flore prouenit. Melanthium tertio ordine calidum & desiccatorium est, & e subtilibus partibus compositum esse uidetur, potensque remedium ubi incidere opus est, abstergere, desiccare, excalfacere.



## Laserpitium, &amp; Laser. CAP.

## LXXVI.

## NOMENCLATURA.

Græ. σιλφιον. Lat. Laserpitium It. Laserpitium.  
Gal. & Off. Benioin. & Assa fœdida.

**L**aserpitium in Syria, Armenia, Media, & Libya nascitur, caule ferulaceo (quē Maspelum uocant) folijs Apio similibus, lato semine. Radix excalfacit, in cibis egre concoquitur, uesciæ noxia, sugillatis illita cum oleo, & strumis, ac tuberculis cum cerato, medetur: ischiadicis conuenit cū Irino aut Cyprino cerato: excrescentibus circa sedem tollendis illinitur, cum putamine mali Punici, & aceto decocta: uenenis pota resistit: os commendat, cibis aut sali permista. Laser è radice atque caule scarificatis colligitur. Præfertur autem rufum, translucens, Myrrhæ æmulum, non porraceum, odore ualens, suauis gustu, quod dilutum facile albescit. Cyrenaicum si quis degustarit, humorem toto corpore ciet, blandissimo odore: adeo ut ne os quidem gustanti nisi paululum spiret. Medicum & Syriacum minus uiribus ualent, & magis uirosus reddunt odorē. Laser omne antequam siccescat adulteratur Sagapeno, aut Fabæ lomēto, quod maleficium deprehenditur gustu, odore, uisu, & dilutione. Caulē aliqui Silphion, radicem Magudarin, & folia Maspelon uocauere. Efficacissimum Laser, mox folia, postremo caulē, Acrem uim habet: inflationes facit: perunctas cum aceto, Pipere & uino alopecias sanat, oculorū aciem exacuit, & incipientes suffusiones, illitum cum melle, dissipat: cauernis dentium in dolore inditur, aut cum Thure in linteo circumligatur, aut cum Hyssopo, ficis coctis in posca, os colluitur. Ijs prodest, quos bestia in rabiem efferata momorderit, uulneribus immixtum: ualet ad-

uerius



uersus uenena telorum, & animalia omnia quæ uirus eiacula-  
tur, potum aut illitum. Scorpionum plagis oleo dilutum circum-  
linitur. Gangrænis præcoërcitis immittitur: & cum Ruta, Ni-  
tro & Melle, uel per se, carbunculis: clauos callosq; prius circū-  
rasos uellit: cerato aut aridorum ficuum carne pramolitum, re-  
centes lichenas ex aceto sanat, & excrescentia in carne, poly-  
posq; si aliquot diebus cum atramento sutorio, aut ærugine illi-  
natur: extuberantia cum forfice extrahit. Veteribus faucium  
scabritijs opitulatur, grauem subitoq; irrauescentem uocem, di-  
lutum aqua, sorbitione confestim expedit: uuam illitum cū melle  
reprimit: anginis ex aqua mulsa utilissimè gargarizatur: uescē-  
tes latiore colore mangoniz at: tussi commodè in sorbili ouo da-  
tur, & pleuriticis, in sorbitionibus: in fellis suffusione, & aqua  
inter cutem, cum aridis ficis: horrores discutit cum uino, Pipere,  
& Thure potum: neruorum contractionibus, opisthotonicisq;  
datur oboli pondere deuorandum: hærentes gula hirudines, gar-  
garizatum cum aceto decutit: ad lac intus coagulatum bibitur:  
comitialibus ex aceto mulso proficit: menses ciet, cum Pipere &  
Myrrha potum: cæliacos adiuuat, in acino uuæ sumptum: cum  
lixiuio autem potui datum, repente conuulsis ruptisq; prodest.  
Ad potiones resoluitur, nucibus amaris, aut Ruta, aut calido pa-  
ne. Foliorum succo ad eadem proficitur, sed multò in efficacius.  
Cum aceto mulso manditur, ad expediendam arteriam, maxi-  
mè cū uox retunditur. Eo cum Lætlucis utuntur, exitq; in ui-  
cem Erucæ. Fertur & altera Magudaris in Libya nasci: radix  
Laserpitio similis, sed minus crassa, acris & fungosa, ex qua nō  
profluit succus: eiusdem cum Lasere facultatis.

**A**Rabum sectarij Assam (quæ eis est Laserpitium) in fœtidam, &  
odoriferam diuidunt. Id ipse etiam Dioscorides indicat, cū Cy-  
renaicum blandissimi odoris, Medicum uero & Syriacum virosum odo-  
rem reddere testatur. Ludouici Romani patricij Aethiopica, Aegyptia,  
Arabia felix & deserta, Syriaca, Indica intra uel extra Gangem na-



uigationis historia abunde ostendit sincerum & verum Belxuinam Laserem esse odoriferum, itidem vt Assam foetidam, foetidum Laserem. Is sexti libri capite nono, Iudice vrbis (Tarnasari) mentionem faciens, qua ratione defunctorum corpora comburant, Belxui hiis verbis mentione facit: Cum comburunt mortuorum corpora, omnisariam odores in rogi conijciunt, Aloen videlicet, & id genus arboris, cuius gummi elegantissimu illud vnguentu gignit, quod vulgo Belxui nuncupatur, Laserpitium eruditiores ab arbore Laseris dicunt. Idem decimo quarto eiusdem libri cap. mercatores dicit Christianos Sarnare Indica ciuitatis incolae, in vrbe Bangella reperiri, qui praeter ea quae velut in emporium eo conuehunt, Laserem etiam, e quo gummi quod Belxuinum vocant estuit, important. Et decimo nono eiusdem libri capite, dum Sumatra insula mentionem facit. Illic conspicitur (inquit) Laser, gummi producens quod Laserpitium appellant, & vulgo Belxuinum. Eo fit vt selectissimum Belxuinum Matthiolo liquor sit Cyrenaeici Laseris, & Assa foetida, liquor Laseris Medici & Cyriaci. Et quod eis satisfiat qui Silphium ferulacei generis herbam & non arborem esse contendunt, Ferula ipsa arborum generi adscribitur, quoniam teneritudo eius processu transit in lignum. Quod idem in Silphio contingere potest. Vulgaris Angelica, vel, Sancti spiritus radix, Ruellio, Laserpitium est Gallicum.

## Sagapenum. CAP. LXXVII.

### NOMENCLATURA.

Gra. σαγαπεννον. Lat. Sagapenum. Ita.

Serapino. Gal. & Off. Serapinum.

**S**agapenum ferulacea herba succus est, quae in Mediana scitur. Optimum est, translucens, fuluo forinsecus colore, & intus albo, nescio quid inter Laser & Galbanum redolens, gustu acri. Prodest laterum & pectoris doloribus, tussibus uetustis, conuulsis & ruptis. Crassam pulmonis pituitam expurgat. Datur comitialibus, opisthotonicis, lienosis. Item contra neruorum resolutionem, perfrictiones, & febrium circuitus, in potu. In unguenta probe admittitur: menses pellit, sed foetum exanimat, cum hydromelite potum. Prodest ex uino haustum, serpentium ictibus. Olfactum ex aceto uuluarum strangulatus excitat, oculorum



oculorum cicatrices, offusam caliginem, habetudines, suffusionesq; detergit. Resoluitur ut Laser, Ruta, aqua, & amaris nucibus, aut Melle, aut calido pane.

**P**rostat Venetijs Sagapenum selectissimum, quantumvis inibi & vaneat ingens adulterati copia. Quæ Sagapenum producit ferula, in aliquot Italiae locis, & præcipue in Apulia provenit, unde iam Sagapenum coepit exportari, sed orientali in bonitate inferius. Sagapenum liquor calidus & tenuibus partibus constans, aliquantum abstersori est. Ipsa tamen planta in totum est inutilis.

## Euphorbium. CAP.

### LXXVIII.

#### NOMENCLATURA.

Græ. εὐφώρβιον. Lat. Euphorbium. Ita. Euphorbio.

Gal. & Off. Latino nomine.

**E**vphorbium Libyca arbor est, Ferula speciem habens, quæ in monte Atlante iuxta Mauritaniam, inuenitur. Ea accerrimo succo turget, cuius eximium feruorem expauescentes incolæ, ouillos uentres elutos arbori circumligant, & eminus caulem contis incidunt, confestimq; è plaga, perinde atque uase quodam, in uentriculos copiosus lactis humor effluit, præter id quod humi sparsum, uulnus ei aculatur. Duo succi genera. Vñ Orobi magnitudine, Sarcocollæ modo emicat. Alterum in uentriculis concrecit, atque uitreum spectatur. Eligendum est translucens, & acre. Euphorbiū adulteratur Sarcocollæ & glutini mistione, sed difficile quidem experimentum: quippe cum leui gustu, os ac sensum diu detineat, adeo ut quicquid ori obijciatur, planè Euphorbium resipiat. Eius inuentio tempore Iubæ regis Libyæ cognita extitit. Succus illitu suffusiones discutit: Potus tota die exurit: quare Melli colyrissq; pro acrimoniæ ratione admisceri debet. Coxarū doloribus prodest in odorifera potione haustus. Squamas osium eadem die eximit, uerum eo utentes, ne-

C 4 cesse est



cesse est linamentis aut ceratis communire corpus quo ossa conuestiuntur. Aliqui memoria prodiderunt, percussos à serpente nihil molesti passuros, si incisa osse tenus capitis cute, intritus succus infundatur, unguisq; postea consuatur.

**E**vphorbium seplasis notum, satisq; perspecta liquoris acrimonia, ab Euphorbio Iuba regis Lybia medico, & Musa Augusti Caesaris medici, fratre, nomen accepit. Virtutem illius solutiua ab Aetio & Actuaria didicimus, qua flegma, & aqua maxime per inferiora purgat. Cholici datur, & corporibus frigefactis. Cū eo tamen, semen quopiam aromaticum apponendum. Dosis tres (non amplius) oboli cum hydromelite. Iuuat & in catapotijs in melle coctum. Quarto abscessu calidum & siccum est.

## Galbanum. C A P.

### LXXIX.

#### NOMENCLATURA.

Gr. γαλβάνη. Lat. Galbanum. Ital. Galbano.

Gal. & Off. Galbanum.

**G**albanum succus est nascentis in Syria Ferula, quod nonnulli Metopium uocant. Maxime laudatur cartilaginoseum, merum, Thuris effigiem præbens, pingue, minime lignosum, retinens nonnihil adiecti seminis & Ferula, graui odore, neque ualde humidum, neque nimis aridum. Adulteratur Fabafresa, Resina & Ammoniaco. Galbanū excalfacit, urit, extrahit, discutit: menses ac partus trahit appositum uel suffitu: lentiginos aceto & Nitro perunctas tollit. Deuoratur ad tussim ueterem, difficultatem spirandi, suspiria, rupta, conuulsa. Aduersatur toxicis, potum cum uino & Myrrha: simili modo sumptum mortuos partus extrahit. Imponitur lateris doloribus, & furunculis. Comitiales & uulua strangulatus, & uertiginosos olfactu suscitatur. Si uratur, fugat nidore serpentes & perunctos feriri non patitur: serpentes cum oleo & Sphondylo circumpositum, necat. Dentium dolorem oblitum, aut

cauer



cavernis inditum, mitigat, urinæ difficili prodesse, existimatur. Resoluitur ad potiones amaræ nucibus, aqua, aut Ruta, aut calido pane, mulsæ: alias Meconio, ære usto, aut felle liquido. Si purgare Galbanum uoles, in feruentem aquam demittito, namque cum liquefactum fuerit, eius sordes fluitabunt: quas hoc modo facile separabis: mundo linteo raroq; alligatum in fictili aut ærea pyxide ita pendeat, ut innum uasis ne tangat: opertoq; uase in feruidam aquam demittito: sic enim sincerum, ueluti per colum eliquescet, & lignosum in linteo remanebit.

**V**enetis verum & non adulteratum Galbanum Seplasiae magis in monile habent, quam ut vaneat. Quod vulgo venditur parum respondet bonitati, quam ex eo requirit Dioscorides, nempe sexcentis mixtionibus oppletum. Diligentis erit pharmacopola aut sincerum comparare, aut eo quo Dioscorides docet modo expurgare. Siquidem eo pacto bona corruptionis pars eruetur. Excalfacientium tertiæ est classis, aut secundæ desinentis, & desiccantium ineuntis secundæ.

## Ammoniacum. C A P.

### LXXX.

#### NOMENCLATURA.

Gr. Ἀμμωνιάκον. Ital. & Off. Armoniacum.

**A**mmoniacum ferulæ succus est, quam iuxta Cyrenem Aphrica gignit, cuius fruticem cum radice Agasyllim vocat. Probatur bene, colaratum, ligni & calculorum expers, Thuris similitudine, minutis glebis, densum, sincerum, nulla sorde spurcatum, castoreum odore imitans, gustu amarum. Hoc genus Thrausma, id est, friaturam appellant: quod uero terram & calculos collegit, Phyrma. Gignitur in Aphrica iuxta Ammonis oraculum, succum stillante ferulacea arbore. Mollit, extrahit, calfacit: tubercula duritiasq; discutit. Potum alium soluit: partus extrahit, lienem consumit, drachmæ pondere cum aceto haustum. Articulorum coxendicumq; doloribus liberat: auxi-

C S hō est



lio est anhelatoribus, orthopnoicis, comitialibus. Item quibus humor in pectore coit, si cum Melle delingatur, aut cum ptisanæ succo sorbeatur: cruentam urinam pellit, albugines oculorum absterget, genarum scabritiam absumit. Tritum autem cum aceto, & impositum, iocinoris lienisq; duritias sedat: discutit tofos, qui in artubus concalluerunt, cum Melle aut cum Pice illitum: lassitudines & coxendicum dolores eo perungi utile est, cum Nitro & Cyprino oleo, uice acopi.

**I**ouis Ammonis in Lybia delubrum, iuxta quod ingens Metopij copia, unde is colligitur liquor, Ammoniaco liquori nomen dedit. In hoc itidem seligendo iudicium apponendum. Quod habemus terra & lapillis immistum, Phyrana, non Trausma esse videtur.

### Sarcocolla. CAP. LXXXI.

#### NOMENCLATURA.

Græ. Σαρκοκόλλα. Lat. & Ita. Sarcocolla.

Gal. & Off. eodem nomine.

**S**arcocolla, lachryma est arboris in Perside nascentis, polli-  
ni Thuris similis, rufa, gustu amara. Vulnera glutinat, oculorum fluxiones inhibet: emplastris inseritur. Adulteratur admisto gummi.

**N**on adulterata Sarcocolla nostro tempore affertur, cum gummi Arabico & alijs gummi. At enim non presente gustui amarore adulterium deprehendetur. Mesue solutiua facit Sarcacollam, eaque virtutem augeri, Gingiberi, & Cardamome permistam. Vires habet è viscosa substantia & pauxillo amarore compositas, & ob id sine mordicatione desiccatur.

### Glaucium. CAP. LXXXII.

#### NOMENCLATURA.

Græ. γλαύκιον. Lat. Glaucium. Ita.

& Off. Memithe,

Glauc



**G**laucium, succus est herbae quae ad Hierapolim Syria nascitur, folijs ferè corniculati Papaveris, pinguioribus tamen, in terram sparsis, odoris tetri, gustus amari: tota croceo succo madet. Folia in olla fictili semifrigidis clibanis calfaciunt indigena, usquedum flaccescant, deinde contusis succum exprimunt: cuius est usus ad oculorum medicamenta, utpotè cum inter initia refrigeret.

**Q**uod nunc in usu est Glaucium, specie licet diuersum sit, viribus tamen & notis satis respondet. Experientia siquidem compertum, id oculis esse salutare. Cum vero ex terrea et aquea substantia, utraque frigida, sine excessu tamen, componatur, aqua fontis conferri potest.

### Glutinum. CAP. LXXXIII.

#### NOMENCLATURA.

Græ. κόλλα. Lat. Glutinum seu gluten. Ita. Colla.

Gal. Colle. Off. nomine Latino.

**G**lutinum, quod Xylocollan, alij Taurocollan uocant, præstantissimum Rhodiaceum, quod ex bubulis corijs conficitur, id candidum est & translucens. Nigrum uerò minus probatur. Resolutum in aceto, impetigines leprasque cutis delet, ambustis igni ex aqua calida dilutum illitumque, pustulas erumpere non patitur. Vulneribus prodest, Melle aut aceto madefactum.

### Glutinū piscium. CAP. LXXXIII.

#### NOMENCLATURA.

Græ. ἰχθυόκολλα. Lat. & Off. Ichthyocolle. Ita.

Colla di pesce. Gal. Colle de bouche.

**I**chthyocolle, gluten piscium, uenter est piscis ceracci. Præstat candidans, natione Ponticum, subasperum, minimè scabrum, & quod celerrimè liquecit. Vtile emplastris, capitis & leprarum medicaminibus, & tetanothris, quæ cutem faciei erugant & extendunt.

Gluti



**C**lutinum notum est, itidem & Ichthyocolla, quàm collam Mor-  
ua, & collam buccæ vocant. Enimvero aurum glutinat santeria,  
ferrum argilla, aris micæ cadmia, Laminas alumen, eramenta stagnū,  
argentum stagnum, marmor & plumbum resina, plumbum nigrum id  
quod album est, plumbum album seipsum.


## Viscum. CAP. LXXXV.

### NOMENCLATURA.

Græ. Ἰξός. Lat. Viscum. Ita. Vischio.

Gal. du Guy. off. Viscum.

quercinum.



Viscum.

**V**iscum optimum est  
recens, intus porra-  
ceum, extrà fulvum, quod  
asperum nihil, aut fursurosi cō-  
ceperit. Fit acinis in Robore  
nascentibus, buxæ fruticis  
folio. Contusum acinum la-  
uant, & postea in aqua de-  
coquunt: sunt qui comman-  
ducādo ipsum efficiant. Gi-  
gnitur quoque in Malo,  
Pyro, & plerisque alijs ar-  
boribus: quinetiam inveni-  
tur in quorundam fruticum  
radicibus. Emollit, discutit,  
extrahit. Parotidas, tuber-  
cula, cæterasq; collectiones  
ad maturationem perducit.

Cum Resina autem & Ce-  
ra



ra pari, epinyctidas in splenio sanat. Vetera ulcera abscessusq;  
quos cacoëthes uocant, ex Thure mollit: lienē cum calce, Gaga-  
te, aut Asio lapide coctum & impositum absumit: cum Sanda-  
racha, aut Auripigmento illitum, unguēs extrahit. Miftum cum  
calce & uini fece, suam uim intendit.

**V**iscum nunquam in terra nascens, semper in arbore proueniēs, præ-  
sertim Quercu, Robore, Ilce, Pyro Maloque syluestribus, Salice,  
Betula, Corylo, Abiete, Castanea, atque adeo vite. Fit viscum præter a-  
lia & è cortice radice plantæ quàm Itali Agrifolio, & ex arbuscula  
quàm ydem Lantana & Entisde uocant, quæ Theophrasti Fluida est.  
Viscum è substantia area & aquea & paucissima terrea componitur,  
discutit, mollit, extrahit, concoquit.

Aparine.

CAP.

LXXXVI.

NOMENCLA-  
TVRA.


Græ. Απαρίνη. Lat.

Aparine. Ita. Speronella.

Gal. Glatton. Off.

Aspergula.

**A**parine ramis multis  
& paruis fruticat,  
asperis, quadrangulis, per  
intervalla orbiculato folio-  
rum ambitu, ut in Rubia:  
flos albus: semen durum, ro-  
tundum, concavum, album,  
umbilici figura, asperitate  
uestium tenaci. Ea pastores  
coli uice utuntur, ad eximē-  
dos



Aparine.



dos è lacte pilos. Seminis, caulium, ac foliorum succus, potu contra uiperarum phalangiorumq; morsus auxiliatur: infusu aurium dolori medetur. Herba cum Axungia trita strumas discutit.

**A** Parine aspretudine vestibis tenacissimè adherens, nota planta absterforia & desiccatoria est, & tenuium aliquantum partium.

### Alyssum. CAP. LXXXVII.

#### NOMENCLATURA.

Græ. Αλυσσός. Lat. Alissum. Ita. Rubbia minore.

Gal. Rubea minor. Off. Mater Sylua.

**A** Lysson fruticosa herbula est, unicaulis, subaspera, rotundis folijs: fructu duplicium scutorum effigie, in quo est semen quadrantenus latum: in montibus & asperis locis emicat. Eius decoctum singultus sine febris, potu discutit. Idem efficit si quis eam aut teneat, aut odoretur. Cum Melle trita, vitia cutis in facie, & lentigines emendat: contusa in edulio, rabiei canis mederi putatur. Domibus appensa salutaris esse creditur, & hominibus atque animalibus fascini amuletum. Purpureo linteo circumligata, pecorum morbos abigit.

**A** Lysson Plinio Rubia est minor: Aëtio, Sideritis heraclea, quæ herba Robertiana est. Galenus Marrubio similem facit, spinosiore & asperiore in summo caule. Ruellius herbariorum rusticam cannabim, putat. In hac sententiarum diuersitate quid pro certo statuendum sit non video, nisi (quod certius est) à Galeno standum esse dicamus. Nam deliniationis huius herba, Matthiolo teste, per totam Italiam vulgaris. Alysson modicè desiccatur & concoquit, & aliquantum abstergit.

### Asclepias. CAP. LXXXVIII.

#### NOMENCLATURA.

Græ. Ασκληπιός. Lat. Asclepias. Ita. Asclepiade.

Gal. non probate, Le Lierre terrestre.

Off. Hirundinaria.

Ascle



\* *Asclepias.*

**A**sclepias, ramos emit  
tit longos: folia He-  
dera, longa: radices numero-  
sas, tenues, odoratas: floris vi-  
rus graue: semen Securida-  
cæ. Nascitur in montibus.  
Radices ex uino potæ tormi-  
nibus auxiliantur, & con-  
tra serpentium ietus. Folia  
aduersus uulnæ mamma-  
rumq; ulcera, quæ cacoëthe  
uocant, illinuntur.

**F**alluntur qui pro Asclepia-  
de, Hederam terrestrem ac-  
cipiunt. Nam præter, id quod  
Asclepiadem non dixit per ter-  
ram serpere: folijs Hedera lon-  
gioribus, non rotundioribus pin-

xit. Fuchsius Asclepias Vincetoxicum est, at Matthiolus collatis notis nõ  
satis respondere opinatur, quemadmodum & haudum in valle Ana-  
nia uidisset, sæpe summa cura perquisitum.

## Atractylis. CAP. LXXXIX.

### NOMENCLATURA.

Græ. Ατράκτυλις ἑτέρα. La. *Atractylis alter.* Ita.

*Atrattile.* Gal. non probate, Chardon benist.

Off. *Carduus benedictus.*

**A**tractylis, spina est Cnico similis, folia multò longiora  
ferens in summis uirgis, magna parte nuda, aspera que,  
qua



*Atractylis. 1.**Atractylis. 2.*

qua foemina pro fufis utuntur : capitula in cacumine spinis horrent : flos luteus : quibusdam in locis purpureus inuenitur : radix tenuis, superuacua. Coma, semen & folia cum Pipere & uino teruntur utilissimè contra scorpionum ictus : percussos tradunt quàm diu ea teneatur herba, nullum experiri dolorem, ipsumq; deposita statim recrudescere.

**A**tractylidem non esse Cartamū sylvestrem è Theophrasti. 6, Lib. cap. 4. de plantarum historia claret, ubi separatim & de Cartamis, & de Atractylide tractat, & singularem illi facultatem resudandi è folijs sanguinis, & non Cartamis attribuit.

**Polycnemum. CAP. XC.**

**NOMENCLATURA.**

*Gra.*



Gr. πολύνκημον. Lat. Polycnemon. It. Polycnemone.

Gal. Off. Ger. ignota.

**P**olycnemon, frutex est surculosus, folijs Origani: caule, ut Pulegij, geniculis multis intercepto, sine umbella: tenui tamen in cacumine corymbo, boni odoris & acris. Vulneribus agglutinandis recens, aut aridū cū aqua, efficaciter illinitur: sed quinto die solui debet: ad urinæ stillicidia ruptaq;, cum uino bibitur.

**P**olycnemon ut duæ præcedentes inter nostro æuo incognitas herbas reponetur, donec exactus quispiam plantarum censor huic perspetæ lucem offeret.

## Clinopodium. CAP. XCI.

### NOMENCLATURA.

Græ. Κλινopodium, Lat. Clinopodion. Ita, Clinopodio.

Gal. Pouliot de montaigne. Off. Poliū montanū.

**C**linopodion frutex est folijs Serpyllo similis, surculosus, aduum dodrantum altitudine. Nascitur in petrosis: flores, Marrubij modo, ex interuallis distincti speciem lecti pedum præbent. Bibitur herba & succi eius decoctum, ad conuulsa, rupta, strangurias, serpentium iclus: menses & partus pellit, & pensiles verrucas, quas acrochordonas uocant, eicit, aliquot diebus potum. Alium sistit decoctum ad tertias, potumq;, si febrim sentiunt, ex aqua, alioquin ex uino.

**C**linopodium in montibus vallis Ananiæ copiose nascitur, folijs non Serpillo tantū simile, at etiam Calamento montano. E subtilibus partibus compositum excalfacit & desiccat tertio abscessu.

## Leontopetalon. CAP. XCII.

### NOMENCLATURA.

Græ. Λεοντοπέταλον. Lat. Leontopetalon.

Ita. Rapeione.

Gal. Pate de Lyon. Off. Pata Leonis.

D

Leon




**L**eonopetalon caulem emittit dodrātalem, aut altiore, plurimis alis concavum, & in cacumine semina parva duo aut tria, in siliquis, Ciceris modo: flores Anemone similes, punicei coloris: folia Brassicæ, sed Papaveris diuisura: radicibus nigris, Rapæ similibus, strumosis. Nascitur in aruis & segetibus. Radix auxiliatur serpentium iclibus, ex uino pota, nec alia res celerius dolorem finit. Miscetur ischiadicorum clysteribus.

**D**omesticū Leontopodiū visitur in multis Italiae hortis, & syluestre Matthiolo multis in Thuscia locis nascitur. Radix cōcoquit, excalfacit, & desiccatur tertia classe.

Teucrium. CAP. XCIII.  
NOMENCLATURA.



\* Teucrium. 1



Teucrium. 2

Græ



Græ. Τεύκριοι. Lat. Teucrium. Ita, Teucurio.

**T**eucrium, siue ut alijs placet, Teucris, herba est uirga referens effigiem, Trissaginis similitudine, tenui folio, non multum à Cicere alieno. Hæc in Cilicia iuxta Gentiadem Cissademq; ubertim prouenit. Recens cum posca, aut arida feruesa-  
Etæius, potu lienem potenter absument: lienosis cum aceto & ficis illinitur. Item serpentium morsibus ex aceto solo, sine ficis.

**O**fficinarum Germanicarum Chamædrys Cordo Teucrium esse putatur. Tragus Veronicam Teucrium facit. Verum Teucrium in valle Anania deprehendit Matthiolus. Errant qui id, Fabam inuersam, existimant. Incidit, & tertio ordine desiccat, & calfacit secundo.

## Trixago. CAP. XCIIII.

### NOMENCLATURA.

Græ. Τριψάγος.

Lat. Trissago.

Ita. Querciuola.

Gal. Petit Chesne. Off. Chamædreos.

**C**hamædrys Græcis, alijs Chamædrops: Latinis Trissago dicitur. Sunt qui eam Teucrion appellauere, propter eam quam cum Teucurio seruat similitudinem. Nascitur in petrosis & asperis. Frutex dodrantalis, folia habens exigua, amara, effigie & diuisura Quercus: flore paruo, penè purpureo. Carpitur semine prægnans. Recens in aqua decocta, potu tussibus, indurato lieni, urinæ difficultati, incipientibus hydropicis, auxiliatur, cit menses, partus extrahit. Lienem ex aceto pota consumit. Aduersus serpentium uenena ex uino, potu illitūque

D 2

effic





\* Trixago. 1



Trixago. 2

*efficacissima. Trita digeritur in pastillos ad supradicta. Purgat  
ulcera, cum Melle: cum oleo illita, caliginem oculorum discutit.  
Natura eius est calfacere.*

**T**rixago Italica herba febrium dicitur, quod continuis aliquot ma-  
tutinis epota decoctio, à tertiana liberet. Thuscis acetarij vice co-  
mesta, à peste securos reddit. Amara qualitas ( quantumvis aliquan-  
tum astringat) vincit in Trissagine. Tertij est excalfacientium & de-  
siccantium ordinis.

## Leucas. CAP. XCV.

### NOMENCLATURA.

Græ. λευκός. Lat. Leucas. Ita. Leuca.  
Gal. Off. Ger. ignota.

*Leu*



**L**ucas montana, latioribus quàm urbana folijs, semine  
 acriore, amariore, ori ingrato, efficacior tamen quàm sa-  
 tiua habetur. utraque ex uino contra animalium uenena, præ-  
 cipuè marinorum opitulatur.

**L**ucas inter herbas nostro seculo incognitas reponēda. Siquidē ni-  
 hil habet commune cum Mercuriali vinacea.

## Lychnis. CAP. XCVI.

### NOMENCLATURA.

Græ. *Λυχνίς σεφάνωμα* *λινή*. Lat. *Lychnis coronaria*.

Ita. *Lychnide coronaria*.

Gal. *Girofles sauages*. Off. *herba Tunica*.



*Lychnis sativa.*



*Sylvestris.*

D 3

Lychn



**L**ychnis coronaria, flore est alba Viola simili, quo corollae faetulantur. Contra scorpionum ictus semen in uino potum auxiliatur. Lychnis sylvestris, omnia urbanae similis. Bilem per aluum detrahit, semine duabus drachmis potio: ictus à scorpione subuenit. Aiunt huius herbae appositu scorpiones torpescere, & inertes prorsus reddi.

**D**ifficile sanè sit Lychnidem reperire, quamuis Matthiolus se in Italicis hortis herbam effigie Lychnidi persimilem uidisse scribat, quae etiam sylvestrem congenerem habeat. Calida & sicca est ordine secundo desinente, aut ineunte tertio.

## Lilium. CAP. XCVII.

### NOMENCLATURA.

Græ. Κρίνον. Lat. Lilium. Ita. Giglio

Gal. Lis. Off. Latino nomine.

**L**ilia coronamentis se dedunt, Liria à quibusdam uocata. E quibus unguentum temperatur, quod aliqui Lirinum, alij Susinum appellant, nervos & priuatim uulvae duritias emolliens. Folia herbae illita contra serpentium ictus auxiliantur: feruescèntia, ambustis proficiunt: aceto condita uulceribus opitulantur. Succus adiecto Melle aut aceto, in aereo uase coquitur, conuenienti medicamento uetustati ulcerum, & ad recentia uulnera. Inassata radix & ex Rosaceo trita, igni ambusta sanat, uulnam emollit: menses ciet, ulcera cicatrice obducit: cum Melle detrita nervis præcis, luxatisq; medetur: uirilignes, furfures & lepras emendat, ulceraq; in capite manantia expurgat: abstergit faciem & erugat. Teritur in aceto cum Hyoscyami folijs, & farina tritici, mulcendis testium inflammationibus. Semen potum moribus serpentium aduersatur: ignibus sacris semen & folia cum uino illinuntur. Tradunt & rubra esse Lilia. In Syria autè & Pisidia Pamphylia, efficacissima unguentis nascuntur.

Lilia





Lilium.

Lilia nota sunt, & ut purpurea prodeat ratione docuit Plinius, satis nostro tempore perspectam. Hoc tam. n. in loco de albis Dioscorides intelligit. Liliorum radix prima detergentium est classis, modicè emollit, & concoquit. flos substantia constat mista ex tenui, terrea, & aquea. Coctus ex oleo mollit & citrà morsum digerit.

Ballote.

CAP.  
XCVIII.

## NOMENCLATURA.

Græ. Βάμβη. Lat. &amp; Off. Marrubium nigrum.

Ita. Marrobio nero.

Gal. le Marrubium noir.

Balloten, nomine alio nigrum Marrubium uocant: caules ædit quadrangulos, nigros, subhirsutos, complures ex una radice: folijs maioribus quam Marrubij, hispidis, intercedente spacio, subrotundis, graueolentibus, Apiastro proximis: unde aliqui Apiastrum eam uocauerūt. Candidi flores uniuersi uerticillato ambitu caulem coronant. Vis eius efficax aduersus canis morsus, folijs ex sale illitis. Feruenti cinere flaccescunt folia, ut condylomata reprimant. Purgant & sordida ulcera cum Melle.

D 4

Ball




**B** Allote adeò Apiastro similem profert effigiem, vt nisi odor ingratus errorem proderet, attento etiam oculo imponeret. Ballote acris est, & abstersoria. Cum sale valet ad morsus canis rabidi.

## Apiastrum. CAP. XCIX.

### NOMENCLATURA.

Gr. Μελισσόφυλλον. la. melissophyllō. It. Cedronilla.  
Gal. Melisse. Off. Melissa.



Apiastrum.

**M**elissophyllon siue Melittena, id est, Apiastrum, id sibi nomen usurpauit, quoniam apes ipsa herba delectantur. cauliculi & folia Ballotæ, de qua paulo antè diximus, similia essent, nisi maiora, tenuioraq, nec ita hirsuta spectarentur. Citreum malum olent. Folia cum uino pota aut illita prosunt cōtra ictus phalangiorum, scorpionumq. Item aduersus canis morsum. Decocto eorundem gratia, foueri prodest. desensionibus fœminarum ad ciundos menses conuenit. Dentes eodem in odore col-

luuntur. Dysentericis infunditur. Fungorum strangulationibus folia, addito Nitro, potu auxiliatur: torminibus & orthopnoicis

cis



*tis, delinctu illita cum sale strumas discutiunt, ulcera purgant, articularios dolores illita sedant.*

**A** Piastrum ad passionem cordis multum efficax, Auienna calidum & siccum secundo ordine. Mirum in modum latificat & roborat cor, odor siquidem gratus, obstipans facultas, & disgregans deopilatio, vtilem in omnia etiamnum viscera faciunt. hac vi soluit. sed quatenus spectat ad exoluendos ab humoribus melancolicis spiritus, qui in sanguine qui circa cor est, versantur. Quod in alijs membris nec in toto corpore conficit. Haec Melissophylli dotes, Galeno, & ceteris gravis fuerunt ignota.

## Marrubium. CAP. C.

### NOMENCLATURA.

Græ. *ῤαῖσιον*. Lat. *Marrubium*. Ita. *Marrubio*.

Gal. du Marrubin. Off. *Marrubium album*.

**M**arrubium, frutex est ab radice ramosus, candicans, subhirsutus, quadrangularibus ramis: folium pollicem aequat, subrotundum, hispidum, rugosum, gustu amaro: semen in caulibus, & ex intervallis: flores verticillato ambitu, asperi. Nascitur propter aedificia, ruinas, & rudera. Huius folia sicca, cum semine decocta in aqua, aut viridum succus datur cum Melle suspiriosis, tussientibus, & ad tabitudinem redactis. Crassam è pectore pituitam, cum sicca Iri eicit: mulieribus à partu non purgatis datur, ut menstrua & secundas extrahat, item in difficili partu, & his qui uenena hauserunt, aut à serpentibus demorsi sunt. Vesicam renesque ledit. Folia cum Melle illinuntur sordidis ulceribus purgandis, pterygia nomasque sistunt, laterum dolores mitigant. Succus folijs cotus expressus, & sole coactus, ad eadem pollet. Cum uino & Melle illitus, oculorum claritatem adiuvat. Naribus regium morbum expurgat: aurium doloribus conuenienter instillatur, per se aut cum Rosaceo.

D 5

Mar



**M**arrubium notius, quàm ut manifestius quippiam à Dioscoride, quo virtutes eius patent, dicendum sit. Calfacientium desinentis est secunda classis, & desiccantium media, aut desinentis tertia.

## Stachys. CAP. CI.

### NOMENCLATURA.

Græ. Σταχυς. Lat. Stachys. Ita. Stachi.

Gal. Saugendre. Off. nomen non habent.

**S**tachys frutex est Marrubio similis, sed longior: folia ferè numerosa, hirsuta, rara, prædura, cana, odoris iucundi, & complures uirgas ab radice exeuntes, Marrubio candidiores. Nascitur in montibus & asperis. Vim habet excalfactoriam & acrem. Foliorum decoctum, potu pellit menstrua & secundas.

**S**tachys itidem non incognita, & nequicquam in ea cōtrouersia est. Herba Marrubio similis, gustu acris & amara, tertio ordine excalfacit.

## Phyllitis. CAP. CII.

### NOMENCLATURA.

Græ. Φυλλίτις. Lat. Phyllitis. Ita. Phyllitide.

Gal. & Off. Lingua ceruina.

**P**hyllitis, folia promit Rumici similia, longiora, & uiridiora, sena aut septena, recta, quæ parte anteriore læuia cernuntur, à tergo autem pensiles, quasi uermiculos tenues ostendunt. In umbrosis & opacis hortorum locis emicat, gustu acerbissimo: neque caulem, neque florem, neque semen profert. Folia in uino pota serpentium moribus aduersantur: quadrupedibus per os infusa auxilio sunt: & si dysenteria aut resoluta aluus exercet, potui datur.

**Q**ui sedulo Dioscoridis notis in delinianda Phyllitide animum aduerterit, hanc ut proculdubio eam, quæ vulgò, Lingua ceruina dicitur, esse cognoscet: ita hætenus falsò, pro Scolopendrio, quod Arabum sectarij Cetrach nuncupatur, usurpatam. Et quod ad fo-  
lior



liorum numerum attinet, multas videre est plantas, contra Dioscoridis sententiam cum quinquaginta folijs, quæ ille sex tantum assignarit: ac extracto è terra Linguaæ ceruinæ cespite, foliorum multitudinem è numerosa radice prodire manifestum est.

## Phalangium. CAP. CIII.

### NOMENCLATURA.

Græ. φαλάγγιον. Lat. Phalangium. Ita. Phalangio. Herba hodie ignota.



Phyllitis.

**P**halangium à quibusdam Phalangites uocatur: ramuli sunt ei duo, aut tres, pluresue, in diuersa tendentes: flos candidus, Lilio similis, multas incisuras habens semine nigro, lato, ad Lenticula dimidiata figuram, multo tenuiore: radice parua, tenui, herbacei coloris dum à terra eruitur. Prouenit in collibus. Huius folia, semen, flos cum uino pota, auxiliantur, contra scorpionum Phalangiorumque ictus: tormina quoque discutunt.

**P**halangium è subtilibus & desiccantibus partibus, non aliter à Plinio quam à Dioscoride descriptum, inter ignotas plantas refertur, sicut nec in Italia reperitur.

Trifo



## Trifolium. CAP. CIIII.

## NOMENCLATURA.

Græ. τριφυλλον. Lat. Trifolium. Ita. Trifoglio.  
Gal. Trefle. Off. inusitatum.



Trifolium.

Trifolium. 2

**T**rifolium, Græci Triphyllon, alij oxytriphylon, alij menyanthes, alij asphaltion uocant. Frutex supra cubiti altitudinem attollitur, uirgas habens tenues, iunceas & nigras, unde ramulares enascuntur appendiculæ, in quibus terna singulis germinationibus exeunt folia, Loto arbori similia: ijs recentior enatis Rutæ odor inest: ubi autem adoleuerunt, Bitumen olent. florem edit purpureum, semen quadantenus latum, subhirsu



hirsutum, ex altera extremitate exertum, antennæ modo corniculum gerens: radix tenuis, longa, ualida. Semen & folia in aqua pota pleuriticis, urinæ difficultati, comitialibus, & ijs qui aquæ intercutem principia sentiunt, scæminis quoque uulnæ uitio opportunis, auxiliantur, menses ciunt: terna drachmæ è semine dari debent, è folijs uerò quaterna. Contra serpentium ictus trita folia, & ex aceto mulso pota, præsidio sunt. Tradunt aliqui, totius fruticis, radicis, foliorumq; decoctum fotu dolores eorum finire, quos serpentes percusserint. Qua autem aqua sanatus quis fuerit, si ea quispiam alius foueatur, qui ulcus habuerit, perinde afficitur ut à serpente demorsus. Quidam terna folia aut semina in tertianis, cum uino potui dedere: & in quartanis, quaterna, ut quæ februum circuitus discutereant. Radix antidotis inseritur.

**T**ria sunt Trifolij genera. Vnum Menyanthes vocant Græci, alijs Asphaltion, Archigenes Asfaltitum, maiore folio, quo coronarij utuntur. Alterum acuto, Oxytriphylon cognomine, Tertium minutissimum ex omnibus. Tria hæc genera Gallica & Italica præta nouere, primum rotundis & magnis, secundum, longis: tertium, rotundis & minutis folijs. Hæc mense Maio flore alias purpureo, alias albo visuntur. Est etiam Trifolij species, quem Trifolium acetosum, & panem cuculi vocant: seplasia, Alleluja. Trifolium odoratum, quem Romani Tribolo nuncupant, Dioscoridis est Cytisus. Arabum Andaioca, è quo oleum fit ad dolorem & tremorē membrorum, Lotus est syluestris & Aegyptia, cuius in sequenti libro neminit Dioscorides. Errant qui è Trifolio vulgari id oleum conficiunt. Tertio abscessu exalfacit & desiccat.

## Polium. CAP. CV.

### NOMENCLATURA.

Græ. πόλιον. Lat. Polium. Ita. Polio.

Gal. Poliot. Off. Latino nomine.

**D**uo genera polij. Montanum, cui Theutrio nomen est, & cuius est usus. Tenuis frutex est, candidus, dodrantalis



*talis, semine refertus: capitulo in cacumine quandam corymborum speciem præ se ferente, paruo, canis hominis simili, graui-ter olente, non sine quadam suauitate. Alterum fruticosius, non usque adeò ualens odore, & uiribus infirmius. Potum feruefa-ctius auxiliatur serpentium ictibus: hydropicis, morbo regio, & lienosis ex aceto: stomachum malè habet: caput doloribus afficit: aluum & menses ciet: substratum suffitumue serpentes abigit: uulnera conglutinat.*


**V**erum Poliū in Thuscia & Gallia Narbonensis montibus enasci-tur: id gustu acre & amarū est, atque in eo, minus, seu syluestre, ualētius. Nēpē tertij desiccantiū ordinis, & excalfacientiū in fine secūdi.

**Scordium.**

**CAP. CVI.**

**NOMENCLATURA.**

*Græ. Σκόρδιον. Lat. & Off. Scordiū. Ita. Scordio. Gal. Chamaraz.*



\* Scordium.



Ailimia.



**S**cordium in montibus & palustribus nascitur, folijs Trisaginis, maioribus, non sic in ambitu diuisis, aliquantum Allia redolentibus, gustu amaris & astringetibus: quadrāgu-  
lis caulibus: subrubro flore. Herba uim excaletoriam habet: uri-  
nam cit. Cocta recens, aridaue cum uino, aduersus uenenatos ser-  
pentium morsus bibitur: ad stomachi quoque rosiones, dysente-  
riā & urinæ difficultatē, binis drach. cum hydromelite: crassa  
men purulentum pectore expellit. Facit arida farina ad uete-  
rem tuſsim: rupta, conuulsa, si cum Nasturtio, melle & resina  
misceatur in eclegmate. Inflammata modicè præcordia, cerato  
excepta, recreat. Cum aceto acri aut aqua, podagris conuenien-  
ter illinitur: menses imposita mouet, uulnera conglutinat, uete-  
ra ulcera purgat, & ex melle cicatricem perducit. Sicca excre-  
scentias in carne cohibet. Succus ad eadem uitia bibitur. Inter  
prima efficax Ponticum natione, Creticumq<sub>3</sub>.

**S**cordium non ita pridem cepit agnosci, & perinde desijt Allium  
syluestre eius loco vsurpari. Scordium Chamædry simile, odore Al-  
lium referens, in palustribus prouenit, & ea de causa Romanis, Tris-  
ago palustris dicta est. Galeno optimum est Scordium Creticum. Ama-  
rum est Scordium, acerbum, & acrimonia satis ad Allium accedens.

## Tussilago. C A P.

### C V I I.

#### NOMENCLATURA.

Græ. Βήχιον. Lat. Tussilago. Ita. Vnghia  
di canallo. Gal. Pas d'Asne. Off.

Vngula Caballina.

**T**ussilaginis folia sūt maiuscula quā Hederæ, sex aut septē-  
à radice, subalbida à terra, supnè uirētia, in plures angu-  
los



los exeuntia: caulis palmum altus, flos luteus; in uere, flore & caule confestim exiit: inde nonnulli his uacare existimauerunt. Radix tenuis est & superuacua. Nascitur in amœnis & riguis. Folia ex Melle trita, igni sacro & omnibus inflammationibus illitu medentur. Arida fumus per infundibulum hianti ore raptus, hos sanat qui sicca tussi atque orthopnœa infestantur: pectoris uomicas rumpit. Eundem effectum præbet suffita radix. Decocta in hydromelite, & pota, emortuos partus eicit.

**T**ussilago vulgaris & nota est planta, caule & flore fugacissimo ut enatis vigor & longissima mora, sit biduum. Namq; die vno locum vniuersum caule & floribus pubescere, postride prorsus cõtabuisset, frondêque sola virefcere, videbis. Ea causa est ut sine caule & floribus plerique qui tam citâ caulis iacturâ non inspexerunt, existiment. Acris herba, & aqueæ substantiæ, minus tamen, viridi etiamnum & tenera planta. Nâ sicca Tussilaginis folia acriora sunt, quàm requirant flegmones. E radice lana extrahitur, quæ parata accendêdo igni idonea est.

### Artemisia. C A P.

### CVIII.

#### NOMENCLATURA.

Gr. Ἀρτεμισία. Lat. & Off. Latino nomine.

Gal. Armoise. Ger. Keinfarn.

**A**rtemisia magna ex parte in maritimis nascitur, Absinthij modo fruticosa, maioribus & pinguioribus folijs, ramisq;: huius quidem genera duo: unum lætius habitiusq; folijs uirgisq; latioribus: alterum tenuius, flore paruo, tenui, candido, graueolente: æstate floret. Sunt qui in mediterraneis unicaulis nomine appellêt, tenuem herbulam, simplici caule & minuto, floribus scatentem tenuibus flauo colore: hæc incüdiorem quã præcedês efflat odorẽ. Vtraq; excalfacit, extenuat. Feruescētæ conuenienter in muliebres desessus adiiciuntur, ad detrahendos menses, partus, secundasq;: item ad præclusiones uulvæ, & eiusdem inflammationes: calculos comminuunt, remorata m urinam



*Artemisia maior.**Minor.*

nam cient, menses pellunt pubi illita. Succus uulua inditus ex Myrrha, eadem quæ in sepsio trahit. Coma tribus drachmis eorundem educendorum gratia bibitur.

**A**rtemisia tria genera facit Dioscorides, inter quæ prima duo non ignota, maioris & minoris Artemisia nomine sapore & calore nihilum dissimili, tantum differunt surculorum & foliorum, floris, & seminis magnitudine. Nec censendum secundam Artemisia speciem esse matricariam, quæ verum est Dioscoridis Parthenium: nec tertia, eadē cum Athanasia seu Tanaceto ducenda: nam vnicaulis, Dioscoridi, Artemisia: Tanacetum, multis ex vna radice & validis constat frondibus. Non iniuriā tenuifolia Artemisia caput à doctioribus expunctum, tū quod huius antea mentionem fecerit tum quod in antiquis codicibus græcis non reperiatur. Matthiolo tertia Artemisia species Italiae nostro tempore ignota.

## Ambrosia. CAP. CIX.

E Nomenclatura



## NOMENCLATURA.

Græ. Ἀμβροσία. Lat. Ambrosia. Ita.


Latino nomine. Gal. Rue de

vigne. Off. Ruta

vinacea.

**A**mbrosia tenuis frutex est, ramosus, trium ferè palmorū: folijs Ruta, circa imum caulem exiguis: cauliculi seminibus, perinde quasi racemulis grauidi, qui nunquam florem pariunt, odore uinoso, suauis: radice tenui, sesquipedali. Coronatur ea Cappadoces. Vis eius reprimere ac repellere, & illitu adstringere humores, quin aliquam partem incumbunt.

**A**mbrosia in aruis & vineis prouenit cum notis quas ei attribuit Dioscorides. Repercutit & reprimat. Hæc rusticis ad arcendum æstum coronaria est. Quam officina ostendunt non est Ambrosia, sed Polemonia.



Botrys.

Botrys. CAP.

CX.

NOMENCLATURA.

Gr. Botrys. La. Botrys

Ita. Botri.

Gal. Pymen. Off. ignota.

**B**otrys furticosa herba est, lutea tota, & in multas alas sparsa: semen circa totos ramulos prouenit: folia Cichorio similia: tota



tota suauem odorem spirat : quare uestimentis interponitur . Inuenitur in torrentium ripis , & conuallibus . Pota orthopneas mulcet . Hanc Cappadoces Ambrosiam uocant , alij Artemisiam .

**B**otrys Ruellio ea est , quam rustici in corbibus portantes , Pijmen magno clamore d. nuntiant , probè adaptato nomine , nam si prægnans suo liquore premeretur , in gummi lætesceret , ex se pigmentarij institoris vice vnguentū efficiens . In adsimiliū racemulorum hortensæ herba , quantumuis summatim racemuli dependeant , non tamen in ramulorum omnium ambitu , vt in Botry , innascuntur .

## Geranium. C A P.

## C X I.

## NOMENCLATURA.



Geranium. 1.



Geranium. 2.

E 2

Græ



Græ. γεράνιον. Lat. Geranium. Ita. Geranio.

Gal. Aguille de bergier. Off.

Acus pastoris.

**G**eranion folijs Anemones, diuisuris longioribus: radice subrotunda, cum estur dulci: Quæ drachmæ pondere in uino pota, uulnæ inflationes discutit. Geranium alterum, caulibus minutis & pilosis, sesquipedalibus: folijs Maluæ in summis alis sursum spectantia gruum capitula insunt, cum suis rostris, aut canini dentes. Nullius in medicina usus.

**T**res Geranij species, Vna latinorum, duæ Græcorum. Plinij Latinorum, Geranium, est quæ Herbariorum vulgus, Rostrum Gruis Rostrum Ciconia, & Acum muscatam nominant. Primam Græcorum Geranij speciem vidit non semel Matthiolus, in valle Anania, quæ tamen ea non sit, quam Acum pastoris dicunt, ut quæ radicem nullam rotundam faciat, nec folijs sit Anemones, diuisuris longioribus. At in totum similis est, Plinij, Latinorum Geranio. Quod tamen Myrrhis non est, nempe huius separatim meminit Plinius Libri vicesimi quarti sexto capite. Secunda est, Pes columbinus vulgaris.

## Gnaphalium. CAP. CXII.

### NOMENCLATURA.

Gr. γναφάλιον. La. Gnaphalium. It. Gnaphalio.

Gal. Lin de pré. Off. Centumculum.

**G**naphalij folijs mollibus minutisq; pro tomento utuntur. Bibuntur efficaciter folia in uino austero ad dysenteriam.

**G**naphalium pauperum olim fuit herba, e qua ob mollitiem & Lanuginem culcitrae farciebant.

## Typha. CAP.

### CXIII.

### NOMENCLATURA.

Græ. τύφη. Lat. Typha. Ita. Mazza sorda.

Gal. L'herbe à masse. Off. non perinde vsitata.

Typha





Typha.

fortis homines apud Italos, *Matteraxia* (vt vocant) conficiunt: vasa vi-  
naria, nempe vulgares flascones, & multi bres cathedras, huius folijs  
contexunt & inuestiunt.

**T**Ypha folium edit Cy-  
peridi simile: caulē  
album, leuem, & quabile: flo-  
rem in acumine ambientem,  
densum, qui in pappos solui-  
tur, quod Paniculam aliqui  
nomināt. Huius herbæ flos,  
suillo adipe eloto exceptus,  
ambustis medetur. Gignitur  
in plaustribus & aquis sta-  
gnantibus.

**T**Ypha nota est planta, pa-  
ludibus, stagnis, lacubus  
innascens, Μαζζα sorda Italis  
dicitur, quod surdos reddat quo-  
rum auribus indatur eius lanu-  
go. Ex eius Lanugine postremæ

## Circæa. CAP.

## CXIIII.

## NOMENCLATURA.

Græ. κίρκια. Lat. *Circæa*. Ita. *Circea*.

Gal. Off. Ger.

ignota.

**C**ircæa, quam & *Dircæam* aliqui uocant, folijs est hor-  
tensis Solani, agnatis crebris: flore nigro, pusillo, copioso:  
semine Mili, nascete in quibusdam ueluti corniculis: dodrantali

E 3

radice



radice, triplici fermè aut quadruplici, candida, odorata, exscalficiente. Nascitur in apricis, saxis, & uento perflatis. Radicis tussa pondo quatuor, in sextarijs tribus uini dulcis, per diem & noctem macerantur, potuq; triduo uulvas expurgant. Semen in sorbitionibus datum, lacte mammas nutricum explet.

**C**irca ignota nostro seculo planta, A Circe nomen accepisse videtur, quod eius maleficijs inferuaret.

## Oenanthe. C A P.

### C X V.

#### NOMENCLATURA.

Græ. Οἰνάνθη. Lat. Oenanthe. Ita. Enanthe.

Gal. non probatè Saxifrage rouge. Off. pari. Filipendula.



Oenanthe.

**O**enanthe folia habet Pastinacæ: florem candidum: caulem crassum, palmi altitudine: semen Atroplicis: radicem magnam in multa rotunda capitula extuberantem. Nascitur in petris. Caulis eius & folia, cum mulso uino pota, secundas eijciunt, Radix è uino urinæ stillicidio conuenit.

Oenanthe



**O**enanthe nihilum amplius à nobis quam Circea agnoscitur. Nec Filipendula in pratis nascens, & non inter saxa: & quòd radicem magnam non producat, nec semen proferat Atriplici simile, quæ in Oenanthæ requirunt Dioscorides & Plinius, eadem cum Oenanthæ plantâ esse non potest.

## Conyza. CAP. CXVI.

### NOMENCLATURA.

Græ. Κορυζα. Lat. Coniza. Ita. &

Off. Pulicaria. Gal. herbes  
aux pulces.

**C**onyzæ duo genera: quæ parua uocatur, odore præstantior est: maior uerò frutice altior & folijs latioribus, graui odore. Vtriusque folia Oliuæ similia, hirsuta, pingua. In maiore caulis binum cubitorum altitudine attollitur. In minore pedem æquat Flos fragilis, lutei aut fului coloris, qui in pappum abit: radices superuacua. Suffitu substratūq; frutex totus serpentes fugat, culices abigit, & pulices necat. Folia conuenienter illinuntur serpentium plagis, & tuberculis, ac uulneribus. Flores & folia cum uino ad menses partusq; eiciēdos bibuntur. Itē contra urinæ stillicidia, arquatū morbum, & tormina: comitiales pota ex aceto adiuvant. Decoctum in defectionibus medetur uulua malis. Impositus succus abortum facit. Ex oleo efficaciter horroribus oblinitur. Capitis dolores tenuis illita sanat. Est tertium Conyzæ genus, caule crassiore, ac molliore, folijs quàm parua maiusculis, minimè pinguis, & maiore minor, multo grauioris odoris & iniucundioris, sed inefficacior. Prouenit locis non riguis.

**C**oniza eiusque species non incognita, quas magnitudo, soli ubi nascuntur natura, & odoris grauitas nullo negotio discriminat. Conizæ maior & minor pari facultate & temperamento, gustu amarorem & acrimoniam præse ferunt. In excalfaciendo & desiccando

E 4 classen



classẽm sibi tertiam asciscunt. Tertia harum species, odorisrgauioris, & virtutis ab alijs minoris est.

## Hemerocallis, siue Lilium syluestre.

### CAP. XVII.

#### NOMENCLATURA.

Gra. Ημεροκαλλίς. Lat. Hemerocallis. It. Giglio  
saluatico. Gal. Lis sauuage. Off. Falso  
Aphodelus siue Hiacinthus.



\*

Hemerocallis.

**H**emerocallis folium & caulem habet Lili, porraceo colore, flores in caule per singulos exortus, terni aut quaterni erumpunt, Lili diuisura, quoties dehiscere cœperunt, colore perquã pallido: radix magna est atque bulbosa: quæ pota, aut cum Melle & lana in pessa apposita, aquam educit & sanguinem. Folia trita mammarũ inflammationes à partu contractas, oculorũque collectiones mitigant. Radix & folia igni ambustis utilissimè illinuntur.

**H**emerocallis seu syluestre Lilium nullibi nõ prouenit. Errat qui p Hemerocalle, Liliũ vocatũ conualliũ accipiunt, nam nota non cõsentunt



sentiunt. Nec sanius sentiunt, qui verum Asphodelum existimant, cum  
huius radix nec amara sit nec acris. Hemerocallis non effigie tantum,  
sed virtute etiam Liliū exprimit.

## Leucoium, siue Viola alba.

### CAP. CXVIII.

#### NOMENCLATURA.

Gr. λευκόιογ. Lat. *Leucoium*, Ital. *Viola*  
*bianca*. Gal. *Giroflees*. Off. *Keyri*. Ger.  
*Veis; Hornungs blum.*



*Leucoium luteum.*




*Leucoium purpureum.*

**L**eucoion vulgaris est notitia, sed in floribus differentia  
quadam: namque aut cærulei, aut albi, aut purpurei, aut  
lutei inveniuntur. Luteum uero præcipui in medicina usus. Huius

E S aridi



*Leucoion Luteum.**Purpurascens.*

aridi flores seruesfacti in desebionibus, ualent contra uulua inflammationes, & menstrua expellunt: sanant oris ulcera, cum Melle: cum cerato, rimas sedis. Semen duum drachmarum pondere ex uino potum, aut cum Melle inditum, menses, secundas et partus extrahit. Radices cum aceto illitæ, lienem reprimunt, & podagricos iuuant.

**V**ulgares iam esse cæperunt Leucoij species omnes à Dioscoride enumeratæ, præter ceruleas, siquidem hæ nec in Italia nascuntur. Lutea magis ad medicinales vsus accedunt. Violæ omnes virtutis sunt absterforiæ, & tenuibus è partibus componuntur. In his flores desiccati, vires virtute præcellunt.

**Cratæogonum. CAP. CXIX.**

**NOMENCLATURA.**

*Græ.*



Græ. Κραταγονον. Lat. Cratægonon. Ita. Crate-  
gono. Gal. non probatè, Curaige.  
Off. Persicaria.

**C**ratægonum, siue, ut alijs placet, Cratænon, folijs Me-  
lampyro simile est, multis calamis ex una radice emicanti-  
bus, multorumq; geniculorum, semine Mily. Nascitur in opacis  
& fruticosis, summoperè acre. Traditum est quibusdam, hoc si  
bibat ieiuno ore, ter die post menses purgatos, tribus obolis, in  
cyathis aquæ duobus mulier, ante conceptum quadraginta die-  
bus: & uir modo consimili, totidem diebus ante coitu hauriat,  
uirilis sexus partum futurum.

**C**ratægoni ignota est planta, nec secunda Persicariæ species est, re-  
fragantibus notis. Est etiam hoc nomine arbor Theophrasto, quæ  
Italia Aquifoliam vocat.

## Phyllum. CAP. CXX.

### NOMENCLATURA.

Græ. φύλλον. Lat. Phyllum. Ita. Folio.  
Gal. Off. & Ger. ignota.

**P**hyllum, quod Eleophyllum uocatur, in saxosis nascitur,  
duum generum est, quod autem Thelygonum appellant,  
nuas habet floribus oleæ similes, pallidiores tamen: folijs itidem  
oliuæ est: caule tenui, breui: radice exili: florem album profert: se-  
men papaueris maiusculum. Sed Arrhenogonon cetera huic  
simile, solo fructu distat: habet enim racemosum quiddam de flo-  
retibus oleis non dissimile. Arrhenogonon potu, masculi sexus  
facere partus, ut Thelygonon fæminei, proditur. Horum Crate-  
nas author est. Sed huiusmodi historia tenuis mihi produxisse ui-  
sum est.

Folium



**F**olium, nullius herbae peculiare est nomen. Atenim ingenti nos molestia liberat, Theophrasti de plantarum historia libri noni cap. 19. Quo loci herbam ponit duarum specierum. Vnam Arrhenogonon, quod masculos: Alteram, Thelygonon, quod epota, feminas concipi faciat. Porro cum Dioscoridis Phyllon in Arrhenogonon & Thelygonon & descriptione & viribus distribuatur, constat idem esse Dioscoridi Phyllon, quod Theophrasto planta quae in Arrhenogonon & Thelygonon diuidatur. Atenim cum Phyllon nullum habeat proprium genus, & tamen Arrhenogonon & Thelygonon vocetur, necesse est ut sub alio nomine lateat. Quod clarum euadet, qui Mercurialis historiam & vires ab hocce auctore descriptas, cum Theophrasti Arrhenogono & Thelygono conseruat. Siquidem una & eadem planta sunt Arrhenogon, Thelygonon, Phyllon, & Mercurialis, cuius duae sunt species, ut postea suo patet loco. Crateuas herbarius, eatenus Dioscoridi (e cuius scripto nobis haec prodidit) imposuit, nec tamen ob id de tanti hominis fide dubitandum.

## Testiculus. CAP. CXXI.

### NOMENCLATURA.

*Gra.* ὄρχις. *Lat.* Testiculus canis. *Ita.* Testicolo.  
di cane. *Gal.* Couillon de chien.  
*Off.* Latino nomine.

**T**esticulus, quem Graeci Cynosorchin uocant, folijs circa caulem mollis Oleae similibus, in terra stratis, longioribus angustioribus, laeuius: caule dodrantali: floribus purpureis radice bulbosa, oblonga, Olivae modo angusta, duplici ordine: superiore, quae plenior est: inferiore, quae mollior ac rugosior. Eduntur radices coctae, ut Bulbi: ex quibus si maiorem edant uiri, mares generari dicuntur: si minorem feminae, alterum sexum. Addunt, in Thessalia mollem mulieres in lacte caprino bibere, ad stimulos coitus: aridam uero, ad inhibendos: & alterum alterius potu resolui. Nascitur in petrosis et sabuletis. Testiculus alio nomine





Orchis.



Cynosorchis.

mine Serapias, Andrea autore, uocatur, quoniam radix ad multa utilis sit: folijs est Porri, latioribus, oblongis, pinguihus, ex alarum sinu inflexis: caule palmeo: floribus penè purpureis: radice testiculis simili, quæ illita tumores discutit, ulcera purgat, & serpere eadem non patitur. Abolet fistulas, & illitu inflammationes lenit. Aridæ radices nomas inhibent: sanantq; putredines, et oris ulcera, cacoëthe: aluum sistūt è uino potæ. De hac, eadē quæ de Testiculo canis, produntur.

## Satyrium. CAP. CXXII.

### NOMENCLATURA.

Græ. Σάτυριον, Lat. Satyrium. Ita. Satirio.

Gal. du Satyrion. Off. Lat. nomine.

Saty





Satyrium Trifolium.



Basilicum.

**S**atyrium aliqui Trifolium uocant, quoniam tria fert folia, ad terram infracta, Rumici aut Lilio similia, minora tamē, ac rubra: caulem cubitalem, nudum: florem Lili effigie, candidum: radicem bulbosam, Mali magnitudine, fuluam, intus ut ouum candidam, gustanti dulcem, & ori non ingratam: quam in uino nigro austero bibere conuenit, contra opisthotonū. Vtendum ea dum concumbendi incessit cupiditas, siquidem ea proniores ad uenerem fieri affirmant. Est & alterum Satyrium Erythronium siue Erythraicon, id est, rubrum, semine Lini, maiore, duro, leui, splendente, quod fertur non secus atque Scincus, libidinem excitare. Cortice radice gracili, rufo: intus autem albū includitur, sapore dulci, non ingrato ori. In montosis & apricis enascitur. Venerem, ut prodūt, si omnino manu teneatur radix, stimu



stimulat: eoq; magis, si bibatur in uino.

**E**rrant qui Testiculos canis & Satyriones pro eodem ducunt. Nam dissimili effigie, licet non admodum imparibus sint viribus. Verè Satyriones vix hodiè reperiuntur, sed horū loco Testiculis canis utimur, & in Italia non nasci Matthiolus testatur, idq; è radice cognosci, quæ in Testiculis canis bifida, cū sui nominis effigie, in Satyrione vuica, mali in rem rotunda, fulua, intus vt ouum candida. Quinque Testiculus canis sub se species cōtinet, præter eas quæ, quòd manui hois similes, Palma Cristi vulgo dicuntur, & Auicenna, Digiti citrini. Hac planta duarū est specierum, maior & minor: vtraque Seplasis cognita. Minoris flores desiccati præsentaneum dysentericæ remedium afferūt, idem efficiet aqua ex eis per alembicū extracta. Radices Auicennæ calidæ & siccæ sunt secundo abscessu. Semen maioris, matutinis nouem continuis, granatim tritum in vino, & epotum, medetur morbo caduco. Idem efficiet radices decoctio, si quis ea miscendo vino utatur. Vtriusque Testiculi canis radices virtutē habet calidā & humidā, & gustu dulcorē quēpiā præferūt. Satyrion tēperamēto est calido et humido, et ob id manifeste dulcis est gustu.

## Horminum. CAP. CXXIII.

### NOMENCLATURA.

Græ. Ορμινον. Lat. Horminum. Ita. Hormino.

**H**orminum herba est, folijs Marrubio similis, caule semicubitali, quadrangulo, circa quem eminentiæ siliquis similes prodeunt, quæ ad radicem spectant, in quibus diuersum semen recluditur: siquidem in syluestri rotundum, fulcumq; inuenitur: in altero, nigrum, & oblongum, cuius est usus. Ad uenerē stimulandam, cum uino bibi uolunt. Purgat cum melle argemas albuginesq;. Illitum ex aqua tumores discutit: eo etiam extrahuntur aculei ex corpore. Idem effectus est illitæ herbæ. Syluestre magis uiribus pollet: quare unguentis, præsertim Gleucino, permiscetur.

**H**orminum domesticum vulgò ea ducitur esse planta, quæ admodum odorata Sclareæ aut Starleggiæ nomē accepit: Syluestre verò ea quæ Gallitricū aut Centrū galli nuncupant. At cū videre sit huiusmodi



modi plātas sapē in duū cubitorū altitudinē subrigi, folijs Marrubio grādiōribus, siliquis in cymā, & non in radicē spectatibus, eos proculdubio errare, qui ita cēsent nō abs rē scribit Matthiolus, maximē cū domestica & syluestris Sclarea semē rotundū proferāt, & nō vt vult Dioscorides, syluestris sit rotundū, alterius oblongū. Adde his quod verosimile nō est Dioscoridē (siquidē ita sensisset) odoris flagrantia data opera prateris se, nā aspirat suauissimē Sclarea. Qui sit vt nostro seculo depicli a Dioscoride Hormini, v. ignoscatur. Plinius duarū harū vocum Prasion, & Prasion, proximitate deceptus, quarū prima Marrubiū, altera Porriū designat, Horminū Porri, & nō vt debuerat, Marrubij folijs delincauit. Est etiā Theophrasto, Plinio, et Galeno Horminū inter frumētū genera.

### Securidaca. CAP. CXXIII.

#### NOMENCLATURA.

Græ. πελεκίνος ἡδύσαρον. Lat. Pelecinus hedyssaron. Ita. Hedisaro. Gal. Febue de Loup.

**H**edyssarō, unguetarij Pelecinū, idest, Securidacā uocāt: fruticosa est, folijs Ciceris: semē rufum in siliquis fert, corniculorū modo adūcis, qđ ancipitē securim æmulat: unde nomē accepit, amarum gustu. Stomacho utile in potu. Additur in antidota. Cum melle ante coitus subditum, concipiendi spem adimit. Nasctur in segetibus & hordeis.

**H**edyssaron seu Securidacā rustici Galli, Grauiam vocāt, quod tritico & hordeo cum quibus alitur, suo complexu molesta sit. Lenti inimi ea Aparine, non Securidaca, vt putat Plinius: licet & ipsa Aphaca, quæ Vicia species est, mortem inferat.

### Onosma. CAP. CXXV.

#### NOMENCLATURA.

Græ. ὄνοςμα. Lat. Onosma. Ita. eodem nomine.

Gal. Off. Ger. ignota.

**O**nosma, oblonga folia habet, ad similitudinem Anchusæ, longitudine quatuor digitorum & unius latitudine, mollia, in terra iacentia, sine caule, sine semine, sine flore: radice niti



nititur longa, tenui, infirma, rubescence. Gignitur in asperis. Folia in uino pota partus extrahunt. Pregnans si eam supergrediat, abortum facere dicitur.

**N**ymphæa palustris et lacustris herba vulgatissima, sub Nenuphar nomine noticia. Nymphæa semen & radix desiccant sine morfu. Valentior est quæ candidam radicem producit, ut in abstersoria facultate potentior, quæ nigra radice constat.

**Nymphæa. CAP. CXXVI.**  
NOMENCLATURA.

Græ. νυμφαία. Lat. Nymphæa. Ita. Off.  
Gal. Nenuphar.



*Nymphaea lutea.*



*Nymphaea alba.*

**N**ymphæa nascitur in paludibus & stagnantibus aquis, folijs Fabæ Aegyptiæ, minoribus, & longioribus, alijs  
F in sum



in summa aqua, alijs demersis pluribus ex radice eadem prodeuntibus: flore Lilio simili, albo, & in medio crocos habente, cum defloruerit, ut rotundum Malum, aut Papaueris caput, extubemat: nigro semine, denso & lato, lenti gustus. Caulis est lauis, niger, minime crassus, ciborio cognatus: radix nigra, scabra, clauæ similis, quæ autumnò secatur. Sicca cū uino pota cæliacis, dysentericisq; auxiliatur, licnem absomit. Radix stomachi ac uesicæ doloribus illinitur: uirilignes ex aqua emendat: imposita cum pice, alopecijs medetur: eadem contra ueneris insomnia bibitur, siquidem ea prorsus adimit. Pota assidue aliquot diebus, genitale infirmat. Idem semen potum efficit. Nymphææ nomen sibi uendicasse uidetur, quoniam aquosa amet. Plurima inuenitur in Elide, in Anygro amne, & in Bæotia Aliarto. Est & altera Nymphæa, cuius flos Blephara dicitur, folijs antedictæ, radice alba, scabra, flore luteo, nitente, Rosæ simili. Huius semine & radix contra fæminarum profluvia efficaciter ex uino nigro bibuntur. Nascitur in Thessalia, amne Peneo.

## Androsaces. CAP. CXXVII.

### NOMENCLATURA.

Gr. Ἀνδρόσακες. Lat. Androsaces. Ita.  
Androsace. Gal. Off. Ger. ignota.

**A**ndrosaces herba est amara, tenues spargens iuncos, sine folijs, folliculos in capitulis habens, in quibus semen continetur. Gignitur in Syriæ maritimis. Ea drachmis duabus in uino pota, copiosam hydropicis urinam ciet. Idem effectus est semini poto, & herbæ decocto: podagris utiliter illinitur.

**N**ostro tempore Androsaces è Syria non assertur, quare in incognitarum herbarum classẽ reponetur.

Asple



## Asplenium. CAP.

## CXXVIII.

## NOMENCLATURA.

Græ. Ασπληνον. Lat. *Asplenium*. Ita. *Aspleno*.

Gal. & Off. *Citerach*.

**A**splenium, aliqui Scolopendrion uocant, alij Splenion, alij Hemionium: folijs est multis, scolopendra animali similibus, ab radice una prodeuntibus. Nascitur in parietibus, saxisq<sup>3</sup> siliceis, & opacis: nec caulem, nec florem, nec semen habet. Folia Filicula modo diuiduntur, subter flauescencia hirsutaq<sup>3</sup>, superne uiridia. Vim hanc habent folia in aceto seruefacta, ut per dies quadraginta pota lienem absumant: quibus etiam contritis liene ex uino illini oportet: stranguria & regio morbo prodest, singultum sedat, calculos in uesica comminuit. Conceptum adimere creditur, per sese, aut cum muli liene appensa. Tradunt noctu, silente luna, huius rei gratia effodiendam.

**O**btrita prisce seculi barbarie, iam iam agnosci coepit, *Asplenium*, esse plantam quam *Seplasia* Ceterach nominant, & non linguam ceruinam, quæ Dioscoridis est *Phyllitis*, ut supra ostensum est. Nascitur in petris, parietibusque opacis, humidis. Laudatissima in Creta, ubi repperit Vitruuius affirmat circa Potereum amnem, qui duas urbes Gnoson & Cortynā interlabitur, parte quæ ad Cortynam spectat, pecoribus sine liene inuentis, quia herbam hanc roderent, altera parte quæ ad Gnoson est, lienem habentibus, quia ibi Herba illa non appareret. Scolopendria quantumuis subtilibus partibus constet, calida tamen non est: & ob id lapillos comminuit, & lienem absumit.

## Hemionitis. CAP. CXXIX.

## NOMENCLATURA.

Græ. Ημιονιτις. Lat. *Hemionitis*. Ita.

*Hemionite*. Gal. & Off. non probatè,

*Lingua Ceruina*.

F

2

Hemio



**H**emionitis, quam aliqui Splenion uocant, folium emittit Dracunculi, lunatū: radicibus coheret multis, tenuibus: nunquam flores, neque semen, neque caulem gignit: in petrosis nascens, austero sapore. Ea ex aceto pota lienem absomit.

**P**hyllitida linguā esse ceruinā, iam in capite de Phytitide patuit, & perinde Hemionitida non esse Linguam ceruinā. Hemionitis a lingua ceruina diuersa, copiosa in territorio Romano nascitur, quod fide digni simpliciarij Matthiolo constanter assauerunt, quam etiam postea inde transpositam, suis hortis implantarint. Plinius Teucrium & hemionitida, diuersas plantas, confundit.

### Anthyllis. CAP. CXXX.

#### NOMENCLATURA.

Græ. *Ανθυλλίς*. Lat. *Anthyllis*. Ita. *Anthillida*.

Gal. & Off. prima ignota. Secunda,  
non probatę, luanon  
muscata.

**A**nthyllis duplex est. Quædam enim lenti similima, folijs mollibus, rectis ramulis, palmi altitudine: radice parua, tenui. Nascitur in salsis terris, & a sole illustratis, non insulso gustu. Altera est folijs ramulisq; *Aiuga* similis, hirsutioribus tamen, breuioribus & asperioribus: flore purpureo, odoris admodum grauis: radice Cichorij. Pota drachmis quatuor, urinæ difficultati, renibusq; plurimū prodest. trita uulue pituitas emolliunt, cum Rosaceo & lacte imposita. Vulneribus medentur. Quæ autem *Aiuga* similitudinem refert, præter alia, potu cum aceto mulso: comitiales sanat.

**N**entra Anthyllidis species quæ picturæ Dioscoridis responderet, se haudum in Italia uidisse, homo attentus, & in Italia & medicine natus, Matthiolus testatur, quāuis Ruellius dicat vulgo Salsola vocari, quod ex ea salē fieri memoriæ proditum sit. Cordo, Anthyllis altera, *Aiuga* ramulis similis in apricis Herciniæ syluæ locis nascitur, tam manifesto salis sapore, ut ex usta & nō usta sal excoqui possit. Hūc salē Arabes AlKabi vocant. Parum desiccat utraque Anthyllis, attamē quæ

*Aiuga*



*Ain*ga similis est magis tenuium est partium, ideòque in morbum cadis cum proficit, & potentius astergit.

# Anthemis. CAP. CXXXI.


## NOMENCLATURA.

*Græ.* Ἀνθεμὶς. *Lat.* Anthemis. Chamæmelon.

*Ita.* Camamilla. *Gal.* Camomille.



*Chamomilla sativa.*



*Chamomilla vulgaris.*

**A** Nthemidis genera tria, tantum flore distantia: rami do-  
drantales, fruticosi, alis multis concavi: tenuibus foliolis,  
parvis numerosis: rotundis capitulis: floribus in medio aureis, fo-  
rinsecus orbiculato ambitu candidis, melinis, aut purpureis, ma-  
gnitudine foliorum *Rutæ*. Nascitur in asperis, & iuxta semitas.

F 3 Colligi



Colligitur uere. Vim habent radices, flores & herba excalfaciendi, extenuandiq. Potu & infusione, pellunt menstrua, partus, urinam, calculosq. aduersus inflationes, & ilei tormenta bibuntur, bilem suffusam expurgant, iocinorum uitia sanant. Decocto earum uesica fouentur. Ex omnibus his generibus ad calculos efficacissima est, quae florem purpureum habet, cuius amplitudo maiuscula est. Hanc proprie Heranthemon uocant. Ea cui Leucathemo nomen est, item quae Chrysanthemon dicitur, uehementius urinam ciunt. Aegilopijs illa medentur: commandata ulcerum eruptiones in ore sanant: nonnulli in clysteribus ex oleo utuntur. Teruntur in farinam, ad abigendos febrium circuitus. Flores & folia recondi debent, & priuatim tusa, in pastillos digeri: radix quoque siccari, dumq. ingruit necessitas, binæ partes herbae dari, modo floris aut radice pars una, modo contra, floris partes duæ, & herba una, permutatim duplicato pondere, alternis diebus: bibere autem oportet in uino mulso, diluto.

**I**nter Anthemidis genera tria, ad calculos efficacissimam facit Dioscorides, eam quae florem orbiculatam purpureum habet: at pharmacopolia id solum nouere genus, cuius flores in medio aurei, per ambitum candidi. Siquidem id genus frequens, alia rara, & inuentu difficilia. Anthemis desiccantium & excalfacientium prima est classis, tenuium partium con quoquit, emolit, rarefacit.

## Parthenium. CAP. CXXII.

### NOMENCLATURA.

Gr. *παρθένιον*. Lat. *Parthenium*. Ita. *Amarella*.

Gal. *Matricaire*. Off. *Marricaria*.

**P**arthenium, aliqui Amaracon uocant, folijs est Coriandri, tenuibus: flore per ambitum albo, intus melino, odore graui, sapore amaro. Siccatum, cum aceto mulso aut sale potum, non secus atque Epithymum, & bilem & pituitam detrahit: suspiriosis prodest & melancholicis. Herba sine flore à calculosis & anhelatoribus magna utilitate bibitur. Valet decoctum ad insiden





insidendum in duritia uulua-  
rum, & inflammationibus  
illinitur, sacro igni, & colle-  
ctionibus cum flore.

**P**Artheniū quid & Amara  
cum, Matricaria est, &  
secunda Artemisiæ species, ingra-  
ti odoris. Errant pariter qui id  
Cotulam esse putant. Nam huic  
folium fœniculi, Parthenio Co-  
riandri tribuitur. Sapor in Par-  
thenio amarus est, in Cotula nō  
item. Parthenij nuncupationem  
Plinius, Parietariæ attribuit.

**Bupthalmum.**

**CA. CXXXIII.**

NOMENCLA-

TVRA.

*Parthenium.*

*Gr. Βούφαλμος. Lat. Bupthalthmon. Ita.*

*occhio di bue. Gal. & Off. non satis pro-  
batè. Cotula non foetida.*

**B**upthalthmon, quidā Cachlā uocant, tenues emittit cauli-  
culos, mollesq; folia Fœniculi: luteū florē, Anthemide ma-  
iorē, oculi similitudine, unde nomen traxit. Circa oppida na-  
scitur, & in campestribus. Flores cum cerato triti, tumores du-  
ritiasq; discutiunt. Aiunt epotam post exitum à balneis, regio  
morbo correptis, colorē tractu temporis reddere.

**D**va sunt plantæ quibus Bupthalthmi nomen sed falso tribuitur.  
Vna cubitalis in pratis nascens, & circa sata, modica foliorū in-  
cisura, flore intrinsecus croceo, forinsecus per ambitū cādido, longe quā  
Chamameli maiore. Altera Cotula est, nō foetida. Harū vtraque licet  
croceo sit flore, ambiēs per circuitū habet vallū, velut cādicas. Quo si sepi-  
retur Bupthalthmō, qua est diligentia, nō id prætermisurus erat Diosco.

B

4

PRON



## Pæonia. C A P.

## CXXXIIII.

## NOMENCLATURA.

Gr. Παιονία. Lat. Pæonia. Ital. Peonia.

Gal. Πίυοεςνε. Off. Lati-  
no. nomine.

Pæonia.

Sex, purpurea. Radix maris tenuis, digitali crassitudine, & pal-  
mi longitudine, gustu astringens, alba: fœminæ radicibus ceu  
glandes circiter septem aut octo inheret, ut in Hastula re-  
gia. Fœminis à partu non purgatis sicca radix datur: ciet men-  
ses nro



*ses nucis Græca magnitudine pota: sic uentris doloribus cum uino auxiliatur. Valet contra regium morbum, & renum ac uesicæ dolores. Decocta in uino aluum sistit. Rubra grana rubentis menses sistunt, decem uel duodecim pota in uino austero & nigro: stomachicis & erosionibus ea esse prodest: à pueris pota initia calculorum eximunt. Grana nigra auxiliantur suppressionibus nocturnis, uulvæ strangulationibus, & matricis doloribus, quindecim numero pota, in aqua mulsa, aut uino. Nascitur in altissimis montibus & præruptis.*

**I**nuentu antiquissima Pæonia, retento Authoris nomine. Fæmina non infrequens. Mas non ita perspectus, siquidem paucis in locis reperitur. Muliebri folia Myrrham redolent, & densiora sunt. Radix sex aut octo glandibus constans videtur. Mas glandosam quoque habet radicem per intervalla torosam, palmi altitudine, digitum crassam & candidam, scemina numerosiore. Pæoniæ radix leniter astringit cum quadam dulcedine, at si exacte commanducetur, acrem quâpiam amaritudinem proferet: desiccatoria etiam est. Galeno pueri comitiali morbo correpti, haustu eius integrum conualescunt, modo radicet gestem, à collo in pectus propendentem.

## Lithospermum. C A P.

### C X X X V.

#### NOMENCLATURA.

*Gr. Λιθοσπερμον. Lat. Lithospermum. Ital.*

*Gal. Off. Milium folis.*

**L**ithospermon à seminis durezza nomen accepit, folijs est. Olea longioribus, & latioribus, mollioribus: iacent humi, quæ ab radice exiliunt: ramulis surculosis, rectis, tenuibus firmis, crassitudine acuti Iunci, in quorum cacumine bifidi exortus cauliculorum speciem exhibent: folijs longis, inter quæ paruum semen, rotundum, Erui magnitudine, durezza lapidea. Nascitur in asperis & æditis locis. Vim hanc habet, ut semine cum

F 5 uino



*Lithospermum maius.**Minus.*

uino albo poto calculos frangat, pellatq<sup>ue</sup> urinam.

## Phalaris. CAP. CXXXVI.

### NOMENCLATURA.

Græ. φαλᾶρις. Lat. Phalaris. Ita. Phalaride.

Gal. Off. Ger. non vulgo nota.

**P**halaris cauliculos emittit & culmis similes, minutis, ac nullius usus radicibus, multos, duum palmorum, geniculis cinctos, graciliores tamen, ac dulces: semen candidum, oblongū, Mili magnitudine. Tunditur, & in aqua aut uino succus ad uesciæ cruciatus utilissimè bibitur. Semen cochlearis mensura potum, ad eadem efficax est.

sepla




**S**epalsia duo Lithospermi genera ostendunt, maius & minus. Nas-  
tur macro solo locis eminentibus. Hanc inter omnes plantas admira-  
tus est Plinius: Lithospermon maius Matthiolo prouenit in multis Thu-  
scie locis, minus per totam passim Italiam. Lithospermon minus Phala-  
ris esse poterat, si cauliculos culmis & ea similes emitteret.


## Rubia. CAP. CXXXVII.

### NOMENCLATURA.

Græ. Ερυθρόδανον. Lat. Erythrodanum. Ita. Robbia.  
Gal. Garence. Off. Rubea tinctorum.



*Rubia sativa.*



*Rubia sylvestris.*

**E**rythrodanum radix rubra est, qua tinguntur lane. Vna  
sponte prouenit, altera seritur, ut in Thebana Gallie, &  
Rauen



Rauenna Italia: in Caria inter oleas, ut in aruis, solo creditur. Hanc non sine quæstu serunt: namque maximum ex ea sentiunt prouentum. Asperi caules & quadranguli, longi, Asparinae non dissimiles, robustiores, et multo prorsus maiores: folijs per interualla certa circum articulos stellatim decussatis. Semen eius rotundum, inter initia uiride, mox rubrum, postea cum ematuruit, nigrum: radix tenuis, longa, rubra. Urinam ciet: qua de causâ regio morbo opitulatur, pota cum aqua mulsâ: item ischiadicis & resolutis. Crassam, copiosamq; urinam pellit, nonnunquam & sanguinem: bibentes tamen quotidie lauari oportet, & excrementorum quæ redduntur differentiam spectare. Aduersus serpentium morsus, ramulos cum folijs uino bibere prodest. Semen ex aceto potum, lienem absomit. Imposita radix trahit partus, menses, secundasq;. Albæ uirilgini illita ex aceto medetur.

**R**ubia tam domestica quàm syluestris non ignota, in Gallijs & in Thuscia nascitur, in territorio maximè Senensi, & patrimonio Romano. Italicæ fœmina folijs & caulibus nempe asperis & rudibus vasa stagnæa perpurgant & expoliunt. Amara est & acris radice Rubia. Reliquæ eius vires è Dioscoride patent.

Lonchitis. CAP.

CXXXVIII.

NOMENCLATURA.

Græ. Λογχίτις. Lat. Lonchitis. Ita. Lonchite.

Gal. & Off. non perinde nota.

**L**onchitis folia habet Porri, latiora, rubentia, plurima, ad radicem circumfracta, ueluti in terrâ procumbentia, pauca in caule, in quo flores, ceu galericuli, hiantibus comicis personis similes, nigri, & è rictu albam exerentes uelut. lingua, quæ ad labrum inferius spectet: semen inuolucris clausum lanceæ simile, triangulum, unde sibi cognomentum arrogauit. Radix Dau-  
ci.



ci. Nascitur in sitientibus & asperis. Radix ex uino pota urinā ciet. Altera est Lonchitis, quam aliqui asperam Lonchitin dicunt: folia scolopendrij emittit, sed asperiora maioraq̃, ac multo magis diuisa. Vulneribus mirum in modum prodest, in eisq̃ inflammationes excitari non patitur. Pota ex aceto lienem absumit.

**P**rima Lonchitis species Ruellio cognita, ea esse ducitur, quā Galli-  
ci pueri, Nigros capetos vocant. Attamen eorum opinionem infir-  
mat, qui secundam Lonchitis speciem, Bursam pastoriā autumant, cū  
ista Eruca folijs, & non Scolopendrij visatur. Secunda hæc species Cordo  
non ignota, effigie est media inter Scolopendrium & Polypodium. Ve-  
rum enim uero Matthiolus nullam inire rationem potuit, qua hæc sibi  
perspectæ essent, atque adeo utranque inter incognitas herbas enu-  
merat.



Althæa.

## Althæa. C A P. C X X X I X.

### NOMENCLA- TVRA.

Græ. Αλθαία. Lat. Al-  
thæa. Ita. Maluanisco. Gal.  
Guimauue. Off. Malua-  
niscus.

**A**lthæa, quam alij Ibi-  
scum uocant, in sylue-  
strium Maluarum genere  
est, cui folia ut Cyclamino,  
rotunda, lanugine canescūt:  
flore rosaceo: bicubitali cau-  
le:



le: radice lenta, intus alba. Althæa appellatur, quòd inter primas sit utilis, & pluribus polleat remedijs. Decocta enim in uino aut aqua mulsa, & per se cum imponitur tusa, efficax est contra uulnera. Item ad strumas, parotidas, abscessus, mammarum inflammationes, fracta sedis, inflationes, neruorum rigores: si quem discutit, & excoquit, rumpit, & ad cicatricem perducit. Cocta ut dictum est, adiecto suillo adipe, aut anserino, Terebinthinaue, ut malagmatis lentor fiat, facit ad uulua inflammationes, præclusionesq; in pectus subdita. Decoctum eodem fungitur munere: onera uulua: reliquiasq; à partu extrahit. Decocta succus ex uino potus, succurrit urinæ difficultati, calculosorum cruditatibus, dysentericis, ischiadicis, tremulis, ruptis: dentium mulcet dolorem, cum aceto decocta, colluto inde ore. Viride semen siccumq; tritum, uirilignes in sole perunctas emendat. Eodem cum oleo & aceto peruncti, à uenenatis non feriuntur. Valet contra dysenteriam & sanguinis reiectiones, aluiq; profluium. In posca aut uino decoctum bibitur, contra omnes uestparum, apum, similiumq; aculeatos ictus. Folia cum olei momento, morsibus, & igni ambustis illinuntur. Constat aquam trita radice addita, sub diuo addensari.

Alcea.


CAP. CXL.

## NOMENCLATURA.

Græ. Ἀλκῆα. Lat. Alcea. It. Maluauischio saluatico.  
Gal. Guimauue fauuage. Off. Herba Simeonis.

**A**lcea syluestrium maluarum generi assignatur: folia habet diuisa, Verbenacæ proxima: caules treis aut quatuor, cortice cannabino uestitos: florem Rosæ, paruum: radices albas, latas,



\* *Alcea.*

*um supplet, ubi discutiendi facultas requiritur. Huius speciatim non meminit Galenus. Paulus Aegineta pares ei cum Dioscoride vires attribuit.*

*latas, quinque aut sex, cum plurimum cubitales: quæ cū uino aut aqua potæ, dysentericis ruptisq; medentur.*

**A**lthea quæ Latinis Hibiscum, græco nomine se medicam herbā esse profitetur, nimirum ob ingentem in medicina usum. Digerit partibus suis omnibus, laxat, phlegmonem leuat, mitigat & excoquit abscessus coctū difficiles, adipibus incocta & subacta. Radice & semine tenuium est partium, & his amplius desiccatur & deterget. Alcea bismalua est sylvestris. Manardus eam esse putat, quæ Italis, herba Vngarica vocatur, à vulgari herbariorum, Alcea, diuersa. Hæc Althea lo-

## Cannabis. CAP. CXLI.

### NOMENCLATURA.

Græ. Κάνναβις. Lat. Cannabis. Ita. Canape.  
Gal. Chanure. Off. Lat. nomine.

**C**annabis sativa plāta magni in uita usus ad robustissimos funes faciliādos: folijs Fraxini, graui odore: caulibus pce-  
ris, inanibus: semine rotūdo, q̄ largiore cibo genitarū extinguit.  
Succus





Cannabis.

Succus ex ea recente, conueniēter aurium doloribus instillatur. Syluestris Cannabis uirgas fert Althææ similes, minores, nigriores & asperiores, cubiti altitudinem æquantes: folio satiuæ, nigriore & asperiore: flore Lychnitis, subrubro: semine & radice Althææ. Decocta radix, illitu inflammationes mulcet, tumores discutit, tofos articulorum dissipat. Huius cortex torquendis funibus accommodatus.

Cannabis satiuæ nulli non cognita semen, diuersum quippiam in hominibus & galinis operatur. Nam ut hominum genituram extinguit, ita vere à gallinis manducatum, generandorum ouorum miram facultatem tribuit, cum alias hyeme, ijs producendis penè inertes sint. Cannabis decoctio in lumbricorum cauernas iniecta, foras exire compellit. Perperam agunt mulierculæ, quæ seminis Cannabis decoctionem pueris epilepticis offerunt. Nam id eis non parum incommodat. In eligenda syluestri Cannabis iudicio & delectu opus est, siquidem paucis in locis vera prouenit.

## Anagyris. CAP. CXLII.

## NOMENCLATURA.

Græ. Ἀνάγρις. Lat. Anagyris. Ita. Eghelo.

Gal. Boys puant. Off. Malua terrestris.

Anagyris, frutex est arboris instar, grauis odore: folijs Agni, uirgisq; flore Brassicæ: semen in corniculis non breuibus



nibus gignit, subrotundum, firmum, uersicolori facie, simile renibus, quod durescit uua maturescence. Tenera folia trita tumores illitu reprimunt: si partus hareat, & secunda mensesq; morantur, drachmæ pondere bibuntur in passo: sic & suspiriosis dantur, & contra capitis dolores in uino. Difficulter parientibus adalligantur, ita ut à partu statim auferantur. Radicis cortex concoquendis discutiendisq; adhibetur. Semen commanducatiu uomitiones uehementer ciet.

**A** Nagyris in omnibus Tridentina iurisdictionis syluis prouenit, iusta proceritatis arbor, Hoc lignum intrinsecus propè medullam nigrum, forinsecus est luteum, in morem Guaiaci quod ex India affertur. Eo loci rustici vineaticos palos cōficiunt, nam solidiorem materiam ob neruorum robur non reperiunt. Anagyris facultatis est maturantis & calidæ, folia ut potè humida minus acria sunt. Sicca incidunt & desiccant. Radicis cortices pari uirtute præditi. Semen tenuium est partiū.

## Cepæa. CAP. CXLIII.

### NOMENCLATURA.

Græ. Κυπαρία. Lat. Cepæa. Ital.

Cepæa. Gal. Off. Ger. non  
probè cognita.

**C**epæa Portulacæ similis est, sed nigriora habet folia, & radicem tenuem, Folia in uino pota, urine stillicidio, & uesicæ scabie laborantibus opitulantur: maxime id præstat, si cū decocto radicum. Asparagi eius, quem Myacanthon, hoc est, Corrudam uocant, bibatur.

**C**epæa ab hortis nomine desumpto, in littoribus tamen arenosis nascitur, & hortensis non est, at potius littoralis Portulaca.

## Alisma. CAP. CXLIIII.

### NOMENCLATURA.

Gr. Αλίσμα. Lat. & Ital. Alisma.

Gal. non probate, Plantain de riuiera,

Off. eodem errore, fistula pastoris.

G

Alisma



**A**lisma, alij Damasonion appellat: folia ei Plantaginis, nisi angustiora essent, laciniosa, conuexa q̄ in terram: caule simpliciter tenui, cubito altiore: capitibus thyrsi: flore tenui, cādido, palleſcente: radicibus tenuibus ut Veratri nigri, acribus, odoratis, modicè pinguibus: aquosos amat tractus. Radix, si drachma una aut altera, bibatur, his conuenit, qui leporem marinum deuorant, aut à rubetis ranis demorsi sunt, aut Opiū hauerunt: torminibus atq̄ dysenteria, per se, aut cum pari modo seminis Dauci, potui datur. Conuulsis, & contra uitia uulue prodest. Herba sistit aluum, mēstrua pellit, tumores illita mitigat.

**D**amasonium quidam fistulā pastoriā existimant, quidā Plantaginem aquaticā. At enim cū Plātagine aquatica, nota Damasonij non conueniūt. Siquidem folium fert Arnoglossō angustius, terra instratum, caulem vnicū & gracile: An plantago aquatica folijs est Arnoglossō grandioribus, quæ in lanceæ modum desinentia, sursum versus aspeclant: caule non constat vnico, at pluribus, vnāque è radice prodeūtib. Eò fit vt in agnoscendo Damasonio inhibendum paulisper iudicium sit, donec certi quippiam ab homine singularis & experientie & doctrina nobis obuēiat. Plura Damasonij genera se cognosse Cordus scribit, sed scribit tantum, & rem acu non deliniat. Decoctiōnem Damasonij lapillos renum comminuere, ipsa experientia Galenū docuit, & ideo absterforium est.

## Onobrychis. CAP. CXLV.

### NOMENCLATURA.

Gr. ονοβρυχίς. Lat. Onobrychis. Ital. Onobrichi.

Gal. Off. & Ger. non nota.

**O**nobrychis, folia habet Lentis, longiora paulo, caulem dodrantalem: florem purpureum: radicem paruam. Nasclitur in uliginosis & incultis. Herba suapte ui, si trita illinatur, tubercula dissipat: cum uino pota, stragurias sanat: illita ex oleo, sudores mouet.

**I**gnotarum plantarum classi Onobrychis ascribenda, quando quidem sollicitè à Matthiolo perquisita, in Italia reperiri non potuit.

Hy



## Hypericum. CAP. CXLVI.

## NOMENCLATURA.

Græ. ὑπερίκον. Lat. Hypericū. It. & Off. Perforata.

Gal. Mille pertuis.

**H**ypericum, alij Androsamon, alij Corion, alij Chamapityn appellant quoniam semen odore Resinam imitatur, surculaceo frutice, dodrantali, rubente, folio Rutæ: flore alba Viola, luteo, qui digitis tritus, sanguineū succum remittit, qua ex causa Androsamon cognominatur: subhirsuta siliqua, & tereti, hordei magnitudine: semine intus nigro, resinosi odoris. Gignitur in cultis & asperis. Urinam cit. menstrua pellit appositum: tertianis, quartanisq; cum uino potum liberat. Semen quadraginta diebus haustum, ischiadicis medetur. Folia cum semine illita, ambusta sanant.

## Ascyron. CAP. CXLVII.

## NOMENCLATURA.

Græ. Ασκυρον. Lat. Ascyron. Ita. Asciro.

Gal. Espece de mille pertuys.

Off. Hypericonis species.

**A**scyrum siue Ascyroides, Hyperici genus est, magnitudine distans, fruticosius, maiores habens ramos, surculosiores, rubentesq;: folia tenuia: flores luteos, & fructum resinosum, Hyperico non absimilem: cuius attritu digiti ferè cruentantur, qua de causa Androsamon uocauere. Vsus semine ad ischiadicos, potum hydromelitis sextario: nam biliosa recrementa amplissimè detrahit: sed assidue dare oportet, donec sanitati restituantur. Illinitur & ambustis efficaciter.



## Androsæmum. CAP.

## CXLVIII.

## NOMENCLATURA.

Græ. Ανδρόσαμου.

Lat. Androsæmon.

Ita. Androsæmo.

Gal. Autre espèce de Millepertuis.

Off. Hypericonis species.



Androsæmon.

**A**ndrosæmon ab Hyperico, Ascyroq<sup>3</sup> differt, quod fruticet ramulis surculosis, ac tenuibus: rubentibus uirgis, & folijs rutilæ, triplo aut quadruplo maioribus, quæ trita uinoso succo manant: complureis alas habet in cacumine, utrinque expensas, pinnatasq<sup>3</sup>: circa quas flores pusilli, lutei: & in calyculis semē Papaueris nigri, insigne lineis. Huius coma trita resinosum odorem reddunt. Semen tritum drachmis duabus potum, biliosa alui excrementa pellit: ischiadicis maxime medetur: sed à purgatione a-

quam exorbere oportet. Herba ambustis illita medetur: uulnibus sanguinem cohibet.

Cor



## Coris. CAP. CXLIX.

## NOMENCLATURA.

Græ. Κόρις. Lat. Coris. Ita. Cori.

Gal. Espece de Millepertuis.

Off. Hypericonis species.

**C**oris, quod aliqui Hypericon uocant, frutex est folio Erica, rubro, pinguiore, ac minore, non altior dodrante, suavis, odoratus, acris. Potum semen menses trahit & urinas: contra phalangiorum morsus, ischiadicos & opisthotonicos ex uino potum auxilio est: horroribus ex Pipere, sed opisthotonicis ex oleo, aptissime illinitur. Radix uino decocta pota, defectis opem ferre creditur: sed laborantem inter potandum quam optime cooperiri licet: siquidem corpus totum desudabit, ex qua re pristinam agilitatem recuperabit.

**H**ypericum, Ascyrum, & Androsæmum eiusdem generis sunt, sola in caule & folijs est differentia, quatenus, aut caules & folia amplius de purpura & virore participant, & ut ea magnitudo & paruitas discriminet. At quod Cori vocatur, minus ad Hypericum accedit, quam Ascyrum & androsæmon. Cori id nominis habuit, quod odoris grauitate odores imitetur. Baccas profert iuniperi baccis non ab-similes, minores tamen, quæ vnâ cum folijs attrita, medium inter Iuniperum, Pinum, & cimices odorem remittunt, alioqui non ingratum. Hypericum non, ut Plinius vult, semine cum hordeo maturescit, siquidem huius sub finem Maij, illius sub desinentem Iulium maturitatem concipit. Hypericum excalfacit & desiccet, & tenuium est partium.

## Aiuga, siue Chamæpitys.

## CAP. CL.

## NOMENCLATURA.

Græ. Χαμαίπυτος. Lat. Aiuga. Ita. Chamepitio.

Gal. Iue Arthetique.

Offic. Iua Arthetica.


G 3

Aiug





Chamæpitys. 1



Chamæpitys. 2

**A**lga herba in terra repens, incurua similis: folijs semperuini minoris, multis, multo tenuioribus, hirsutis & pinguioribus, circum ramos densis, odore Pinus: flore tenui, luteo, uel candido: radicibus Cichorij. Folia septem diebus in uino pota regio morbo medentur: & quadraginta diebus ex hydro melite, ischiadicos sanant. Dantur peculiariter urinae difficultatibus, iecinoris & renum uitis: torminosis prosunt. Ea apud Heracleam Ponticam, perinde atque antidoto contra Aconitum utuntur, bibentes decoctum. Ad antedicta illinitur, cum polenta iure decocti subacta. Trita in farinam, & cum Fico in pilulis sumpta, aluum emollit: excepta melle, cum aeris squama & Resina deijcit: apposita ex melle: uulua uitia extrahit: marumarum duritias discutit, uulnera glutinat, ulcera quae serpunt,

cuma



cum Melle illita, cohibet. Alterum est genus *Ainga* cubitalibus ramis, in anchoræ speciem incuruatis, prætenuibus, coma super prædictæ: flore candido: semine nigro. Hæc etiâ Pinum redolet. Tertia mas nominatur, paruula, folijs exilibus, albis, scabris: caule aspero, candido: luteis floribus, semine iuxta alas. Resipit & hæc Pinum. Hæc duæ uim superioris obtinent, sed non usque adeo efficacem.

**N**on dispari in errore versantur, qui *Chamæpityn*, quæ olim Latini omnibus *Ainga*, aut *Abiga* dicebatur, aut *Chamæpencem*, aut primam sideritis speciem, aut *Chamædryn* esse contendunt. At reuerà *Chamæpytis* illa est herba, quam Iuâ cognomine Muscatam *Seplasia* nominant, non illa, quæ illis est, *Chamæpytis*. Tria eius habentur discrimina. Vnū sesquipedalibus surculis, flore Pinus & odore: Alteriù breuius, & incuruum: tertium, folijs scabris, digitali caulis crassitudine. Mira similitudo inter Iuam, & verum *Polium*. sibi tamen non succedanea.

*Finis Libri Tertij.*

G 4

*Pedan*



PEDANII DIO-  
SCORIDIS ANAZAR-  
bei De medicinali materia, Li-  
ber Quartus, Ioanne Ruel-  
lio Sueffionensi in-  
terprete.

*Ad puncta annotationes doctæ  
& compendiosæ.*

P R A E F A T I O.



*RIBVS* antè libris, amantissime Aree, tra-  
didimus odoramenta, olea, arbores, unguenta,  
animalia, frumenta, olera, radices, succos, herbas,  
seminaq. In hoc autem Quarto differemus de  
radicibus, & eis quæ restant herbis.

Betonica. CAP. I.

NOMENCLATURA.

Græ. Κεσποπ. Lat. Ita. & Off. Betonica.


Gal. Betoine.

**C**estron Psychotrophon uocitatur, quoniam frigidis locis  
inueniatur, Latini Betonicam appellant: herba est caule  
ferens tenuem, cubiti altitudine, aut maiorem, quadratum: folia  
Quercus, mollia, longa, in ambitu diuisa, odorata, prope radicem  
maiora: in summis caulibus semen ueluti Satureiæ spicatum inest.  
Decerpta huius folia siccant plurimos ad usus: radicibus nititur,  
ut ueratri, tenuibus, quæ ex hydromelite in potu, pituitosam uo-  
miti





Betonica. 1



Betonica. 2

mitionem euocant. Folia dari debent ruptis, conuulsis, mulieri-  
 bus uulua malo opportunis, & ad laxandos uteri strangulatus,  
 denarij pondere cū hydromelite. Tres in uini sextario drachmæ,  
 contra serpentium morsus ebibuntur. Herba magna utilitate  
 illatis à serpente uulneribus illinitur: aduersus etiā uenena dra-  
 chma ex uino pota conuenit: præsumpta ea, si uenenum hauria-  
 tur, nihil nocebit. Urinam ciet, aluum subducit, medetur comi-  
 tialibus & insanis, pota ex aqua: & iocinoris, lienisq; uitij,  
 drachmæ pondere in aceto mulso, concoctionem adiuuat, si quis  
 eam Fabæ magnitudine secundum cœnā cum melle cocto deuo-  
 rarit: modo consimili acida ructantibus propinatur. Stomachi-  
 cis eam manducare & succum deuorare proderit, si postea di-  
 lutum uinum sorbeatur. Datur sanguinem excreantibus, tribus



obolis, cum diluti uini egelidi cyatho, ischiadicis, renum & uer-  
fica doloribus, ex aqua: aquæ intercutem binis drachmis ex hy-  
dromelite, si febricitant: sin aliter, ex mulso: regio morbo labo-  
rantes recreat, menses pellit, drachmæ pondere cum uino pota-  
alum purgant drachmæ quatuor potæ, in hydromelitis decem  
cyathis. Facit cum Melle ad tabem & purulentam excreatio-  
nem. Folia sicca tritaq; fictili uase reconduntur.

**A**ntonius Musa Augusti Caesaris medicus, scripsit de Betonica pe-  
culiare volumen, in quo præcellentes illius virtutes explicat. Ve-  
tones, ut inquit Plinius, in hispania eam inuenere: quæ in Gallia, Be-  
tonica, dicitur, in Italia Serratula, ante cunctas laudatissima. Effectus  
non absimili, specie diuersa est, quam Paulus Aegineta vnicaule facit,  
Pulegi ramulis, sed tenuioribus, gustu fatuo, in petrosis fere nascentem.  
Incisoria virtutis est Betonica, amara, & modicè acris.

## Britannica. CAP. II.

### NOMENCLATURA.

Græ. Βεῖτανικὴ. Lat. Ital. Off. Britannica.

Gal. Natium non habet.

**B**ritannica aut Vetonica, folia habet syluestris Lapathi,  
sed nigriora, & densiora, gustu adstringentia: radicem  
tenuem & breuem: caulem paruum emittit. Folijs exprimitur  
succus, qui igni aut sole cogitur. Vim habet adstringentem, pri-  
uatim depascentibus oris & tonsillarum ulceribus accom-  
modatum. Valet etiam ad reliqua, quibus adstrictione est  
opus.

**G**ermanica, herba est Britannica, quam frisijs Romanis, cum illic  
Germanicus res ageret, ostendere, in mali remediū, è fontis cuius-  
piam potu contractum, quo dentes intra biduum decidebant, compa-  
gesque in genibus soluebantur. Id morbi medici, Stomaccacen, & Scele-  
tirben vocabāt. Ruellio Italis Pittamana dicitur, quæ Matthiolo Italo  
homini sagaci & curioso plantarum indagatori, haud dum ostensa sit.  
Non secus errant, qui hanc, Bistortam esse existimant. Nam quamuis  
Bisto





Bistorta, folia producat Lapa-  
tho sylvestri similia, attamē nec  
nigra, nec pilosa sed leuia, & su-  
periori parte purpurascētia, in-  
ferioricaesia. Radice Britannica  
constat tenui, & breui: Bistortæ  
grossa est, rubens, & serpentis  
in modum contorta. Britanni-  
ca, eiusque succus astringunt,  
cetera è Dioscoride patent.

## Lysimachia.

CAP.

III.

\* Britannica.

## NOMENCLATURA.

Græ. λυσιμάχιον. Lat. & Ital. Lysimachia.  
Gal. Lysimachie. Offic. Salicaria.

**L**ysimachia, quam aliqui Lytron appellant, caules emit-  
tit cubitales, altioresue, fruticosos, tenues, prodeuntibus  
geniculatis folijs, tenuibus, salicis figura, gustu adstringenti-  
bus: flore rufo, aut aureo. Gignitur in aquosis & palustribus. Fo-  
liorū succus adstringente sua vi sanguinis reiectionē supprimit:  
dysentericis potui datur, aut infunditur: mensū abundantia si-  
stut, in pefso: sanguinis pfluuiū subuenit, si nares ea herba obturē-  
tur



\* *Lysimachia.* 1*Lysimachia.* 2

tur: uulnerum cruorem cohibet: acerrimum nidore suffita reddit: qua de causa serpentes fugat, & muscas interficit.

**L**ysimachia ab inuentore Lysimacho rege, celebri desumpto nomine, corneola non est, qua insciendis in colorem viride pannis tinctorum flores utuntur, & quæ Thuscis Cerreta, aut Braglia dicitur. Siquidem Corneola Matthiolo, caule & folijs est Lini, non Salicis, flore luteo, semine, ut in Genista, è folliculis enascente. In pratis prouenit, nec gustu astringit. Lytron pro, Luteum, in Dioscoride & Plinio deprauatum censet Ruellius, & hanc esse herbam quam, Vitruvius auctore, cæruleo insciendo, cum non possint Chrysocolla propter raritatem uti, tinctorum usurpant. At hac Cordo sui generis herba, quæ Græcis, Isatis, dicitur, Glastrum & Lutea Latinis. Verum Ruellij Lutea, eadem cum Glastrum esse non potest, nempe Glastrum superinducta, è cæruleo colore, quo Glastrum tingit, viridis color inscitur. Qui sit ut Luteum, siue Lutea, nec Gla



Glastum sit, nec *Lysimachia*. Planta etiamnum alia ostenditur, quæ in quadrangularem caulem assurgit, folijs *Salicis*, flore rufo. At quod com manducata, nullam gustui astrictiorem expromat, *Lysimachia* esse non potest. His ductus rationibus *Matthiolus* *Lysimachiam* veram, nostro hoc tempore, in Italia non reperiri concludit, nec secus duco, in Gallijs. *Ruellio*, *Pellibossa*, vera est *Lysimachia*.

## Sanguinaria, siue Polygonum.

### CAP. IIII.

#### NOMENCLATURA.

Græ. πολύγονον. Lat. *Polygonum*.

Ita. & Off. *Corrigiola*.

Gal. *Corrigiole*.

**P**olygonum mas, ramos habet teneros & molles, frequentibus geniculis cinctos: qui per terrâ, ut *Gramen*, repunt: folia *Rutæ*, sed molliora longioraq; semine sub folijs turgescere: unde marem appellari uolunt: flos eius candidus, aut puniceus. Vis epoti succi est spissare, ac refrigerare: prodest cruetæ excretioni, cholera, alui fluxionibus, & urinae stillicidio: urinâ aperte ciet, cum uino potus, contra serpentium morsus auxiliatur. Datur in febribus per horâ ante significationes, Fœminarum profluvia impositu sistit: idem succus purulentis auribus instillatur: facit eximie ad genitalium ulcera, cum uino, adiecto Melle, decoctus. Stomachi feruori, sanguinis reiectionibus, ulceribus quæ serpunt, ignibus sacris, collectionibus, tumoribus, & recetibus uulneribus folia illinuntur. *Sanguinaria* fœmina fruticat uno caule, arundini tenero simili, densis geniculis, & in se tubarum modo sarctis. Articulos in orbem cingunt apices, foliolis *Piceæ* similes: radicis nullus usus. Nascitur in riguis. Huic quoque spissandi refrigerandique natura, ad eadem ualens, sed inefficacior.

**P**olygonon mas, campestris & vulgaris plâta, *Polygonon* fœmina, non æquè passim frequens & copiosa. Nomen utriusque à frequentia geniculorum, aut seminis multitudine. Mas vulgò *Centimodia*: Fœmina

Gall




Gallis, Aquatica pinus. Nāque ea in humidis fructicat, vno caule Arundini tenera simili, densis geniculis in se tubarum modo fārctis, quorum torulos folia pinus in orbem cingūt, radice nullius vsus. Vis vtriq; spissandi refrigerandiq;: Sed imbecillior in fœmina.

# Polygonatum. CAP. V.

## NOMENCLATURA.

Gr. πολυγόναιον. Lat. Palygonatū. Ita. Fraßinella.  
Gal. La Genouillee. Offic. Sigillum Salamoninis.



Polygonatum mas.

Fœmina.

**P**olygonatum nascitur in montibus, frutice cubito altiore: folijs Lauri, latioribus & leuioribus, sapore mali Cotoniei, aut Punici, cum quadam adstrictione: flores per singulos foliorum exortus promit, candidos, folijs numerosiores, incepta à radice supputatione: radicem habet albam, mollem, longam, crebro



brò geniculatam, densam, graueolentem, digitum crassitudine aquantem: quæ uulneribus efficaciter illinitur: quin etiam maculas in facie delet.

**P**olygonatum sic dictum, quod radix frequētibus geniculorum nodis per intervalla tumcat. Ex eius radice mulieres aquā, earū leuissimā peculiarem, efficiunt. Atenim polygonatum, non est Secacul. Nāque Serapio Secacul describens, nullam Dioscoridis mentionē facit, ut ei moris est, cum quippiam ex hoc authore mutuatur. Ad hac Serapio suo Secacul, pisellorum, non Lauri, folia attribuit. Porro ipsæ vires non consonant. Siquidem polygonatum, græcis, maculas in facie delet: cum Arabum Secacul, semen, & venereas vires adaugeat. Polygonatum facultatis est mistæ, hinc è modica astrictione & acrimonia: inde è fastidiendo gustu, qui ne explicari quidem possit. Est hac in planta mas & foemina, è Valerij Cordi industria. Errant tamen qui hanc cum Dictamno & Helleboto albo confundunt.

Clematis.

CAP. VI.

NOMENCLATURA.

Græ. Κληματίς δ'αφροειδής.

Lat. Clematis Daphnoides. Ita. Prouenca.

Gal. Petit Liseron.

Off. Vinca Peruinca.

**C**lematis humi serpit: læto, pinguiq; solo provenit, uticulas spargens crassitudine iunci, exiguas: folio Lauri figura & colore, multò minora. Ea cū caulibus in uino pota, alui profluvia & dysenterias sedant. Subdita in pessa cum lacte & Rosaceo, aut Cyprino, cruciatibus uulnæ medentur. Dolores dentium commanducata finit: imposita serpentium morsibus, inuamentum præstat: fertur etiam contra aspidum ictus ex aceto pota opitulari. Gignitur in terrenis. Est & altera Clematis, quæ uticulosum emittit ramulum, rubescentem, lentum: folium gustu admodum acre, ac exulcerans: repit per arbores, ut Smilax. Semen tritum, pituitam bilemq; detrahit, in aqua aut hydromelite potum. Folia eius illata lepras purgant.

De D<sup>ni</sup> Manuel Casti Cum

110



*Cum Lepidio conditur ad  
cibos.*



### *Clematis.*

*Clematis astrictoria, & ea  
qua de primo loco scribit  
Dioscorides, ea proculdubio est,  
qua Vinca peruinca Officinis  
dicitur. Nec tamen Peruinca,  
Chamadaphne, Laureolæue  
erit, quantumvis hanc Clema-  
tida, Chamadaphnem Plinius  
nuncupet. Secunda Clematis,  
multum à prima differt, &  
quemadmodum è notis concipi  
potest, quam Galli Viornam  
vocant, & Itali, Vitalbe, &  
Vitex &c. Clematis erit altera.  
Namque viticulis constat rube-  
scentibus, lentis, & obsequiosis,  
Smilacis folijs, gustu admodum  
acri, ac exulcerante, sese sepibus  
inuoluit, ac per arbores vt Smi-  
lax repit. Sic non erit genus il-  
lud Conuoluuli, cuius flos rudioris Lilij figuram habet, & vulgo Cam-  
panella, Latinis Cymbalaria, à Cymbalorum effigie dicitur. Non dissi-  
milis eorum prodetur error, qui Vitem nigram, quam Dioscorides, fe-  
rè sub huius libri finem, describit, secundam Clematida esse putant, cum  
ad illius caput deuenimus. Quam Itali, Flammola vocant, folijs,  
flore, semine, & peracri sapore, à Clematide non admodum dissidet,  
vtut in arbores & dumeta non reptet, sed caules cubitū altos producat  
foliaq; intoleranda acrimonia. E queis in balneo mariæ, aquam limpi-  
dissimam, non discrepante acrimonia Matthiolus eduxit, qua in frigi-  
dos effectus vsus est, non improbato successu. Flammula referente Pla-  
teario, quarto ordine excalfacit & desiccant. Siccitas in Clematide cete-  
ris qualitatibus preualet, id gustus indicat, cui astrictionis quippiam  
modica, cum vehementi amarore expromit. Siccat tamen, idque citrà  
mordicationem. Postremam humi capitis partem, de Clematide soluti-  
o, è Galeni scripto didicimus, cum solutiuis herbis in fine huius libri*

*rect*



rectè vt erat ab authore, collocatam, ac processu à curioso quopiam, illi a-  
strictoria Clematidi nullo iudicio coniunctam.

## Polemonia. CAP. VII.

### NOMENCLATURA.

Græ. πολέμωνιον . Lat. Polemonia . Ita. eodem.

nomine. Gal. Sauge sauuage. Off.

Behen album.

**P**olemoniam alij Philiteriam, Cappadoces Chiliodyna-  
min appellant, ramis exilibus, utrinque pinatis: folijs pau-  
lo quàm Rutæ maioribus, ac longioribus, Calaminthæ sangui-  
nariæ proximis, quibus in summis uelut corymbi dependent, ni-  
gro semine: radice cubitali, albicante, radícula simili. Nascitur  
in montosis & asperis. Bibitur in uino Radix contra serpentes  
& dysenteriam: & ex aqua, aduersus urinae difficultatem, &  
coxendicum cruciatus. Datur ex aceto drachmæ pondere lien-  
sis: eadem scorpionis plagæ alligatur. Tradunt, eum qui radi-  
cem gestauerit, à scorpione non feriri: eumq; si ictus sit, nihil mo-  
lestipassurum: dentium dolorem mansa mitigat.

**V**idit Polemoniam Matthiolus in altioribus & asperioribus val-  
lis Anonæ montibus, gracili & quadrato, caule, flore, serè Ne-  
petæ, coma corymbacea, nigro refertâ semine, radice longa & candida.  
Id tamen quæ est modestia, non affirmat. Atenim Rutam caprariam,  
quæ Galega Italis, non esse constanter per asseuerat, vt quæ omni, sua  
sua effigie scænungæ, referat, nec corymbos in cyma producat, sed follicu-  
los quæ rubescens semen includitur, & natales non conueniunt. Bosci-  
salua, quam Ruellius pro Polemonia profert, Cordo ad id extorta vi-  
detur, folijs & radice, oculata experientia diuersis. Polemonia tenuibus  
partibus constat, & incisoria virtutis est.

## Symphytum, siue Alus. CAP.

### VIII.

### NOMENCLATURA.

Gr. σύμφυτον πετράιον. La. Symphytum petraeum.

H

off.



Ita. Symphito petreo. Gal. Bugle & Sanicle.  
Off. Prunella.



Symphiton. Petraeon.

**S**ymphyton petraeon, id est, *Alus*, nascitur in petris: ramis tenuibus, parvis, Origano similibus: capitulis Thymi: furculosum totum, odoratum, gustu dulce, saluam ciens: longa radice, subrusa, digitali crassitudine. Decoctum in aqua mulsa & potum, pulmonis uitia purgat: sanguinem reijcientibus, & renum malis, ex aqua datur: ad dysenteriam, rubraq; sceminarum profluvia, in uino decoctum: ad conuulsa uero & rupta, ex aceto mulso bibitur. Quin & comanducatum sitim sedat, faucibus asperis subuenit: uulnera recentia enterocelasq; conglutinat, & illitu cohibet: carnes autem cum Symphyto decoctae coalescunt. Est & alterum Symphyton, quod alicui Petlon uocant: id caulem emittit bicubitalem, aut maiorem, crassum, leuem, an



uem, angulosum, ut Sonchi inanem, circa quem breui interuacante spacio: folia exeunt angusta, Buglosso proxima, oblonga, hirsuta: caule secundum angulos quosdam striato: folijs tenuibus ex alarū sinu prodeuntibus, in quibus flores lutei & circa caulem uelut Verbasci semina emicant. Tam caulis quam folia, aspera lanugine horrent, tactuq; pruritus concitant: radices demittuntur foris nigrae, intus candidae, viscosae: quarum est usus. Trita & pota cruentis excreationibus, ruptisq; proficiunt. Recentia ulnere illita conglutinant: carnes quoque si concoquantur, cogunt addita inflammationibus praesertim sedis, cum Senecionis folijs utiliter illinuntur.

**S**ymphytum Petraeum in Italia nostro tempore non videri Matthiolus, nescio si in Galijs quāuis ita esse Ruellius asseneret. At quod secundo loco ponitur Symphytum, nulli dubium est, quin illa sit planta, quam Consolidam maiorem vulgus herbariorum vocat. In pratis nascitur, floribus non croceis tantum, sed rubescentibus etiam & candidis, vni- formibus tamen. Errant qui Consolidam minorem, Symphytum Petraeū esse contendunt, siquidem diuersissima sunt effigie. Nec saniori iudicio, erit Cōsolida media, quae folia profert supramodum caerulea, & Italis Laurentina: Senensibus, Morandola dicitur. Duae haec plantae Graecis & Arabibus ignotae, praestantia modernis remedia proferunt, sed quae sedulo praetereo, ne prolixior, & quod in manus omnium venerint, qui haec ad vnguem prodiderint. Germani inter Consolidas Sanniculā etiam reponunt, quae duorum est generum. Est etiam Consolida regalis, Italis, Sperone di caualiere. Empiricis haec plantae, earumque perspetae vires. Symphyton excalfacientium, desiccantium, & contrahentium ordinis est secundi.

## Holostium. CAP.

### IX.

## NOMENCLATURA.

H. 2

Græ.



Græ. ολέσιον. La. Holostium. Ita. Holestio.

Gal. & Off. ignota.

**H**olostion quadrantalibus herbula est, humi repens: folijs uticulisq; Coronopo aut Gramini proximis: gustu adstringentibus: radice alba, pratenui, usque in capillamenti speciem, longitudine quatuor digitorum. Nascitur in collibus terrenis. Vfus eius ad rupta, in uino pota: nam & carnes coguntur, decoctionibus addita.

**H**olostium herba non vulgò cognita, ut quam in Italia Matthiolus non cognovit. Licet Ruellio Gallico ruri, Denticulus canis vocetur, attamen vulgaris Pillosella non est. Namque cum facie Coronopum non exprimat, unico reptandi habitu conformis, folia habet per intervalla geminatim copulata, obtusiori quàm in Gramine mucrone. In summa, effigies, nihil cum Holostio convenit. Pillosella inimica pecori, ob astringendi vim, ut ab eius pastu præ nimia astrictione commoriantur, & ideo arcendis fluxibus omnibus, & maxime capitis idonea. Caterum desiccata & astringit Holostium.

Stœbe. C A P. X.

NOMENCLATURA.

Græ. Στοιβη. Lat. Stœbe. Ita. Stebe.

Gal. la Scabieuse. Off. Scabiosa.

**S**tœbe vulgaris est noticia, cuius semen & folia stringunt, Squapropter decoctum dysentericis infunditur: auribus quoque purulentis instillatur. Illita folia oculis ab ictu cruentis prosunt, erumpentis sanguinis impetus cohibent.

**S**tœbe, quæ & Phleum Theophrasto dicitur, frutex est caule, perinde ut folio, aculeatus, molli semine & rubido, radice pecoris pabulo gratissima, non alibi quàm in aquaticis nascens. Hæc delinatio, satis ostendit aberrare eos, qui hanc, vulgarem Scabiosam esse contendunt. Nam Scabiosa, folio est Erucae, laciniato, subhirsuto, non tamen spinis horret, flore specioso, diuturno, cerulei coloris, & ex cassio albicatis. Hæc decoctione, potu, & inserto unguentis succo, scabiei medetur. Vallet in pectoris, diaphragmatis, & membrorum spirituum affectus, & inibi generatos ascessus infringit. Anthracibus pestiferis illinitur: siquidem à

tribus



tribus horis, hac lue defungitur corpus. Stœbes folia & fructus, astringunt, & nihilum mordicant. Desiccat sub tertij ordinis initium.

## Clymenum. CAP. XI.

### NOMENCLATURA.

Græ. κλύμενον. Lat. Clymenum. Ita.

& Off. Saponaria. Gal. du Stego.

**C**lymenum caulem fert Fabæ, quadratum: folia Plantaginis, folliculis supra caulem in sese inflexis, ut in polyporum cirrhis. Probatissimum est e montibus. E frutice toto cum radice succus exprimitur, qui ad sanguinis reiectiones in potu efficax est. Cœliacos, rubraq; scæminarum profluvia, refrigerando infrenat: sanguinem naribus erumpentem suppressit. Trita folia, aut siliquæ recentibus uulneribus impositæ, eâ ad cicatricem perducunt.

**I**gnotarum plantarum classem inibit Clymemum. Poterat quidem videri, Saponaria, si ea ut folijs Plantaginem, itidem caule, qui rotundus est & nodosus: & flore, qui dispar est, Clymenum reserret.

## Periclymenum. CAP. XII.

### NOMENCLATURA.

Græ. περικλύμενον. Lat. Periclymenum.

Ita. Vincibosco. Gal. Vincibosque.

Off. Caprifolium.

**P**ericlymenon, simplex fruticat, ex intervallis parua folia habens ipsum amplectentia, subcandida, hederacea: inter folia surculi exeunt, in quibus bacca, hederæ similes: flos Fabæ, candidus, aliquantum rotundus, & quasi in folium procumbens: semen durum, & quod difficile euellatur: radice rotunda, crassa. Nascitur in aruis ac sepibus, conuolens se adminiculis propter assidentibus. Semen eius postquam ematuruit collectum, & in umbra siccatum, si drachmæ pondere detur in uino quadragenis diebus, linem absument: lassitudinem discutit, sed urinam



ciet statim à sexto die cruentam, orthopnœa & singultui prodest: partum accelerat. Folia sunt eisdem uiribus prædita: quæ tricenis septenis diebus epota, sterilitatem facere produitur. Perunctis ex oleo, febrium algores abigunt.

**Q**uemadmodum eruditorum consensus, Periclymenon & Matrisyluam, in unam & eandem plantam copulauit, ita emunctiorum examen, Caprifolium, à Matrisylua segregauit. Siquidem Caprifolium, Dioscoridis vera est Pixyacantha. Ianus a vigo Chirurgicus, è Galeni libro de simplicium facultate octauo, Matrisyluam in tiliarum ulcera commendat, At id: ut ex hoc loco patet, non scripsit Galenus.

## Tribulus. CAP. XIII.

### NOMENCLATURA.

Græ. τριβόλος. Lat. Tribulus. Ita. Tribolo.  
Gal. Macres. Saligorz. Off.  
Tribulus marinus.

**T**ribuli genus unum terrestre, folijs ad effigiem Portulacæ, tenuioribus uticulis, in terra stratis: spinis secundum folia rigidis, præduris. Iuxta amnes & rudera nascitur. Est & alterum genus, aquis familiare, quod in fluminibus natum commā exerit, aculeos condens: folijs latis: & pediculo longo: caule parte summa quam ima crassiori: capillamenta quedam indidem exorta spicantur: semen durum, ab altero non abhorrens. Vterque refrigerantis & inspissantis est natura: ideo inflammationes omnes cataplasmate adiuuat. Ulcera in ore erumpentia, putredines, gingiuas, tonsillasque persanat. Succus ex his colligitur ad oculorum medicinas. Semen dum recens bibitur, calculosis iuuamentum affert. Drachma terrestris Tribuli pota, illitæue, iectos à uipera recreat. contra uenena cum uino aptissime bibitur. Decoctum eius sparsum pulices necat. Thraces qui ad Strymona



*Strymona amnem habitant, uirenti Tribulo equos sagināt, & è dulci semine & esculento panem quo uescuntur faciunt.*

**T**ribulus terrestris Dioscoridi, vnus, Theophrasto & Plinio diu-  
est generū. Vni Cicercula folia, alteri aculeata. hic & serius flo-  
ret magis que septa obsidet villarū, Semen ei rotundius, nigrum, in sili-  
qua. Folium idem habet secundum spinam, alteri acanaceum, & Sesa-  
ma figura. Aculeatum hoc tribuli genus nostro saeculo planta est inco-  
gnita. At qui folijs Portulacam refert, Venetijs visitur, propter diuī  
Nicolai cathedram. Calcatreppa, quae Italis Cacatrepola, viticulos nul-  
los, sed nec siliquam qua semen includatur, producat, cum Tribulo spi-  
noso non admodum facit. Aquaticus tribulus in lacis Mātuanis, & Fer-  
rariensi nascitur, & Venetijs in lacunis, maritimis locis adiacentibus.  
Editur fructus, castaneae similis, cineri calido incoctus. Tribulus compo-  
nitur partim ex essentia humida, paucillum frigida, partim è sicca, nō  
modice frigida. In terrestri essentia, frigidum terristri praeualet, in a-  
quatica, aqueum terrestre.



*Limonium.*

## Limonium. C A.

### XIIII.

#### NOMENCLA- TVRA.

*Græ. λειμώνιον. Lat.*

*Limonium. Ita. Limonio.*

*Gal. Reparee de pré.*

*Off. Pyrola.*

**L**imoniū folia habet Be-  
ta, tenuiora & longiora  
H 4 decem



decem, sæpe plura: caulem tenuem, rectum, Lilio æqualem, seminibus rubris scatentem, quæ gustata adstringunt. Semen tritum, & ex uino acetabuli mensura epotum, dysentericis celiacisq; prodest. rubra fœminarum profluvia sistit. Nascitur in pratis & palustribus.

**L**imonium Plinio, Beta est sylvestris, quam Nomoidem à quibusdā vocari scribit. At Galenus libro de facultate alimentorum secundo, nullam Beta sylvestris speciem agnoscit, nisi fortè ex illa, Rumicem quis intelligat. Qui sit, ut sui generis herba sit Limonium, non infrequens à Matthiolo in vallis Ananie paludibus animaduersa. Quæ, sit necne Ruta pratensis, aut Officinarum Pyrola, iudicium alijs relinquo. In remedia, Limonium acetabuli mensura offerendum.

## Lagopus. CAP. XV.

### NOMENCLATURA.



\*  
Lagopus.

Gr. Λαγοπους. Lat. Lagopus. Ital. Lagopo.  
Gal. Pie de lieure. Off.  
nō nota. Ger. Katzent-  
see Hasenpfontsin.

**L**agopus herba sistit  
aluum in uino pota:  
aut in febris, ex aqua. Ea-  
dē inguini alligatur, in inflā-  
matione. Nascitur in seg-  
tibus.

Nullam



**N**ullam Lacopi effigiem Dioscorides exhibet. Id nobis eius cognoscendi certum tollit argumentum. Matthæus saluaticus, Caryophyllatam esse putat. Sed eius opinio à nullo penè recipitur, quod ea in montibus nascatur, non in segetibus & aruis. Ruellio, ea ducitur, quæ Trinitatem, vulgus vocat. Nempè humilis Trifolij genus, in segetibus & armis enati. Germani pro Lacopo herbam ostendunt, caulibus rotundis & hirsutis, folijs Loti pratensis, semine in paniculis muscosis lanuginosisque, pedi leporino admodum similibus. Hæc gustu astringit, & exiccantis est facultatis.

## Medium. CAP. XVI.

### NOMENCLATURA.

Gr. Μέδιον. Lat. Medium Ital. Medio-  
Gal. Off. Ger. ignota.

**M**edion in saxis & opacis nascitur. Folia habet Iridis: caulem tricubitalem, & in eo florem grandem, purpureum, rotundum: semine Cnici, minuto: radicem dodrantalem, crassitudine baculi, gustu acerbo. Quæ trita in farinam, & ex Melle decocta, rubros menses fœminarum sistit, eclegmate per aliquot dies sumpto. Semen in uino potum, menstrua pellit.

**E**xemplarium diuersitas, in depinguendis Medi solijs, cum hæc Iridi similia, alia Seridi faciunt, satis extricari non potest. Plinius qui Iridi satiuæ similia depingit, Seridem intellixisse videtur. Nam Iris Theophrasto culturam non desiderat. Sed hæc Delio natatore indigent. Medi radix, austera est, & refrenat fluxus, etiam muliebres. Contra semen, menses elicit, nempè tenuium partium & incisoriæ facultatis.

## Epimedium. CAP.

### XVII.

### NOMENCLATURA.

Græ. Επιδιον.  
Lat. Epimedium.  
Ital. Epimedio.  
Gal. Off. Ger. ignota.

H S Epime




**E** *Pimedium*, caulis est non magnus, *Hederæ* folijs, denis atque duodenis, neque florem, neque fructum ferens: radice tenui, nigra, graui odore, gustu fatuo. Nascitur in humidis. folia cum oleo trita, imposito cataplasmate, mammas increescere non sinunt. Radix cōceptum adimit. Folia trita quinis drachmis, post menstruas purgationes quinque diebus in uino pota, præstant mulieribus ne concipiant.

**I**ncognita herba *Epimediū*, sed nec herba est, *Trinitas* vocata, ut vult *Cordus*. Nam *Trinitas*, caulem & florem producit: *Epimedium*, caule & flore destituitur. Præter hæc, nota aliæ, & vires non consentiunt.

## Gladiolus. CAP. XVIII.

### NOMENCLATURA.



*Xiphion.*

Græ. Ξίφιον. Lat. Off.  
*Xiphion*. It. *Gladiolo*. Gal.  
*Glais*.

**X** *Iphion*, alij *Phasgannon*, alij *Macharonion*, Romani *Gladiolum* uocant. Nomen inde accepit, quod folium gladij præbeat speciem. Iridi simile erat, nisi minus & angustius uideretur, & gladij modo mucronatum, neruosumq;. In caulem exit cubitale, in quo purpurei flores, in ordinem digesti, inter se distant: rotundo



tundo semine: radicibus geminis, una, bulborum modo, super alteram insidente: quarum inferior gracilis est, superna uberior. Nascur in aruis. Superior cum Thure illita, admisto uino, spicula & aculeos e corpore extrahit, panos cum Lolij farina & hydromelite discutit: qua de re huiusmodi emplastris inseri solet. Menses imposita trahit. Superiori radice ex uino pota, uenerem stimulari, & inferiore sumpta sterilescere tradunt. Superiorem quoque utiliter infantium enterocelis, cum aqua potui dari precipiunt.

**E**T si veteres omnes herbas, quæ gladiolis simile esset folium, Gladio los vocauere, ut Iris, Sparganium, Acorus, Xiris, & aliæ. Est tamen sui generis herba, Gladiolus, quem Græci Sphaganon, Xiphion, & Macheronion appellant. Hic in Thuscis inter segetes nascitur, nulla refragante nota. Flores Thuscis, Monacuccie, dicuntur. Plinij Gladiolus in humidis nascens, is Gladiolus esse videtur, quem pro Acoro, vulgus usurpat. Rura Gallica verum Gladiolum, Spatham, aut, Segetalem Gladiū appellant. Radix Gladioli maxime superior, attrahit, concoquit, & desiccatur.

## Sparganium. CAP. XIX.

### NOMENCLATURA.

Græc. σπαργάνιον. Lat. Sparganium.

Ital. Spargonio.

**S**parganium, aliqui Xiphidion uocant. Folia habet Gladioli, sed arctiora, & in terram magis procumbentia. In summo caule ueluti pilulae prominent, in quibus semen. Contra serpentis uenena, radix cum uino datur.

**S**parganium non esse Cotulam foetidam, hinc probatur. Spatula foetida folia habet latiora & longiora Gladiolo, quæ in terram non procumbant. Ad hæc, Spatula foetida pillulas in summo caule, indidit semine incluso, non profert. Ex Spatulae foetidae succo (ut id obiter dicam) scabies, & impetigo medicantur. Vidit Matthiolus Sparganium in territorio Romano, loco quem Tolpa, vocant, ubi rupem Alumen conficitur ad radices motis, Rōcone, nuncupant, consuetudine notis omnibus. Desiccatorium est Sparganium.

Xyris



## Xyris. CAP. XX.

## NOMENCLATURA.

Græ. ξίρις. Lat. Xyris. Ita. Xiride.

Off. Spatula fœtida.



Xyris.

& collectionibus illita cum aceto medetur. Radix ex passo bibitur, ad conuulsa, rupta, coxendicum dolores, strangurias et alui profluvia. Semen tribus obolis potum, urinam uehementius impellit: & cum aceto, lienem absumit.

Xyris in varijs Italia locis, in Thuscia, & Gallijs prouenit. Cordera est, quā Itali Spatulam fœtidam vocant. Sed huius rei non meminit Matthiolus, proculdubio, si eo pacto se haberet, non prateriturus. Tanta hominis est sedulitas. Xyris vim habet abstergerendi, digerendi, & desiccandi, non radice tantum, sed amplius etiam semine.

Anchu



## Anchusa. CAP. XXI.

## NOMENCLATURA.

Græ. Ἀνχούσα. Lat. & Ita. Anchusa. Off.

Buglossa rubea. Gal. Orchanette.

**A**nchusa, quæ alio nomine Calyx, aut Onoclia appellatur, folia habet Lactucæ, in acumē fastigiata, hirsuta, aspera, nigra, multa, quoquoersum humi sparsa, spinis horrida: radici crassitudo digitalis, quæ æstate prouenit, ac manus inscit sanguineo colore. Lato solo nascitur. Radix adstringit, ad ambusta & uetera ulcera, ex oleo & cera efficax est. Igni sacro cum polenta medetur, lepris & uiliginibus illinitur ex aceto, partus extrahit, uulua indita. Eius decoctum renum uitjs, lieni, & bile suffusis datur: & si febris sit, ex aqua mulsa. Sistunt aluum folia in uino pota. Radice pigmentarij utuntur ad unguentorum spissamenta. Est & altera, quàm aliqui Alcibiadion, aut Onochiles appellarunt. Hæc à priore distat, quòd minora habeat folia, sed simili modo aspera: ramulos exiles: florem purpureum in puniceum uergentem: radices rubras, oblongas, quæ mæsis sanguineum succum fundunt. In sabulosis nascitur. Vis ei folijsq; inest, quæ contra uirus cum reliquorum serpentium, tum maxime uiperarum, auxilietur, siue cibo, siue potu, siue alligatu. Nam si quisquam mandens, in serpentis os inspuat, eum necabit. Est & alia huic haud dissimilis, semine puniceo, minore. Cuius semen manducatum, si in serpentis fauces inspuatur, eam interficiet. Radix acetabuli mensura cum Hysopo & Nasturtio pota, latus uentris tinea excutit.

**A**nchusæ quartū genus facit plinius, primò generi admodū ad simile, quàm pseudanchusam vocat. Atenim hæc, prima hirsutior est, lanuginosior, & minus spissa, folijsque constat gracilioribus & languidioribus. Ruellio pseudanchusa aruis arenosis innascitur, & mæsis sanguineum humorem exudat. Matthiolo, pseudanchusa non visa, cum

Anchu



*Anchusa* genera tria à Dioscoride descripta, in multis & varijs Italia locis, inspexerit, succūque ex earum radice, per astatē, rubentem extraxerit. *Anchusa* omnes, flores per totum caulem producunt, è casto purpurascētes penē forma vulgaris Buglosi, sed rubent, & explicantur magis. *Anchusarum* radices astrictione facultatis, & amarae sunt, infrigidant, & abstergunt. Folia licet minus possint, desiccandi tamen & astringendi virtute non privantur. *Lycopsis* in astrictione, *Onoclea* valentior. *Alcibiadion* aut *Onochile*, plus in re medica potest, siquidem gustata acrior, est.

## Lycopsis. CAP. XXII.

### NOMENCLATURA.

Græ. λυκοψις. Lat. *Lycopsis*. Ita. *Licopside*.

Gal. Langue de chien. Off.

*Lingua canis.*

**L**ycopsis, quæ à nonnullis *Anchusa* vocatur, folijs lætluæ longioribus, asperioribus, latioribusq̃, crassius, ad radicis caput recidentibus: caule longo, recto, scabro, hirsutis adnatis multis, cubitalibus: flore parvo, purpureo: radice rubra, & adstringente. Nascitur in campestribus. Cum oleo radix illita vulneribus medetur: & cum farina hordeacea, ignibus sacris. Sudores peruncta mouet, adiecto oleo.

## Echium. CAP. XXIII.

### NOMENCLATURA.

Græ. εχιον. Lat. *Echium*. Ita. *Echio*.

Gal. Buglosse fauauge. Off.

*Buglossa vulgaris.*

**E**chion folia habet prælonga, hirsuta aliquantum tenuia, *Anchusæ* proxima, minora tamen, subrubra, & pingua, spinulis tenuibus horridula: cauliculos exiles, numerosos: minutaq̃, utroque latere folia, expansa, pinnataq̃, nigra, in summo caule



*Echion domesticum.**Sylvestre.*

caule minuscule: flores secundum folia purpureos, in quibus semina capiti uiperarum similia insunt. Radix nigricat, digito tenuior, quæ non percussis modo à serpentibus ex uino prodest, sed eos qui antea biberint, feriri non patitur. Folia & semen idem præstant munus. Lumborum dolores sedat. In uino aut sorbitione sumpta, lac extrahit.

**E**chium inde nomine accepto, quòd semine sit viperarum capitibus non absimili, & possit in earum morsus: siquidem, Echis, græcis Viperam sonat. Alcibijs, dormiens in genu à Vipera demorsus, hausto Echij succo, applicataq; morsui herba quam expresserat, cum ex insperato conualuisset, quod planta huius esset remedium ostēdit. Plinio duū est generum. Vnum Pulegio simile, coronatum folijs. Alterum, lanugine distinguitur spinosa, cui capitula sunt uiperæ. Hoc proculdubio, herba Hircina est, quam sic vocant, quòd constet, eius pabulo hircos capellasq; delectari. Nas citur non in Italia tantum, sed etiam in Gallijs.

Ocima



## Ocimastrum. CAP. XXIIII.

## NOMENCLATURA.

Græ. ωκυμοιδῆς. Lat. Ocimoides. Ita. Basilico saluatico. Gal. Basilic sauuage.

**O**cimoides, Latini Ocimastrum uocant, folia fert Ocimi, & ramos dodrantes, hirsutos, siliquas Hyoscyamo similes, semine, ut Gith, nigro prægnantes. Vim habet semen in ui no potum, qua uiperarum ceterarumq; serpentium morsibus medeatur. Datur ischiadicis cum Melle, uino, Myrrha, & Pipere. Radice nititur tenui & superuacua.

**O**cimastrum, seu Basilicon sylvestre, ea est herba, quam vulgo Potulariam nominant, quod siliquæ, pocillorum quibus bibamus, imaginem quandam referant. Namq; Siliquæ Hyoscyami dehiscunt capaci ventris sinu, arctis vasculi faucibus, & leuiter per ambitum denticulatis, in quibus Gith semen occultitur. In Ocimaastro consentionibus Matthiolo & Ruellio, Cordus notas discrepare contendit, at solis nititur verbis.

## Erinus. CAP. XXV.

## NOMENCLATURA.

Græ. Ερίνος. Lat. Erinus. Ita. Basilico aquatico. Gal. Basilic d'eau.

**E**rinus nascitur apud fontes & fluuios, folijs Ocimi, sed minoribus, parte superna diuisis, quinis, senisue, dodratalibus surculis: flore candido: semine nigro, & acerbo. Folia & caules lacteo succo turgēt. Semen drachmis duabus in quatuor Mellis cyathis oblitum, oculorum fluxiones cohibet. Succus cum sulphure & Nitro instillatus, aurium dolores sedat.

**E**rinum, Echinum vocat Galenus, prout etiam in antiquioribus Dioscoridis codicibus habebatur. Herba succo manat lactis, tum colore, tum dulcedine, vnde Lactariæ nomen apud vulgus inualuit. Erini semen tenuium partium, desiccat sine morfu.

Gramen



## Gramen. CAP. XXVI.

## NOMENCLATURA.

Gr. Αἴψωσις. Lat. Gramen. Ita. Gragmina.  
Gal. Dent de chien.



Gramen.

**G**ramen geniculatis  
serpit ramulis, a quibus crebro radices spargit  
dulces, articulis præcinctas:  
folia dura, & ut Arundinis parua, lata, in exilitate fastigiantur, eaque iumenta  
& boues pascunt. Trita radix illitu uulnera conglutinat. Decoctum eius in potu,  
torminibus medetur, & urinae difficultatibus: calculosa etiam uesicae excrementa  
comminuit. Est & arundinaceum Gramen, priore multo maius, quod iumenta necare traditur, praesertim in  
Babylone: idque iuxta uias nascitur. Quod in Parnaso monte gignitur, desius fruticat: folijs hederaceis: flore odorato, candido; semine paruo, non inutili: radicibus quinque aut senis, digitali crassitudine, candidis, mollibus, & admodum dulcibus. Succus si in uino cum Melle pari, & Myrrhae dimidio decoquatur, adicianturque Piperis & Thuris tertiae portiones, probatissimum erit oculorum medicamentum. Id in area pyxide reconditur. Decoctum



Etum radicis, idem quod herba præstat. Semen uehementius ur-  
nam impellit, aluum uomitionesq; sistit. Natum in Cilicia Gra-  
men, quod incolæ Cinnam appellant, boues inflammat, si eo ui-  
renti sæpe pascantur.

**N**otum est primum Graminis genus à Dioscoride descripti. Nam  
Babilonium & Parnassæum, nostris regionibus non nascuntur.  
Plinius tria facit aculeati Graminis genera. Dactylon vocant, cui in ca-  
eumine aculei sunt, plurimum quini. Hæc Thusci vocatur, Sanguinel-  
la, vel Capraria. Alterum Aix oo simile, quo ad paronychia vnguium,  
& cum in eis caro excreuit, vtuntur: Ideo Dactylon appellantes, quia  
digitus medeatur. Tertium genus Dactyli, sed tenuius, nascitur in parie-  
tinis & tegulis. Huic caustica vis inest. Sistit vlcera quæ serpunt. Ra-  
dix Graminis tenera mandendo est. Hæc modicè frigida & sicca, parum  
mordet, tenuibus partibus constat, qua calculos potu comminuit.

## Sideritis. C A P.

## X. X V I I.

## NOMENCLATURA.

Græ. σιδήρις. Lat. Sideritis. Ita.  
Siderite.

**S**ideritim alicui Heracleam uocant: folia habet Marrubij,  
sed longiora, satis ad frondem Quercus aut Saluæ acce-  
dentia, minora tamen, & aspera. Caules ædit quadratos, pal-  
mum sæpe excedentes, non iniucundi gustus, aliquantumq;  
substringentis, in quibus per interstitia orbiculatæ uertebrae, uti  
in Mar





Sideritis.

in Marrubio, spectantur, & semen in eis nigrum. Nasctur in petrosis. Illius folia, suapte ui, sine inflammationis periculo iungunt. Altera Sideritis binum cubitorum, ramulis exilibus: folio Filicis, numero, utrinque per oras diuiso: pediculo longo: prodeuntibus è summo alarum sinu surculis, longis, tenuibus: capitulo in cacumine orbiculato, aspero, in quo semen continetur, quam Betæ rotundius aliquanto, ac durius. Huius uis, foliorumq, ad uulnera præcipua est. Siderit in

aliam esse tradunt, quam Crateuas Heracleam uocat, in maceris & uineis nascentem, folijs ab una radice multis, Coriandro similibus, circa cauliculos dodrantes, teneros, laues, subcandidos atque subrubicundos: flore puniceo, paruo, gustanti amaro, & lento. Huius ea uis est, ut quamuis recenti uulneri imposita, sanguinem supprimat.

**S**ideritis genera tria, Matthiolus vir in inuestigandis plantis miræ solertia, & ingenij penè diuini, primam & tertiam Sideritis speciem in ualle Anania, qua ad Tridentum vergit, non semel uidit & collegit: secundam haud dum reperire in Italia potuit. Quod verò ad foliorum delineationem attinet, quam nunc Marrubij, nunc Quercus, nunc Saluie similitudine Dioscorides repræsentat, ita intelligendum: Quæ longa sunt, ad Saluie, qua superne hirsuta & candida, ad Marrubij: quæque per ambitum incisa, ad Quercus foliorum similitudinem accedere.



dere. Eo explicato, non difficile erit, tria hac genera secretim agnita seligere, eamque non in primum ducendam genus, quæ spicatos flores in ipso caulium cacumine, & non in ipso caule, vt Marrubium producit. Auicenna autoritas, qui per herbam Iudaicam, Eruum intelligit, falsis eorum errorem coarguit, qui hanc Sideritim esse contendunt. Quod si per Herbam Iudaicam, quam & Paganam vocant, ea planta intelligatur, cui vulgus, Virga aurea nomen imposuit, est Virga aurea caule rubenti, binum cubitorum alto, & non infrequenter sublimiore, pellucido & leui, cui folia Oliuæ incumbunt, orbiculatim denticulis minutissimis incisa, & in superiori parte lauia: flores profert in summo caule spicatos (dissimiles tamē Camomilla) aurei coloris, qui vt ematurnerint, in pappos & ventos abeunt. At hæc, primum Sideritis genus esse non potest. Sideritis facultatis est abstersoria, maiori tamen ex parte humida, & modicè frigida est, ac aliquantum astringit.

## Achillea. C A P.

### XXVIII.

#### NOMENCLATURA.

Græ. Ἀχιλλεῖος. Lat. Ita. Achillea. Off.  
Millefolium minus. Gal. la grande  
Millefeuille.

**A**chillea, quibusdam Achillea Sideritis, dodrantes aut maiores gerit scapos, fusorum effigie, quasi minutis folijs circumdatos, crebris in latere foliorum sectionibus, Coriandri similitudine, subfuluo colore, odore multo, non insuauis, medicato & glutinoso: umbella in cacumine rotunda, floribus candidis, purpureis, & aurum emulantibus. Prouenit lato solo. Trieta coma, sanguinolenta glutinat, & ab inflammationum periculo tue





Achillea.

culo tuetur. Erumbentem sanguinem inhibet, & cruenta uulua profluvia, in uel-  
lere. Decocto, quoque insi-  
dent fœmina, fluxione uul-  
uæ laborantes. Ad dysen-  
teriam bibitur.

**A**chillea in plantarū in-  
cognitarum classē rele-  
gabitur. Nam si notas, quas  
hoc in capite Achilleæ attri-  
buit Dioscorides, cum eis quas  
Stratiote Millefolio (quod nō-  
strum est vulgare Millefolium)  
idē author huiusce libri cap. 88.  
assignat, uel oscitanter contu-  
leris, nimirum eandem plantā  
non esse cognosces. Errori an-  
sam præbuit Plinius, qui 25. Li-

bri, cap. 5. latinis Millefoliū vocari scribit. Sed ut videtur, Achilleam eo  
loci non descripsit, at Dioscoridis Myriophyllum. Quod apparet, quanam  
vera esset Achillea dubitasse Plinium, & ideo solidum ex eo argumen-  
tum auferri non posse. Serapio Achilleæ succum, qui rubens ab ea expri-  
mitur ( & constat e vulgari Millefolio similem non educi ) Sanguinem  
draconis appellat, in cuius locum in seplasijs omnibus adulteratus habe-  
tur, cū resina, hyrci sanguine, Sorbis siccis, & sexcentis alijs mixturis.  
Cordo Achilleia Millefolio cognata planta Germanis, Feldtgarbe. dici-  
tur. hæc sit necne, Officinarum Millefolium maius, planè affirmare  
non audeo.

## Rubus. CAP.

## XXIX.

## NOMENCLATURA.

I 3

Gra.



Græ. Βάτος. Lat. Off. Rubus. It. Ro uo.  
Gal. Ronce.



Rubus.

Caules cum folijs tunduntur, exprimiturq; succus, mox sole co-  
gitur, singulari remedio contra omnia quæ modo dicta sunt.  
Mori in Rubo nascentis quàm optime maturi succus, ad oris  
medicamenta conuenit. Si situr alius præmaturi cibo, necnon  
flore in uino poto.

**R**ubus, notitiæ uulga-  
ris. Vim habet siccan-  
di & adstringendi: capillum  
tingit. Ramorum decoctum  
potu aluum sistit, & fæmi-  
narum profluvia: presteris  
morsui accommodatissimum:  
gingiuas firmat. Oris uitijs  
folia commanducata meden-  
tur: cohibent ulcera quæ ser-  
punt, ulceribus in capite ma-  
nantibus, oculisq; prociden-  
tibus remedio sunt: condylo-  
matis & hæmorrhoidibus  
folia illinuntur: cardiacis,  
& stomachi doloribus, tri-  
ta conuenienter imponuntur.

Rubus Idæus. C A P.

X X X.

NOMENCLATURA.

Gr. Βάτος ἰδᾶϊξ. Lat. Rubus. Idæus. It.

Ampomole. Gal. Framboise.

Idæus



**I**daeus Rubus appellatus est, quoniam passima Id in proueniat. Est autem longè tenerior priore, ac minoribus spinis horrens, quanquam & sine spinis inueniatur: insuper eadem præstat quæ supradictus. Ceterum flos cum melle oculorum collectionibus commodissime illinitur. Ignem sacrum extinguit, stomachicisq; ex aqua bibendus datur.

**R**ubus tres maxime sunt species. Quidam fructueta sepes & arborescens. Alius humilis, cubitum ut plurimum altus, spinis horrente caule, non raro singulari est fructu a Solstitio maturo. Tertius per arua & humi ramulis seu viticulis aculeatis repit, ideoque Graecis Chamabatos, & Theodoro Gaza, è Theophrasto, Humirubus interpretatur. Nascuntur in omnibus Tridento adiacentibus montibus, Rubi qui mora sine nucleis producant, quos rustici Ampomole vocant, Fragis similia, gustu, per æstatem admodum grato. Hos puto nostras esse frambofcias. Idæus Rubus patriam designat quidam frambofciam vulgarem existimant, quæ liberè in dumetis & syluis sub umbra crescens, Gallico nomine inde mutuato, siquidem Idæus erit hic Rubus, illò ab Idæo puero in coloniam deductus est. Rubi omnes vim habent astringendi. Folia tenera & recens nata, & gemmule, aqueum quiddam cum astrictione possident. Temperamento sunt hinc è frigida & terrea essentia composito: inde ex essentia aquea tepida. Fructus cum maturuit, calidè temperatus, nempe dulcis: hocque liquore, & astrictione modica gratus est gustui. Immaturus terrestre quippiam continet, nempe acerbus & desiccatorius. Flos eiusdem est virtutis. Radix astringit, & tenuium est partium.

## Helxine. C A P.

### XXXI.

#### NOMENCLATURA.

Gr. ελξίν. Lat. Helxine. It. El sine.

off. Volubilis.

**H**elxine cognomento Cissampelos, folijs est Hederæ, minoribus, ramulis exilibus, quibus amplectitur, quodcunque cōtigerit adminiculum. Nascitur in sepibus, uinctis, & segetibus:

I 4 tibns:



*Helxine minus.*

nem reddere debuerat, hancque Theodorus, Carduum pineam interpre-  
tatur. Helxine digerendi vim habet.

tibus: foliorum succus potus  
deicit aluum.

**H**elxine Cyssampelos, siue  
Vitis Hederacea, Convol-  
uuli aut volubilis est species, sed  
que, satis non statui potest, nisi  
ea sit, quæ æstate candidas cam-  
panulas producit. Hunc florem  
Sernius in virgilium, Ligustri  
perperam esse putauit. Est &  
& alia Helxine, quæ Parieta-  
ria, Muralium, & Perditium  
dicitur, in parietibus, muris, &  
sub stalicidijs nascens. Alsines, hu-  
ius cõsini quæ in syluis nascitur  
caput, nõ probè in secundum li-  
brum à quibusdam transpositũ  
ducitur. Plinius in 21. libri, cap.  
16. Carduum quendam descri-  
bens, malè huic Helxines nomẽ  
indidit, quẽ è Theophrasto, Ixã

## Elatine. C A P.

## XXXII.

## NOMENCLATURA.

Gr. Ελατίνη. Lat. Elatine. Ital. Elatine.

Gal. Lierre terrestre. Off. Hedera

**E**latine folia habet Helxina minora, rotundiora, pilosa: do-  
drantalibus ramulis, quinis senisue, à radice foliosis, gustu  
adstringentibus. Nascitur in segetibus & cultis. Oculorum flu-  
xionibus & inflammationibus auxiliatur, folijs cum polenta  
tritiss



\*  
Elatine.

tritris & impositis. Eadem  
cocta sorbitionis usu dysen-  
teriam sistit.

**R** Vellius dum Elatinem cā  
pestre Rapistrum, rusticis  
nominari scribit, non id tamen  
cum Rapo sylvestri confundit, sed  
eo rura ut Rapo sylvestri in ver-  
nis acetarijs uti. Elatine modi-  
cè desiccat & infrigidat.

Eupatorium.

CAP. XXX/

III.

## NOMENCLATURA.

Gr. Ευπείλοιοι, Lat. Eupatorium. Ital.

Eupatorio. Gal. Aigremoine. Off.

Agrimonia. Ger. Agrimonien

Odermenig. Lebertkletten.

**E**upatorium fruticosa herba est, unicum efferens caulem, li-  
gnosum, nigricantem, rectum, tenuem, hirsutum, cubitale  
interdum ampliorem, folijs per intervalla Quinquesolij aut Cā-  
nabis magis similibus quinquepartito amplius diuisis, nigrican-  
tibus, per ambitum serratis: semen medio caule crumpit, pilo-  
sum, deorsum spectans, quod siccatum uestibus inhaeret. Contra  
huius folia, & cum suillo adipe imposita, ulceribus quæ agrè ci-  
catricē trahūt, medetur. Herba aut semen in uino potū dysente-

I s ria



*Eupatorium.*

vermes) infantibus bibendam offerunt. Mensura, cyathus dimidius cum mirando effectu. Nascitur in campestribus. Hic submonendi Arabum se Etarj, ut in compositionibus Mesue, pro Eupatorio, herba Giulia utantur: in Auincenna suo itidem Eupatorio: in Gracorum, Agrimonia. Eupatorium tenui est partium, & extrinseca vi excalearia, incidit, et emundat.

ria, iocinoris uitijs, & serpē-  
tium ictibus liberat. Nec  
desunt qui aberrantes, Ar-  
gomonem hanc appellarint,  
cum tamē longē alia sit, uti  
exposuimus.

**N**unc tandem verum Eu-  
patorium in Agrimonia,  
priorisque saculi aberrans bar-  
baries cepit agnosci. Plāta qua  
olim pro Eupatorio utebantur,  
ipssimum est Auincenna Eu-  
patorium. Mesue Eupatorium,  
ab Agrimonia, & Auincenna  
Eupatoria diuersum. Enimve-  
ro ea est planta, quam herba  
Giulia, vocant. Hanc Itale mu-  
lieres per noctem in vino albo  
infusam, mane (ad occidendos

## Quinquefolium. C A P.

### XXXIII.

#### NOMENCLATURA.


Gr. πενταφύλλου. Lat. Quinquefolium. Ita.

Quinquefoglio. Gal. Quintefueille.

Off. latino nomine.

Quin





### Quinquefolium.

scabritias, gargarizatu leuigat. Contra alui profluvia, & dysenterias auxiliatur. Item articulorum coxendicumq; cruciatibus potum. Cocta in aceto, & illita, serpentia ulcera cohibet: strumas, tumores, duritias, abscessus & collectiones discutit, ignes sacros, reduuias, condylomata, psorasq; sanat. Tenuis radicis succus, contra iocinoris pulmonumq; uitia prodest. Item aduersum uenena. Cum hydromelite autem uel diluto uino, & Piperis exiguo, bibuntur folia, contra febrium circuitus, in quartana quidem, quaternum ramuloru: in tertiana uero, ternum: in quotidiana, unius. Ea quoque folia, tricenis pota diebus, comitialibus profunt. Folioru succus, tribus cyathis aliquot dies potus, celerime regio morbo medetur. Illita cum Melle & sale, tam uulneribus, quam fistulis remedio sunt, enterocelicis auxilium praeſtant.

Quin

**Q**uinquefolium ramulos fert surculaceos, tenues, dodrantaes, in quibus semen: folia Menthae, quina singulis pediculis, raro plura, in ambitu serrata: florem ex luteo pallescentem, auri emulum. Nas citur in riguis, & aquarijs ductibus: subrubram habet radicem, oblongam, Vetro nigro crassiore. Plurimis pollet remedijs. Ius radicis decoctae ad tertias, si in ore contineatur, dentium dolores sedat. Putrida oris ulcer, collutione sistit. Arteriae



*Quinquefolium sanguinis profluvia, & potu, et illitu sistit. Ad expiationes, castimonias, & incantamenta inciditur.*

**V** Nam nec amplius, Dioscorides *Quinquefolij* speciem facit, cum tamen quattuor eius species, à se in Italia perspectas, depingat Matthiolus. Harum maxima, ipsum est Dioscoridis *Quinquefolium*. Secunda, primæ nihil absimilis, præterquã quod folijs & flore candicat. Tertia, paruula, & vt plurimum per terram repit. Quarta, folijs est viteis, quinquefariam incisis, hancque Itali sua lingua, *Diapensia* & *Sanniculo* nominant. Profert hoc *Quinquefoliū* tum in caulū cacumine, tum in ramusculis gemmulas, & fructus, qui è viridi candescunt, fragis naturæ consimiles. Primum radice constare subrubra (quod aliquibus nō placet) ipsa experientia à se circum Goritiæ fossam collecta, multifida, & *Helleboro* maioris, Matthiolus docuit. Et peraquè verum *Quinquefolium*, *Tormentillam* non esse. Nam *Tormentilla*, rarissimè minus, quàm septenis ex vno pediculo folijs: *Quinquefolium* infrequenter quina excedere reperitur. *Quinquefolium* radice, licet crassiori, refert *Helleborum*: *Tormentilla* breuissima est, crassiuscula, & nodosa. Nasçitur *Tormentilla* locis sterilibus, & editissimis montibus: *Quinquefolium* in planis, & iuxta aquæductus. Germani Chirurgici, quarta speciei *Quinquefoliū*, in plagas intrinsecas, fistulas, & vbicunque consolidato est opus, potu ministrant. Verum id *Quinquefolium*, non illa est *Sannicula*, quæ mirando naturæ artificio, connexis est in nodum radicibus, & longè ab illa differt. *Quinquefolij* radix valenter desiccat, nempe tertio ordine, sine morſu tamen, tenuium est partium, calida ad sensum vsque.

## Phoenix. CAP. XXXV.

### NOMENCLATURA.

*Græ. φοῖνιξ. Lat. Phoenix. Ita. Loglio saluatico.*  
*Gal. Yuraye sauuage.*

**P**hœnix folia habet *Hordei*, sed breuiora, & angustiora, spicam *Lolio* similem: calamos digitorum senū, radici aduolutos



nolutos: septenas octonasue spicas. In aruis tectisq<sup>3</sup> recenter illitis nascitur, harum uirium compos, ut in uino austero pota, alui profluuium, & emanantem uulua sanguinem sistat, urinæ impetus infrenet. Sunt qui adalligatam in puniceo uellere & suspensam, sanguinem suppressere prodant.

**P**Hœnix quæ herbarijs, Auena sterilis, dicitur, cognitu non perinde difficilis, Plinio, Murum Hordeum vocatur.

## Idæa radix. CAP. XXXVI.

### NOMENCLATURA.

Græ. Ἰδαία ρίζα. Lat. Idea radix. Ita. Radice Idea.

**I**Dæa radici folia sunt ea quæ Rusco: adherent his ueluti exigui pampini, in quibus flos. Radix spissandi naturam habet, his conueniens quibus adstrictione opus est. Pota, citam aluum, mensesq<sup>3</sup>, & omnem abundantiam sanguinis sistit.

**I**Dæa radix incognitarum plantarum ceteram subibit. Plinius Idæā herbam nominat: ei folia sunt Oxymyrsinæ. Adherent ijs ueluti pampini, in quibus flos.

## Rhodia radix. CAP. XXXVII.

### NOMENCLATURA.

Græ. ῥοδιά ρίζα. Lat. Rhodia radix. Ita.

Radice Rhodia.

**G**ignitur Rhodia radix in Macedonia, Costo similis, leuior, inæquabilis, quæ contrita, rosas redolet. Vtilissima capitis doloribus, si madesacta fronti & temporibus cum Rosacei momento imponatur.

**R**Hodia radix, quantum è sobolis enascentia, quæ Goritiæ in hortu suo. prosilyt, è misso Petri Saliceti medici, deprehendit Matthiolus, his notis quæ, ut Dioscorides, ita ceteri silentio prateriere, noscitari potest. Radix Rhodia, caules producit rotundos, quadantenus cœcanos, palmum



*Rhodia radix.*

terra intantum per ambitum exigua, vt vix affigenda satis sit. Cerebrum roborat odoris gratia, tenuium est partium: in digerendo & ex-calfaciendo secundi ordinis est desinentis, aut tertij ineuntis. Ruellius ligni meminit, quod è nouo (quam vocant) orbe asportatum, tritum vel in orbem derasum, rosarum suauolentiam exprimit, queis cum decer-tat, & incunditate vincit. Hoc precarij orbiculi fiunt.

palmum aut cubitum altos, è queis folia prodeunt longiuscu-la, acuminata, crassa vt Portu-laca, minutimq; per ambitum incisa: enascitur in caulium cacu-mine umbella viridis, vt Tithy-mali, sed hæc à flore rubescit. Ra-dix est inequalis, grossa vt Co-sti, leuis, & qua recens, splendi-da est foris, intus candida, sicca vero, leuis, intus rubes, & squa-mosa foris. Cōmanducata aut trita, Rosas odoris suauitate prouocat, vnde ei Rhodia no-men. Hæc omnium radicum vi-uacissima. Nam è terra educta, si in locum non admodum siccū reponatur, à multis mensibus denuò plantata, regerminat. In editissimis montibus nascitur, saxosis, & præruptis: præcipuè in Alpibus circa Saltzburgū,

## Equisetum. CAP. XXXVIII.

### NOMENCLATURA.

Græ. ἵππουρις. Lat. Equisetum. Ita. Coda di  
canalo. Gal. Queue de cheual.  
Off. Cauda equina.

Equis



**E**quisetum in riguis & scrobibus nascitur. Cauliculi prodeunt inanes, geniculati, in se sarcti, rubescentes, scabri, & iuncea circa eos folia, crebra, exilia. In sublime Equisetum attolitur, uicinos arborum caudices scādens, obuolutumq; dependet, comis multis, nigris, ut equorum cauda. Radix lignosa, dura. Vis herbe spissare: quare sanguinem naribus erumpentem succus ipse sistit. Prodest dysentericis in uino potus. Urinam cit. Sanguinolenta uulnera glutinantur, tritis folijs, & illitis. Radix cū sua herba tuſim, orthopnæam, ruptaq; adiuuat. Folijs in aqua potis, dissectiones uesticæ & intestinorum, enterocelæq; in unum coalescere, cogiq; feruntur. Alterum Equisetum caulis est rectus cubitalis, aut maior, inanis, comis per interualla breuioribus, candidioribus, & mollioribus. Id cum aceto tritum, uulneribus remedio est, eademq; fungitur facultate.

**E**quiseti genera duo à Dioscoride descripta, non incognita sunt. Nā primò quod Itali Asprella nomināt, eius regionis mulieres, stagno splendorem & nitorem conciliant, hacq; materiarij fabri ligneam petinum, & aliorum minorum operum scabritiem eruderant & expoliunt. Ex altero quod cauda equina propriè dicitur, penè statim ut emergit, germen enascitur grossum & tenerum, à Senensibus maritimis palustri nuncupatum. Hoc quadragesima in cibos utuntur, primum elixo, post farina inducto, ac demum patella infriſto. Equisetum vim habet cum amaritudine astringentiam: hacq; de causa valenter, & sine morſu deficcet.

## Coccum infectorium CAP.

### XXXIX.

#### NOMENCLATURA.

Græ. κόκκος βαφικῆ. Lat. Coccus Baphica.

Ita. La grana. Gal. Vermillon.

Off. Grana tinctorum.

**C**occum quo infectores utuntur, frutex est surculosus, paruus, cui grana ceu Lentesc adherent, quæ electa conge



congeruntur. Optimum gignitur in Galatia & Armenia, deinde Asia & Cilicia, ultimum ex omnibus Hispanicum. Vis huic spissandi, uulneribus neruisq; præcis, conuenienter ex aceto tritum illinitur. Nascitur quoque in Cilicia, è Quercubus, cochlearum exilium similitudine, quod illius regionis mulieres ore legunt, & Coccum uocitant.

**Q**uamuis Coccum tinctorium, res sit non incognita, ipse tamen frutex, qui id producit, non satis perspectus. Nam quod habent seplasia, rotundum profert granum, & intrinsecus vacuum. Videri poterit genus illud, quod plinio in Asia & Attica nascens, celerrimè in vermiculum se mutans, quod ideò Scolecion vocabant, improbabantque, li maci parua simile. Rustici in Narbonensi prouincia, ubi frequens est, Vermilonum vocant. Falluntur qui Chermes Arabum, grana esse putant, quæ Pimpinella vulgaris radicibus affixa nascuntur. Siquidem Serapio per Chermes, grana quæ Græci Coccum vocant, intelligit, ut qui totum huius caput ex hoc Dioscoridis exscripserit. Et sanè nostri temporis Cremesinum, ex eo etiam sit grano, quod in pimpinella radice prouenit, verum id non concludit, Chermes Coccum esse tinctorium. Id facultatis est astrictoria, & amara, neutriusq; mordicantis.

## Tragium. CAP. XL.

### NOMENCLATURA.

Græ. Τράγιον. Lat. Tragium. Ita. Tragio.

Gal. Off. ignotum.

**T**ragium nascitur in Creta tantum insula, Lentisco semine, folio & ramis simile, singulis tamen minoribus: succus ei lacteus, gummi non dissimilis. Semen, folia, lachrymaq; illitu spicula è corpore eiciunt, omnia quoque corpori impacta euocant, pota stranguriæ medentur, calculos uesicæ frangunt, menses trahunt. Modus in sumptione est, drachma una. Fama est syluestres capras sagittis confossas, eius herba pabulo spicula excutere. Est & alterum Tragium, quod Tragoceros aliqui uocant, folia Scolopendry habet, & radicem sylvestris Raphani, tenuem



tenuem, candidam, quam crudam uel coctam esse dysentericis prodest, folia autumnio hirci uirus olent: exinde sibi Tragij, nomen adoptauit. Prouenit in montibus & præcipitijs.

**C**vm Tragium, quod hic primo loco à Dioscoride pingitur, in sola Creta nascatur, nullaque planta, à secundi generis Tragio, Scolopendrij folia proferat, ambe non iniuria inter incognitas plantas referentur.

## Tragum. CAP. XLI.

### NOMENCLATURA.

Gr. Τράγος. La. Tragos. Of. Vermicularis. It. trago.

**E**st etiam herba Tragos, quam aliqui Scorpion aut Traganon uocant, maxime in maritimis nascens, palmū alta, aut amplior, fruticosa, humilis, oblonga, sine folijs, pusillis circa ramos acinis, rufis multis, magnitudine tritici, acuto cacumine, gustu multum adstringente. Racemorum acini decem ex uino potu, celiacis, & fœminis fluxione uulue laborantibus auxiliantur. Tunduntur à plerisque, & in pastillos digesti asseruantur, quibus utitur cum opus est.

**T**Ragos Plinio, quibusdam Scorpion dicitur, semipede alta, fruticosa, sine folijs, pusillis racemis, rubentibus, grano tritici, acuto cacumine, & ita in maritimis nascens. Hæc indidem ab herbarijs eruitur iunco marino similis, & ob id ab eis non aliter quàm Iuncus marinus appellatur. Cordo Italis, Pagnola dicitur, quod oblongi eius acini, quos pro folijs habet, Pineis nucleis similes sint. Huius vocabuli non meminit Matthiolus, attamen sub Argentæi montis radices, in maritimis Senensibus, nasci scribit iuncum pusillum, consentientibus cum plinio & Dioscoride omnibus notis.

## Iuncus. CAP. XLII.

### NOMENCLATURA.

Græ. Σχίον.

Lat. Iuncus. Ital. Giunco.

Gal. Ionc.

k

Iunci



**I**unci duo genera. Vnū lauis nominati, alterū acuti, qui in mucronē fastigiatur. Cuius etiā duo assignantur genera, unū sterile, reliquum fert semen nigrum, rotundū, & crassiore constat calamo, carnosioreq̃. Tertius est Iuncus qui uocatur Oloschænos, prioribus carnosior, asperiorq̃, is simile supradicto fructum in cacumine parit. Semen utriusque tostum, ex diluto uino potum, sistit aluum, & rubra fœminarū profluvia, urinam cit, capitisq̃ dolores facit. Quæ proxima sunt radici folia tenera, conuenienter illinuntur aduersus Phalangiorum morsus. Aethiopici Iunci semine somnus allicitur: sed modus in potione seruandus est, ne sopor fiat.

**T**riplex est iuncus. Est Iuncus molli acumine, in aquosis nascens, hunc Græci, Schinou Lian, vocant. Alius in maritimis nascitur, fastigiato, & infligēdo vulneri aptato mucrone. Oxyshænos, dicitur. Tertius grandior, in lacubus & stagnis prouenit. Græci: Oloschænon: Latini, Mariscum nominant. Iunci temperamento constant, partim ex essentia terrena, modicè frigida, & partim ex aquea, leuiter calida. Oxyshæni secundæ speciei semen somnum prouocat, minori tamen efficacia quàm Oligoschæni, nam id etiam mentem alienat.

## Lichen. CAP. XLIII.

### NOMENCLATURA.

Græ. Λειχην. Lat. Lichen. Ita. Pulmonaria.

Gal. Hepatique. Off. Hepatica.

**L**ichen qui saxis est familiaris, aliquibus Bryon appellatur: asperginosis petris adheret, ut muscus. Is illitus sanguinis profluvia sistit, inflammationes arcet, impetigini medetur. Iuuat regio morbo correptos, cum Melle illitus: oris & linguæ defluxiones inhibet.

**L**ichen inde nomine accepto, quod Lichenas & impetiginē sanet, Asperginosis hæret saxis, ut muscus, folio singulari, semper petris familiariter incumbente. Matthiolo cauliculos è saxis profert, unde pusilla quæpiam acetabula exeunt, & præcipue mense Iunio: huic non admodum dissimilis quam Pulmonariam, & à similitudine quam habet

bet





Lichen.



Pulmonaria.

bet cū humano pulmone, & è remedijs quæ huius vlceribus, & sanguineis reiectionibus affert, nominauere. hæc admodū sicca et astringentia est.

### Paronychia. CAP. XLIIII.

#### NOMENCLATURA.

Græ. παρωνύχια. Lat. Paronychia. Ita. Paronichia.

**P**aronychia exiguus frutex, in petris nascens, Peplo similis, minor longitudine, maioribus folijs. Illita paronychijs atque duritijs, remedio est.

**P**aronychiā vidit Matthiolus, in ingenti illa sylua. quæ è Lubiana Goritiā itur, saxi imminente, & siccis arborū truncis, Paronychia virtus. tenuium est partium desiccatque sine morfu.

### Chrysocome. CAP. XLV.

#### NOMENCLATURA.

Græ. χρυσόκη. Lat. Chrysocome. Ita. Chrisocome.

k 2

Chry



**C**hrysocome palmi altitudine fruticat, coma specie corymborum, Hyssopo simili: radice hirsuta, Veratri nigri modo, tenui, Cyperum æquante: gustu non iniucundo, ex austero dulci. In petrosis opacisq; nascitur. Radix excalscit, & adstringit, his conueniens, quos iecur aut pulmonis inflammatio male habet. Contra purgationes uulvæ, decocta cum hydromelite assumitur.

**C**hrysocome in Natura hortum releganda, ne si nos opum suarum dominos effecerit, nihil sibi peculiare possideat. Cordus tamē Saracenicam Menthā, quam Græci recentiores, Costum herbam vocant, ut Chrysocome cognatam expromit, ob aureos, qui summis caulibus insident, corymbos, & accedentes ad veratrum nigrum radices, & odoratam cum planta radicem. Ruellio ad eam accedit Pulegium, quod herbarij montanum vocant. Sed è neutra, vera nobis Chrysocome patet.

### Chrysogonum. CAP. XLVI.

#### NOMENCLATURA.

Græ. χρυσόγονον. Lat. Chrysogonū. Ita. Chrisogono.  
Offic. Caryophyllata,

**C**hrysogonum dense fruticat, quernis folijs: flore coronarij Verbasci: radix ut Rapū extuberat, intus ruberrima, foris nigra. Quæ trita cum aceto, atque imposita, muris aranei morsibus auxiliatur.

**H**æc etiam planta, in secretissimo Natura horto, nostro sæculo delitescit, non secus ac alia complurima.

### Elichrysum. CAP. XLVII.

#### NOMENCLATURA.

Græ. ἐλίχρυσον. Lat. Elichryson. Ita. Elichriso,  
Gal. Stichados citrin. Off. Stichas citrina.

**E**lichryson quidam Chrysanthemon, nonnulli & id Amaranthon uocant, quo deorum simulachra coronant. ramulum habet candidū, uirentem, rectum, firmum: folia intercedentibus spacijs angusta, abrotano similia: comā aurea lucis, in orbem,





Elichrysum. 1



Elichrysum. 2

hem, umbella rotunda ueluti siccis corymbis dependentibus. radice tenui. Nascitur in asperis, & torrentium alueis. Contra serpentium iclus, coxendicum dolores, urinæ stillicidia, ruptaq; comma è uino pota opitulatur. Ciet menses. Sanguinè concretu uentris ac uesicæ absumit, pota cū mulso, ieiunis, trium obolorū pondere, sistit destillationes, dato in uino albo diluto: uestibus in seritur, ut eas ab erodentium iniurijs tueatur.

**H** Elichryson Matthiolo in Thuscia nascitur, notis omnibus quas ei assignat Dioscorides, nihil euariantibus. Flos in longū tempus asseruatur, & ideo uere cū flores deficiūt, flore Helichrysi sicco utimur, ut Amaranthi, quem Fioreuelluto, Itali vocant, Porro Helichryson, Stechas est citrinum officinarum, & Paulo Amaranthus vocatur. Ruellia rusticis Gallis, Chamesum maius vocatur.

**Chrysanthemum. CAP. XLVIII.**

NOMENCLATURA.

k 3

Gra.



Græ. Χρυσάνθεμον. Lat. Chrysanthemum.  
Ital. Chrisanthemo.



\* Chrysanthemum.

Valerius Cordus Chrysanthemon cū Buphthalmom confundit. Sed Matthiolo ambas eandē esse plantā nō placet, hic rationibus. Dioscorides diuersis capitibus de Buphthalmo & Chrysanthemom nō fuerat tractaturus, nisi diuersas censuisset esse plantas. Siquidem Buphthalmom, folia fert similia Feniculo, quæ capillacea sunt: Chrysanthemon, multifida. Chrysanthemi caules, oleris vice mandūtur, quod de Buphthalmo tacuit. Buphthalmom flores habet Anthemidis, nō ideo tamen Chrysanthemom similes. Chrysanthemon herba est tenera & fruticosa, & id in Buphthalmi descriptione præterit. Quātū verò ad virtutes & effectus attinet, flores dicit Buphthalmi, tumores & abscessus discutere (in genus & certū loquēs) cū cera tumores & abscessus discutere: de Chrysanthemom verò, cū cerato tritos, steatomata discutere, particulatim & dubiè perscribēs. Id causa fuit vt veteres quidā Græci, quī Buphthalmom & Chrysanthemon vnā & eandē plantā existimaret, quicquid de Buphthalmo tertio libro scripsit Dioscorides in hoc caput transp



transportarint. Quod factū eodē est pacto, in Ruta sylvestri, & Hyperico: nec secus, in Asaro, & Bacchare. Ea de re id caput obelo distinxit, Matthioli censurā sequēs, Chrysanthemon copiosum idē vidit, in Montis nigri territorio, quod Illustrissimæ Senensiū est ditionis, in totū simile picturæ huius emēdati capitis. hac ab indigenis editur, vt Beta, Spinacia, Brassica, cum Bupthalthemon in Italia non viderit. Atenim ex eo patet errare eos, qui Chrysanthemon eam Ranunculi speciem faciāt, quæ in pratis nascens, folia profert Apij, & luteos flores.

## Ageratum. CAP. XLIX.

### NOMENCLATURA.

Græ. Αγρίστον. Lat. Ageraton. Ita. Agerato.

**A**geraton fruticosa herba est, palmari longitudine assurgens, simplex, humilis, Origano maxime similis: umbellam gerit, in qua flos bullis aureis emicat, Elichryso minor. Nomen ei inditū est, quoniā diutissime flos in sua coloris specie conseruetur. Vis decocti feruens. Huius uis & nidor urinam cit, & uulvæ duritias emollit.

**A**geratum per totam Thusciam nascitur, caule & floribus Origani, umbella tamen minutis & aureis floribus referta. Inflammationes leniter concoquit & digerit.

## Verbenaca. CAP. L.

### NOMENCLATURA.

Græ. Περισσέωυ ὑπὸ σῖτον.

Lat. Verbenaca recta. Ita. Verminacola.

**P**eristereon, siue Verbenaca, nascitur in aquosis. Nomē ex eo duxisse uidetur, quod colubæ circa hanc perquam libenter uersari soleant: dodrantis altitudine, & interdum amplius adolescit: folia è caule prodeunt incisa & subalbida: ea singulari ramo, radiceq; sola consistere sæpius inuenitur. Folia cū suillo adipe recēti, aut Rosaceo imposita, uuluarū dolores finire putatur. Ignē sacrū illita ex aceto reprimat putrida ulcera cohibet, uulnera glutinat, ueteraq; ex Melle, ad cicatricem perducit.

k 4

Sacr







bus, & foliosa: nec aliud soliorū aut florū est, discrimen quāuis quibusdam Verbenaca recta, florem croceū producat, quod nec Dioscorides dicit nec Plinius. Quin & hic in cōmuni vtriq; pictura, glauci floris meninit.

## Astragalus. CAP. LII.

### NOMENCLATURA.

Græ. Ασράγαλός. Lat. Astragalus. Ita. Astragalo.  
Gal. Cices sauuages.

**A**stragalus, paruus à terra frutex, folijs & ramis Ciceri similis: flore purpureo, paruo: radice rotunda, Raphani modo, grādi, quæ adnatas appendices firmas habet, nigras, præduras, ueluti cornua inter se implicatas gustu adstringetes. Nasctur in uentosis, opacis, & in niualibus, eo Memphis Arcadiæ scatet. Aluum sistit radix in uino pota, urinam mouet, uetustis ulceribus, sicca efficaciter inspargitur, sanguinē supprimit, egrè, propter duritiā, tunditur.

**A**stragalus in vallis Ananiæ montibus nascitur, & in comitatu Goritiano, quo loci radicibus vtuntur ad prouocandā vrinā. Astragali radices astringunt, & valenter desiccant, Gallis è Ruellio, Rusticum est Cicer: quibusdam, syluestris Cerra.

## Hyacinthus. CAP. LIII.

### NOMENCLATURA.

Græ. Ὑάκινθος. Lat. Hyacinthus.  
Ital. Cipolle canine.

Gal. Vacier. Off. ignotus.

**H**YACINTHUS folia habet Bulbi: dodrantalē, minimo digito tenuiorē, herbacei coloris: comā procumbentē, florum purpureorū plenā, incuruā: radicē bulbaceā quæ, ut creditur, pueris cū uino albo illita, pubertatē coerces, & non patitur erūpere: sistit aluum pota & urinā impellit. phalangiorūque moribus auxiliatur. Semen adstringentiū est, theriacis expectum, Regium morbum emendat, cum uino potum.

k s

Hya





Hyacinthus. 1



Hyacinthus. 2

**H**Yacinthus flore & radice bulbacea, in campestribus, inter segetes, & in memoribus nascitur, & ea causa fuit Gallis nemoralē aut agrestem cepam nuncupādi. Floret cum violis sub finem Martij, & Aprilis initium. Longiusculē perdurant flores, antequam emarcescant. Thuscis, Cipolle canine, aut., saluatiche dicuntur. Hic tamen Hyacinthus, non ille est poetarum, qui ē sanguine Aiacis editus, literis etiamnum huius nomen refert. Namq; (vt eorum habent fabule) rubentē est flore, Lilio adsimili. Hyacinthi radix primo desiccantium est ordine, & infrigidantium secundo desinente, aut inchoante tertio. Fructus leuiter abstergit & astringit, desiccātq; tertio ordine inter caliditatem & frigiditatem fere medius.

Papa





Hyacinthus. 3



Hyacinthus. 4

## Papauer erraticum.

## CAP. LIIII.

## NOMENCLATURA.

Græ. Μηλον ή ροιδας. Lat. Papauer erraticum.

Ita. Papauero saluatico.

Gal. Coquelourdes. Off. Papauer rubrum.

**P**apauer erraticum, quod Rhæada uocant, uere quidem in aruis cum hordeo nascitur, flore protinus deciduo, unde & nomē apud Græcos accepit. Folia Erucæ, aut Origano, aut Cichorio, aut Thymo similia spectantur, sed longiora, diuisa, scabra: iuncens ei caulis, rectus, cubitalis, asper: flos sylvestris Anemones, puniceus, interdum albus: oblongum  
cap





*Papauer erraticum.*

caput, sed quam *Anemones* minus: semen rufum: radix longa, subalbida, minoris digiti crassitudine, gustu amara. Huius capita quinq<sup>3</sup> aut sex, in uini cyathis tribus ad dimidias decocta, potui dabis quibus somnus exercendus est. Semina acetabuli mensura ex aqua mulsa pota, aluum leniter emolliunt. Ad idem præstandum mellitis placentulis, & dulciarijs libis admiscuntur. Folia cum calycibus illita, inflammationes sanant. Eorundem sotu & perfusione, somnus allicitur.

## *Papauer satium.* CAP. LV.

### NOMENCLATURA.

Græ. *Μήκωρ ήμερ* &.

Lat. *Papauer satium.*

Ital. *Papauere domestico.*

Gal. *Pauot.* Off. *Papauer.*

**E** satiui *Papaueris* genere, quod hortense est, semen in panem densatur, qui sanis in usu sit. Eo etiam ex Melle pro *Sesama* utuntur, *Thylacitin* uocant: capitulum habet longum, & semen candidum. Sylvestre uero, caput infidēs demissumq<sup>3</sup>, &





Papauer sativum.

& nigrum semen, quod Pi-  
thitis nominatur, nonnullis  
tamen & ipsum, Rhœas di-  
citur, quoniam eius scapo  
lacteus succus emanat. Ter-  
tium magis sylvestre, & ad  
medicinas ualentius, multo  
his longius, productiore ca-  
pitulo. Omnium in com-  
mune natura refrigeratrix.  
Quare si capita ipsa & fo-  
lia decoquantur in aqua,  
somnum foku conciliabunt.  
Bibitur decoctum contra ui-  
gilias. Calyces cum polenta  
triti, & cataplasmatibus ad-  
misti, ignibus sacris, & in-  
flammationibus prosunt. Tun-  
duntur quoque uirides, &

digeruntur in pastillos, qui siccati ad usum reconduntur. Capita  
quoque per se in aqua coquuntur ad dimidias, iterumq<sup>3</sup> adiecto  
Melle, dum humor coeat in eclegmatis lentorem. Id medica-  
mentum in tussi, arteriæ fluxionibus, & cæliacorum affectu,  
doloris leuamentum præbet: efficacius tamen redditur, addi-  
to Hypocistidis succo & Acacia. Papaueris nigri semen tri-  
tum cum uino bibitur contra citam aluum, & fœminarum  
profluuiâ. In peruiigijs fronti temporibusq<sup>3</sup> illinitur, ex aqua.  
Opium eius magis refrigerat, inspissat, siccâtq<sup>3</sup>. Sumptû Erui  
magnitudine, dolorem finit, concoquit, & somnum allicit,  
tussi atque cæliacorum ualetudini auxiliatur. Verum si copio-  
sius hauriatur, nocet, cum lethargicos efficiens interimat. Ad  
dolo



dolores capitis cum Rosaceo perfusum efficax est. Aurium do-  
lori, cum Amygdalino, Myrrha, & Croco instillatur. In-  
flammationibus oculorum cum torrefacto oui luteo proficit:  
igni sacro & uulneribus cum aceto: podagris, cum lacte mu-  
lieris & Croco. Somnum accersit, subditum sedi pro balano.  
Optimum habetur graue, & densum, gustu amarum, odoratu  
soporiferum, quod facile aqua diluitur, laue, candidum, neque  
asperum, neque grumosum, quod inter colandum non ut cera  
coeat, & in sole diffundatur: dein admotum lucernis, non atra  
luceat flamma: extinctum denique odoris uim conseruet. Sed  
Opion Glaucio, gummi, aut syluestris Lactucæ succo, adulterant.  
Verum Glaucio fucatum, in dilutione Croci colorem reddit:  
Lactucaceo succo fictum, exiliter spirat, & asperius spectatur:  
gummi uitiatum, splendet, & infirmum est. Nec desunt qui  
eò dementia deuenierint, ut adipem ei admiscerent. Fictili nouo  
torretur ad oculorum medicamenta, dum mollius atque rufius  
appareat. Diagoras, ut Erasistratus autor est, usum eius damna-  
uit, oculorum lippitudinibus & aurium uitij infundi uetans.  
quoniam uisus aciem hebetaret, & soporem gigneret. Addi-  
dit Andreas, illitos eo protinus excacari, si non adulteraretur.  
Mnesidemus usum duntaxat olfactandi probauit, quoniam ad  
conciliandum somnum conueniret, alioqui nobis ut noxio in-  
terdicit. Quæ commentitia esse, experimento deprehenduntur:  
siquidem effectus, uirium huiusce medicamenti fidem faciunt:  
quare non alienum fuerit scriptis mandare, quonam modo is  
excipiatur succus. Aliqui capita ipsa folia tundunt, & prælo  
exprimunt, terentesq; in mortario, digerunt in pastillos. Id Me-  
conium uocatur, multum Opio ignauius. Porro Opij faciundi  
ratio hæc est: Cum ros in eo exaruerit, cultro decussatim in  
stellas, penitus adigatur, ex obliquo in rectum summam cu-  
tem.



tem incidere oportet, lachrymam exeuntem digito in concha  
 aspergere, nec, multò post redire, ut concreta inueniatur. Ete-  
 nim quæ tum, aut postero die etiam offenditur, in uetere pila te-  
 ri debet, & in pastillos cogi. Cum tamen inciditur, retroceden-  
 dum est, ne uestibus succus deradatur.

**N**on ignotum est Papauer erraticum, in campis & segetibus inna-  
 scens. huius flores sici in puluerem redacti, pectoris dolores sedant  
 quos Pontia, Itali vocant. Probè succedens experientia, medicos Syrupi  
 ex eo conficiendi rationem docuit, ex horum nempe nunc succo, nunc in-  
 fusione, quod bellissimè agris cessit. Tridentina rustica herba Papau-  
 eris erratici in cibum abutuntur. Quod vsitatum fuit Theophrasti tem-  
 pore. Enimvero hoc in capite deprauatus est locus, qui de foliorum pi-  
 ctura agit. Nam Rhæadis folia, perperam Origani & Thymi conferun-  
 tur. Habet enim Rhæas, Eruce siue Chicorij modo incisa, à quibus lon-  
 gissimè absunt Thymi & Origani folia. Error eorum, qui id Papauer  
 Papauer cornutum, & Glaucion existimant, satis, non respondentibus  
 notis, apertus est. Papauer satium, in hortēse & sylvestre, cuius duas fa-  
 cit species, à Dioscoride diuiduntur. Tres tamen hæ species, domesticæ  
 sunt. Siquidem & olim Plinij tempore serendo erant, & nunc album,  
 quod ipsum est Papauer satium ingenti copia in Tuscia nascitur: duæq;  
 nigri species, quas ille sylvestres vocat, in Lombardia & Tridentinis  
 montibus, spaciosus aruis, fabis insertæ seminatur. Ex eorum semine pul-  
 metaria ab incolis fiunt, quæ Pauere, nominant. Hæc cū ad saturita-  
 tem ederint, nihilum somnolentiores euadunt. Quod Matthiolo, ut  
 lacte, quod eis incisis manat, cum aqua hordei in ardentissimis feбри-  
 bus queis permolestæ vigiliæ, rteretur, pauore defunctus, qui ei à medi-  
 cis ingerebatur. Id lac, liquor est Papaueris, & Opium vocatur: succus  
 vero, Meconium. Opium quamtunvis quarto ordine frigidum statua-  
 tur, si tamen è sapore temperamentum, & effectus agnoscuntur, Opi-  
 um ( quantum deprehendere potuit Matthiolus ) gustu amarū est, &  
 ore retentum, linguam exulcerat. Quod manifestè ostendit, non  
 mediocrem illi caliditatem inesse, & id ipsum coarguit, qui ex eo pro-  
 dit acris & grauissimus odor. Hac tamen in re quisque & suam alie-  
 nam, tum eruditionem, tum iudicium consulat. Siquidem ea facultas  
 magna



magna ex parte adulteratur cū Gaulcio, Opium, poterit accidere, quod è dilutione nascitur, nam tum in aqua croceum refert. Papauera omnia refrigerandi naturam habent.

## Corniculatum papauer.

### C A P. L V I.

#### N O M E N C L A T V R A.

Gr. Μήκον κεράσις.

Lat. Papauer corniculatum.

Ital. Papauere cornuto.

Off. Papauer cornutum.

Ger. Geel Nagsamen Geel olmagen oder Moen.



**P**apauer Ceratites, id est, corniculatum, folia habet cādida, hirsuta, uerba sco similia, in ambitu syluestris Papaueris more serrata caule non dissimili, flore pallido: calyculo Fœnigraci, in corniculorum modum inflexo, unde nomen mutuatur: semine Papaueris, pusillo, nigroq; radice per summa cespitum nigra, crassa. Nascitur in maritimis & asperis. Radici ea uis in est, ut in aqua decocta ad dimidias, coxendicum & iocinoris affectus potu sanet. Prodest his qui crassa quædam, aspera, aut arenosa cum lotio reddunt. Alium leniter purgat semen, acetabulo in aqua mulsâ poto. Crustas emargi

Corniculatum papauer. potu sanet. Prodest his qui crassa quædam, aspera, aut arenosa cum lotio reddunt. Alium leniter purgat semen, acetabulo in aqua mulsâ poto. Crustas emargi



emarginant, illita ex oleo folia: floresq<sup>3</sup>. Argema ac nubeculas iumentorum perunctas abstergunt. Sunt qui Glancium, hoc Papaueris genere facituri existimarunt, falsi quadam foliorum cognatione.

## Spumeum papauer. C A P. L V I I.

### NOMENCLATURA.

Græ. μήκωρ ῥοιός. Lat. Papauer spumeum.

Ita. Papauero spumeo.

**A**liud papaueris genus Aphrodes, id est, spumeum uocatur, ab alijs Heracleum, caule dodrantali: folijs admodum paruis, Radicula similibus: fructu inter ea candido. Nam herbula alba est, & spumea tota: radice in summo cespite. Legitur æstate semen, cum integrè adoleuit, deceditq<sup>3</sup>, exiccatum. Datum acetabuli mensura in aqua mulsa, uomitione expurgat: priuatim huiusmodi purgatio comitialibus prodest.

**P**apauer Cornutum magna copia in maritino Senarum tractu nascitur, nempe in territorio Grosseti, Orbetelli, & Herculis portu, & præcipuè in pluribus montis Argentæi locis, & sub Triestinam urbem, quæ non admodum à littore maris distat, vere magna abundantia saxi implantata cernitur. Seruntur in alijs Italiæ locis ad publicum spectaculum, ut in raris & non admodum vulgaribus simplicibus facituri consuevit. Papauer Cornutum, virtutis est incisoria & abstersoria. Papauer spumeum nostro æuo incompertum, incognitarum plantarum centuriæ adscribetur. Plinius dum in Papauere spumeo Theophrastum reddit, è libri noni cap. 13. perperam Papaueris folia, speciem passerum representare describit, ac de suo addidit, quo ampliorem fidem faceret: Si procul intuearis. Nam Papauer id, Struthij herba folijs comparandum: liniisque per æstatem splendorem non addit, quod Struthij, seu Lanariæ proprium est. Error hinc fluxit, quod pro Struthio, quod Radiculam sonat, Struthon, qui passer est, intellexerit.

## Hypecoum. C A P.

### L V I I I.

L

Nomencla



## NOMENCLATURA.

Gr. *υπ'ηκοον*. Lat. *Hypecoon*. Ita. *Hipecoo*.

**H**ypecoon, alicui Hypopheon uocant. Nasctur in segetibus aruisq, folijs Ruta, exilibus ramis. Natura eadem quæ Papaueris succo.

**H**ypecoon Matthiolo ostensum, sub Ruta syluestris centuriam (nam non uni plantæ id nominis herbarij indidere) palmum alta panta, folijs ferè Ruta, caule tenero & laui, croceis & pusillis floribus. Infrigidantium ordinis est tertij, pauxillum à Papauere distans.

## Apollinaris, siue Hyoscyamus.

## CAP LIX.

## NOMENCLATURA.

Græ. *υοσκυαμος*. Lat. *Hyoscyamos*. It.

*Iusquiame*. Gal. *Hanebane*. Off.

*Iusquiamum*.

**H**ioscyamus, frutex est caules emittens crassos, folia lata, oblonga, diuisa, nigra, hirsuta: flores è latere caulis ordine prodeunt, tanquam Punicorum cytini, scutulis septi seminũ plenis, ut Papaueris. Tres eius differentie: una semine nigro, floribus penè purpureis, smilacis folijs, cytini præduris & spinosis: alterius semen subflauũ, ut Irionis, flores lutei, folia & siliquæ simpliciores. Ambo insaniam gignunt & soporem, ideo in communi usu damnantur. Tertium genus, ut quod mitissimũ esset, medici recepere, pingue, lanuginosum, molle, candidi floris seminisq, in maritimis rudibusq, nascens. Cuius occasio si non adsit, rufum usurpari oportet. Niger, ut deterrimus, improbat. Recenti semine, caulibus folijsq, tuis, succus in sole exprimitur, & exiccato humore, usus ad annum usque prorogatur: nã facile corruptionem sentit. Extrahitur etiam ex sicco semine se-

paratim





Hyoscyamus.

mationes placant. Semen eadem præbet. Tussi, destillationibus, oculorum fluxioni, & doloribus, efficax. Contra mensium abundantiam, & erumpentem aliunde sanguinem, oboli pondere cum Papaueris semine, & aqua mulsa, bibitur. Podagris subuenit. Testibus inflatis, mammisq; tumentibus à partu, tritum ex uino illinitur: alijs quoque cataplasmatibus, quæ doloris leuamentum præstant, admisceri solet. Folia omnibus medicamentis dolorem sedantibus, per sese, & ex polenta, utilissimè imponuntur. Recentia ad mitigandos omne genus dolores oblinuntur Cum uino terna, quaternæue pota, sanant algidas febres quas Epialos uocant, Cocta olerum modo folia, si acetabuli mensura manduntur, mediocrem insaniam gignunt. Idem efficere tradunt, si, colo-

L 2

ulcus

paratim in aqua calida tuso, & expresso. Liguamentū autē, succo lacteo præstātius est, & magis dolores finit. Contusa herba recens, addita trimestri farina, digeritur in pastillos, & reconditur. Liguamentum primum, & quod à sicco semine exemptum est, collyrijs quæ doloris sensum auferunt, commodissime inseri solent. Contra acutas calidasq; fluxiones, dolores aurium, atque uulue mala, prosunt: cum farina autem aut polenta, oculorum, pedum, cæterarūq; partium inflam-



ulcus sentiente, infundantur. Radice in aceto decocta, dentes in dolore colluuntur.

**R**vellius sic Hoscynamum distinguit, ut qui in Dioscoride primi est generis, Iusquiamum nigrum vocetur herbarijs. Qui secundi, est generis, Iusquiamum flavum. Qui tertij, album. Is Cordo in rudibus, fossis, & circa oppida pagosque nascitur. Matthiolus in Italia, id solum genus repperit, quod secundo loco, à Dioscoride, sub flavo semine, & floribus luteis describitur, duo quæ restant, quantumvis solleter indagavit, qui ostenderet, neminem inuenit. Id in eo homine mirum, qui eruditus & diligens, nil veritus herbariorum impudentem & indoctam imperitiam, qui tria hæc genera sine delectu, ignavis & credulis ostentant.

## Psyllium. CAP. LX.

### NOMENCLATURA.

Gr.  $\Psiύλλιον$ . Lat. Psyllium. Ita. Psilio.

Gal. Herbe a pulces.

Off. Pulicaris.

**P**syllion folijs Coronopo non dissimilibus, hirsutis, longioribus: sarmentosa sæni modo, in totum heburia: ramis dodrantalibus: coma à medio caule exoritur, duobus tribusue convolutis in cacumine capitulis: in his semine duro, nigro, pulicum simili: unde & nomen. In aruis & incultis nascitur. Vis ei ad refrigerandum, inspissandum, & molliendum conveniens. Articulorum morbis, parotidibus, tuberculis, tumoribus, uulsis, illitum auxiliatur. Imponitur in dolore capitis, cum Rosaceo, aqua, aut aceto. Enterocelis infantium, &

promi





Psyllium.

prominenti umbilico, illitū  
ex aceto medetur. Teritur  
acetabuli mensura, & in a-  
qua sextario madefactum,  
ubi concreuit aqua, illinitur:  
siquidem uehementer refri-  
gerat, & in feruentem a-  
quam deiectum calorem re-  
primit. Contra ignes sacros  
efficax est. Fama est, si uirēs  
domum importetur, non si-  
nere in ea pulices gigni. Cum  
adipetum, sordida ulcera,  
& quæ cacoëtheuocantur,  
expurgat. Succus uermicu-  
losus auribus, aut fluxione la-  
borantibus, ex melle prodest.

**P**syllium seu Pulicaris, ubique prouenit, & nota est planta, nomi-  
ne à Latinis indito, è semine, cuius color & quantitas pulci si-  
milia sint. Psyllium, ea lege sumptum, quam ei tribuit Mesue, proculdu-  
bio venenum erit, nimirum quarto ordine calidum & siccum. Galeno,  
summè proficuum est semen, secundi infrigidantium gradus, in hume-  
tando & desiccando temperatum.

## Hortense Solanum. C A P.

## LXI.


## NOMENCLATURA.

Græ. στρύχνος κήπαιος. Lat. Hortense solanum. Ita.

Ita. Solatro Hortolano. Gal. Morelle. Off. Solatrum.

**H**ortense Solanum, frutex cibus idoneus, exilis, pusillus,  
multis concauis alis: folio nigro, maiore quàm Ocimi,  
& latiore: fructu rotundo, uiridi, qui post maturitatem nigri-





*Solanum Vesicaria.*

cat, aut fuluescit. Herba innocentis gustus. Natura ei refrigerandi. Quare folia ulceribus quæ serpūt, & ignibus sacris, conuenienter cum polline polenta illinuntur. Aegilopia, capitisq; dolores, trita & imposita per se sanant, æstuanti stomacho auxiliantur, parotidas, cum sale detrita, illitu discutiunt. Valet succus eius aduersus ignem sacrum atque ulcera quæ serpunt: cum cerussa, rosaceo & argenti spuma, ad aegilopas: cum pane, infantium adustioni, quam syria-  
 sin uocant cum Rosaceo perfusus proficit. In collirijs, aqua uel o u uicem exhibet, contra acutas fluxiones illitus. Aurium dolori instillatus prodest. Mensum abundantiam sistit, in uellere subditus. Succus fuluo gallinarum corticalium fimo subactus, & linteo appositus, aegilopis præsentaneo est remedio. Est & aliud Solanum, quod peculiari nomine Halicacabon, id est, Vesicariam, aut Physalida uocant, folijs antedicto latioribus: cuius caules, posteaquam adoleuerunt, prona terram spectant, folliculis orbiculatis, fuluo intus acino, uesiculis simili, rotundo, leui, quo coronarij utuntur, corollis intorquentes. Vim usumq; hortensis Solani habet, uerum cibus nequaquam expetitur. Regium morbum purgat, semine poto, & urinam pellit. Ex utraque herba succus extrahitur, qui siccatus in umbra, reconditur, ad eadem ualens.

*Solanum*



## Solanum somniferum. C A P.

## LXII.

## NOMENCLATURA.

Gr. στρυχνου ὑπνοτικου. La. & Off. Salanum somni-  
ferum. Ita. Solatro sonnifero.

**S**olanum somnifarum, aliqui etiam Halicacabon appellant, fruticat multis ramis, densis, caudicosis, fractu contumacibus, pinguium foliorum, Cotoneæq; mali similium plenis: flore grandi, rubro: fructu in folliculis crocato: radice lingua, subrubro cortice uestita. Nascitur in saxis, non procul à mari. Radicis cortex, in uino drachmæ pondere potus, somnificam uim habet, Opio mitiorem. Semen uehementer urinam cit. Corymbi duodecim hydropicis dantur: si quid numero adijciatur, alienationem mentis faciunt. Remedio est aqua copiosa mulsæ, potui data. Succus pastillis inseritur, & medicamentis quæ doloris leuamentum præbent. Decoctu in uino, si in ore contineatur, dentium doloribus auxiliatur: radicis succus cum Melle illitus, oculorum hebetudines tollit.

## Manicum Solanum. C A P.

## LXIII.

## NOMENCLATURA.

Græ. στρυχνου μανικου. Lat. Solanum furiosum.  
Ita. Solato furioso.

**S**olanum manicon, aliqui Persion, alij Thryon appellauere. Huic folium Erucæ simile, manus aliquanto, satis Acætho, quæ Paderota uocât, accedens. Caules à radice proceros emittit

L 4 decem



decem aut duodecim, ulnæ altitudine adolēcentes: caput in cacu-  
mine oliuæ figura, sed ut Platani pilula, hirsutius, uerum maius  
latiusq; florem nigrum. Postquàm eo exiit, racemus exit ro-  
tundus, niger, denis aut duodenis acinis constans, similibus He-  
deræ corymbis, ut uua mollibus. Radice firmatur cādida, crassa,  
caua, cubitali. Gignitur in montibus, uento perflatis, & Plata-  
netis. Radix drachmæ unius pondere pota ex uino, facit species  
uanas, imaginesq; non iniucundas obseruari: sed duplicatus hic  
modus: ad treis usque dies mentis alienationem affert: quadru-  
plicatus, interimit. Remedio est aqua mulsa copiosius pota, &  
uomitione reiecta.

**E**X his quatuor Solani generibus, duo prima tantum nempe hor-  
tense, & quod Halicacabon, seu Physalida vocant, nota sunt. Son-  
nificū & furiosū incognita, nec magnopere præstiterit illa cognosse, detri-  
metū magis, quā utilitatis allatura. Herba Bella Dōna ob foliorum simi-  
litudinem, Solatri genus, antiquis incogniti. Est aliud itidem genus,  
in territorio Tridentino repperit Matthiolus, fruticosum, longum, fra-  
ctu contumax, candidum, flexile, quod Periclymeni in morem proximis  
se quibuslibet inuoluit, folijs est Solatri, minoribus tamen, contractio-  
ribus, leuioribus, & plus in mucronē desinentibus: flos est purpureus, ex  
his racemi generatur, longiusculi, rubentes, acetoso gustu, ciceris magni-  
tudine: horum succus valenter infrigidat & desiccāt, (quod expertus  
est Matthiolus) maligna vlcera, & plagarum inflammationes. Aliud  
est Halicacabi genus, quod hortorum cameras, & adium aprica conue-  
nit, folijs longis & incisis, flore candido, vesicis Halicacabi, in quibus se-  
men candidum & rotundum includitur, quod vna ex parte cordis effi-  
giem exprimit, coloris nigri. Hæc in cordis affectus valentem esse herbā  
cōmonstrat, ut Echion, in viperas, ob semen viperinis capitibus simile.  
Vulgata itidē hortis Stomonā, Solanum refert, fructu viridi, rotundo,  
circa medium aliquantum cōcauo & spinoso, folijs Solatri, odore Opj,  
floribus cymbalorum forma, suau odore liliū referentibus.

## Dorycnium. CAP. LXIIII.

### NOMENCLATURA.

Gr. Δορύκνιον. Lat. Dorycnium. Ital. Dorycnio.

Doryc



**D**orycnion Creteus Halicacabon, aut Caleā uocat. Frut-  
tex Oleæ prodeunti similis. Nascitur in petris, nō procul  
à mari, ramis cubito minoribus, folijs Oleæ similibus colore, mi-  
nusculis, firmioribus, præter modum scabris, flore candido: sili-  
quis in cacumine, ceu Ciceris, densis, rotundis, quinis intus aut  
senis seminibus, exigui Erui magnitudine, lauibus, firmis, uersicoloribus. Radix ad digiti crassitudinem & cubiti longitudinē  
adolefcit, id somniferum esse constat. Copiosius haustum mortē  
adfert. ~~Nascitur in petris, nō procul à mari, ramis cubito minoribus, folijs Oleæ similibus colore, minusculis, firmioribus, præter modum scabris, flore candido: siliquis in cacumine, ceu Ciceris, densis, rotundis, quinis intus aut senis seminibus, exigui Erui magnitudine, lauibus, firmis, uersicoloribus. Radix ad digiti crassitudinem & cubiti longitudinē adolefcit, id somniferum esse constat. Copiosius haustum mortē adfert.~~

**D**orycnion Cordo, illa est halicacabi species, quē superius, in semine  
cordis effigiem repræsentare diximus. Id tamen non nouit Mat-  
thiolus, non præteriturus, si ita putasset.

## Mandragoras. CAP. LXV.

### NOMENCLATURA.



Mandragoras.

Gr. Μαγδ' αργός. La.  
Mādragoras. Off. Ital. Man-  
dragora. Gal. Mande-  
gloyre.

**M**andragorā aliqui  
Antimalū: alij Cir-  
cā uocāt, quoniā uideatur  
radix ad amatoria cōduce-  
re: Duo eius genera: niger,  
quæ femina existimat Thri-  
dacias appellatus, angustiori-  
bus folijs, ac minoribus quā  
Lactucæ, graueolentibus, in  
terra sparsis. Mala gerit Sor-  
bis similia, pallida, odorata,  
in quibus semen ueluti Pyro-  
rum. Radicibus inhaeret be-

L S ne ma



ne magnis, binis, ternisue, inter se conuolutis, nigris foris, intus albis, crasso cortice uestitis: uerum is Mandragoras caule uiduus est. Alter candidus, qui mas dicitur, nonnullis Morion uocatus. Huius folia magna, alba, lata, leuia ut Betæ: mala quam alterius duplo maiora, colore in Crocum inclinante, incūde cum grauitate quadam olentia. Horum pomorum cibo, aliquantum opiliones soporantur. Radix, alterius similis, maior & candidior, orbata caule. Succus fit e cortice recentis radiceis tuso, & prælis subiecto: qui insolatus ubi concreuerit, fictili reconditur. Malis quoque succus depromitur, sed aliquanto ignauior. Delibratur radix, & traiectus lino cortex, ad usum suspenditur. Aliqui radices in uino ad tertias coquunt, & defecatum uis seruant: cyathosq; uno utuntur in perurgilijs, & doloribus, & ante sectiones uestionesq; ne sentiantur. Succus duobus obolis ex mulso potus, ut Veratrum, per uomitiones bilem atram pituitaq; extrahit, uerum potu largiore, uita adimitur. Medicamentis ocularibus, & his quæ dolores finiunt, pessis quoque emollientibus, admiscetur. Semioboli pondere inditus, per se menses & partus expellit. Subditus sedi pro balano, somnificus est. Radix Ebur emollire fertur, quæ senis horis cum eo decocta sit: & ad accipiendam, quam effingere optaueris, formam, ipsum facile præstat. Folia recentia conuenienter oculorum inflammationibus, & collectionibus quas ulcera citarunt, cum polenta illinuntur. Duritias omneis, suppuraciones, strumas & tubercula discutiunt, Stigmata sine exulceratione delent, si quinis senisue diebus sensim perfricentur. Folia seruantur in murijs eosdem ad usus. Trita radix ignibus sacris ex aceto, & serpentium ictibus ex Melle aut oleo, medetur: strumas atque tubercula, cum aqua dissipat: articulorum cruciatus, cum polenta sedat. Fit citra coctionem uinum e cortice radiceis, ad hunc modum: Ternæ minæ in uini dulcis metretam conyiciuntur. Dantur ex eo terni cyathi, ijs qui se-

cari



ari aut amburi debent, ut antè dictum est: siquidem nullo tunc efficiuntur dolore, sed ueterno quodam pressu, torpescunt. Mala oporè afferunt olfactu, & etiam si mandantur itè expressus ex his succus: nimio tamè odore percussi, obmutescunt. Semen Malorum potum, uulnas purgat: appositumq; cum sulphure, ignem nò experto, rubra sceminarum profluvia sistit. Scarificata punctisq; nullifaria aperta radice, erumpens lachryma cauo uase recipi-  
tur. Liquamentum aut succo lacteo præstantius est: sed non ubique, ut experientia docet, radices lacteu succum delachrymant. Alium tradunt esse Mandragoram, nomine Morion, in opacis iuxta specus enatū, folijs albi Mandragoræ, minoribus, albis, drantalibus, radice ambientibus: quæ mollis est & candida, paulo maior palmo, pollicemq; crassitudine æquat. Trandunt eam in pane, ossa obsonioque, drachmæ pondere deuorata, usum rationis intercipere. Obdormiscit enim homo, eo ferè quo comederit habitu, sensus impos, ternis quaternisue, ex quo data est, horis. Hac medici utuntur, cum scindendi, urendiq; necessitas adest. Antidotum esse uolunt radicem, cum manico Solano potam.

**M**andragoræ prima & secunda, sponte multis in locis Italicorū montiū nascuntur, & maximè in Apulia & monte Gargano, quod S. Angeli vocat, & inde herbarij cortices & poma in alias Italiae regiones exportat. Visitur & in hortis Neapolitanis, Romanis, Venetis, & nunc etiam in Gallis. Mandragoræ tertia species in umbrosis nascens, Morion vocant, nostrum seculum non agnoscit. Tertio ordine infrigidat Mandragora, caliditatis tamen & humiditatis particeps. Radicis cortex valentissima, non infrigidat tantum, sed etiam desiccatur.

## Aconitum. CAP. LXVI.

Græ. Ακόνιτον. Lat. Aconitum. Off. Vua versa.

**A**conitum, aliqui Pardalianches, alij Cammoron, alij Thelyphonon, alij Myoelonon, alij Theriophonon uocat. Folia habet Cyclamini, aut Cucumeris, tria aut quatuor, minora & subhirsuta. Caulē palmo altū, radix Scorpij caudā emulatur,





\* *Aconitum.*

stinis exilit, à priore distans, quoniam folia faciat effigie Platanis, crebriore diuisura, longiora, & multò nigriora: caulem Filicis, leuem stylum, cubitali altitudine, aut ampliorem: semen in siliquis oblongis recondit. Radices in modum Squillæ marinæ cirrhorum nigrescunt, quibus ad uenationem luporum utuntur. Insertæ siquidem crudis carnibus, & deuoratae, lupos enecant.

**A**conitum Pardalianches, quòd Leopardos & Pantheras perimat, vidit & collegit Matthiolus, in prominentibus Tridento locis, hocq; utuntur qui Romæ & Neapoli consciendis lupis singularem operam nauāt, & in S. Angeli ponte non infrequenter radices vanales offerunt, quòd hæ radices lupos confestim perimant. Non tamen hæ radices Lupariæ sunt, quæ tertia Aconiti est species, nempe Pontici, quæ & Tridentum

tur, & Alabastri modo splendet. Torpescunt, ut fama est, scorpiones admota radice, stupentq;: qui rursum Hellebori contactu excitantur. Oculorum medicamentis leuādi doloris gratia adijcitur. Enecat pantheras, sues, lupos & feras omnes in carnibus obiectum. Est et alterum Aconitum, quod aliqui Cynoëtonon, alij Lycopëtonon appellant. Huius genera sunt tria: Vnum quo utuntur uenatores, alia duo in usum suum uertere medici. E quibus tertium, quod Ponticum nominatur, plurimum in Italia, montibus Iu-



lentinis, herba della Volpe, quod vulpes, qui hanc carnibus intrita gustarint, perimat. Hæc folia habet pluribus quam Platanus incisuris liuisa, caulem Filicis, luteum florem, Ranunculi figura, radices nigras. At quæ prostant radices, è candido flauescunt. Verum enim uerò tertia Aconiti species, non ea est planta, quam vulgò, herba Paris, vocitant, quod ex huius herbae notis liquet, maximè cum hæc radice constet cæpilari, è candido flauescens, nullaq; caudæ scorpionis forma, aut Alabastris splendor in ea visatur. Nam id in Aconito requirit Dioscorides. Ad hæc Aconiti folia, è Theophrasto, Cucumeri, & Pani porcino similia, non in medio caule euascentur, quod in herba Paris accidit, sed hirsuta statim à radice prodeunt. Semen tritico ad simile, nec spicis inclusum, plurimum ab herba Paris distat. Auicennæ itidem Napellus, Aconitum non est. Siquidem is author secundo libro de duobus Aconitis tractat, & horum vnum, strangulatorem Adip, alterum strangulatorem nominant Leopardi, eodem illi significato, quo Græcis, Lycostonos & Pardaliæches, & postea proprium caput Napello attribuit, ab illis diuersum. Et quod ad Napelli confectionem attinet, id adeò correctum esse potuit, vt extra detrimentum fuerit. Vel Napelli nomine murem intelligit, qui è radice Napelli vescitur, in altis Anania montibus non semel à Matthiolo perspectum, quiq; verum est antidotum non Napelli tantum, sed totius etiã veneni.

## Cicuta. CAP. LXVII.

### NOMENCLATURA.

Græ. Κώνειος. Lat. Off. & Ita. Cicuta.

Gal. Cigue.

**C**icuta caulem ædit geniculatum, ut Fœniculi, grandem, in cacumine ramosum: folia Ferula, angustiora, graui odore: rami, mox umbella in summo prodeunt: flores quoque albicantes, & semen Aniso candidius: radice non alta, concaua. Cicuta letale uenenum est, suaq; ui refrigeratoria necat. Remedio est uini meraculi potus. Succus exprimitur contusis cacuminibus, priusquam semina & comæ siccescant: qui sole densatur in pastillos. Multus ad medendi rationem usus est aridi. Commode miscetur collyrijs, quæ leuandi doloris gratia temperantur. Ignis sacros,





Cicuta.

mortifero edentium esu. Calidioribus & regionibus & locis nocentior, ut de Parthia, Asia, & Europa quibusdam tractibus, Candia, Athenis, & Megaris prodidit Plinius. Hæc asinis manducata, torporis intantum conciliat in Thyscia, ut mortuis similes, a se pellē detrabi, non sentiant, ac non raro excitentur, iam medij pelle erugati: frigidissima Cicuta temperatura, id genus alienationis mentis inducit, quod Conion Greci vocant, vel ipsis radicibus ab inscientibus, Pastinacæ loco, in cibum assumptis.

sacros, & ulcera quæ serpunt, illitu restinguit. Herba cum coma trita, & testibus circumlita, libidinum imaginationes in somno compescit: sed genitale resoluit. Lac puerperarum mammis apposita extinguit: in uirginitate mammas coercet, & increfcere non patitur. Pueris præstat, ut eorum testiculū cibū nō sentiētes, intabescāt. Efficacissima uis Cretica, et Magarensi, mox Attica, et in Chio et Cilicia nascenti.

Cicuta non ignota planta, tetro se prodit odore adulta, pubescens Apium mentitur,

Taxus. CAP.

LXVIII.

NOMENCLATURA.

Græ. σμίλαξ. Lat. Taxus. Ita. Nasso.

Gal. Yf.

smilax



**S**milax à Græcis, Taxus à Latinis appellatur, arbor Abietis magnitudine, & foliorum eiusdem figura, in Italia & Narbonensi Gallia Hispaniæ contermina nascens. Auiculæ quæ talicæ Taxi baccas deuorant, denigrantur: & qui ederint easdem homines, alui profluvio corripiuntur. Narbone tam præsens est ueneni, ut si qui dormiant sub ea, aut in eius umbra subsileant, ledantur, & sexnumero moriatur. Quare de Taxo hæc raduntur, ut ab ea caueamus.

**T**axus mortifera arbor, multum differt à Smilace aspera, & leui, de quibus superius diximus, hancq; ideo in venenatas plantas Dioscorides abegauit, quo quæ eiusdem naturæ, suo more, etiã vnâ permisceret. Ex hac arbore materia fit in quotidianos vsus elegantissima. Frondium fumus mures enecat.

## Apocynon.

## CAP.

## LXIX.

## NOMENCLATURA.

Græ. Ἀποκύνου. Lat. Apocynon.

Ita. Apocino.

**A**pocynon, siue Cynocrambe, Brassica canina, frutex est viticulis constans, male olentibus, lentis, utiliumq; modo obsequiosis, fractu serè inuictis: folio Hederæ, molliore tamē, & per extremum acutiore, lento, graui odore: id luteo succo turget. Siliqua, ceu Fabarum, folliculari specie, digiti longitudine protenduntur: semine intus albo, duro, paruo. Folia cum adipe in panes coacta, canes, lupos, uulpes, & pantheras enecant, in cibo data, & protinus eorum coxendices resoluunt.

**A**pocynon, Cynocrambe, aut Brassica canina, venenata, & iuxta incognita planta, Galeno, non canes tantum, sed etiam lupos, & homines tollit. Grauißimum odorem spirat, & ob id admodum calida, attamen non per æquē sicca, quò fit vt summè maturet.

Nerium,



## Nerium, seu Rhododendrum.

## CAP. LXX.

## NOMENCLATURA.

Græ. Νήριον. Lat. Nerium. Ita. Oleandro.

Gal. Rosagine. Off. Oleander.



Nerion.

nerion aliqui Rhododaphnen, alij Rhododendron uocant, frutex est uulgaris notitiæ, longioribus, quàm Amygdala folijs, crassioribusq; flore in Rosam conformato: fructu nuci Græcæ simili, corniculato, qui patefactus quandam lanosam naturam ostendit, spinarum pappos representantem: radice longa, acuta, lignosa, gustanti salsa. Nasctur in amœnis, maritimis, et secus amnes. Flores & folia mulis, canibus, asinis, & quadrupedum plurimis uenena sunt: hominibus uerò contra serpentium morsus præsidia, è uino pota: eo magis Ruta addita. Imbecillæ etiam animantes, ut pecus & capræ, si aquam bibant in qua folia ea maduerint, moriuntur.

Nerion, Matthiolo in Laci Benaci ripis, inter Myrteta & Laureta nascitur, & in monte Argæteo circa maritimam Senensium orâ. Planta visu admodum grata, tum maxime, suis onusta rosis. Nerion Galeno,



Galeno, extra illita, vim habet digerendi, per os sumpta, venenū est, nō homini tantum, sed etiam brutis. Id quod Dioscoridi & Plinio non con-  
cinit, nisi dicamus Nerion, serpentium morsibus medicari, haud secus  
ac Cantharides, canis rabiosi morsibus prosunt, Euphorbium scorpionis  
iclibus, quin & pleraque venena, diuersi generis venenis medicandis  
inseruiunt, ut in sexto libro patebit.

## Fungi. CAP. LXXI.

## NOMENCLATURA.

Gra. μύκητες. Lat. & Off. Fungus. It.

Fongho. Gal. Champignon.

**F**ungorum differentia duplex: aut enim manduntur, aut  
perniciales sunt. Multis de causis uenenosi gignuntur, ubi  
videlicet clauis ferreus, in quo sit rubigo, aut panni marcor ad-  
fuerit: aut si iuxta serpentis cauernam, arborēsue, quæ priuatim  
pariunt noxios fructus, erumpant. Continēt qui tales sunt, ne-  
scio quod strigmentum, ocncretamq; pituitam, terraq; eruti, quā  
celerrime computrescunt, atque marcore uitiantur. Sed qui uc-  
neno imbuti non sunt, suauem in iuribus gratiam habent: lar-  
gius tamen sumpti nocent, & acrius concocti strangulant, aut  
choleram morbum citant. Remedio est Nitri potus, aut lixiuiū  
cum acidamuria, aut feruescētē Saturia, aut Origani iusculum.  
debellantur etiam gallinacei fimi potu ex aceto, aut eiusdem de  
linctū cum Melle multo. Corpus alunt, sed agrē dissoluuntur,  
cum magna ex parte integri ipsi, cum recrementis alui re-  
iciantur.

**F**ungorum non malus est cibus, sed si temerē mandantur, in discri-  
mē adducunt: nā & nocentiū, & probatorū multa, & diuersa sunt  
species. Horum plus præ tota Italia ferax est Thuscia. Siquidem annis  
singulis à primo Aprilis imbre emergunt, odore eximio, gustui gratissi-  
mi, & innocui. Hos Prignoli incolæ vocant. Suilli primò incoquuntur a-  
quæ, post friguntur. Venenati eo agnoscuntur, cum dilutus in eis rubor  
apparet, rancidus aspectus, linidus intus color, rimosa stria, pallidum  
per ambitum labrum. Tutissimi qui rubent callo, minus diluto quàm

M

Boletis



Boletis rubore, & qui è rubis & carduis vere nati, rotunditate clusili. Eos Spinulos, Prunulos, & Cardeolos appellant, Merulos, Fusios, Campestres, Crepitus lupi. Fungi innocetiores arborum ramis innascuntur. Inuenti Neapoli lapides, qui defossi, & terra aliquantum operti, tum superiecta aqua tepida, intra quatrimum fungos producerent. Ij eam ob causam summa diligentia asservantur. Fungus vt potè frigidus & humidus, iunctam habet facultatem venenatam & mortiferam, præcipuè qui cariosus est.

## Colchicum. CAP.

## LXXII.

## NOMENCLATURA.

Græ. κόλχικον. Lat. Colchicon. Ita.

Colchico. Gal. Tuechien. Off.

Hermodyctylum.



\*Colchicum. 1.



Colchicum. 2.

Colchi



**C**olchicon, aliqui Ephemerum, sunt qui agrestem Bulbum uocant, autumnū exitu florem edit Croci, candicantem: ab eo tempore folia Bulbi, sed pinguiora: caulem palmo altum, ferentem rufum semen: radicem foris è nigra rufescentem, quæ delibrata, candida & mollis spectatur, lacteo succo madet, atque gustatu dulcis inuenitur. Bulbus eius mediam habet rimam, fissuramq<sup>3</sup>, qua flos erumpit. Plurimum in Messenia, & Colchis enascitur. Ea comesa, Fungorum more, strangulando enecat. Hanc autem depinximus, ne à quoquam imprudenter pro Bulbo deuoretur: mirum enim in modum saporis uoluptate imperitos allicit. Remedio sunt eadem quæ Fungis, bubulum etiam lac potum auxiliatur. Itaque cum adfuerit, non aliud desideratur auxilium.

## Ephemerum. CAP.

## LXXIII.

## NOMENCLATURA.

Græc. ἐφίμερον. Lat. Ephemerum. Ita. Iride.

saluatico. Gal. Lis sauuage.

**E**phemerum, alicui syluestrem Irim appellant, folia habet Lilyj, sed tenuiora: caulem parem: florem candidum, amarum: semen molle: radicem unam, digitali crassitudine, longā, astringentem, odoratam. Nascitur in syluis & opacis. Huius radix dentibus præcipua, si decocto colluantur. Folia in uino cocta, discutunt tumores, & tubercula, quæ nihil adhuc humidi contraxerunt.

**E**phemerum Colchiocum, è Colchide, Ephemerum inde nomen sumpsit, quod præsentaneo adeo sit veneno, ut infra unius diei spacium hominem enecat. Porro Ephemerum Colchicum, ipsum est Officinarum Hermodactylum. Officinarum dixi, quoniam verum non sit Hermodactylum: quodque verum Colchicum, à vero Hermodactylo longissime desideat. Errori suadamentū præbuit Serapio, qui cōfusane de

M

2

Ephemero





Ephemerum.

Paritoire. Off. Parictaria.

Ephemero & hermodactylo eodem capite pertractat, huicque titulum indit, de Hermodactylo. Contra Græci, è quæis extracta Ephemeræ & Hermodactylæ nomina, diuersis de eis capitibus tractauere.

Helxine, id est,  
Muralis herba.  
CA. LXXIIII.

NOMENCLATVRA.

Græ. ΕΛΞΙΝΗ. Lat.

Helxine. It. Vetriola. Gal.

**H**elxine nascitur in parietinis, sepibus & macerijs. Folia ei Mercurialis insunt, hirsuta: cauliculi subrubentes, & circa eos ueluti semina aspera, adhaerentia uestibus. Folia refrigerandi spissandiq; naturam habent, qua ex causa sanant illitu sacros ignes, adusta, condylomata, panos incipientes, tumores, inflammationesq;. Succus eius cum Cerussa, ignibus sacris, & ulceribus quæ serpunt, commodè illinitur, imponiturq; podagris cum hircino adipe, aut cerato Cyprino. Veterem tussim emendat instar cyathi haustus. Tonsillis inflammationem sentientibus utiliter & gargarizatur, & oblitur: aurium dolorem cum Rosaceo instillatus leuat.

Alfine.



## Alſine. CAP. LXXV.

## NOMENCLATVRA.

Gra. Αλσίνη. Lat. & Off. *Alſine*. Ita.  
Centone. Gal. Mouron.

*Alſine.**Alſine minor.*

**A**lſinem, aliqui Anthyllion, nonnulli Myosota uocant, quoniam muscutorum aures folia imitantur. Lucis opacisq̃ gaudet, unde Alſine dicta est. Hæc erat eadem quæ Helxine, nisi humilior esset, & folijs longioribus, nec hirsuta: cū teritur, odorem cucumis reddit. Vim refrigerandi adstringendiq̃ obtinet. Oculorum inflammationibus cum polenta illinitur. Succus aurium doloribus infunditur. Quin & emēdat omnia quæ

M

3

Helxine



*Helxine, id est, muralis herba.*

**D**iffert hæc Helxine, que Muralis & Parietaria, ab Helxine, Cys-  
sampelo, atque ipsarum nomen differentiam produnt. Namque  
ambæ notæ sunt. Helxine Vitreolaria abstergendi astringendique vir-  
tutem habet, humiditati infrigidanti coniunctam. Alsinæ plures sunt  
species, licet vnius tantum mentionem faciat Dioscorides. Eiusdem est  
cum helxine facultatis.

## Lens palustris. C A P.

### LXXVI.

#### NOMENCLATURA.

*Græ. φακὸς ἐπὶ τοῦ τελευατῶν. Lat. Off. Lens.*  
*palustris. Ita. Lenticularia. Gal.*

*Lentille de mer.*

**L**ens palustris inuenitur in aqua non fluente, muscus Len-  
ticula similis, refrigeratoriæ naturæ. Propter quod conue-  
nienter collectionibus, igni sacro, & podagris illinitur per se,  
& polenta. Glutinat & procidentia puerorum interanea.

**L**ens palustris aquis stagnantibus & resedibus innatat ceu muscus  
pusillus & astrictus folijs, semine lentem referens, infrigidantium  
secundi est ordinis.

## Semperuium, seu Sedum. C A P.

### LXXVII.

#### NOMENCLATURA.

*Græ. Αἰζῶον μέγα. Lat. Off. Semperuium.*  
*maius. Ita. Sempreuino maggiore.*

*Gal. Ioubarbe.*

**S**emperuium magnum ideo nominatur, quoniam perpe-  
tuo folia uireant: cuius caules cubiti altitudinem implent,  
interdum excedunt, pingues, crassitudine pollicari, uirentes,  
Characiæ Tithymali modo infecti: folia pingua, carposa, lon-  
gitudine pollicari, in cacumine lingue similia, alia in terram cō-

*hexa,*



*Semperuium.**Paruum.*

uexa, alia in capite stantia inuicem, ita, ut ambitu effigiem imitentur oculi. Nascitur in montibus, & testaceis. Supra aomici-  
lia etiam seritur, Eius uis refrigerare, & astringere: medentur i-  
gni sacro, nomis, ulceribus quæ serpunt, oculorum inflamma-  
tionibus, ambustis igni, podagris per se, & cum polenta illi a  
folia. Succus capiti, in doloribus, cum polenta aut Rosaceo per-  
funditur. Datur in potu contra phalangiorum ictus, dysente-  
riam, aluiq; profluvia. Teretes tineas potus in uino excutit. Sub-  
ditus in uellere, mulierum abundantiam sistit. Succus oculorum  
lippitudinibus, sanguinis uitio conceptis, inungitur. Semperui-  
um paruum in petris, parietinis, & maceris, necnon scrobibus  
opacis nascitur, caulibus ab una radice multis, tenuibus, crebro  
foliatis: exilibus folijs, rotundis, pinguibus, mucronatis: caule à  
medio emicante, palmum alto, umbellam herbidosq; flores &

M 4      tenues



*Aizoon maius.**Minus.*

tenues gerente. Folia eisdem cum priore uiribus prædita sunt. Tertium uidetur Sēperuiui genus, quam aliqui *Andrachnen agriam*, aut *Telephion* uocauerunt, Romani *Illecebram*: pusillis, crassibusq; folijs, hirsutis, *Portulacæ* proximis. Nascitur in saxis. Vis ei excalfactoria, acris, exulcerans. Illita cum axungia, strumas discutit.

**S**emperuium maius & minus omnibus nota sunt. Maius tamen, speculariter *Semperuium* vocatur: minus, *Vermicularis*. Huius due sunt species: Vna, quæ florem præfert luteum, folia pusilliora & duriora: hæc pro mare habetur. Altera, folijs constat longiusculis, rariusculis, & crassiusculis, flore candido, hæc semina ducetur. Tertia *Semperuiui* species non omnibus cognita. Hæc cognouisse videtur *Cordus*, quæ & solæ ex omnibus *Aizoi* generibus, calidum habere tēperamentū nec esse *Vermicularē* asseuerat. *Matthiolo* nondū in Italia demonstrata, quāuis *Sēperuiū* maius & duas *Vermicularis* species nullibi nō perspexerit.

*Vmbilic*



## Vmbilicus Veneris. CAP.

## LXXVIII.

## NOMENCLATURA.

Gr. Κοτυληδόν. Lat. &amp; Off. Vmbilicus Veneris.

Ital. Ombilico di Venere. Gal. la Rondellete.

**C**otyledon, siue Vmbilicus Veneris, folio est in acetabuli formam tornato, ineuidenter concauo, breui in medio cauliculo, in quo semen inest: radice Oliuæ modo rotunda. Succus cum uino circunlitus, instillatus siue, contacta genitalia nudat: inflammationibus, sacris ignibus, strumis, pernionibus, illitus auxiliatur. Stomachi ardorem refrigerat. Folia cum radice comesa, calcalos frangunt, urinam cient, hydropicis ex Melle dantur. Herba utuntur ad amatoria. Est & alterum genus eiusdē, Cymbalion aliqui uocant, pinguibus folijs, latioribus, ligulari modo densis, circa radicem medium oculi ambitum describentibus, ut in maiore Semperuino, adstringentis gustus: cauliculo tenui, in quo flores & semina Hyperici: radice maiuscula. ~~Est etiam genus alterum, quod dicitur Cymbalion minus, folijs latioribus, ligulari modo densis, circa radicem medium oculi ambitum describentibus, ut in maiore Semperuino, adstringentis gustus: cauliculo tenui, in quo flores & semina Hyperici: radice maiuscula.~~

**V**mbilicus Veneris copiose per omnē Thusciam muris vetustis & saxis innascitur, huius folia, quæ operculis vasculorū similia sint incole Cupertionole vocant. Hæc docti quipiā Cymbalariā putant, sed falso. Namq; hæc comæ modo è parietibus dependet, caule tenui, folio hederaceo, plurimum per ambitum mucronato. Cotyledonis alterum genus, Cordus Crassulam maiorem putat, crassius & carnosius est folijs, Aizo maioribus, quæ per hyemem simul cum caule exarescunt. Vmbilicus Veneris infigidat, repercutit, abstergit, & discutit.

## Vrtica. CAP. LXXIX.

## NOMENCLATURA.

Gr. Ακκλίφη. Rat. Vrtica. Ital. Ortica.

Gal. Ortie griesche.

M 5

Duo





Urtica. 1.



Urtica. 2.

**D**uo Urtica genera: Sylvestris, asperior, latioribus, nigrioribusq; folijs: semine Lini, sed minore: altera non æquè aspera, minuto semine. Folia utriusque illita, canis morsibus, addito sale, medentur. Gangranas, carcinomata, sordida ulcera, & quæ cacoëthe uocantur, item luxata, panos, tubercula, parotidas, suppurationesq; sanant. Lienosis cum cerato imponuntur. Faciunt ad profluvia narium, cum succo trita, & naribus indita. Menses ciunt eadem, detrita cum myrrha, & imposita, prociuentes uulvas, recentia contactu resilire cogunt. Semen potum ex passio, uenerem stimulat, uulvæ ora patefacit. Cum Melle delinctum, orthopnææ, lateris & pulmonum inflammationibus prodest, thoracem expurgat. Erodentibus medicamentis admiscetur. Cocta cum conchis folia, aluum emolliunt, urinas mo-  
uent



ent, inflammationes discutiunt, decocta cum ptisana, uitia pectō  
is extrahunt, Mulierum menses euocant, cum Myrrha modico  
ota. Inflammatione turgentem uuam, gargarizatus succus ex-  
rimit.

**V**Rtica genera duo facit Dioscorides, quæ satis nota sunt. Præter  
hæc in Italia nascitur & tertium genus, folijs pusillis, & caule  
breui. Hæc, quam alia duæ, vehementius adurit. Est etiam inter Vrticæ  
genera, quam Cardiacam vocant. Vrticæ semen excalfacit, & tenuis  
est partium, concoquit, & expurgat.

Galiopsis. CAP.  
LXXX.



Galiopsis.

NOMENCLA-  
TVRA.

Græ. γαλιόψις. Lat.  
Galiopsis. Ita. Ortica fetida.  
Gal. Orties mortes. of.  
Vrtica mortua.

**G**aliopsis frutex in to-  
tum caulem & folia  
habet Vrticæ, leuiora, &  
quæ grauem odorem trita  
reddant: flore purpureo, te-  
nui. Nascitur circa sepes, ædi-  
ficiarū areas, ac semitas ubi-  
que. Folia, caules, semē, suc-  
cusq̃, duritias et carcinomata  
dissipāt: strumas, panos, et pa-  
rotidas discutiūt. Oportet bis  
die



die tepidū ex aceto cataplasma imponere, & eius decocto fovere. Ad putrescentia, gangrenas, & nomas, cum sale efficaciter eliminantur.

**C**Aliopsm Itali Vrticam fetidam vocant, siquidem attrectata putet mirum in modum, folijs & caule Vrticis similis, non adurentibus tamen. Errant qui Galiopsm, Scrofulariam, aut Millemorbiam existimant, quod florem habeat, hianti mustella persimilem. Siquidem folia non admodum ad Vrticam accedunt, nec odore est ingrato. Nodosa radix, qua maximè medicinam facit, praterita à Dioscoride, subindicat eum non de Scrofularia intellexisse. Natales etiam non conveniunt. Nam Scrofularia circa aquarum fossas, & riuulorum ripas nascitur, non circa sepes, & edificiorum areas, ac semitas. Ruellio, Galiopsis, Agripalma est, vteri suffocationis singulare remedium.



Gallion.

Gallion. C A P.  
LXXXI.

NOMENCLAT-  
TVRA.

Græ. γάλλιον. Lat. Gal-  
lion. Ita. Gallio. Gal. Petit-  
muguet.

**G**allion nomen ex eo  
trahit, quod in con-  
trahendo lacte, coaguli vice  
impleat: ramulum foliumq;  
habet Aparinae simillimu,  
rectum: florem in cacumine  
luteum,



uteum, tenuem, densum, copiosum, odoratum. Flos igni ambu-  
 is illinitur. Sanguinis profluvia sistit. Cerato Rosaceo Gallion  
 admiscetur, in solatum usque dum albescat, lassitudines reficit.  
 Radix uenerem concitat. Nascitur in palustribus.

**G**allion, Aparine, aut Rubia minoris similis, ubique circa publicis  
 iter nascitur, flore nunc candido, nunc luteo. Lacti additum, pro  
 agulo est. Hoc in locum herbe, quam, Presura, Itali vocant, uti possunt  
 qui caseum dulce consciunt. Vim habet desiccandi, cum aliquanta acri-  
 monia.

Senecio.

CAP.

LXXXII.

NOMENCLATURA.



Senecio.

Græ. Ἡριγέρων. Lat. Se-  
 necio. It. Cardoncello. Gal.  
 Senecon. Off. Scutū cæli.

**S**enecio cauliculo est cubi-  
 tali, subrubro: folijs con-  
 tinuis, diuisura Erucæ, sed mi-  
 noribus multo: luteis flori-  
 bus, qui celeriter dissecti ua-  
 nescunt in pappos. Nomen ue-  
 rò sibi uendicauit, quoniam  
 flores capillorum ritu, uere  
 canescant: radice superuacua.  
 Nascitur maxime in mace-  
 rijs, & circum oppida. Folia  
 cum floribus refrigerant. Qua-  
 re illita cum uini modico, uel  
 per sese, testium & sedis in-  
 flam



flammationes sanant. Quin & ex manna Thuris medentur cū reliquis uulneribus, tum ijs quæ nerui acceperunt. Illiti per se cū aceto pappi, idem munus præstant: uerū recentes epoti stranguant. Totus caulis, si coctus in passo potui detur, stomachi dolores à bili contractos persanat.

**S**Enecio, ubique etiam in veteribus muris nascitur, nec cognitu difficilis. Nomen ei Græci indidere, quod uere canescat. facultatis est mixtæ, refrigerantis, & peraquè quadantenus digerentis.

### Thalietrum. CAP. LXXXIII.

#### NOMENCLATURA.

Græ. θαλίητρον. Lat. Thalietrum. It. Argentina.

Gal. Argentine. Off. Cotula fetida.

**T**halietron folia Coriandri habet, pinguiora paulo, caulem Rutæ, in quo folia. Quæ trita, illitu antiqua ulcera ad cicatricem perducunt. Nascitur maximè in campestribus.

**T**halietron Argentina ne sit, nec asseuerare, nec impugnare audeat Matthiolus, at Cordus herbam Germanis dictam, Heyleblat, asseueranter pronuntiat. Hac rustici in Saxonia maxima curant uulnera, nullo adiutore medico. Nascitur in campestribus & pratis non ita humilibus. Trium eius generis differentia, deprehensu faciles. Desiccatur Thalietrum sine morso.

### Marinus muscus. CAP.

#### LXXXIII.

#### NOMENCLATURA.

Græ. βρυον θαλάσσιον. Lat. Muscus marinus. Ita. Corallina. Gal.

Coralline.

**M**arinus muscus nascitur in scopulis, testaceisq; haud procul à mari, gracilis, capillaceus, caulis expers. Præcipua ei spissandi uis, & collectiones cohibendi, & podagras, quas refrigerare opus sit.

Coralli



**C**orallina, qua ad conficiendos in infantibus vermes vtuntur, verus est Muscus marinus. Nam rupibus & testis adhaerens, & circumplexus corallo, haud aliter quam muscus cortici, & arborum ramis innexus, reperitur. E terrea & aquea substantia componitur, vtraque frigida, quod gustum in eo astringentium parit.

## Fucus marinus. CAP.

## LXXXV.

## NOMENCLATURA.

**Gr.** φύκος θαλάσσιου. **Lat.** Phycus marinus. **Ita.**

**Phuco marino. Gal.** Fueillet de mer.

**E** Phuci marini generibus, quoddam latum, & alterum sublongius, & rubens: tertium candidum, nascens in Creta, toridum ualde, quod nulla corruptionis labe polluitur. Omnia in habent refrigeratorem, non podagrae modo, sed etiam inflammationibus, in cataplasmatibus efficaciter utilem. Verum isti humidis conuenit, priusquam exarescant. Nicander, puniceum diuersis serpentes dedit. Hoc fucus quidam putant mulieres suum colorem mentiri, cum tamen sit radícula eiusdem nominis, qua se fucant.

**P**hucus marinus, Alga nobis incognita genus. Nempe non illa est Alga, quae Venetijs, vitris, ne rumpantur, interseritur. Phucus ita humidus est, è mari extractus, secundo ordine desiccatur & infigitur, & acerbis aliquantum in se continet.

## Potamogeton. CAP. LXXXVI.

## NOMENCLATURA.


**Græ.** ποταμογείων. **Lat.** Fontalis.

**Ita.** Potamogeto.

**P**otamogeton, folium Betae simile, hirsutum, paululum supereminens extra aquam. Refrigerat & inspissat: pruriginibus utile, & contra ueterum ulcerum nomas. Nomen ex eo inditum est, quod palustribus & aquosis enascatur.

Potamo





\* Potamogeton.

Semper uiuo similis, ni maiora haberet folia, quæ refrigerant: sanguinē qui defluit à renibus, pota sistunt: uulnera quæ inflammationem minantur, intumescere non sinunt: ignibus sacris & tumoribus ex aceto illinuntur.

Stratiotem aquaticum qui referente plinio Libri 24. cap. 18. in Aegypto tantum inundatione Nili nascitur, huius in locis perquirere superuacaneum fuerit. Aizoo similis planta, folijs licet maioribus.

Stratiotes millefolium. CAP.

LXXXVIII.

NOMENCLATURA.

Græ.

Potamogeton lacis & paludibus innatans, folio Betæ visitur. Id in Anania vallis lacubus, & vidit, & legit suis manibus Matthiolus. Restrigit & infigidat Polygoni modo, essentia tamen, quam polygonum, crassioris.

Stratiotes. CA.

LXXXVII.

NOMENCLATURA.

Græ. στρατιώτης. Lat.

Stratiotes. Ita. Stratiote.

Stratiotes in aquis nascens, isdem supernatat, & sine radice uiuit: unde cognomentum traxit, Herba



Græ. Στρατίωτης ὁ χιλιόφυλλος.

Lat. *Stratiotes Millefoliū*. Ita. *Stratiote Millefoglio*.

Gal. *Millefueille*. Off. *Millefolium*.

**S**tratiotes *Millefolium* exiguus frutex, palmi altitudine, aut amplius assurgit, folijs auicularum pennas imitantibus, breui admodum dissectoq; foliorum exortu. Folia syluestre *Cuminum* simulant, præsertim breuitate atque scabritia, breuiora paulo, densiore umbella, & pleniore. Surculos in cacumine gerit exiguos, & capitula in modum *Anethi*: flores paruos, candidos. Nasctur in asperis agris, præcipue circa semitas. Eximij usus ad ulcera uetera, recentiaq; profluentem sanguinem, & fistulas.

**S**tratiotes *Millefolium*, incultis innascens, dubio procul ea planta, quam nullibi non *Millefolium* vocant, nimirum nulla est quæ refragetur nota. Nam *Asininum* *Daucum*, *Ferulacea* & *umbellifera* herba, nihilum ad *Stratiotem* *Millefolium* accedit. *Aquaticus* *Stratiotes*, frigidus est & humidus, terrestris leuiter astringit.

## Verbasum. CAP. LXXXIX.

### NOMENCLATURA.

Græ. φλόμ. Lat. *Verbasum*. Ital. *Tasso barbato*.


Gal. *Bouillon*. Offic. *Tassus barbatus*.

**V**erbasum differentias summas habet duas, hoc nigrum, illud album: in quo mas & fœmina intelligitur. Fœmina igitur folia sunt *Brassica*, pilosiora multo, & latiora, candida: caulis albus, cubicalis, aut amplior, subhirsutus: flores albi, aut ex luteo pallecentes: semen nigrum: radix longa, gustu acerba, crassitudine digiti. Nasctur in campestribus. *Verbasum*, qui mas appellatur, oblongius, albis folijs, & angustioribus, tenui caule. Sed nigrum prorsus albo simile esset, nisi nigriore latioreq; costaret folio. Syluestre folia fert *Saluia*, altas uirgas & lignosas, & circa eas ramulos quales *Marrubiū*: flores luteos,

N

auri





Verbascum. 1



Verbascum. 2

auri emulos. Sunt & Phlomidēs duae, hirsutae, rotundis folijs, humiles. Tertia Lychnitis appellatur, ab alijs autem Thryallis, folijs ternis, aut quaternis, uel paulo pluribus, asperis, crassis, pinguibusq̃, apta ad lucernarum lumina. Radix priorum duarum adstringit: quare quod magnitudine ludicrum talum aequet, in alui profluuiū conuenienter ex uino datur. Decoctum ruptis, conuulsis, fractis, antiquae tussi, auxiliatur. Dentium dolorem collutione mitigat. Verbascum cui flos aureus, capillos tingit, & quocunque abijciatur, blattas in se contrahit. Cocta in aqua folia, aduersus tumores, inflammationes oculorum, syderata ulcera, ex uino & Melle illinuntur, cum aceto quoque uulneribus medentur. Contra scorpionum ictus sunt auxilio. Syluestris folia ambustis igni sunt cataplasmata. Aunt in folijs





Verbascum. 3



Verbascum. 4

lyis eius, quam scæminam dicimus, aridos ficos omnino non putrescere.

**V**erbasci genera tria: duo domestica, & vnum sylvestre, quod solijs constat Saluæ, floribus aureis, omnibus nota sunt. Phlomidæ duas, & Ichnitis in Italia haud dum à Matthiolo perspectæ. Is Ruellij opinionem infirmat, censentis Phlomidæ, duas illas esse plantas, quæ Brachæ cuculi, & Primulæ veris dicuntur. Nam solijs, quæ rotunda vni, alteri longa sunt, Verbascum non exprimunt: eorundem lauer, cum hirsuta esse debuerint, Dioscoridis delineationi cõpugnat. Porro de flore illo, herbæ Paralysis, aureo, verisque incuntis nuntio, nulla à veteribus metio facta est, nõ præterituri si cognoscent. Verbasci astringunt, desiccant, & abstergunt. Tryallis Cordo hortulana est planta.

N 2

Aeth



## Aethiopis. CAP. XC.

## NOMENCLATURA.

Græ. Αἰθιοπῖς. Lat. Aethiopis. Ital. Aethiopide.

**A**ethiopis folia habet Verbasco similia, perquam hirsuta, densa<sup>q</sup>, in orbem circa radicem imam redacta: caulem quadrangulum, scabrum, similem Apiastro, aut Arctio, multis concavum alis: semen Erui magnitudine, geminum, in uno conceptaculo: radices ab eodem cespite numerosas, longas, glutinosas gustu, quæ sicca nigrescunt durantur<sup>q</sup>, ut cornua possint uideri. Plurima nascitur in Ida monte Troadis, & in Messenia. Auxiliatur purulentis excreationibus, ischiadicis, pleuriticis, arteriæ scabritijs, decocta radix & pota: quin & cum Melle, eclegmatis uicem præbet.

**A**ethiopis nec apud nos enascitur, nec ex Aethiopia adfertur, nec ex Ida Troadis aut Messenia, ideoq; ignotarum plantarum classem subitura.

## Arction. CAP. XCI.

## NOMENCLATURA.

Græ. Ἀρκύσιον. Lat. Arction. Ita. Arctio.

Gal. Bardane. Offi. Lappa.

**A**rction, aliqui potius Arcturon uocant, similis est Verbasco folijs, nisi quod hirsutiora & rotundiora sunt: caule longo, molli: semine Cumini, paruo: radice tenera, alba, dulci<sup>q</sup>. Decocta cum semine radix in uino, dentium dolorem mulcet, si contineatur ore decoctum. Ambusta perniones<sup>q</sup> fouentur eodem. Bibitur aduersus coxendicum dolores, & stranguriam, è uino.

**E**rant qui Lappam minorem (quæ verum Dioscoridis est Xanthion) pro Arctio accipiunt. Quò fit ut ignota sit planta, Arction. Arctij semen tenuium est partium, modice desiccatur & abstergit.

Perse



XC. **Personata, siue Lappa. CAP. XCII.**

NOMECLATURA.

Græ. Αρνειον. Lat. Personata. Ita. Lappa maggiore.  
Gal. Gloteron. Off. Bardana maior.



**P**ersonata folia habet  
Cucurbitæ, maiora  
& hirsutiora, & crassio-  
ra: caulem albicantē, quan-  
quā & interdum uidua  
caule reperiatur: radice in-  
tus cādida, foris nigra. Hæc  
drachmæ unius pondere po-  
ta, cum pineis nucibus, puru-  
lenta & cruenta extusien-  
tibus auxiliatur: trita dolo-  
res à cōtorsionibus artuum  
contractos, illitu sedat. Folia  
utiliter antiquis ulceribus il-  
linuntur.

**Personata, siue Lappa.**

**A**rcion, Personata, & Bardana idē esse, ipse Dioscoridis cōtextus  
indicat: hac tamen alia maior est, qua rustici Itali, cum sub ar-  
dente canicula fruges aut demetunt, aut triturant, pileos quo astum  
fallant, mentiuntur. Aparinem herbam, Rubia (quam vocant) similē,  
& qua Speronella vulgo Italico dicitur, ac inter lentes nascitur, Lappā  
non esse, satis liquet. Arcion digerit & desiccet, & modicē astringit.

**Petasites. CAP. XCIII.**


NOMENCLATURA.

Græ. Πετασίτης. Lat. Petasites. Ita. Petasite.

N 3

Peta





**P**etasites pediculus cubito maior, crassitudine pollicis, à quo prægrande folium, galeri modo amplum, ceu fungus dependet. Contra Phagedenas, & ulcera quæ cacoethe uocant efficaciter illinitur.

**P**etasites, non est ea Lappa maioris species, quæ in fossarum ripis nascitur, sicut nec in Italia à Matthiolo reperta, cū Ruellius dicat sibi in Gallia notam, & rusticis, Bardanam maiorem nominari.

\* Petasites.

Epipactis. CAP.

XCIIII.

NOMENCLATURA.

Græ. ΕΠΙΠΑΚΤΙΣ.

Lat. Epipactis.

Ital. Epipactide.

**E**pipactis, ab alijs Helleborine, parua herba, fruticosa, exiguis folijs. Iocinoris uitij utilis, & contra uenena pota.

Histo



**H**istoria Epipactidis, in Dioscoride, breuitas, ignotam penè hanc herbam facit. A tenim nò dubitat Matthiolus, quin in Goritia-  
no comitatu copiose nascatur, quòd inibi pusilla quæpiam herba nascatur, quæ omni sua effigie, Epipactidis historiam representet. Cate-  
rum Plinio, Elleborina, quod Elleborum nigrum referat, dicitur.

## Capnos, seu Fumaria.

### CAP. XCV.

#### NOMENCLATURA.

Græ. καπνός. Lat. Fumaria. Ita. Capno.

Gal. Fumeterre.

Off. Fumus terre.



Capnos, seu Fumaria.

**F**umaria fruticosa her-  
bula est, prætenera, Co-  
riandri similis: folis candi-  
dioribus, undiq; numerosis,  
cineracei coloris: flore pur-  
pureo. Huius succus clarita-  
tem facit oculis, delachry-  
mationemq; unde nomen  
traxit. Illitus cum gummi,  
euulsas palpebras renasci  
prohibet. Commanducata  
herba biliosam urinam tra-  
hit.

**C**apnos, Fumariæ nomen  
accepit, quod huius suc-  
cus claritatem oculis faciat. Ver  
opportunitum legendæ Fumariæ  
tempus, & eliciendo succo. Ad  
calidū temperamentū inclināt,

N 4 quod



quod tamen frigiditas infrenet, dominetur licet in exterioribus partibus frigiditas: verum in sicco, secundam classē subintrat. Laxat, confortat, & preparat. Qualitatis est amara, & pauxillum acris, & nulloatenus acerba.

## Lotus urbana. CAP. XCVI.

### NOMENCLATURA.

Græ. Λωσος ὀρεος.

Lat. Lotus urbana.

Ital. Loto domestico.

Gal. Trefle odoriferant.

Offic. Trifolium odoratum.

**L**otum urbanam, alij Trifolium uocant. Nasctur in hortis. Extractus succus, addito Melle, oculorum argema, nubeculas, ceterasq; caligines discutit.

## Syluestris Lotus. CAP. XCVII.

### NOMENCLATURA.

Græ. Λωσος ἄγρι.

Lat. Syluestris Lotus.

Ital. Loto. saluatico.

**S**yluestris Lotus, quam Trifolium minus appellant, plurimum in Lybia gignitur, caule bicubitali, & sæpe maiore, alis multis: folijs Trifolij pratensis: semine Fœnigraci, multo minore, gustu medicato. Vim calfaciendi & leniter astringendi obtinet. Vitia cutis in facie, maculasq; cum Melle peruncta expurgat. Trita per sese aut cum Maluæ semine, in uino aut passo, bibitur aptissimè contra dolores, qui uesticam male habent.

**E**loti satiuæ floribus, præstantissimum & iuxta expertissimum fit oleum in totius corporis & præcipuè iuncturarum dolores, & callos veteres, quod Andacota sicut & herbam, Arabes uocant. Syluestre huius generis, hæctenus incognitum: siquidem exoticum est: nempe





\* Sylvestris Lotus.

in Lylia nascens. Lotus satina modicè digerit, & desiccat, temperatè calida & frigida. Lybica semen, calidum est secundo gradu, & aliquantum absterforiū. Hæc Lotus, Officina- rum est Melilotus.

## Cytisus. CAP. XCVIII.

### NOMENCLA- TVRA.

Græ. ΚΥΤΙΣΟΣ.

Lat. Cytisus.

Ital. Trifoglio ca-  
uallino.

**C**ytisus, frutex est albus in totum, ut Rhamnus, ramos spargens cubito longiores, in quibus folia Fœnigraci, aut Loti trifolia, minora, dorso medio prominente. Ea digitis trita Erucam olet, gustataq; Cicer sapiunt. Folia refrigerant. Tumores inter initia discutiunt, si cum pane trita illinantur. Decoctum potu urinam ciet. Nonnulli, quod apes alliciat, prope aluearia serunt.

**C**ytisus copiosissimè in Italia nascitur, effigiem referens pictura Dioscoridis & Plinij. Italorum quidam, Trifoglio cauallino: alij, Tribolo nominant. Surculos profert frutex cubitales aut maiores, quæ folia supereminent, veri Trifolij similitudine, dorsulo in medijs prominente. Iis color candidus, & tritis Erucæ odor subolet: & commandu-

N 3 catis



catis, sapor profilit cicerum recentium. Flores incani & muscosi propetunt racemorum forma, quibusdam lutei, alijs candicantes. Is in Galijs etiā prouenit, in segetibus præcipuè hordaceis. Satio autumnovet vere fieri potest, semine subacto solo, & in areas digesto. Si desit, cacumina disponuntur, ita vt quoquouersus quatuor pedum spacia distent. Terram stercoreatam desiderat. Si pluuia non inceserit, rigandum erit.

## Lotus Aegyptia. CAP. XCXI.

### NOMENCLATURA.

Græ. Λωτὸς Αἰγυπτίῳ.

Lat. Lotus Aegyptia. Ita. Loto d'Egytto.

**E**st & in Aegypto Lotus, quæ in campis flumine inunda-  
tis prouenit, caule Fabæ flore paruo, candido, Lilio simili,  
quem tradunt occidente sole comprimi, occludi, ad ortum au-  
tem aperiri: adduntq; caput ipsum uestpera aquis condi, & ad  
exortum solis emergere. Caput quale Papaueris, maximum:  
& intus grana ceu Milij, quæ Aegyptij exiccant, & in panes  
cogunt. Radicem Lotus hæc habet mali Cotonei similitudine,  
quæ cruda coctaq; manditur: decoctaq; lutei oni qualitatem ex-  
hibet.

**L**otus Aegyptia peregrina & nostro cælo incognita planta, à Se-  
rapione cum duobus supra descriptis Lotis, Andacoca nominatur.  
Ex huius semine tuso oleum exprimitur, quo Arabum sectarj in dolo-  
res iuncturarum vtuntur. Id tamen eius qui è floribus seu semine Lotis  
urbana elicitur, virtutem non extenuat, probato hæcenus successu.

## Millefolium. CAP. C.

### NOMENCLATURA.

Græ. Μυριοφύλλον

Lat. Millefolium. Ital. Millefoglio.

Gal. Millefeuille.

**M**Yriophyllum, siue Millefolium, caulis est tener, singu-  
laris, unica nixus radice: plurimis folijs, lauibis, Fæni-  
culo



ulo similibus: unde nomen accepit. Caulis flauescit uarius, ac  
 elui ex industria deliniatus. Nascitur in palustribus. Vulnera  
 ecentia ab inflammatione uindicat, siue uel uiride, uel siccum  
 x aceto oblinatur. Pracipitatis in potu, cū aqua & sale datur.

**M**illefolium hoc, admodum à Stratiote Millefolio dissidet. Nam Mil-  
 lefolium vulgare in asperis agris, & circa semitas nascitur, non in  
 palustribus, ut Myriophyllum. Adde his, quod illius folia nihil ad scemi-  
 ulum accedunt.

## Myrrhis. CAP. CI.

### NOMENCLATURA.

Græ. *Myḡḡis*. Lat. *Myrrhis*. Ita. & Offic. *Cicutaria*.

Gal. *Perfil d'Asne*.

**M**Yrrhis simillima est *Cicuta*, caule, folijsq̃. Radix ei ob-  
 longa, mollis, rotunda, cibo non insuavis. Quæ pota in  
 uino, *Phalangiorum* morsibus auxiliatur. Cit menstrua, &  
 partus secundos, purgatq̃ à puerperio fœminas. Subuenit &  
 phthysicis cocta in sorbitione. Aiunt quoque eandem bis die  
 tære potam, ex uino, in pestilentia salutare esse, & ne morbi  
 contagia sentiantur, obstare.

**M**Yrrhis *Cicutariæ* apud herbarios nomen sumpsit, quod figura pro-  
 ximè ad *cicutam* accendat. Nascitur inter arbusa, ideoq̃; summo pe-  
 re cauendū, ne eius loco, palustris *Cicuta*, quæ mortifera est, accipiat. A-  
 tenim falluntur qui *Angelicam* vulgò dictā, plantam pro *Myrrhide*  
 accipiunt. Siquidē *Angelica*, folia fert *Pastinacæ* domesticæ similia: *Myr-  
 rhis*, *Cicuta*. Nec vero simile est, si *Dioscoridi* *Myrrhis* *Angelica* fuisset.  
 eximium illū & *Aromaticum*, quem *Angelica* radix exhalat, odorem  
 silentio præteriturum. Ceterum cum *Chærephyllum* supra demonstra-  
 uerimus esse *Gingidion*, falluntur qui illud *Myrrhidem* existiment.

## Myagrum. CAP. CII.

### NOMENCLATURA.

Græ. *Μύαγρον*. Lat. *Myagrum*. Ita. *Miagro*.

Gal. *Carmeline*.

*Myag*



**M**Yagron, aliqui Melampyron uocant, herba est succulacea, folijs Rubiæ, pallidis, tripedanea. Semen oleosum, Fænograceo simile. Quod contusum igni torrent, perunctisq; uirgis ad lucernarum lumina utuntur. Hoc pingui, scabritias corporis leuigari, atque expoliri constat.

**Q**uamuis Camelia aut Camamina Gallica quadantenus Myagrum referat, satius est tamen de hoc dubitare, quam precipitato iudicio sententiam proferre. Sitque oleo Camelia parando, non medicina, donec compertius quid obueniat.

### Onagra. CAP. CIII.

#### NOMENCLATURA.

Græ. *Ὠνάγρη*. Lat. & Ital. Onagra.

**O**nagra, siue Onothera, aut Onuris, frutex est arboris instar, prægrandis, Amygdalino folio, sed latiore, Lilio non dissimili: flore Rosaceo, magno: radice candida, longa: cum siccata est, uinum olente. Nascitur in montibus. Aqua in qua radix maduerit, in potu data, feras mitigat, & cicures facit. Illitu quoque tetra ulcera mulcet.

**O**nagra quantumuis ad mitigandas & cicurandas feras summam utilitatem allatura fuerit, nullus est tamen qui commonstret.

### Cirsium. CAP. CIIII.

#### NOMENCLATURA.

Græ. *Κίρσιον*. Lat. Cirsum. Ital. Cirsio.

Gal. La Buglosse.

Offic. Buglossa.

**C**irsium, caulis est tener, duorum cubitorum, triangulo similis: ab imo foliola, Rosæ speciem referentia: anguli spinosi, per intervalla molles: folia Buglosso similia, maiora, subcandida, modicè hirsuta, partibus extremis aculeata. Cacumen caulis orbiculatum, hispidum, in quo capitula purpurea, quæ soluantur in lanugines. Radicem huius, loco laboranti adalligatam



gatam, dolores uaricum sedare Andreas scripsit.



**C**Yrsion, simpliciariorum bona pars, vulgarem Buglossam existimant, sed obstat, caulis rotundus, qui in Cirsio quadrangularis est: Sicut nec foliola ab imo, Rosarum specie, spinosis angulis producit, verum longa & continua: nec flores in lanuginem solvuntur, sed integri fere decidunt, succidaneo in folliculis semine. Prestabit igitur hanc aut ignotam, aut Seplasiam Buglossam ducere.

\* Cirsium.

Aster Atticus, seu Inguinalis.

CAP. CV.

NOMENCLATURA.

Græ. Ἀστὴρ Ἀττικὸς.

Lat. Aster Atticus. Ital. Aster Attico.

Gal. La petite Aspergoutte.

**A**ster Atticus cauliculus lignosus, florem in cacumine habens purpureum, luteumve, & in ambitu diuisum, anthemidis modo, capitulum: sed ea quæ caulem ambiunt folia, stella modo radiata, oblonga, hirsuta. Feruētī stomacho, oculo-

rum





*Aster Atticus Inguinalis.*

uisura, folijs sit per ambitum stella more radiatis. Notissima est planta, nasciturque in asperis excultis. Porro Inguinalis dictus, quod non si illinatur tantum, sed etiam si gestetur, inguinis affectibus prodest. Mixta est, uti Rosa facultati. Siquidem refrigerat, non tamen vehementer, digerit, & exiccat. nempe quod ei sit amara qualitas. Cordus in contextu capitis legit, florem purpureum & luteum, quod pro locorum diversitate, nequaquam flores nunc purpureos, nunc luteos proferant, sed quod utrunque colorem simul idem flores ostendant: medijs, luteis, radios exprimentibus, purpureis. Visa planta id discriminis auferet.

**Isopyrum. CAP. CVI.**  
NOMENCLATURA.

Græ. ἰσόπυρον.

Lat. Isopyrum. Ital. Isopyro.

Isopy

rum inflammationibus, pro-  
cidue sedi, ac inguinibus il-  
litu auxiliatur. Tradunt  
purpureum florem, si ex  
aqua bibatur, anginis, &  
pueris comitiale malum sen-  
tientibus, opitulari. Ingui-  
num inflammationi recen-  
tem illinire conuenit. ~~Stem-~~  
~~du flos, flos, & luteus~~  
~~moderatum, & inguin-~~  
~~bus illigant, & luteus~~  
~~est.~~

**A** Sterem Asticum iam su-  
perius, in capite de Eryn-  
gio, ostendimus non eandem cum  
illo esse plantam. Aster autem  
dicitur, quod in ipsa capituli di-



**I** Sopyron aliqui Phasiolon ob similitudinem uocant, quoniam  
 folium quod est Aniso simile in pampinos torquetur. Capitu-  
 la sunt in summo caule tenuia, plena seminis, Melanthij gustum  
 mitantis. Contra tussim, & cetera pectoris uitia seme ex aqua  
 nulla bibitur: hepaticis, & sanguinem excreantibus utile.

**I** Sopyrum hodie incognitum, natura sui horti sepibus inclusit, hicque  
 nisi ea prodente, a cluturo delitescet.

## Viola purpurea. C A P.

### C V I I.

#### NOMENCLATURA.



*Viola purpurea.*

*Græ. Ιορ. Lat. Viola.*

*Ital. Mammola. Gal.*

*Violletes.*

**V** iola alba pupurea fo-  
 liū habet Hederæ mi-  
 nus minus ac nigrius tenec mul-  
 to dissimile. Cauliculus à ra-  
 dice medius p̄dit, in quo flo-  
 sculus suauiter olēs purpureus  
 opacis & asperis nascit. Re-  
 frigi



frigerandi naturam habet. Folia per se & ex polenta illinuntur aptissime stomacho aestuanti, & oculorum inflammationibusque, sedisque procidenti.

**E** Violarum purpurearum sunt genere ut in totum persimiles, candidae, quae inodora, frigidis in locis proveniunt: & sub aestatem, Maio & Iulio mensibus, flores, supernè purpurei, in medio candidi, infernè lutei, plurimum ad Violas purpureas accedentes, nullo licet odore. folijs hac planta constat rotundis, & per ambitum serratis, longitudine tamen ab incremento contracta, caulibus triangularibus, quadantenus striatis, & intus concavis, quibus paribus spacijs nodi superimminet, è quorum concavo cauliculi exeunt, qui flores producant. Hac Iaccea vocatur. Nec tamen ideo compertum, ea ne sit Iaccea, qua recentiores in intestinalium rupturas utuntur. Viole facultatis sunt, aquae & infrigiditantis. Ex harum infusione saepius repetita, terrestri in eo separata substantia, laudatissimus fit syrupus, ad soluendam aluum. Dosis in pleuresi, & alijs pectoris affectibus, quatuor unciae.

### Cacalia. CAP. CVIII.

#### NOMENCLATURA.

Gr. Κακάλια. Lat. Cacalia. Off. Lilium conuallium.

Gal. Muguet.

**C**acalia, quae Leontice vocatur, folia fert magna, alba: è quibus medius caulis emicat, rectus, albus, florem ferens Robori aut Oleae similem. Nascitur in montibus. Radix in uino madefacta, aut Tragacantha, delinctu, aut manducatu, per se, tuſibus, scabritijs arteria, medetur. Grana quae post excussum florem innascuntur trita, & cum cerato illita, faciem erugant, & cutem extendunt.

**C**acaliam, ut apparet, eruditiorum nullus agnouit. Huic recentiores perperam, Agrestis Carui, nomen indidere.

### Bunium. CAP. CXI.

#### NOMENCLATURA.

Gr. Βούνιον. Lat. Bunium. Ital. Nauone saluatico.

Gal. Herbe au charpentier.

Bunium



**B**union caulem edit quadrangulum, procerum, digiti crassitudine, in quo ramuli minutis folijs ac floribus scatent: folia proximè radicem, Apio similia, longè tenuiora, Coriandrinis proxima: flores Anethi: semen odoratum, Hyoscyaminus. Urinam ciet, excoalfacit, secundas euocat, lieni, uesica, renibus utile. Tam humidi quàm sicci, expressi<sup>q</sup>, succi caulibus, folijs, radicibus<sup>q</sup>, usus inualuit ex aqua mulsa. Pseudobunion palmi altitudine fruticat in Creta, folia ramulos<sup>q</sup>, Napi ferens, acri gustu. Tormina, atque stranguriam, laterum<sup>q</sup>, dolores, sanant quaterni rami eius poti in aqua: illiti quoque cum sale & uino, tepentes, strumas discutiunt.

**B**union in aruis incultis nascitur, præciq<sup>ue</sup> in locis frigidis. Pseudobunion Cretæ peculiaris planta, nihil mirum si nobis ignota est.

### Chamæcissus. CAP. CX.

#### NOMENCLATURA.

Græ. Χαμαίκισσος. La. Chamæcissus. Ita.

Chamecisso. Gal. Lierre terrestre.

Off. Hedera terrestris.

**C**hamæcissos folio est Hedera, tenuiore, longiusculo, ramulis à radice quinis senisue, dodrantalibus, foliosis: flore Viola albæ simili, candidiore, ac tenuiore, gustu supra modum amaro: radice tenui, candida, inutili. Nascitur in cultis. Bibunt conuenientissimè ischiadici folia, tribus obolis in aquæ cyathis tribus, tricenis quadragenisue diebus. Eodem pota modo, senis aut septenis diebus, regium morbum purgant.

**C**hamæcissos aut humilis Hedera, nō ea est planta, quæ Seplasia eodem nomine, Hedera terrestris, appellatur, maxime cum de spica tauerit Dioscorides, & notæ sibi inuicem non respondeant.

### Chamæleuce. CAP. CXI.

o Nomenclatura



## NOMENCLATURA.

Græ. χαμαίπευκη. La. Chamæpeuce.

Ita. Chamæpeuca.

**C**hamæpeuce lumborum doloribus propitia est, herba uirens, incuruis folijs, surculisq<sup>3</sup>, flore Rosaceo.

**C**hamæpeuce (nam ita, & doctè à Plinio legendum) & non Chamæleuce, folio constat Piceæ simili, pusillo, inflexo, inflexis & ramulis, flore roseo, non temerè à quouis cognita, licet Cordus Germanicè Senutammen, nominet. Proinde sustinendum parumper de ea pronuntians iudicium.

Buglossum, seu Lingua bubula.

## CAP. CXII.

## NOMENCLATURA.

Græ. Βουγλωσσον. Lat. Buglossum. Ita. Bor-

ragine. Gal. Borrache.



Buglossum.

**B**uglossum nascitur in campestribus, & sabulosis. Iulio mense colligitur. Aiunt eam quæ treis thyrsos emittit: cum semine & radice tritam, potamq<sup>3</sup>, cōtra tertianos horrores prodesse: quæ quatuor, ad quartanos. Ea in uino decoquitur. Herbam abscessibus utilem esse uolunt. Verbasco simile est, folium in terra sparsum, nigrius, asperum, bubulas imitans linguas. Quod in uinum deiectum, animi uoluptates auget.

Buglossum



**B**vglossum per Apuleium Lucanis, Corrago dicebatur. B. in. C. metathesi. Et id verum est, Borraginem vulgarem, ipsissimum esse Bvglossum. Huius Borraginis species est, quam Officina Bvglossam vocat. Seritur nostro hoc tempore in hortis Italicis, Bvglossi genus allatum ex Hispania, quod Bvglossum domesticum vocant, magis ad Discoridis descriptionem accedens, quam Borrago hortulana. Bvglossum temperamento est calido & humido, & vino iniectum, animi letitiam & voluptatem parit.

## Cynoglossum. CAP.

## CXIII.

## NOMENCLATURA.

Græ. κυνόγλωσσοῦ. Lat. Cynoglossum.

Ita. Cynoglossu. Gal. Langue de chien

Off. Lingua canina.

**C**ynoglosson folia latifolia Plantaginis habet, arctiora, minor, languinosa: caule racat, & humi sternitur. Prouenit in sabuleis. Folia Cum suillo adipe ueteri, medentur moribus canum, alopecijs, & ambustis. Emollit aluum, decoctum herba ex uino potum.

**C**ynoglossam videre est in macris per Gallias, & arenosis locis, multum a Seplasia dissidentem, ramusculis bicubitalibus, flore purpurea, semine in lappaceis umbilicis rufo & exili. Errant qui Lycopsis & Cynoglossam, pro eadem planta accipiant.

## Phyteuma. CAP. CXIIII.

## NOMENCLATURA.

Græ. φύτευμα. La. & Ita. Phyteuma.

**P**hyteuma folia habet Radicula, minora: copiosum semen, perforatum: radicem paruam, tenuem, per summa terræ nitentem: ~~quoniam amara est, & in conuulsione venter non movetur.~~

0 2 Phyteu



**P**Hyteuma amatoris apta lenocinis, à nobis ignorabitur, nisi hanc Venus quæpiam, vel Cupido promouerint.

## Leontopodium. C A P.

### C X V.

#### NOMENCLATURA.

Græ. λεοντοπόδιον, Lat. Leontopodio.

Ita. Leontopodo. Gal. & Off. Cruciata.

**L**eontopodium diuim digitorum herbula est, folia ferens angusta, longitudine ternum quaternumue digitorum, hirsuta, quæ iuxta radicem lanosiore flocco canescunt, capitula in summo caule quasi perforata: flores nigri: semen usque adeo spissa lanugine inuolutum est, ut sæpe fallat: radice parua coheret, ~~quæ iuxta radicem lanosiore flocco canescunt, capitula in summo caule quasi perforata: flores nigri: semen usque adeo spissa lanugine inuolutum est, ut sæpe fallat: radice parua coheret,~~  
~~quæ iuxta radicem lanosiore flocco canescunt, capitula in summo caule quasi perforata: flores nigri: semen usque adeo spissa lanugine inuolutum est, ut sæpe fallat: radice parua coheret,~~  
~~quæ iuxta radicem lanosiore flocco canescunt, capitula in summo caule quasi perforata: flores nigri: semen usque adeo spissa lanugine inuolutum est, ut sæpe fallat: radice parua coheret,~~

**L**eontopodium, suis artibus sufficiens Cupido, ab hominis notione: sustulit. Siquidem cogi Cupidines nolunt, ducere assueti.

## Hippoglossum. C A P.

### C X V I.

#### NOMENCLATURA.


Græ. ιππόγλωσσον, La. Hippoglosson. Bislingua.

Off. Vnularia. Gal. Langue de villain.

**H**ippoglosson frutex est folia habens Rusci tenuis figura, & spinosam comam, & in summo, seu linguas e folijs exeuntes. Capitis dolorem corona ex comis imposita minuit. Malagmatis radix succusq. admiscetur.

**S**atis id conuenit Hippoglosson, & Italarum Bonifaciam eandem esse plantam. At Bonifaciam & Alexandrinam Laurum diuersas esse plantas, in capitis de Lauro Alexandrina annotationibus commostrabitur. Hippoglosson valentissima in matricis affectus planta. Foliorum radicisve puluis coclearis mensura præbitus, matricis suffocationi præsentia





\* Hippoglosson.

Gal. L'Oeil de chat.

sentaneum est remedium. Hæc hernia, intestino in scrotum de-  
eidente, eximie subuenit, hausto  
sub orientem solem, huius cum  
carnium iure puluere, verum in-  
testinum primis diebus ex hernia  
erupturum videtur, sed postea  
consolidatur, & in pristinum sta-  
tum redit, ideoq; braccis hæc ex-  
terior eruptio coercenda. Blasie e-  
tiam auxiliatur.

## Antirrhinum.

## CAP. CXVII.

## NOMENCLATVRA.

Gr. ἀντίρρινον, Lat.  
Antirrhino. It. Antirrhino

**A**ntirrhinon, alij Anarrhinon uocant, herbam caule &  
folijs Anagallidi similem: flore albæ Violæ, purpureo:  
deoq; sylvestris Anagallis nominata est: semine utuli narium  
simili. Tradunt perunclos ea, cum oleo Lilino, uenustiores fieri:  
nec ullo medicamento lædi posse, si quis appensum gestet.

**A**ntirrhinon maioribus est quam Anagallis folijs, cætera simile, in  
campestribus & asperis nascitur. Facultate Asteri Attico, licet in-  
ficaciori, propinquum.

## Catanance. CAP.

## CXVIII.

0 3

Nomenclatura



## NOMENCLATURA.

Græ. κατανάγκη. Lat. &amp; Ita. Catanance.

**E**X eo genere una, folia Coronopi habet, longa, radicem, Iunci modo, prætenuem: capitula sena, septenauæ, in quibus Erui semen inest. Arescens in terram flectitur, & se contrahit ad speciem unguium milui exanimati. Altera Mali patua magnitudinem explet, radice exigua Oliuæ magnitudine: folijs quoque Oliuæ colore, & figura, mollibus, diuisis, humi inclinatis: semen, ut Cicer, minutum, in uirgulis dependet, punicei coloris, multis foraminibus pertusum. Vtramque narrant in amatoria expeti. Thessalica mulieres his uti traduntur.

**T**Hessalica, in amore, veneficijs vsurpata Catanance vtraque species, nihil r fert si à nobis non cognoscatur. Nam id iuris in homines Cupido exercet, vti herbaceis nihil necessum habeat auxilijs vti.

## Tripolium. CAP.

## LCXIX.

## NOMENCLATURA.

Græ. τριπόλιον. Lat. Tripolion. Ita. Tripolio.

Gal. &amp; Off. Turbith.

**T**Ripolion in marinis nascitur locis, quæ allidit unda, recedensq; dimittit, neque in mari, neque in sicco: folio Glafsi crassiore: palmeo caule, in mucrone diuiso. Eius, ut tradunt, flores colorem ter die mutant, manè candidi, meridie purpurei, serò punicei conspiciuntur: radice alba, odorata, calidi gustus. Quæ drachmis duabus in uino pota, aquam, urinamq; per aluum extrahit. In medicamenta digeritur, quæ uenena arcent.

Serapio




Serapionis & Auicennæ Turbith: (quod ipsum est Tripollum) non est Turbith Officinarum. Nam licet hoc candidum sit & solutiuum, nullam tamen odori fragrantiam, nec gustui acrimoniam reddit. Mesue Turbith, ex Aëtuario, Alypi est radix, atque adeò ipsum Turbith, quod hodie Seplasia vtuntur. Quod verò ex S. Angeli monte Turbith afferretur, Thapsia, & per aëtuarium, Pityusa est radix. Proinde verum Dioscoridis Tripollum & perinde Serapionis & Auicennæ Tribith, nobis erunt incognita. Attamen Tripoly radix, temperamento est tertio ordine acri & calido.

## Adiantum. CAP. CXX.

### NOMENCLATURA.

Græ. Ἀδίαντον. Lat. Adiantum. Ita. Adianto.  
Off. Capillus Veneris.



Adiantum



Politrychon.

0 4

Adian



**A** Dianton, Polytrichon, pusilla gerit folia: similia Coriandri, in summo incisuris diuisa: cauliculi, quibus exoriuntur nigro colore nitent, prætenues, palmum alti: radice supernacua, neq; caulem, neque fructum, neque florem profert. Decoctum herbae potum, prodest spirandi difficultati, suspiriosis, lieni, & felle suffusus, & urinae difficili, calculos frangit, aluum sistit, serpentium morsibus auxilio est. Contra stomachi fluxiones in uino bibitur. Secundas ciet, & menstrua. Sanguinis reiectiones inhibet. Contra serpentium morsus cruda herba illinitur, alopecias densat, strumas discutit, furfures, & manantia capitis ulcera, ex lixiuio emendat. Defluentes capillos continet, cum Ladano & Myrtino, & Susino, aut Hyssopo, uinoq; Decoctum eius cum lixiuio, & uino infusum, idem præstat. Coturnices & gallinaeos pugnatiores facit, in cibos eorum additum. Seritur gratia utilitatis pecorum: circa ouilia. Umbrosis, & palustribus, circa parietum aspergines, & fontium specus enascitur.

### Filicula, seu Trichomanes.

#### CAP. CXXI.

#### NOMENCLATURA.

Gr. Τριχόμανες. Lat. Trichomanes. Ital.

Trichomane. Off. Polytrichon,

**T**richomanes nascitur eisdem in locis, quibus Adianton Filici simile, sed exilius: folijs Lenticulae, tenuibus, in ordinem utrinque digestis, aduersis in se, in ramulis tenuibus, acerbis, fusco colore splendentibus. Eadem quæ & Adianton præstare posse constat.

**Q**ui Theophrasti caput decimum tertium, libri de historia plantarum septimi legerit: Plinij, in libri vicesimi secundi capite vicesimo primo, errorem deprehendet, qui Adianti, quod in eodem auctore est secundum genus, Trichomanes, seu Filiculam faciat, quæ seplasis est Polytrichon. Atenim Adiantum nigrum Theophrasti, illa est planta, quæ seplasia pro Capillo Veneris, & usu




et usu & nomine pducunt. Nigrū autē, quod nigro colore cauliculi splē  
 escāt, dicitur. Albū vero, quod cū Trichomane, & vulgari officinarū  
 polytricho, veteribus muris, & fluniorū cauernulis & humētibus tu-  
 nulis innascitur, folijs in viridi obscuris, minutim incis, & per luteas  
 inferiori parte maculas distinctis, caule gracili, in viridicādicāte, fir-  
 mo & flexili. Id quidā Rutā murariā, alij Saxifagiā vocāt. Nec ob id  
 amē ea erit Saxifagia, quae inter saxa erūpit. Siquidē Epithymo simi-  
 s, capillacea in totū est frōde, qđ multū à cādido Adiātō distat. Adiātū  
 medio est inter frigidū & calidū tēperamēto, desiccāt tamē discutit & di-  
 erit. Filicula, gustu est, ex acri, dulci, & amaro permixto, & in radice  
 cerbo.

## Xanthium, siue Lappa. C A P.

## C X X I I.

## NOMENCLATURA.



Xanthium.

Gr. Ξάνθιον. Lat. Xan-  
 thion. Ital. Lappola  
 minore.

Gal. Glouteron. Off.  
 Lappa inuersa.

**X**anthium nascitur  
 lato & pingui solo,  
 & lacubus exiccatis, caule  
 cubitali anguloso, pingui, pro  
 deuntibus ex eo crebris alis.  
 Folia Atriplicis habet, inse-  
 Ela, Nasturtium odore imi-  
 tantia: fructum grandis Oli-  
 uae modo, rotundum, & ut  
 Platani pilula, spinosum, qui

o s con



contactu uestibus adhaerescit. Is antè collectus quàm perfectè siccescat, tunditur, & fictili uase reconditur. Flauos autem facit capillos, si acetabuli instar tepida aqua madescat, mox caput, Nitro antè perfrictum, illinatur. Alij in uino tidunt, & ita afferuant. Semen aptissimè tumoribus imponitur.

X Anthion publicis vbique itineribus & lacubus exiccatis nascitur. Phasganion Galenus vocat, & eius semini vim digerendi tribuit.

**Aegilops, siue Festuca. C A P.**

**C X X I I I.**

**NOMENCLATURA.**

Græ. Αἰγίλοψ. Lat. Aegilops.

Ita. Egilopa.

**A**egilops herbula folia tritici habens, sed molliora, in summo capite semina bina ternaque rubra, quibus arista quasi capillacea exeunt. Illita cum farina herba, aegilops medetur: duritias discutit. Succus farinae admixtus siccatur, & eorundè gratia reponitur. Bromus herba Aegilopi similis, exiccatoria vim habens, decoquitur cum sua radice in aqua ad tertias, & iuricolato par modus Mellis adijcitur: rursus incoquitur, dum liquidi Mellis crassitudo fiat. Linteum eo humore imbutum, & naribus inditum, contra graueolentiam ulcerum efficax est. Aliqui tritam Aloën addunt, & eo modo utuntur. Cum siccis Rosis cocta in uino, grauem oris halitum emendat.

**A**egilops hordeaceis & speltaceis campis innascitur. Atenim inter hanc, & Auenam, quauis longè spectantibus nihilum distare videantur, grandis est differentia. quod facile cuius, qui caput hoc, cum secundi libri cap. octogesimo sexto contulerit, manifestum erit. Aegilops vim habet maturandi, quod è gustu, qui leniter acris est noscitur.

**Glaux. C A P. C X X I I I I.**

**NOMENCLATURA.**

Græ.



Græ. γλαυξ. Lat. Glaux. Ita. Glauco.

Gallicum nomen non  
habet.

**G**laux Cytiso & Lenticula folijs similis, quæ supernè ui-  
rent, auersaq; candidiora spectantur: ramuli à terra exi-  
unt quini senue, tenues ab radice, dodrantem alti: flores ceu  
iola albæ, purpurei exeunt, minores tamē. Nascitur iuxta ma-  
ris. Coquitur cum hordeacea farina, sale & oleo in sorbitione,  
ad reuocandam extincti lactis ubertatem.

**G**laux, Ruellio, ut apparet, & Cordo cognita, huicque non in ma-  
ritimis tantum nasci, sed in siccis etiam, & apricis montibus, &  
abruptis vjs inuenitur. Sed cum neuter vernaculum nomen proferat, è  
Ruellio coniicit Matthiolus, illum de herba quam Itali, Galegam, &  
autam caprariam vocant, intelligere. At flores obstant & ramuli, qui  
non raro bicubitales sunt: & natales differunt: Glaux in maritimis na-  
scitur, Galega abundè vbiq; prouenit.

**Polygala. CAP. CXXV.**

NOMENCLATURA.

Græ. πολυγαλον. Lat. & Ita. Polygala.

**P**olygala palmi altitudinem petit: folijs Lenticula, gustu ad-  
stricto. Quæ pota, lactis abundantiam facit.

**P**olygala, nisi aliquo prodente Mercurio, incognita in Lacteo orbe  
delitescet. Nā Dioscoridis & Plinij in ea describenda breuitas, omne  
iudicium sustulit.

**Osyris. CAP. CXXVI.**

NOMENCLATURA.

Græ. οσυρις. Lat. Osyris. Ita. &

Off. Linaria.

**O**syris frutex est niger, ramulos ferens tenues, lentos, fra-  
ctūq; cōtumaces: et in his folia, quaternaria, quina, senaria,  
ut ceu Lini, nigra in initio, dein colore mutato rubescentia. Decoctū  
eius potum, iuuat arquatos,

Osyris,



**O** Syris, quod caule & folijs Linum exprimat, Linaria vocatur, & quāvis floris nihil memnerit Dioscorides, is tamen aureus est. Osyris amara est, aperit, & laxat.

## Aspera Smilax. C A P.

### CXXVII.

#### NOMENCLATURA.

Græ. σμίλαξ τραχεῖα. Lat. Smilax aspera.

Ita. Ronô ceruino.



\* Smilax aspera.

lexipharmaca, id est, ad ea medicamenta, quibus uenena arcentur.

**S**milax aspera, folia habet Periclymeni: sarmēta tenuia, multa, Rubi modo aut Paliuri aculeata, arbores scandit, ab imo ad summa perreptans, se conuoluens eis. Fert racemos exiles, qui maturi rubescunt, gustumq; leniter mordent. Nascitur in palustribus & asperis: radice dura, crassaq;. Folia & acini, & ante & post epotis, uenenorum antidota sunt. Tradunt, si infantibus nuper in lucem editis, quid ex his tritum propinetur, nulla postmodum uenena nocitura. Inciditur etiam ad alexipharmaca,

Læuis



## Læuis Smilax. CAP.

## CXXVIII.

## NOMENCLATURA.

Græ. σμιλαξ λεία. Lat. Læuis Smilax. Ita. Vilucchio maggiore. Gal. Pommes de merueilles,



Smilax læuis.

**L**æuis Smilacis folia Hederæ similitudinē habent, molliora, læuiora, tenuiora. Huius sarmenta nullis horrent spinis. Conuoluitur arboribus, ut prior: fructum parit Lupini modo nigrum, exiguum, floribus in cacumine perpetuis, multis, rotundis. Hac Smilace, quadam topiariorum arte, tentoria contra æstus molestiam faciuntur. Folia per autumnum decidua. Semine cum Dorycnio poto, ternis singulorum obolis, uaria & tumtuosa in somnis obuersari traduntur.

**S**milax aspera, Hederæ genus est, Cilicia cognomine, importata ex ea terra in Græciam. Abundē in Thuscia nascitur, & in syluis frequens arboribus circumplicata cernitur. Nec minori abundantia Smilax læuis in Thuscia prouenit. Hæc officinarum est Volubilis. Hic admonendi lectores, ne Dioscoridem & ex eo Galenum erroris insimulent, quod duas plantas diuersas cum vna sint, plantas faciant. Nec de temperamenti æqualitate contendant, aut Galenum in eo cæcutisse existiment. Vt vero longius



longius rem repetam, Phasioli, Itali fagioli vocant, candidi sunt, rubentes, lutei, & diuersis variegati coloribus. Candidi, pusilliore quam ceteri grano, aliorum leguminum more per campos seruntur. Rubentes, lutei, & variegati, seruntur in hortis, & ad fructum, & ad umbra cula. Hortenses hi Phasioli, qui diuersis coloribus constant, & ab Italis, fagioli Turcheschi, nominantur, vera sunt, Smilax hortensis, quæ à Dioscoride sub secundi libri finem descripta, nec aliud à Dolichis Theophrasti & Galeni. Porro diuersa ab ea est, Smilax aspera, quæ Italis, Hedera spinosa, & Rouo ceruino. Et leuis, Viluchio maggiori. Hæc fructum ferēs Lupini modo nigrum, flores candidos & orbiculatos, nō admodum ad Smilacem hortensem accedit, quæ siliquas profert scenigraci, semine inæqualis coloris, magna tamen ex parte flauescens. Ceterum medicinæ symmistis Dioscoridi & Galeno obloqui, num in ipsum Iouem tonantem cum Socrate oppondere est? Nec prudentioris modestia rem sibi non cognitam, alijs incompertam facere.

## Ruscus. CAP. CXXIX.

### NOMENCLATURA.

Græ. μυρσίνη ὀξυγία. Lat. Sylvestris Myrtus. Ita.  
Pongi topi. Gal. Houx. Off. Bruscus.

**S**ylvestris Myrtus, aliquibus Oxymyr sine, aut Myrtacantha, Latinis Ruscum appellatur. Folium fert Myrti, latius in formam lanceæ mucronatum. Bacca per maturitatem rubescunt, rotundæ, à medio folio dependentes, osseo intus nucleo. Cubitales ramuli ab radice exeunt, utilium modo lenti, fractu contumaces, foliosi. radice Graminis simili, acerbæ, & subamara. Folia & bacca in uino potæ urinam cient, menses pellunt, uescicæ calculos frangunt, stillicidio urinæ medentur, dolores capitis sanāt, et regium morbum. In asperis & præcipitibus locis enascitur. Decoctum radice in uino potum, eosdem præbet effectus. Cauliculi recentes, Asparagorum iace, in cibo sumuntur: amari aut sunt, sed urinam mouent.

Ruscum



Uscum spinosam plantam, Itali ab effectu, Pongii topi vocant, quod fibulis carni salsa circumpanfiliis, foliorum aculeato mucrone ea mures inhibeat. hac planta similem sui arborem habet, & Græcis Ælestri Myrtus, à foliorum similitudine dicitur. Iampridem is explorator, qui Cubebas, Oxymyrsinæ fructus putaret.

## Laurus Alexandrina. C A P.

### C X X X.

#### NOMENCLATURA.

Gr. Ἀλεξάνδρεια. Lat. *Laurus Alexandrina*. Ita. *Lauro Alexandrina*. Gal.

Laurier d'Alexandrie.

*Laurus Alexandrina* folio est *Rusci*, maiore, molliore, et candidiore: semine inter folia rubro, *Ciceris* magnitudinis: ramos spargit in terra, dodrantes, interdum longiores: radii sylvestri *Myrto* simili, maiore, molliore, odorata. Inuenitur in montosis. Difficiles partus accelerat, radice pota sex drachmarum pondere in uino dulci, & stillicidio urinae auxiliatur: sed sanguinem extrahit.

Siquidem *Laurus Alexandrina* & *Hippoglossum*, unam & eandem plantam duxisset Dioscorides, nihil necesse fuerat secretis & adeo propinquis capitibus tractasse. Adde his quod quamuis utriusque folia Rusco maiora describat, *Hippoglossum* tamen pingit spinosa coma, & summo ceu ligulas è folijs emergentes. At in *Lauro Alexandrina* nul- lum ligularum è folijs prodeuntium mentionem facit, cum eam dicat fo- lis esse Rusco maioribus, mollioribus, & candidioribus, & ramos p- ter- um spargere dodrantes, interdum maiores. Porro priuatim *Lauro Alexandrinae*, radicem tribuit Rusco maiorem, teneriorem, & odoratam, partui accelerando propitiâ, quod diuersas esse plantas, *Hippoglossum* & *Lau- rum Alexandrinum*, ostendit. Matthiolus qui *Hippoglossum* in comita- bus Goritiæ montibus viderit, Laurum Alexandrinum veram comon- rantem non inuenit. Hac calida, gustu acris, & amara est.

## Daphnoides. C A P. C X X X I.

Græ. Δαφνοειδής. La. *Daphnoides*. Ita. *Laureola*.

*Daphnoi*



**D**aphnoides cubiti altitudine fruticat, ramis flexilibus obsequiosisq<sup>3</sup>, multis, inde sursum uersus foliosis: cortex supra modum uiscosus ramos uestit: folia Lauri, graciliora, & molliora, fractu contumacia, quorum gustatu os, & fauces incenduntur: flores cādidi: bacca, cum ematuruit, nigra. Radix inutilis. Nasctur in montosis. Pituitas extrahit folium recens uel aridum in potu, menses ciet, & uomitus: caput inanit commatucatum, sternutamenta mouet. Bacca quindecim potæ, aluum resoluunt.

Chamædaphne. C A P.

C X X X I I.

N O M E N C L A T V R A.

Græ. χαμαϊδ' ἀφύη. Lat. Chamedaphne.

Ita. Laureola maschio. Off. Laureola mas.

**C**hamadaphne uirgas emittit cubitales, singulari ramulo constantes, rectas, tenues, leues: folia Lauri similitudine, leuiora multo, ac uiridiora: semen rotundum, rubens, annexum folijs. Illinuntur capitis doloribus: trita folia, stomachi ardores mulcent: ad sedanda tormina, cum uino bibuntur. Potus cum uino succus, menses & urinam ciet. Idem facit pessa appositus.

**L**aureola notissima Italiae planta, in vallis Ananie montibus magna abundantia nascitur. Errant tamen qui Laureolam, Mezereon esse putant. Nam Mezereon Chamelæa est, qua de hoc in libro scribit Dioscorides. Chamadaphne, Laureola est non absimilis, praterquā quod illa singulari ramulo constat, cui folia per ambitum insident, & in cyma rotundam umbellam efficiunt, quæ deinceps semen, Laureole simile, depromat. Et ob id eam nonnulli Laureola maschio nominant. Clematidem, primò libro à Dioscoride descriptam, quæ & Prouenca est, Chamadaphnē existimauit Plinius, quod plerosque induxit ut crederent, Prouencam, veram esse Dioscoridis Chamadaphnem. At virtutes quas

Vinea



incaperuincia tribuit Plinius libri 21. cap. 11. cum eis collata, quas  
em, Dioscoridi concinens, libri. 24. cap. 15. vera Chamædaphnæ assi-  
nat, diuersè de ijs sensisse reperiatur, nec foliorum Lauri similitudinem,  
hilum de differentia detrabere.

# Veratrum album. CAP. CXXXIII.

## NOMENCLATURA.

Gr. ΕΜΕΒΟΡΟΣ. Lat. Veratrum album. Ita. Elle-  
boro bianco. Gal. Veratre. Off. Elle-  
borum album.



*Helleborum album.*

**H**elleborum album,  
Latini Veratrum al-  
bum uocant, fert folia Plan-  
taginis, aut Beta Sylvestris  
similia, sed breuiora, & ni-  
griora, rubescentia: caulem  
cauum, quadrantalem, tu-  
nicis conuolutum cum are-  
scere cæpit: radicibus niti-  
tur multis, tenuibus, ab ob-  
longo & exiguo capite ex-  
euntibus, Ceparum modo fi-  
bratis. Nasçitur in monti-  
bus et asperis. Radices mes-  
sibus colligenda. Optimum  
habetur candidum, friabi-  
le, carnosum, modicè ex  
P tentum,



tentum, nec tamen Iunci modo mucronatum, quod frangendo puluerem emittit, & tenuem habet medullam, gustu non ad modum feruens, neque saliuam subinde ciens, huiusmodi autem strangulat. Primatum Cyrenaicum tenet. Galaticum autem & Cappadocicum, candidiora, & puluere quodam obsita, celerius strangulatus mouent. Vomitione autem uarios extrahit humores: collyrijs admiscetur, quæ caliginem oculorum discutiunt: partus impositum necat, menses pellit, sternutamenta excitat: mures interficit, cum Melle & pollenta subactum: absumit carnes, si coquatur una. Datur per se ieiunis, & cum Sesama, aut Ptisana succo, aut Halicæ, aut Lentis cremore, cum aqua mulsa, aut pulte, aut quauis alia sorbitione. Cogitur cum pane, & ita inassatur. Preparatio corporum, ac uictus ratio, diligenter tradita est, cum ab his quide medica eius potione scriptitarunt, tum maxime à Philonide Siculo Ennensi, cui nunc assentimur. Quippe longum nimis esset, in hac præsertim editione de materia, simul medicam curandi rationem exponere. Dant nonnulli in pultis sorbitione, aut copioso Halicæ cremore: aut paucum antea cibum dari præcipientes, statim Veratrum offerunt, ijs præsertim, quibus strangulationis suspicio imminet, aut ualetudo corpus infirmat. Hoc enim modo deiectio nihil periculi minatur, quod cibo munitis, non intempestiuè medicamentum corporibus offeratur. Vomitiones concitant subditæ ex co balani, cum aceto.

## Veratrum nigrum. CAP.

### CXXXIIII.

#### NOMENCLATURA.

Græ. ΕΜΕΒΟΡ & μέλας. Lat. Veratrum, nigrum.

Ita.





Veratrum nigrum.



Album.

Ita. Elleboro nero. Off. Elleborus niger.

**H** Elleborum nigrum appellatur Melampodion, quoniam caprarum pastoris nomine Melampus, furentes in se Prætidæ, primus purgasse, & sanasse fertur. Folia ei virida, Platani similia, minora, folijs Sphondyli proxima, subaspera, nigriora, pluribus diuisuris incisa: caulis asper: flores purpurei, candidi, racematim coherentes: semen Cnici, quod in Anticyra Sesamoides vocat, quo deiectiones molliuntur. Radicibus coheret nigris, tenuibus, à capitulo Cephæ simili confibratis, quarum est usus. In collibus, asperis, & sitientibus locis enascitur. Optimum est quod ex huiusmodi petitur terris, ut ex Anticyra. Nigrum inibi probatissimū gignitur. Eligi debet corpulentū & plenū, in quo tenuis sit medulla, acre gustu, feruēsque, cuiusmodi est in Heli-

P 2

cone,







usione) quemuis quaternarium, si non primum, at secundarie sanaret. Nec aliter in melancholicis, per albi infusionem successit, nullo tamen e-  
 mergente incommodo. Quod Tridentini fortassis ut frigidi, coeli causa co-  
 git, & quod probe correctum. florent tres hæ nigri species mense Mar-  
 io, purpureus maximè, in sylua, qua è Goritia in Carniole Lubianã  
 ur. Huius radices, nigriores, carnosiores, & solidiores, alijs quæ ceru-  
 æ, & subalbide sunt. Veratrum nigrum quadrupedes conficit, albo  
 s inuocuo. Veratrum statim è terra erutum, purgandum est primum,  
 & quicquid est caulium eradendum, tum in umbra siccandum & sepo-  
 endum. Pulvis valentior infusione, sed non nisi robustis offerendum.  
 dosis, A Cluario, tres oboli, plus aut minus, pro ægrotantium habitu.  
 Veratrum album & nigrum excafcientium & desiccantium tertij  
 unt ordinis, cum nigrum, gustu caliditatem ampliolem, album ama-  
 orem maiorem præferat.

## Sesamoides magnum.

### CXXXV.

#### NOMENCLATURA.

Græ. Σησαμοειδης. Lat. Sesamoides.

magnum. Ita. Sisamoide maggiore.

**S**esamoides magnum, in Anticyra Helleboru uocant, quo  
 niam albo Veratro in purgationibus misceatur. simile est  
 senecioni aut Ruta: longo folio: flore candido: radice gracili,  
 gnaua: semen gustu amaro, cætera Sesamæ simile. Ventrem de-  
 rahit datur tritum ad bilis pituitaq; deiectiones, quantum tri-  
 bus digitis capitur, addito Veratri albi sequiobolo, ex aqua mul-  
 a. Sesamoidi paruo cauliculi sunt dodrantes: folia Coronopi,  
 minora, hirsutiora: & in cauliculorum cacumine capitula, flo-  
 rum penè purpureorum, medio eorum albo: semen Sesamæ, ful-  
 um, amarum: radix tenuis. Detrahit bilem pituitasq; semen ex  
 aqua mulsa potum dimidio acetabulo. illitum ex aqua, tumores  
 ac tubercula discutit. Nascitur in asperis.

**C**um Sesamoidis utrūque genus in sola Antycira nascatur, nihil  
 mirum si hoc careamus, ac ideo incognitorum simplicium ordine  
 P 3 censebi



cenſebitur. Quauis Cordo, Sefamoidis minoris, vires, & radicum delineationem referre putet, quam ſeplaſijs Agrythæ, pro Veratro nigro venditant. At natales obſtant.

## Sylueſtris cucumer. C A P.

### C XXXVI.

#### NOMENCLATURA.

Græ. Σίνυς ἄγριος. Lat. Cucumis ſylueſtris.

Ita Cocomero ſaluatico. Gal. Cocombre.

fauuage. Off. Cucumis

Anguinus.



Cucumer ſylueſtris.

Cucumis ſylueſtris fructu ſolo diſtat à ſatiuo Cucumere, quem longè minorem parit, oblongis glandibus non diſſimilem. Folia atque ſarmenta ſatiui reſert: radice candida, magna. Naſcitur in ſabuletis, & ruderibus, frutice in totum amaro. Inſtillatus foliorum ſuccus, aurium dolori conuenit. Illita ex polenta radix, ueterem omnem tumorem diſcutit: impoſita cum reſina Terrebintina, tubercula rumpit: iſchiadicis inſunditur, podagras diſcutit, decocta ex aceto, & illita. Eius decocto dentes in dolore colluuntur. Arida farina impetiginē, lepras & uirilignes abſterget, nigris cicatris colorē reddit, & in facie maculas expurgat. Radicis ſuccus ſequiob



uioboli pondere, & item cortex, acetabuli quarta parte, bi-  
m pituitamq; deiciunt, praesertim in hypropicis: (deiectiones  
item citra stomachi iniuriam mouet) radicis selibra, in uini  
praesertim Libyci hemina conteritur, danturq; ex eo terni cyathi.  
iduo, dum tumor abunde deprimi cernatur. E fructu huiusce  
cucumeris, fit medicamentum quod Elaterium uocatur, ad hūc  
modum: Decerpti Cucumeres, qui tacti protinus exiliunt, seruā-  
tur nocte una: post die imposito supra craterem rariore cribro,  
utrisque manibus prehēsi, sigillatim supino cultro, sursum uer-  
sus aciem habente, finduntur: atque per cribrum humor in sub-  
iectum uas exprimitur: simulq; carnosum quod hēsit, cribro,  
quod facilius excidat, eliditur: quod ita pressum est, residere sini-  
tur, atque in uicinam peluim dimittitur: coacernata autem in cri-  
bro segmina, dulci aqua persunduntur, & denuo pressa abij-  
ciuntur: humor in pelui agitatur, & linteo opertus, soli exponi-  
tur, dumq; steterit, tota supernatans aqua cum humore concre-  
ta, effunditur: hoc uero identidem fieri solet, donec existens aqua  
liquefeat: qua stillatim exhausta, sedimentum mortario suscipi-  
tur, & conterendo cogitur in pastillos. Sunt qui ad hauriendam  
protinus succi abundantiam, cribratos cineres humi inspargant,  
& medium cauantes, triplicatum linteum obtendant, per quod  
elaterium cum sua humilitate diffundunt, siccatumq; in pila, ut  
dictum est, conterunt. Aliqui pro dulci aqua marinam persun-  
dentes, ita eruunt. Alij in nouissima lotionē mulsam aquam re-  
spargunt. Elaterium optimum esse constat, leue, non pondero-  
sum, cum candore leniter humectum, gustu amarissimū, quod-  
que lucernarum luminibus obiectum, facile flagret. Porraceum  
tamen scabrumq; si turbidum spectetur, atque Erui cinerisq; ple-  
num sit, graue & uitiosum esse solet. Nec desunt pui Cucumis  
succo Amylum immisceant, ut candorem ipsum & leuitatem  
imitentur. A bimatu ad decennium deiectionibus utile est.



Integer modus, obolus est: minimus, semiobolus: pueris, chalciduo: siquidem copiosius, periculum adfert. Bilem ac pituitam utrauis parte extrahit. Optima suspiriosis est purgatio. Quod si in animo sit deiectionem moliri, adiecto salis duplo, & stibij quod colorare sufficiat, ex aqua Erui magnitudine catapotia, dato, postea cyathus unus aquæ tepida sorbeatur. Ad citandas tamen uomitiones aqua diluens Elaterium, subiectas linguæ partes penitissimè pinna oblinito. Quod si quisquam difficilius euomat, oleo aut unguento Irino resoluito, somnum inhibeto. Porro his qui eximie uacuantur, continuè uinum & oleum dari cõuenit, etenim uomendo restituuntur. Quod si uomitiones non finiantur, aqua frigida, polenta, posca, poma, & quæ stomachum densando corroborant, offerenda sunt. Ciet Elaterium menses: partus enecat, in pessa subditum. Morbo regio medetur, cum lacte naribus infusum, & diuturnis capitis doloribus liberat. Efficacissimè anginis illinitur, cū uetere oleo, Melle, aut felle taurino.

**C**ucumber Anginus Asininusue satis cognitus. Elaterium verò Cucumeris sylvestris est succus exiccatus, & in pastillos redactus. Porro in textu, ubi in præstantioris Elaterij delectu legitur, Quodq; Lucernarum luminibus obiectum, facile flagret: legèdū, facile extinguat, idque è Theophrasti autoritate, Qui Elaterio tantum humoris inesse describit ut quinquaginta annorum lucernam cui admoneatur, extinguat. Quod ipsum & Plinius testatur. Elaterium tenuium cum caliditate est partiū, valentis amaroris, caloris imbecilli, eaque de causa digestoriū. Radicis & foliorum Cucumeris agrestis succus, quæ Elaterium, sed inuolidius potest. Attamen radix proximius accedit, nempe abstersoria, digestoria, & emolliens. Cortex magis desiccatur.

## Staphis agria. C A P. CXXXVII.

### NOMENCLATURA.

Gr. Σταφίς ἀγρία. Lat. Staphis agria. Ital. Vua saluatica. Gal. l'Herbeau poulx. Off. Pituitaria.

Sta





Staphis agria.

**S**taphis agria, siue herba  
pedicularis, folia habet  
Labruscæ diuisa: & caulicu-  
los rectos, molles nigrosq̃.  
Fert florē Glasti: & follicu-  
los uirides, similes Ciceri, &  
in his nucleum triangulum,  
scabrum: ex nigro subfulues-  
centem, intus album, gustu  
acrem. Grana quindecim, si  
tritu in aqua mulsā dentur,  
crassum humorem per uomi-  
tum purgant, sed qui hause-  
runt, ambulare debent. Pru-  
denter tamen attendere oportet,  
& aquam mulsam con-  
tinuò potui quoniam pericu-

strangulationis inferunt, & fauces adurunt. Trita, & ex  
leo illita, phthiriasi prodest: item prurigini & psoris. Cit plu-  
rimam pituitam commenducata: cocta in aceto, dentium dolori  
olluto ore, subuenit, rheumatismum gingiuarum sistit. Vlcera  
oris manantia, cum Melle sanat. Vrentibus malagmatis impo-  
nuntur.

**S**taphis agria, quæ & Pedicularis, & Pituitaria, in Apuleia Cala-  
bria, Istria, & Sclauonia, nascitur. Hoc in apophlegmatismos & vn-  
guenta pedicularia, vtuntur seplasia. Staphis agriæ è summa acrimonia  
constat, & absterforia est, verum exulcerat.

## Thapsia. CAP. CXXXVIII.

## NOMENCLATURA.

Gr. Θάψια. Lat. Off. Ita. Thapsia.

P

3

Tha



**T**Hapsia nomen ideo accepit, quòd in Thapso, eiusdem nominis insula, primum inuenta sit. Tota uerò natura Ferula similis est: graciliore caule: folijs Fœniculi: umbella Anethi in cacumine, à singulis surculis erumpente flore luteo: semen quale Ferula, latum, sed aliquanto minus. Radix foris nigra, intus candida, longa, acris, crassiore libro uestita. Lactis extrahendi ratio hæc est: Facto in ambitu scrobe, cortices inciduntur: aut radix in fornicis speciem in se excauata cooperitur, quòd merus succus confluat. Oportet illuc sequenti die se conferre, & congestum succum extrahere. Tunditur etiam radix in pila, & succus organo per quallum expressus, fictili crasso insolatur. Aliqui foliū unā terunt: sed inualidior huiusmodi succus. Hoc autem interest, quoniam qui ab radice manauit, grauius olet, & humidus permanet: è folijs autem extractus exiccatur, atque teredinum iniuriā sentit. Qui succum colligit, stare debet non obuersus uento: aut potius, cum dies apricus est, & à flatu silet: quoniam ob halitus acrimoniam facies uehementer intumescit, nudaq; corpora inuadunt pustula: ob id prius liquido cerato & adstringente, nudas partes illinunt, & ita muniti accedunt. Tam cortex radice, quam succus, purgandi uim habent. Lacteus succus in aqua mulsa potus, utrinque bilem extrahit. Radicis modus, quaterni oboli, cum tribus seminibus Anethi drachmis: succi, terni oboli, lactis, obolus unus. quod eo amplius assumitur, periculosum est. Huiusmodi purgatio conuenit suspiciosi, & diurnis laterum doloribus, reiectionibusq; datur in cibis aut obsonio, quibus difficile sit uomere. Tam radix quam succus omnium maxime, quæ pares cum eis uires adepta sunt, uim habent extractoriā ex alto, ubi ex imo aliquid euocandum est, aut meatuum laxitas aliò transferenda est: unde succus illitione, aut radix recens affrictu, alopecias explent. Radix succusq; cum æquis ceræ Thurisq; portionibus, sugillata liuoresq; tollunt: sed non plus binis horis dimit



mittantur: locus deinde aqua maris calida foveatur. Vicia cum in facie emendat, cum melle illitus succus, lepras tollit, tubercula discutit, perunctus cum sulphure, in diuturnis pulmonum, terum, pedum, articularumq; uoletudinibus utiliter illinitur: ulet ad integendam colic glandem, ijs qui natura, non circumfusione, curti sunt tumorem enim excitat, qui pinguium foteuollitus, præputij iacturam refarcit.

**T**hapsia herba nomen indidit Thapsus insula, ubi primum reperia est. Hæc nostro tempore Italia non ignota, non in Apulia tantum, quo loci ferulaceæ planta nascitur, prouenit, sed in maritimis etiam peninsulis. Padua & Venetijs in hortis uisitur, Ferula adsimilis. Quotannis ex Apulia veniunt herbarij, Thapsiæ radices elibrant, ac Ostea Turbith uice hos cortices euendunt. Si ad eadem quæ Turbith ualent. Thapsia acris & potenter calida, & perinde humida est, siquidem cito corrumpitur.

## Spartium. C A P.

### CXXXIX.

#### NOMENCLATURA.


Græ. σπάρτιον. Lat. Spartion. Ita.

Genestra. Gal. Geneft.

**S**partion frutex est longus, ferens uirgas, sine folijs, firmas, fractu contumaces, quibus uites uinciuntur: semē Lenticula, in folliculis Phasiolorum modo nascens: florem, ut albæ Violæ, luteum. Purgant per superna uehementer, Hellebori uice, citra periculū flores & semina, quinīs obolis in aqua mulsā pota. Semen deiectionem mouet. Ramis in aqua maceratis, mox tuis, extractus succus, ischiadicis & angina laborantibus auxiliatur, si cyathi modum ieiuni bibant. Quidam marina aqua macerare malunt, & infundere ischiadicis clystere: strigmenta autem elicit cruenta.

Spartion





Sparton.

**S**parton seu Genista notissima planta, duum est generū. Nam vna in fuues torquetur, & hac corbes texuntur, Vitis passis & ficibus asseruandis. Altera validioribus constat virgulis, quam vt ex his simile quiddam facitetur. Seminis & virgularum Geniste succus, attractoriae virtutis est.

**Silybū. C A P. C X L.**

**NOMENCLATVRA.**

*Græ. σίλυβον. Lat. Silybon. Ita. Silibo.*

**S**ilybon lata spina est, folia ferens Chamaleonis albi. Hæc recens cum sale oleoq; cocta estur. Radicis succus drachmæ pondere potus, uomitiones ciet.

**I**ncompertum Silybum in Naturæ hortum, cum sui similibus plantis ablegabitur, cum illa voluerit, noscitandum.

**Glans unguentaria. C A P. C X L I.**

**NOMENCLATVRA.**

*Græ. βαλανόμυρεψικη. Lat. Glans unguentaria. Ita. Ghianda unguentaria.*

*Glans*



**G**ans unguentaria, fructus est arboris Myricæ similis, magnitudine Auellanae nucis, cuius nucleus græcarum nucum more tritus, humorem reddit, quo ad preciosa unguenta et oleo utuntur. Nascitur in Aethiopia, Aegypto, Arabia, et Petra oppido secus Iudeam. Præfertur plena, recens, candida, quæ facile delibretur. Ea drachmæ pondere pota, lienem abimit. Cum Lolij farina et aqua mulsa, podagricis illinitur. Foras leprasque decocta in aceto: uiligines et nigras cicatrices cum Nitro, emendat. Et cum lotio, lentigines, uaros et papulas in facie, et cutis uitia tollit. Vomitiones mouet, aluum cum hyssopomelite resoluit: stomacho aduersatur. Oleum quod ea exprimitur, aluum potu ciet, Cortex eius magis adstringit, uerum tunc et expressæ succus abstergentibus medicamentis adijcitur, quæ aduersus pruriginis et scabritias idonea sunt.

**N**vx unguentaria, quam Græci Myrobalanon, et Balanon Myrsicon vocant, nostro tempore copiose in Hispania nascitur, apudque unguentarios uisitur, Ben nomine. Fructus in totum Pistacijs similis, fragilior tamen, cortice candida, fæcto admodum nucleo, crasso, et oleoso, e quo oleum, quod Ben uocitant extrahitur, nulli senio aut mucori subditum. Id maximè ducitur ab unguentarijs, ad distemperandos odores. Ostenduntur nostro sæculo radices, Been rubentis, et candidi cognomine, quas seplasia in medicinas cordiales usurpant. Sed neutra, uerè Been est radix. Nam Serapioni Been radices, Pastinacæ minoris similes, contortæ, odoratæ, et commanducatu viscida, ex Armenia asseruntur. Nostræ et cælo et vi distant.

## Narcissus. CAP. CXLII.

### NOMENCLATURA.

Græ. ναρκισσος. Lat. Narcissus.

Ita. Narcisso.

**N**arcissum sunt qui ut Liliū, Lirium appellarint, folia Porro similia, tenuia, multo minora, et angustiora: caulibus uacuis, et sine folijs, supra dodrantem attollitur: flos albus, intus



intus croceus, in quibusdam purpureus: radix intus alba, rotunda, bulbosa: semen uelut in tunica, nigrum, longum. Probatissimus nascitur in montibus, suauis odore. Ceteri Porrum imitantur, atque herbaceum uirus olent. Radix cocta, siue estur, siue bibitur, uomitoria est. Ambustis igni prodest, cum exiguo Melle trita. Precisos nervos illitu glutinat. Luxatis malleolis, diuturnisq; articulorum doloribus trita ex Melle & imposita, subuenit. Vitia cutis in facie, uirilignesq; cum semine Vrticæ & aceto emaculat. Cum Eruo & Melle, ulcerum sordes expurgat. Abscessus rumpit concoctioni repugnantes. Infixa corpori extrahit, illita cum Lolij farina & Melle.

**T** Hespensium in Bæotia commentum est, adolescentem Narcissum suumet amore captum, in sui nominis florem conuersum. A narce, id est, torpore, dictum censet Plinius, quoniam caput grauet, non a sabuloso puero, floreque constare vel purpureo, vel herbaceo. Faciem alij aliter referunt. Et reuera Narcissi diuersa sunt specie, & coloribus in flore varijs. Albi Rosæ muscatis similes, Venetijs spectandi in horto praeclentissimi medici D. Maphæi a Maphæo. Narcissi radix, desiccata abstergit, & attrahit.

Hippophaës.

CAP.

CXLIII.

NOMENCLATURA.

Græ. ἵπποφαῖς. Lat. Hippophaes.

Ita. Hippophae.

**H**ippophaës, quo fullones uestes interpolant, in sabulosis maritimisq; nascitur, surculaceo frutice, undique denso et largo: folijs Oleæ, longioribus, mollioribusq;: inter quæ candicantes spina emicant, sicca, angulosa, interstitio quodam distantes: flores Hederæ corymbis similes, racematim coherent, minusculi tamen, & molles, candidi, ex parte rubescences. Radix lacteo succo madet, crassa, mollis, amara gustanti. Ex qua, perinde ac Thapsia,



Thapsia. Succus eximitur, qui per se, & cū Erui farina subactus, exsiccat, & ad usum reconditur. Syncerus pituitas, bilē, aquasq; detrahit, oboli pondere: Erui uerò farina subactus, quatuor obolis, cum aqua mulsa dimidia hemina tritus datur. Radice & herba liquamentum depromitur, uti in Thapsia. Huius in purgationibus modus est drachma.

**D**Va ha planta nobis incognita, ad Chironis centauri palingenesiam, remanebunt. Nam ipsum nomen, equorum naturæ accommodatas ostendit.

### Hippophæstū. CAP. CXLIII.

#### NOMENCLATURA.

Gr. ἵπποφαιστον. La. Hippophæsto. It. Hippophesto.

**H**ippophæston, id quod aliqui Hippophæes appellant, nascitur eisdem locis quibus Hippophæes, estq; spinæ fulloniæ genus, humilis herba, sine cauliculo, sine flore: inanibus tantum capitulis: folijs paruis, spinosis: radículas habens molles, crassas. Succus radice, folijs & capitulo exprimitur, & exsiccat. Datus, cui uoles, tribus obolis, in aqua mulsa, aquam pituitasq; detrahit. Priuatim comitialibus morbis, neruorum uitijs, & orthopnææ conuenit huiuscemodi purgatio.

### Ricinus. CAP. CXLV.

Græ. ῥιζινον. Lat. Ricinus. Ita. Fagiuolo Turchesco. Gal. & Off. Palma Christi.

**C**ici, aut Croton, nomen accepit à Ricini animalis similitudine. Arbor prouenit parua Ficus altitudine, folio Platani, maiore, leuiore, & nigriore: ramis, caudicibusq; cauis, in Arundinis morem: semine in uuis asperis, quod corticibus exutum, Ricinum animal representat: ex quo oleum, nomine Cicinum, exprimitur, cibus fœdum, lucernis emplastrisq; utile. Grana triginta numero purgata, trita potu, pituitas, bilem, aquamque





Ricinus

boum, caprarum, equorum & exterorum animalium dorso inharens, non prius à suctu secedit, quàm rumpatur. E semine oleum fit ad lucernarum lumina. Id purgat, mundat, & digerit. Quod ex eo exprimitur oleum, communi calidius & humilius est, eaq; de causa valenter digerit.

que per aluum extrahunt, uomitiones mouent, sed in iucunda admodum est, & molesta purgatio: siquidem stomachum uehementer subuertit. Tusa & imposita, uitia cutis in facie, uarósque expurgat. Folia cum polenta trita, inflammationes oculorum, tumoresq; leniunt, rigentes mammas cohibent: eadem ex aceto illita, ignes sacros restinguunt.

**R**icinus inde dictus, quod semen habeat Ricino insecto simile. Id animalculi, canum,

## Tithymali. CAP.

## CXLVI.

## NOMENCLATURA.

Græ. τιθυμαλ. Lat. Tithymallus.

Ita. & Off. Esula. Gal.


Herbe à lait.

Tithy





Tithymalus. 1




Tithymalus. 2

**T**ithymalli genera septem, quorū masculus, Characias ap-  
pellatur, ab aliquibus Amygdaloides: alter, Myrtites,  
qui scēmina existimatur, eumq<sup>3</sup> Myrsinitem aut Caryitem uo-  
cant: tertius, Paralius, quem Tithymalida appellarunt: alius,  
Helioscopius: quintus, Cyparissias: sextus, Dendroides: septi-  
mus, Platyphyllos dicitur. Characia caules supra cubiti altitu-  
dinem attolluntur, rubri, lacteo succo atque acri madentes: fo-  
lijs Olea circum ramos, angustioribus, & longioribus: radice  
crassa, lignosa: pendet in cacuminibus caulium, coma iunci, sub  
qua caueola foliolis balnearum similes, in quibus semen conti-  
netur. Nascitur in asperis & montibus. Succus aluum purgat:  
rahbit pituitam bilemq<sup>3</sup>, binis obolis in posca sumptis: & cum  
aqua mulsā, uomitiones mouet. Appetente uindemiarum tem-  
pore,

L

pore,





Tithymalus. 3

pore, succus congestis ramulis, mox dissectis, & uase conclusis, excipitur. Aliqui adijciunt farinam Erui, & in pastillos digerunt, qui Erui magnitudine impleat.

Alij in aridas ficos, ternas quaternasue guttas instillant, ut cum his inarescant: quas ad usus recondunt.

Per se etiam tusus in pila, & in pastillos coactus reponitur.

Porro cum extrahitur lac, neque quo uentus aspiret, stare quenquam, neque manus oculis admouere conuenit: sed antequam colligas,

corpus, praesertim faciem, collum, scrotumq; genita-

lis, adipe aut oleo cum uino perungere. Fauces autem exasperat: quapropter catapotia cera aut decocto Melle oblini par est, & hoc modo dari: binas tamen ternasue ficos, purgationis gratia sumpsisse, satis est. Recens lac ex oleo, perunctos in sole capillos euellit, renascentesq; flauos & exiles efficit: denique omnes perimit. Dentium cauernis inclusum, leuat dolores: sed cera dentes oblinendi, ne suo delapsu, fauces & linguam uitiet: tollit illitu impetigines, formicantes uerrucas, pensiles, & quae Thymi florem representant. Valet aduersus pterygia, carbunculos phagedenas ulcerum, gangrenas, fistulasq;. Legitur semen autumno, & siccatum sole leuiter tunditur, seruesactumq; loco mundo reponitur. Fo-

lia



ha item siccantur. Semen & folia lactei succi effectum praebent, dimidio acetabulo pota. Sunt qui inueterant, admisto cum lacte Lepidio, caseo contuso. Radix dragmæ pondere in hydromelite pota, per inferna trahit. Decocta cum aceto, dentium dolori auxiliatur, colluto ore. Fœmina, quam Myrsiten, aut Caryiten uocarunt, similis suapte natura Daphnoidi: folijs Myrti, sed maioribus, firmis, in cacumine acutis, & pungentibus: ramulos ab radice mittit dodrantes: fructum fert alternis annis, Nuci similem, mordaci gustu. Nascitur in asperis. Succus, radix, semen, folia, consimilem antedicto sortiuntur facultatem: sed ad citandas uomitiones inualidior hæc est. Aliud Tithymali genus dicitur Paralios, quem Tithymalida, aut Mecona aliqui appellauere. Nascitur in maritimis, ramis subrubentibus, palmum altis, quinque senisue à radice exeuntibus: folijs Lini, angustis, paruis, oblongis, in uersus quosdam digestis: capite in cacumine orbiculato, in quo semen ut Eruum, uario colore emicat. Flos albus. Frutex totus cum radice lacteo succo turget. Similes ad usus reconditur. Helioscopius dicitur, folijs Portulacæ, tenuioribus, rotundioribusq; ramulis prodeuntibus à radice, quatuor aut quinque, rubentibus, dodrantali altitudine, tenuibus, lactis copiosi plenis: capite Anethi, semine uelut in capitulis incluso. Helioscopij nomen accepit, quoniam comas cum sole circumagat. Circa oppida nascitur, potissimum in rudibus. Colligitur succus semenq; ut aliorum. Eadem quæ superioribus uires, non tamen usque adeò ualida. Cyparissias in caulem exit dodrantalem, uel maiorem, subrubrum: ex quo folia Piceæ similitudine exoriuntur, molliora tamen, & tenuiora. & in totum nascentem Piceam æmulatur, unde nomen traxit. candido succo madet, cui eadem uis quæ superioribus. In petris nascens, Dendroides cognominatur.



tur ampliter opacat: in cacumine frondosam spargens comam, succo lacteo pragāns, cauliculis rubentibus. Folijs Myrti tenuioris: fructu Characiæ. Eiusdem effectus, cuius superiores, similiq; modo reconditur Platyphyllos, Verbasco similis est. Radis, succus, & folia, per inferna trahant aquas. Pisces necat, tussus, & aqua inspersus. Reliqua Tithymalorum genera quæ supra scribuntur, idem efficiunt.

**P**Erpulchre ordine de Tithymalis scribit Dioscorides. Quod itidem Arabes non faciunt, nempe Mesue & Auicenna in nomine Alsebram. Atenim satius fuerit, dum suis oculis tenebras inuicem offundunt, ex illorum controuersijs emergere, quam erroris aspergine, sese mutuum commaculare. Porro Tithymalus Characias, siue Vallaris, nostro seculo non reperitur. Myrsinites item semina, pungentibus & Myrto similibus folijs, fructu nucis figura, nequiquam agnoscitur. Paralius seu maritinus (non ille tamen quo vulgò Seplasia vtuntur, nam hic est Cyparissias) in Senæ maritimis copiose nascitur. Thusci Herba mora, nominat. Huius radice receti & saccis immissa ad conficiendos pisces vtuntur. Palthyphyllos à foliorū latitudine, in eundem vsum à Thuscis piscatoribus vsurpatur, huncque Tortumaglio vocant, ejusdem quibus Paralius locis prodeuntem. Helioscopius, quod solem suo rotatu consequatur, ubique nascitur. Cyparissias, planta est quam Esulam minorem offcina vocant. Dendroidem, extra Terracinam vidit Mattholus, intra saxa antiqui spelæi, marino littori incumbentis, arboresceti effigie, emergentem. Tithymali omnes acres sunt, calidi, & amari. In eis plus pollet liquor: fructus & flores, secundo sunt loco. huius facultatis est radix, sed non æquabiliter. Quarti excalfacientium sunt ordinis.

## Pityusa. CAP. CXLVII.

### NOMENCLATURA.

Gr. Πύτυσα. Lat. Pityusa. Ital. & off.

Esula maggiore.

**P**ityusam specie à Cyparissias differre constat, & si Tithymalorum generi assignetur. Caulis supra cubiti altitudine assurgit geniculatus: folijs Piceæ, acutis exilibus: flore paruo uelut



uelut purpuro: semine instar Lenticule, lato: radice crassa, candida, succo referta. Quibusdam in locis frutex hic prægrandis inuenitur. Detrahit per aluum radix, drachmis duabus data in aqua mulsa: item seminis drachma. Succum cum farina subactis, cochleariū in catapotio datur. Modus foliorum drachmæ tres.

**P**ityusa nihil aliud est, quàm Officinarum Esula maior. Huius radices herbarij qui è monte Gargano prodeunt, pro Turbith venditant, nō aliter quàm de Thapsia superius diximus. Ea causa fuit Actuario scribendi, Turbith album, Alypi: nigrum vero, radicē esse Pityusæ. Quo intelligit interiorem omnē substantiam, & non tenuem & exteriorem illam pelliculam, quæ rufa, nigrorem siccando contrahit. Porro manifestum præbet argumentum Serapio, Pityusam, Esulam esse maiorem quæ Alsebram & Sebram Mesue & Auicenna dicitur, ut qui integrum de Pityusa Dioscoridis, in Scebram caput transposuerit. Quare Alsebram maior Arabum, Tithymalus latifolius esse non potest. Nasctur in Italia Pityusa, Esula minori (hæc Cyparissias est Tithymalus) in totum similis, nisi quod longè maiorem profert caulem, ramos, folia umbellam, semen, & radicem. Multis in locis, ut in Apulia, arborefcit. Visitur ingenti copia in planitie Veronensi, in qua tamen quod marum & aridum sit solum, non admodum excrescit. Pityusa vulgò vocatur, Turbith de monte S. Angeli, & à medicis vsu repudiatur, nisi in corpora vel rustica vel robusta. Ea ob succum cum Tithymalis parem, eorum generis ducitur. Et sanè purgat, & iisdem virtutibus est prædita.

## Lathyris. CAP. CXLVIII.

### NOMENCLATURA.


Græ. Λαθυρίς. Lat. Lathyris. Ita. Cataputia minore.

Gal. Expurge. Off. Cataputia minor.

**L**athyris, quā aliqui Tithymalū appellant, eamq̃, Tithymalorum numero adscribunt, caulem emittit cubiti altitudine, & digitali crassitudine, inanē. Gignūtur in cacumine alæ, & folia in caule oblonga, amygdalinis proxima, latiora, & leuiora. Quæ autē in summis ramulis exierunt, minora conspiciuntur, Aristolochiæ, aut oblongæ Hederae figura. In cacumine fructum summis surculis gerit, triplici loculamēto insignem,

2 3 rotundus





Lathyris.

ribus folia decoquuntur ad eosdem effectus.

## Peplus.

## CAP. CXLIX.

## NOMENCLATURA.

Gr.  $\pi\epsilon\pi\lambda\omicron$ . Lat. Peplus. Ital. & Off. Esula rotunda.

Gal. Reueille matin de vigne.

**P**eplos frutex est lactei succi plenus, folijs parvis, ut Ruta, paulo latioribus: rotunda coma, fere dodratali, humi respersa: semine folijs rotundo, minore quam candidi Papaveris. pluribus scatet auxilijs: unica radice habet, supernacua, ex qua fruticat. Nascit inter vites, & in hortis, colligitur mensibus. Siccatur in umbra, & continue versatur. Fructus iustus & feruesfactus recoditur. Bilis ac pituita detrahatur, acetabulo eius in hydromelitis cyatho poto. Obsonijs inspersa coturbat alium: muria coditur.

Peplis.



## Peplis. CAP. CL.

## NOMENCLATURA.

Græ. πεπλῖς. Lat. Peplis. Ital. Peplio. Ignota.

**P**eplis, quam aliqui Sylvestrem Portulacā uocant, Hippocrates Peplion, in maritimis maximè nascitur, latè opaco rutice, candidi succi pleno: folijs satiuæ Portulacæ, rotundis, inferiè rubentibus: semine sub folijs rotundo, uti in Peplo, feruète guttu: radice singulari, superuacua, tenui. Colligi, & reponi de da-  
i, uti Peplos, & sale condiri solet. Easdem habet uires.

## Chamaſice. CAP. CLI.

## NOMENCLATURA.

Gr. χαμαῖςυκη. la. chamaſyce. It. chamaſyce. ignota.

**C**hamasice aliqui Syce nomināt. Ramos emittit quaternū digitorū, teretes, succosos, in terrā deiectos: folia Lētis, parua, Pepli planè referētia, tenuia, quæ à terra nō attollūtur: semine sub folijs rotundo, ut in Peplo: neq; caule, neq; florem promit, radice firmatur tenui, superuacanea. Rami ex uino triti uulnæ dolores sedant, in pecto appositi. Tollunt tumores ac uerrucas omnium generū illiti. Decoctorum cibo aluus resoluitur. Succus simili effectu prodest. Illitus cōtra scorpionis iclū auxiliatur, aduersus caligines oculorū utilis, & hebetudines, incipientes suffusiones, nubeculas, cicatrices, cū Melle inunctus. In squalidis petrosiq; nascitur.

## Scammonia. CAP. CLII.

## NOMENCLATURA.

Græ. Σκαμμορία. Lat. & Ital. Scammonia.

**S**cammonia ramos ab una radice emittit trium cubitorum, multos, pingues & qui nonnihil crassitudinis præ se ferāt: folijs Helxinæ, aut hederaceis, mollioribus tamen, hirsutis, & triangulis: flore candido, rotundo, in calathi modum cauo,

Q 4 gra



grauolente: radice prælonga, crassitudine cubitali, candida, graui odore, succo grauida. Legitur ad hunc modum succus: Capite exempto, radix in testudinis speciem cultro excauatur, quo fit ut in cauum confluat succus, qui conchis demum excipitur. Alij scrobes in terra concamerato sinu fodiunt, in quos, subiectis iuglandium folijs, profundunt succum, siccatumq; extrahunt. Laudatur autem Scammonium leue, nitidum, rarum, & colore quàm simillimum taurino glutini, fungosum, tenuibus fistulis, quale ex Mysia regione Asia deportatur. Nec attendere solum par est: si lingua tactu albescat (hoc enim euenit adulterato, quod admisto fit Tithymali lacte) sed longè magis antea narratis. Item si non uehementer linguam exurit, id quod misti Tithymali argumentum est. Natione autem Syriacum & Iudaicum deterrima habentur, grauiora, densa, Erui farina & Tithymalo mixta. Succus drachmæ unius aut quaternum obolorum pondere haustus, ex aqua pura uel mulsa, per inferna bilem & pituitam extrahit. Ad resoluendam aluum binos obolos cum Sesama, alioue semine, sumpsisse satis est. Dantur efficacioris purgationis causa, succi tres oboli, cum duobus Veratri nigri, & Aloes drachma una. Fiunt purgatorii sales, drachmis uiginti succi Scammonia, in senos salis cyathos adiectis: Horum proportionem uirium: integer quidem, tria cochlearia, medius duo, minimus unum. Radicis drachma una aut altera purgat, cum ijs quæ retulimus. Nonnulli decoctum radicis ebibunt. Coquitur in aceto, & cum hordeacea farina teritur, captaplasmate ischiadicis utili. Partus enecat succus, uulua in lana subditus, tubercula discutit, cum Melle aut oleo illitus. Decocto in aceto, peruncta lepra abiguntur: diurni capitis dolores ex aceto & rosaceo perfunduntur.

**S**cammonia, quæ ex Alexandria, Venetijs & inde per omnes Europæ regiones exportatur, seligenda magna adhibenda diligentia: nam electa & approbata ingens penuria: adulterata, vel sexcentorum (ut ita dicam)

came



melorum onus. Nec mirum, cum hac quæ à mercatoribus emitur, Sy-  
rica, & Iudaica sit, grauis, densa, Eruifarina, & Tithymalo vitia-  
quam deterrimam Dioscorides asserit. Id parum animaduertentes  
pharmacopolæ, Scammoniam probatam existimant, quæ salua tempe-  
ta, confestum lactescit, Dioscoridi non concordēs, qui id genus è Tithy-  
mali lacte adulteratum existimat. eò deprehensum, quod vehementer  
guā exurat. Eapropter Medici si probè & sanctè sua functione vti-  
lit, pro viribus, suum quisque pharmacopolā perurgebit, vt selectio-  
m, & è Dioscoridis figura (quo planius dicam) qualificatam apud se  
beat. Nam cum Scammonia solutiuorum electuariorum basis sit &  
fundamentum, qui hanc perperam & adulteratam immittunt, multis  
causis sunt. Porro Scammoniam adulteratam & Tithymalo im-  
mixtam hinc patet. Decem, aut ad maius quindecim grana, aluum sol-  
unt quàm sepius: cum sincera, eo operi, vix vna dragma sufficeret.  
vinctiam si, per Dioscoridem, ad vnicam purgationem, Veratri albi  
& Aloes vna adderentur. Scammonia plantam Neapoli pharma-  
copola quissiam, sibi ex Apulie Gargano allatam, Matthiolo common-  
strauit. Huius nullam mentionem facit Gallenus. Mesue solutinam me-  
dicinam furiosam nominant, ac quinque eius nocumēta recenset, cuius  
medicina candidato non ignota. Porro cum Dioscorides, Scammoniam,  
delxines folijs depingat, non Parietaria, sed Cyssampeli, aut Conuol-  
uli folijs collatam, existimandum.

## Chamelæa. CAP. CLIII.

### NOMENCLATURA.

Græ. Χάμελαία. Lat. Chamelæa. Ita, Chamelea.

Gal. Boys gentil. Off. Oliuella.

**C**hamelæa surculosa fruticat, ramis dodrantalibus. Folia  
oleæ similitudinem habent, tenuiora & amara, quæ gu-  
tata linguam mordent, & arteriam deradunt. Detrahit pitui-  
am bilemque, folijs præsertim in catapotia deuoratis: namque  
Absinthij partes, adiecta Chamelæa una, hydromeli-  
e excipiuntur, & in catapotia coguntur: ea autem in uen-  
tre non liquefcunt: siquidem quotquot fuere deuorata, rege-  
runtur. Folijs cum Melle tritis, sordida ulcera & crustosa  
repurgantur.

℞ s Thy



## Thymelæa. CAP. CLIIII.

## NOMENCLATURA.

Gr. Θυμελαία. Lat. Thymelæa. Ital. Pepe montano.  
Gal. & herbarijs Lin sauuage. Off. Mezereon.

**T**hymelæa est, qua granum Gnidium, quod est semen ipsius, colligitur. Hoc Eubæi Aetolium uocant, alij uero Linum, quoniam satiui Lini frutex suapte natura similitudinem referat: uirgas edit perpulchras, multas tenuës, triped. neas: folijs Chamelææ, angustioribus, & pinguioribus, uiscosis, gummosisq; si mordeantur: flore candido: fructu Myrti in modum rotundo, qui inter initia uiret, & tandem rubescit: inuolucrum fructus durum, foris nigrum, intus album. Hoc per inferna bilem, putuitam, aquasq; detrahit, si uiginti granorum pars interna bibatur: uerum fauces adurit. Itaque cum farina aut polenta, aut in uua acino dari debet, aut Melle cocto obductum deuorari. Qui agere defudant, trito semine cum Nitro & aceto, iniunguntur. Folia quæ peculiariter Cneorum appellantur, per messes colligi debent, & siccata in umbrâ recondi. Quibus dare libeat, antea tundere, & nervos eximere conuenit. Illius acetabuli modo cum diluta uini portione, aquam extrahit. Mediocrius purgat, addita Lente cocta, aut contritis oleribus. Thymelææ farina uua acerba succo excipitur, & in pastillos diuiditur. Herba stomacho infesta. Partus imposita necat. Nascitur in montibus & asperis. Hallucinantur qui Coccon Gnidium fructum esse Chamelææ existimant, decepti quadam foliorum similitudine.

**C**hamelæam & Thymelæam, Arabes confusane Mezereon uocant, duum generum. Horum unam Mezereon album: alterum, Mezereon nigrum. Ambabus Laureolâ immiscet, distinctione intantum intrinsecata, ut nisi a Delio natatore extricari non possit. Ambae hæ plantæ validæ in euacuando atque adeo maniacâ operâ exercent, sic ut ab eis sumptis, præ nimia imbecillitate utentem conficiant, excussis viscerum membranis

aper



Artisque venarum oribus. Quod ad natales attinet, vtraque magna  
 indatia, in vallis Ananie quæ Tridentinae sunt iurisdictionis monti-  
 nascitur, ambaque ( id licet in Chamelea præterierit Dioscorides )  
 Myrtino similem producant, quamvis Thymelææ fructus, ali-  
 tum longior, & magis ad Oliuæ figuram accedat. Fructus hi pri-  
 exortu virides, rubentes dum maturescunt, postremum nigri sunt. In  
 rustici, Piper montanum, vocant, quo sumpto dum medicis &  
 iarijs negotium ( vt putant ) facessunt, e sua sibi, non illis, medicina  
 eunt. Eo factum vt non abs re, Mezereon, venenis propinquum Me-  
 iudicet, quod præcipuis & vitalibus membris noceat. Quare ab hu-  
 usu abstinendum, non infrenata, quæ superfluit acrimonia, & cali-  
 ate, frigidiorum mixtione simplicium, quemadmodum optimè tra-  
 Mesue.

## Sambucus. CAP. CLV.

### NOMENCLATURA.



Sambucus.

Gr. Ακτὺ. Lat. Sambu-  
 cus. Ital. Sambuco.  
 Gal. Suseau.

Sambuci duo genera.  
 Vnum in aborem assur-  
 git, surculos spargens arundi-  
 naceos, teretes, canos, candi-  
 cates, proceros folia in glan-  
 dis terna quaternaque, ex in-  
 ternallis circa ramos exeunt  
 graui odore, minutim in  
 ambitu secta: & in ramulo-  
 rum cacuminibus cauliculis-  
 que circinatae umbellæ, quæ  
 florem



florem candidum pariunt, mox acinum Terebintho similem, nigredine subpurpureum, racemosum, succo madentem, uino sumq. Alterum genus, Chamæacle uocatur, Romanis Ebulū longe humilius est, magisq. herbaceo generi assignandum, caule quadrangulo, geniculato, folijs Amygdalæ, ex intervallo longioribus, geniculatim expensis, pinnatisq., graueolentibus, in ambitu serratis: muscario Sambuci, flore & acino eiusdem: radice nititur longa, crassitudine digitali. Eadē utriusque uis, & usus exiccans, aluo detrahens aquam, stomacho inutilis. Folia olerum more coquuntur, ad pituitam bilemque detrahendā. Caulē teneri in patinis cocti, eadem efficiunt. Radix in uino decocta & in cibis data, hydropicos adiuuat. Prodest uiperarum moribus, eodem pota modo. Vulus emollit insidentium decocto: patet facit earum spiracula, & uitia corrigit. Acini in uino potē eodem funguntur munere: denigrant capillos illiti. Folia, si præternera ac mollia ex polenta illinantur, inflammationem mitigāt: ambustis & canis moribus illitu prosunt. Ulcera quæ dehiscunt in fistulā, agglutinant: ijs qui podagra tentantur, cum seno taurino aut hircino prosunt illita folia.

**S**ambucus tum arbor, tum herba nulli non nota sunt. Aqua florum Sambuci, fronti applicata, dolorem capitis sedat, & caliditate prodeunt. Succus ē corticis radice elicitus, magna vi vomitum pronocat, & hydropicorum aquam expurgat. Idem præstat radice Ebuli succus, qui & crassos humores iuncturis eliciat. Ebuli seminis à nigro illo succo, eloti delibrati puluis, dragma pōdere, si in Iuæ decoctione offeratur, podagræ iuncturaru: & Gallici morbi dolores mitigat. Exprimitur & ex Ebuli radicibus succus, qui siccatus digeritur in pastillos. Clysteribus inditur ad dolores frigidos, & ischiadicos. pedes ob febris diuturnitatem inflati, decocti radice fotu iuuantur, hocq; iecur additis consentaneis roboratur. Sambucus & arbor & herba, desiccant, agglutinant, & aliquantum digerunt.

Picnocomum. CAP. CLVI.  
NOMENCLATURA.

Græ



Græ. πυκνόκομος.

Lat. Pycnocomon. Ital. Picnocomo. Ignota

**P**ycnocomon cōstat eruce folijs, acrioribus, scabris & cras-  
sis: caule quadrāgulo: flore Ocimi: semine Marrubij: radi-  
gigra, aut pallida, rotunda, exigui mali figura, terram redo-  
te. Inueniatur in saxosis locis. Semen grauiā somnia & tu-  
multuosa facit, drachmæ instar potū. Tumores discutit, illitum  
in polenta spicula, adaëtosq; corpori aculeos, extrahit. Folia  
in tubercula, panosq; discutiunt. Radix eius in aqua mulsā  
cum drachmarum pondere, aluum soluit & bilem extrahit.

Ignomum ignota planta, Naturæ horto colenda, & dignoscenda re-  
linquetur, quando & is eas cohibet quas perspectas arbitramur.



\* Apios.

## Apios. CAP. CLVII.

### NOMENCLA- TVRA.

Græ. Απιος.

La. Apios. Ita. Apio.

Gal. nomine ignota.

**A**pios iuncos duos siue  
tres spargit, rubros,  
tenuēs, qui à terra parum  
attolluntur: folijs Rutæ, ob-  
longioribus tamen, & an-  
gusti



gustioribus, herbaceis: semine paruo, radice *Hauſtula* regiæ in formam *Pyri* turbinata, rotundiore tamen, succi ſecunda, intus habet corpus candidū, extrā cortices nigros, Superior pars eius uomitione bilem pituitasq̃ extrahit: inferior per aluum. Totū utrinque purgationes mouet. Succū ſi libet eximere, tuſa radix in ſicili mergitur, & agitata aqua, quod ſupernatat pinna ſelectum, exiccatur. Purgat utraque parte is ſuccus, ſeſquiobolo potus.

**N** Aſcitur in Italia *Apios*, minutis folijs, *Hyperici* proximis, cum primo vere prodeunt, proceſſu verò temporis è linea candida fiſſilibus: caule rubente, iunceo, & lacte candido turgēti. Porro radix tota, & uomitione ſtomachum, & purgatione aluum inanienſ, proſectū haud benè cum eis ageret, qui ea pro cibo vterentur.

## Colocynthis. CAP. CLVIII.

### NOMENCLATURA.

Græ. Κολοκυνθίς. Lat. *Colocynthis*. It. *Coloquintida*.  
Gal. *Coloquinte*. Off. *Coloquintida*.

**C**olocynthis ſarmenta foliaq̃ ſatiui cucumeris emittit, per terram repentia, diuiſa, fructum in ſpeciem mediocris pile conglomeratum, uehementer amarum: quem legere oportet, cum cæperit in pallidum colorem permutari. Medulla fructus purgatoriam vim habet, ſi quatuor oboli cum aqua mulſa, Melle cocto, Myrrha & Nitro excipiantur, & cogantur in catapotium. Arefacta pile teruntur, & infuſe clyſteribus proſunt neruorum reſolutioni, coxædicum doloribus, & coli uitijs. ut quæ bilem, pituitam & ſtrigmenta, interdum etiam cruorem eliciant. Fœtus admotæ enecant. Dentium dolorem tollit, ſi unâ repurgetur, & luto oblita cū aceto & nitro inferueſcat, hocq̃ iure decocti dentes colluantur. Si aqua mulſa aut paſſum in eadē incoquatur, & ſub diuo refrigeſcat, potu craſſum humorem & ſtrigmenta alui detraheth. Stomacho ſupra modum





Colocynthis.

dum aduersatur. Subdita ex ea balano, alui excrementa eijciuntur. Virentis succo utilissimè ischiadici perfricantur.

**C**olocynthis, vulgaris noticiæ plāta quantūvis in diuersos morbos polleat, cordi tamē, iocinori, & stomacho aduersatur. Et sane gustu amara est, at epota, amarorem illum manifestò prodere non potest, ob purgatorie virtutis robur, qua è corpore ante humores secedit, Viridis succus ischiadicos iuuat.

## Epithymum. CAP. CLIX.

### NOMENCLATURA.

Græ. Επιθυμου. Lat. Epithymum. Ital. Epithimo.

Gal. Teigne de Thyn.

**E**pithymon, flos est è Thymo duriore Satureiæ simili, capitula habet tenuia: & leuia, & in eis caudiculas, quasi capillamenta. Potum cum Melle detrahit pituitā, bilem q̃, atrā, per inferna. Priuatim prodest melancholicis, & inflatis, ac abuli mensura, ad quatuor drachmas, cum Melle, sale, & aceti exiguo. Plurimum in Capadocia & Pamphilia gignitur.

Epithy



**E** Pithymum, non Thymi flos, siquidem is iam pridem detectus error sed Cuscuta Thymo innascens. Quæ Thymbræ adnascitur, Epithymbrum vocatur, Epithymum eiusdem cum Thymo virtutis, tertius classe desiccatur & excoctatur.

## Alypum. CAP. CLX.

### NOMENCLATURA.

Græ. ΑΛΥΠΟΥ. Lat. Alypum. Ita. Alypo.

**A**lypon surculosa herba est, subrubra, gracilibus ramulis tenuibus folijs: flore molli, leui, & copioso: radice Betæ tenui, referta, acris succo, semine Epithymi, Gignitur in maritimis, maximè Lybiæ, quam largissima: quanquam alibi quoque plurima provenit. Semen, atram bilem deijcit, si mensura Epithymo pari cum sale & aceto sumatur: uerum interanea leuiter exulcerat.

**A**lypi ex Aeluariio radix, Turbith est albū, quod ex oriente afferatur, quoq; vulgò utitur officinæ. Iam superius descripsimus radicem cortices, quæ pro Turbith venduntur.

## Empetrum, seu Calcifraga.

### CAP. CLXI.

### NOMENCLATURA.

Græ. ΕΜΠΕΤΡΟΥ.

Lat. Empetron. Ital. Calcifraga.

**E**mpetron aliqui Phacoides uocant. Nascitur in montibus & maritimis, salso gustu: sed quo propius terreno fuerit, amarius sentitur. Trahit bilem, pituitam, & aquam, si bibatur in iure aliquo, aut hydromelite.

**E**mpetron herba effigiem non describens, Oedipi sciscitandi materiam præbuit. Hac se molestia exolunt, qui Empetron eam plantam arbitrantur, quam herbarij fœniculum marinum: & Itali, herba di S. Pietro nominant. Porro hæc verū est Dioscoridis Crithamon, siquidē præter notas quæ concinunt, quantumuis copiose edatur, pituitam tamen & aquam non educet.

Vitis



## Vitis sylvestris. CAP.

## CLXII.

## NOMENCLATURA.

Græ. ἀμπέλ &amp; ἄγρια. La. vitis sylvestris.

Ita. vite saluatica. Gal. Vigne sauuage.



Vitis sylvestris.

**V**itis sylvestris sarmēta utis modo praelonga emittit, aspera, lignosa, rimoso cortice: folijs hortensis solani, longioribus ac latioribus muscoso flore, & capillaceo: fructu exiguis uuis simili, post maturitatem rubente: rotunda est acinorum facies. Feruesfacta radix in aqua & in cyathis duobus uini aqua marina diluti pota humorem alui ciet, ideo hydropicis datur. Vna eius, uittia cutis in facie, & maculas omneis expurgant. Enascentes uiticulae, cibi gratia, sale condiuntur.

**C**omptulis mulieribus non ignota Vitis sylvestris, ut cuius uuis, quo colorata appareant, faciei cutem confricent, nempe mordax & aris, statim ut attigerit, adurit. Hanc in annum incorruptam asseruant, nam etsi aliquantū flaccescat, tamē nec humor, nec color depereunt. Vitis sylvestris vna, virtutis sunt absterforia, siquidem cutem emaculant, Viticulae incipientes aliquantum astringunt, ac ideo muria in cibos antiquitus seruabantur.

R

Vitis



## Vitis alba. CAP.

## CLXIII.

## NOMENCLATURA.

Gr. ἄμπελος λεύκη. Lat. *Vitis alba*. It. *Vite bianca*.  
Gal. Couleuree. Off. Bryonia.



Vitis alba.

**V** Item albam aliqui Bryoniam uocant. Folijs uiticulis, pāpinisq<sup>3</sup>, satiniā uitem imitatur, sed hirsutiora sunt omnia: ea quos prope se nata sit frutices, suis clauiculis complectitur: fructus rubens in uua dependet, quo coria pilis spoliatur. Ex ea Asparagi, qui prima germinatione exeunt, decocti in cibo, aluum & urinam cient. Folia, fructus, radix, acrem uim sortiuntur. Itaque ulcerum phagedenas, gangrenis, chironiis, putretium tibiārum tadio, efficaciter ex sale illinuntur. Radix corpus abstergit, & cutem erugat. Vitia cutis in facie, uarosq<sup>3</sup>, lentigines & cicatrices nigras emendat, cum Eruo, creta Chia, & Fœnogræco. Eodem effectū prodest decocta in oleo, usquedum liquecat: sugillata tollit, redunias committit: inflammationes discutit, illita ex uino: suppurationes



rationes rumpit, medicamento aptè immiscetur, quod carnem  
 exest: infraëta ossa extrahit, trita & imposita. Datur comitia-  
 libus in potu drachmæ pondere, quotidie, anno toto. Prodest at-  
 onitis, & uertigine laborantibus, consimiliter assumpta. Con-  
 tra uiperarum iëlus pota drach. duabus, auxiliatur, partus ne-  
 at, mentem interdum subturbat. fœminarum locis apposita, par-  
 us secundasq; morantes trahit: cit urinam pota: eclegma ex ea  
 fit cum Melle, difficile spirantibus, strangulatu oppressis, tussie-  
 libus, uulsis, rupis, & laterum doloribus: lienem ternis obolis  
 pota ex aceto triginta diebus, consumit, illinitur ad eadem cum  
 Ficco. Ad muliebres infessus decoquitur: siquidem uulvas pur-  
 gat, sed abortum facit. Succus è radice uere exprimitur, qui tra-  
 hit pituitam, cum aqua mulsa potus. Ad psoras & lepras semè  
 efficaciter illinitur. Lactis abundantiam facit succus eius, si cum  
 tritico decocto sorbeatur.

**V**itis alba, cognita satis planta, præter vires quas illi Dioscorides  
 attribuit, præfocationi matricis diuinū quoddā remediū est. Vitis  
 alba viticula amaroris aliquantū & acrimoniæ cum vi astrictoria cō-  
 tinent. Radix virtutis est abstersoria, desiccatoria, & modicè calida.  
 Candida radix, alba Viti nomen indidit.

## Vitis nigra. CAP. CLXV.

### NOMENCLATURA.

Gr. ἀμπέλ & μέλαινα. La. Vitis nigra. Ita. Tamaro.

**N**igra uitis, quam alij nigram Bryoniam uocant, folia fert  
 Hedera, sed maiora, Smilaceis proxima: caules etiam co-  
 gnatos, capreolis suis arbores, quasi admimicula, comprehendit:  
 fructus racematim coherent, qui inter principia uirent, & post  
 maturitatem nigrescunt. Radix foris nigra, intus buxæo colore  
 nitet. Viticula quæ primo germinum partu erumpunt, Menses  
 pellunt, urinas cient lienem absumunt, uertiginosis, comitialibus,  
 neruorum resolutione tentatis, prosunt. Radix eadem, quæ Vitis

R 2 alba



alba præstat, sed inefficacius. Folia cum uino exulceratis iumentorum ceruicibus commodissime illinuntur: luxatis itidem imponuntur.

**V**itis nigra, à baccarum insigni nigrore, non à radice nomine desumpto, vna taminiæ Romanis dicitur. Viticula statim ut è terra prodeant, Asparagis similes, eorum more in acetaria veniunt, quanuis non pari qua Asparagi, in gustu gratia. Quam Vitalbam Thufci vocant, Clematidis secundum est genus, à Dioscoride in huius initio libri descriptum, planta summè aeris, & exulcerans, & non vitis nigra.

## Filix. CAP. CLXV.

### NOMENCLATURA.

Græ. πτερίς. Lat. Filix. Ita. Felce.

Gal. Feuchiere.

**F**ilici folia sine caule, sine fructu, sine flore, ex uno pediculo, cubitali longitudine, multifida, & lateribus pinnata, subgravi odore: radice per summa cespitum nigra, oblonga, filices multas fundente, substringente gustu. Nascitur in motibus & saxosis. Radix laticineas excutit, sumpta drachmis quatuor ex aqua mulsæ, melius si cum Scammonia aut Veratri nigri totidem obolis detur: sed qui sumunt, Allia prægustare debent: laborantes lienis incremento recreat. Radix & potu & illitu cum axungia vulneribus sagitta arundinea factis, est auxilio. Cuius rei probatio talis fertur: Peribit Filix, quam per ambitum sata copiosior Arundo coronet: & contra, euanescent abibit Arundo, quam obseprensus multa Filix in orbem cinxerit. Filix fœmina folijs est Filicis, surculosis, altioribusque, & quæ non singulari, ut illa, pediculo fulciantur: radicibus longis, pluribus, obliquis, quæ ex nigro in luteum flauescunt. Aliquæ etiamnum rubræ inueniuntur. Pellunt lata interaneorum animalia, cum Melle eclegmate sumpto. Potæ cum uino drachmis tribus, teretes tineas eijciunt. Datæ fœminis, sterilitatem faciunt, & prægnantibus abortum, si supergrediantur. Farina humidis ulceribus, & cica





Filix Mas.



Fœminæ.

Et cicatrici repugnantibus, inspargitur. Iumentorum cernicibus medetur. Folia recentia in oleribus cocta manduntur, ut ventrem emolliant.

Filix mas & fœmina è Dioscoridis descriptione, & ipsa facie noscenda, Mas ex vnico pediculo multa folia educit, nullo caule. Fœmina longos habet caules, folia plurima, masculæ, latiora & breuiora. Filix gustu amara est aliquantum astringit.

Filicula, siue Polypodium CAP.

CLXVI.

NOMENCLATURA.

Græ. πολυπόδιον. Lat. Polypodium. It. Filicola.

Gal. Polypode.

Filicula nascitur in montosis petris, & uetustis arborum caudicibus, præsertim Quercuum, palmi altitudine, Filici simili

R 3

lis, sub



lis, subhirsuta, non tenui perinde diuisura: radix pilosa, in qua continentur cirrhi, ceu polyporum, crassitudine digiti minimi, coloris intus herbacei, austera aliquanti, & gustu subdulcis. Purgandi vim habet. coquitur cum gallina, aut piscibus, aut beta, aut malua, ad aluum soluendam. Arida farina aqua mulsae insparsa, detrahit bilem & pituitam: trita luxatis efficaciter illinitur, & aduersus rimas quae inter digitos fiunt.

**P**olypodium siue filicula duplex est. Vnus per sp. et in seplasis & vulgo, alterum non cuius cognitum: nec omnibus locis innascitur. hoc folijs constat Aspleni, longioribus tamen, viridioribus, & magis incis. Radix figura, gustu, colore prima nihilum dissimilis. Copiose hoc secundum, in quibusdam montibus prouenit, nempe his quae e Goritia Carmiolam itur. Dulce & austerum, desiccatur sine morfu.

### Dryopteris. CAP. CLXVII.

#### NOMENCLATURA.

Gr. *δρυοπτέρις*. Lat. *Dryopteris*. It. Felce di quercia.

**D**ryopteris nascitur in ueterum Roborum musco, Filici similis, multo minore foliorum incisura, radicibus inuicem implexis, hirsutis, gustu acerbis, in dulcedine uergentibus. Psilothrum est cum radicibus trita: illinitur enim primum usque dum sudorem euocet, mox sudor abluatur, & recens imponitur.

**D**ryopteris, inde nomine accepto, nascitur in annosarum Quercuum musco, Filici similis, tenui foliorum subdulcium incisura, radice hirsuta. Qualitatis est mixta, e dulci, acri, & in radice acerba, incisoriæque vim obtinet.

### Cnicus. CAP. CLXVIII.

#### NOMENCLATURA.

Græ. *κνίν* & . La. *Cnicus*. Ita. *Zaffarano*.

Saracinesco. Gal. *Saffranbastard*.

Off. *Carthamus*.

**C**nicus folijs constat oblongis, per ambitum diuisis, asperis, spinosis, caule sesqui pedali: capitulo magnitudine grandis

dis Oli





Cnicus.

dis Oliuæ: flore Croci: semine candido, alioqui rufo, longo, anguloso. Huius flore in obsonijs utuntur. Seminis tusi & expressi succus, cum aqua mulsæ, uel iure gallinæ, aluum purgat: sed stomacho aduersatur. Ex eo autem fiunt offula, quas placentulas uocant, adiectis succo Amygdalis, Nitro, Aniso, & Melle decocto. quæ aluum emolliunt. Hæ in partes quatuor finduntur, quæ nucis iuglandis magnitudinem impleant: e quibus ante cœnam duas uel tres sumsis-

se satis est. Ratio temperandi hæc est: Cnici candidi sextarius, Amygdalorum testorum & delibratorum cyathi tres, Anisi sextarius unus, Aphronitri drachma una cum carnibus triginta caricatum. Seminis succus lac cogit, & magis ipsum resoluenda alui facultate donat.

**C**nici flore quidam in cibis utuntur, Croci vice. Solius seminis usus est in medicina. Theophrastus duo Cnici facit genera. Vnum recto caule, fructu nigro, grandi, amaro, capite acanaceo, oliuaris crassamenti, luteis crinibus capillato. Hunc officinæ, sylvestrem Cartamum, dicunt. Alterum hirsutius torosiori caule, foliorumque mollitia humi pene serpens, radice fulua, tenui, superuacua, tubere acanaceo, in quo lutea stamina prominent molli intus lanugine semen operiente. Hunc Carduum benedictum Officinæ appellat. Cnici semen expurgat, sed foris applicitum, tertij est excalfauentium ordinis.

## Mercurialis. CAP. CLXIX.

R 4

Gra.




Gra. Αἰνό?ωσις. Lat. Mercurialis. Ital. Mercorella.

Gal. Mercuriale.



Mas.



Fœmina.

**L**Ynozostis, aliqui Parthenion, alij Hermu Botanion appellant, folijs constat Ocimi, minoribus, Helxinae cognatis ramulis duplici geniculorum nodo cinctis, alarum cauis multis, fructu fœmina, copioso, quandam racemorum speciem præbente: mari, è foliorum sinu dependente, paruo, rotundo, ceu binis testiculis unà coherentibus: frutice dodrantali aut maiore. Vtraque in oleribus manditur, ad aluum ciendā. Cocta in aqua, epo to iure, bilem aquamq; detrahit. Constat ut mares gignantur, hunc facere: ut fœmina, illam: si à purgatione bibantur, & trita folia genitalibus admoueantur.

Mer



Mercurialis genere sex uve distinguitur. Nam quæ duplicia, & testiculorum effigie connexa habet semina, mascula vocatur, fœmina constat copioso semine, quod uuarum modo acinis dependeat. Iam superius ostendimus, Phyllon Herbam, & Mercurialem idem esse, & proinde Theophrasti Arrhegonon & Thelygonon, ipsum esse Phyllon & Mercurialem.

## Cynocrambe. CAP. CLXX.

## NOMENCLATURA.

Gr. Κυνόκραμβη. Lat. Cynocrambe.

Ital. Marcorella bastarda. Gal.

Mercuriale bastarde.



Cynocrambe.

CYnia aut Cynocrambe, cauliculum binū dodrantum altitudine emit, mollem, subalbidum: folia Mercuriali aut hederæ similia, certis interstitijs subalbida: semē folijs adheret paruum, rotundum. Folia cum caulibus pota, aluum cient: oleribus commendantur. Ius decocti & pituitam: & bilem, a quamq; detrahit.

CYNocrambe, herba, nisi quod maiora profert semina, Mercuriali mascula cetera similis campestribus, vijs publicis, & vineis prouenit, longè

R S ab A tri



ab Atriplice sylvestri herbariorum disidens, nam hac non in binum d  
drantum, sed in binum non raro cubitorum altitudinem exurgit, Hui  
errorem agnovit Ruellius, & prodidit, non ipse impegit.

## Heliotropium. CAP. CLXXI

### NOMENCLATURA.

Gr. ἡλιοτρόπιον. Lat. *Heliotropium*. Ita.

*Heliotropio*. Gal. l'Herbe au Chancre.

**H**eliotropio magno flos est effigie scorpionis cauda, unde  
scorpiuro ei nomen, & quoniam folia cum sole circum  
agat, *Heliotropion* dicitur. Folia Ocimi habet, hirsutiora, candi  
diora, et maiora. Ramuli à radice terni, quaterni, aut saepe qui  
ni exiliunt, multis alis cōcaui: flos in cacumine candidus, aut sub  
fulvus, incuruatur ut scorpionis cauda. Radix tenuis est, & in  
utilis. Nasitur in asperis. Decoctum herbae ex aqua, fasciculo  
manus plena, potu pituitam bilemq; per alium extrahit. Contra  
scorpionum ictus ex uino potum & illitum prodest. Adalliga  
tur ad conceptus arcendos. Aiunt per horam unam ante acces  
siones, seminis grana quatuor cum uino, quartanas finire: tria  
uerò, tertianas. Illitum semen formicantes uerrucas pensilesq; et  
thymos, & epinyctidas exiccat. Folia infantium destillationi  
bus, quas syriaseis uocant, podagris, luxatisq; utilissimè illinun  
tur, menses cient, partus trita & imposita pellunt. *Heliotropion*  
paruum nascitur in palustribus, iuxta lacus, folijs antedicto pro  
ximis, rotundioribus: semine, *acrochordonum* uerrucarum mo  
do, pensili, rotundo. Herba cum suo semine pota, adiecto Nitro,  
Hysopo, Nasturtio, & aqua, latas tineas terretesq; excutit. Pen  
siles uerrucas, quæ *acrochordones* uocantur, cum sale illita tollit.  
Scorpioides herbula est, folijs paucis, semine caudæ scorpionis ef  
figie. Illita scorpionum ictibus præsentaneo est auxilio.

*Helio*



**H**eliotropium maius, ea est planta quam Verrucariam seplasia nominant, quod verrucas & myrmecias afflicta potenter tollat. Prole errant qui Calendulam vulgo vocatam, Heliotropium maius exināt. Siquidē Dioscoridi, flos, non semen Heliotropij, caudæ scorpionis similitudinē refert. Vulgatū huius nomē, herba cancri, indē potius propterea, quod carcinomata & phagedænas mirādo successu percuret, quam eadem & gammarorum similitudine. Heliotropium minus, non semel a Catthiolo deprehensum, & medicis & spetiarijs ostensum, lacubus et muldibus adnascens, quæ Tridentinis angustijs imminet. Enimvero Calendula, Scorpionides erat, si folio exiguo esset & breui, cum Calendula longo sit & arcto, semine non scorpionis caudæ, sed scorpioni toto conuili. Cæterum ipsum Heliotropij nomen latē apud Græcos patet, nemini omnes plantas, quæ suo circunactū solem affectentur, cuiusmodi sunt, Malua, Cichorium, Scorpiuron, Lotos, Lupinus, attamen Verrucaria, peculiarem aufert Heliotropij nomenclationem.

*Finis Quarti Libri.*



## PEDANII DIO

SCORIDIS ANAZAR

bei, De medicinali materia, Li

ber Quintus. Ioanne Ruel

lio Suefsionensi

interprete.

*Ad puncta annotationes doctæ &  
compendiosæ.*

## PRAEFATIO.



VPERIORIBVS Quatuor libris,  
amicissime Aree, tradidimus de aromati-  
bus, oleis, unguentis, & eorundē lachrymis  
ac fructibus: item Animalibus, Melle, Lacte,  
Adipe, Cerealibus, Oleribus, necnō de omni  
Radicum, Herbarum, Succorum, Seminūq; ratione. In hoc aut  
totius operis Quinto, differemus de Vinis & metallicis, à Vite  
nostram commentationem auspicati.

## Vitis uinifera. CAP. I.

## NOMENCLATURA.

Gr. Ἀμπέλ & οἰνόφορος. Lat. Vitis vinifera.

Ita. Vite uinifera. Gal. Vigne.

Folia Vitium & triti capreoli, capitis dolores illitu mitigāt:  
& inflammationem stomachi ardoremq; cū polenta: Fo-  
lia etiā per se, ut quæ refrigerent & adstringant, imponi solent.

Potius





Vitis vinifera.

Potus eorū succus dysenteri-  
cis, sanguinem excreantibus,  
stomachicis, & grauidarū  
malacia medetur. Eadē effi-  
ciunt madefacti in aqua ca-  
preoli & poti. Lachryma ui-  
tium, quæ ueluti gummi in  
caudicibus cōcreſcit, ex uino  
pota calculos pellit. Illita li-  
chenas et pſoras leprasq; Ni-  
tro prius perfrictas sanat: ea-  
dem cū oleo ſæpius pilis illi-  
tis, Pſilothri effectū habet:  
maximeq; ſanies, quā accen-  
ſa ſarmenta Vitium uiridia  
exudarunt: qua & perūctæ  
uerrucarum informicationes

trahuntur. Cinis ſarmentorum & uinaceorum, detractis in  
de cōdylomatis, & thymijs, illitus ex aceto medetur. Prodeſt  
exatis, & uiperarum morſibus: contra lienis inflammationē  
unitur, cum Roſaceo & Ruta & aceto. Labruſca duorum ge-  
nerum eſt. Alterius uua non matureſcit, ſed flore tenuis Oenan-  
then nominatam perducit. Altera ad frugem peruenit, paruis  
cinis, nigra, & adſtringens. Folia, caules, & clauicula quibus  
compunt, uim habent cultæ Viti ſimilem.

## Vua. CAP. II.

## NOMENCLATURA.

Græ. Σταφύλη. Lat. & Ita. Vua.  
Gal. Raiſin.

Vua



**V**va recentes aluum turbant, & stomachum inflant: innocentiores, quæ decerptæ diu pendere, ideo quod in e copia humoris exiccatur, utilesq; sunt stomacho ægrisq; atque cibi aviditatem excitant. In vinaceis & ollis servatæ, ori & stomacho gratae sunt. Aluum sistunt, sed vesicam & caput tentant, & sanguinem excreantibus conveniunt. Similesq; quæ in musto fuere. Sapa aut passo conditæ, stomachum magis infestant. At quæ solem prius passæ in aquæ cœlesti conduntur, minus vino sæ sunt, siticulosi, ardentibus & longis febribus salubres. Reconditi Vinacei inflammatis mammis, rigentibus ac præduris, cum sale illinuntur. decoctura eorum dysentericos, cœliacos, & fœminas fluxione vulvæ laborantes iuvat infusa, ad dessestiones, ac fetus assumitur. Nuclei acinorum adstringendi vim obtinēt, stomacho utiles sunt, inspargitur farina tostorum, polentæ modo, dysentericis, & cœliacis, & solutis stomacho. Vva passa, alba, adstringentior est. Prodest esitata caro earum tussi, faucibus, renibus, ac vesicæ. Estur in dysenteria per se cum nucleis, & decocta in patinis cū Melle, admista Milij ac Hordei farina & ovo. Valet ad purgandū caput, eiusdem gratia cum Pipere commendatur. Testium inflammationes sedat, illita cum lomento Fabarum, aut Cumini farina. Fauos, epinyelidas, carbunculos, enatas in articulis putredines, & gangrenas, sine nucleis trita, & cum Ruta imposita sanat. Podagræ convenienter cum Panacis succo illinuntur. Mobiles ungues illita, celerius extrahit.

### Oenanthe. CAP. III.

#### NOMENCLATURA.

Gr. Οἰνάρη. Lat. Labrusca. Ita. Lambrusca.

Gal. Grappe de vigne sauvage.

**O**enanthe nascitur Vitis sylvestris fructus, cum floret. Recondi debet sicci non picato, collectaq; substrato linteo,



umbra siccatur. Laudatissima in Syria & Cilicia & Phœni-  
 cis ei adstrictoria, quare pota stomacho ac ciunda urinæ uti-  
 Aluum sistit, ac sanguinis excreationes. Contra fastidia &  
 rem stomachi, sicca & illita efficax est. Capitis doloribus  
 in uiridis quàm sicca, ex aceto & Rosacco perfunditur. San-  
 uolenta uulnera cataplasmate, & incipientes agilopas, oris  
 era, & genitalium nomas, trita cum Melle, Croco, Myrrha,  
 Rosaceo, ab inflammatione uindicat: pessis miscetur, ad sisten-  
 m sanguinem. Contra oculorum delachrymationem, & sto-  
 machi ardores, cum polline polentæ & uino illinitur. Cinis cre-  
 ta in testa, cādētibus prunis, facit ad oculorū medicamēta, re-  
 uias et pterygia: abscedētes gingiuas, cruētāsq; cū Melle sanat.

## Omphacium. C A P. I I I I.

### N O M E N C L A T V R A.

Gr. Ομφάκειον. Lat. Omphacium. Ita, Agresto.

Gal. Veriust. Off. Agresta.

**O**mphacion succus est acerba uua, nondum maturescētis,  
 ē Thasia uite aut Aminæa. Oportet aut ante canis ortū,  
 pressam melliginem in rubro are, linteo cooperto, insolare,  
 quedū cogatur, semperq; quod ceruici uasis cōcretū hāsīt, reli-  
 o humori permiscere: noctu à subdialibus locis in lectū referre  
 ando quidē nocturni rores ipsum cōcrescere nō sinūt. Eligen-  
 m est flauū, friabile, uehemēter astringēs, & linguā mordēs.  
 nt qui coquēdo melliginē cogāt. Prodest cōtra tonsillas, uua,  
 tera oris, humida ginginarū uitia, purulētās aureis, cū Melle  
 et passo. Itē ad fistulas, uetera ulcera, nomasq; ex aceto: dysente-  
 ris, et mulieribus fluxione uulua laborētibus clystere infundit.  
 ulorū claritati, et scabritia, et erosionibus angulorū cōuenit.  
 bit ad recētē sanguinis excreationē, etiā si rupta parte aliqua  
 ingat: sed paucō, et aquatiore est utēdū: ualde siquidē exurit.

Vini



## Vini natura. CAP. V.

## NOMENCLATURA.

Græ. Οἶνος. Lat. Vinum. Ita. Vino.

Gal. Vin.

**V**ino uetere nerui leduntur & reliqui sensus, quod tamen gustu suauius est. Quare cauendum ijs qui intestinae ac ius partis imbecillitatem sentiunt: attamen in secunda ualitudine paucum, aqua dilutum, innoxie sumitur. Nouum inflat, & coquitur, insomnia parit graua, & urinam ciet. Aetate rediit, utraque uitia fugit: quare ad uictus sanorum agrorum usurpatur. Album, tenue, stomacho utile est, ac facile in mētem distribuitur. Nigrum uero, crassum est, & concoctu difficile. Nēm alit, & ebrietatem creat. Giluum, utpote quod mediū inter medias inter utrumque uires habet. In secunda tamē & sinis ualitudine, cum primis laudatur album. Quin & uina saporem distant. Siquidem dulce crassis partibus constat, & difficiliter corpore expirat: stomachum inflat, aluum & interanea, ut in flatum, turbat: sed minus inebriat, renibus, & uesica aptissimum. Austerum, per urinam celerius transit: sed capita dolore tentat & temulentiam gignit. Acerbum, ad ciborum per membrorum digestionem accommodatissimum, aluum, & ceteras fluxiones cohibet, minusq; urinam expellit. Nouum neruos minus tentat. Vinum aqua marina factum, stomacho aduersatur, sitim stimulat, neruos infestat: aluo aptum, à ualitudine se recolligentibus inutile. Passum, quod uuis sole siccatis in area, aut in sarmentis torrefactis exprimitur, Creticum cognomine, aut Pramnicum aut Protropon: & Sapa, quæ sit musto igni decocto, Græci rion aut Hepsēma appellant: nigra quidem, & quæ dicuntur Melampsithia, crassa sunt, & corpora multum alunt: candida tenuius: & Heluola inter hæc media, medias sortiuntur uires.

Omnia



omnia tamen adstringunt, & pulsus reuocant. Faciunt aduer-  
 s uenena quæ exulcerando necant, ex oleo pota, & uomitio-  
 bus reddita. Contra cicutas, Meconium, Pharicon, Toxica,  
 & concretum in grumos lac. Item contra renum, ac uesicæ pru-  
 tus, rosiones, exulcerationesq; inflant tamē, & stomacho ad-  
 rasantur. Priuatim prodest Melampsinthiū: si uenter rheuma-  
 tum sentiat: album, magis cæteris emollit aluum. Gypso cō-  
 tū, neruis officit, caput aggrauat, & incendit, ac uesicæ aduer-  
 tur: contra uenena cæteris aptius. Picata, aut resinata, excal-  
 ciunt, concoquunt, sanguinem excreantibus inimica. Quæ ue-  
 Aparachyta uocant, ut quæ admistam Sapam recipiunt, ca-  
 it implent, temulentiam gignunt, ægrius in halitum expirant,  
 machum malè habent. Inter Italica uina Falernum princi-  
 m locum obtinet, quod inueteratum per quàm facile coquitur:  
 lusus exuscitat, aluum adstringit, stomacho utile. sed uesicæ no-  
 t, atque ijs qui uisus hebetudinem sentiunt: & ad potus cre-  
 ros minimè idoneum. Albana crassioribus constant partibus,  
 alcia, stomachum inflant, uentrem emolliunt (sed concoctio-  
 em non æquè adiuuant) & nervosa minus infestant: uetusta-  
 eadem austerum saporem concipiunt. Cecubum, cum sit dul-  
 est & Albano crassius. Corpus & colorem alit: ægrè ta-  
 ien coquitur. Surrentinum, ualde austerum est: quare intesti-  
 orum & stomachi fluxiones cohibet, & cum tenue sit, caput  
 inus tētat: inueteratum suauius redditur, & stomacho utile.  
 Adrianum & Mamertinum in Sicilia æquè crassis partibus  
 ignuntur. Modicè adstringunt, & ocysimè inueterantur,  
 unusq; ob suam tenuitatem, nervos tentant. Paratypianum,  
 uod ex Adriatico sinu desertur, odoratum ac tenuius est: qua-  
 liberaliter epotum fallit: diu seruat ebrietatem & soporem  
 lsert. Istricum Paratypiano simile est, sed urinam uehemen-  
 us pellit. Chium tamen antedictis mollius, & aptum potui est:

S

Bene



Bene alit, & minus inebriat fluxiones cohibet oculorum medicamentis utile. Lesbium facile membra subit, Chio lenius, & alio idoneum. Ephesium eandem uim habet, quod Phygeli nominatur. Verum Asianum è Tmolo monte, Mesogites appellatum, capitis dolores ciet, & nervos lædit. Coum uero & Cymenium, quoniam multam sibi maris aquam uendicant, facile corrumpuntur: flatus mouent, aluum turbant, nervis offiunt. Vinum omne (ut reliqua in commune dicantur) merum ac sincerum, & sua natura austerum, excalfacit, facile in membra distribuitur: stomachum adiuuat, appetentiam ciborum inuitat, uires alit, ac robur auget, somnum conciliat, & commendat colorem. Potum liberalius auxilio est contra assumptam Cutem, Coriandrum, Pharicum, Ixiam, Meconiam, Argemispumam, Taxum, Aconita, Fungosue: contra serpentium morsus, & omnium ictus quæ refrigerando necant, aut stomachi in uomitiones effundunt. Facit ad longas inflationes, rosionesque præcordiorum, ac distentiones, stomachi resolutionem, & si ueter aut interanea rheumatismum sentiant. Conueniunt sudatoribus, & quibus corpus immodico sudore digeritur, maxime alba, uetera, & odorata. Quæ tamen uetustate dulcescunt, renibus ac uesicæ accommodatiora redduntur. Vulneribus, inflammationibusque in succida lana imponuntur. Tetra ulcera & phagedænica, & fluxionibus obnoxia, commodè perfunduntur. Quæ marinam non receperunt, austera & alba, ad sanorum uictus usurpantur. In his, præstant Italica, Falernum, Surrentinum, Cecubum, Signinum, & permulta Campaniæ, & Parrætypianum ab Adriatico sinu, & Siculum quod Mamertinum appellatur. Ex Græcis Chium, Lesbium, & Phygelites ex Epheso. Crassa uero & nigra, stomacho negotium exhibent, inflationem pariunt, corpus augent. Tenuia tamen & austera stomacho prosunt, & minus carnes alunt. Vetera ualde tenuia,

& can



Et candida uehementius urinam ciunt, Et dolores capitis mo-  
uent, neruosq; largius pota tentant. In media etate, ut à septimo  
anno, potui saluberrima sunt. Modus autem pro etate, Et tem-  
ore anni, Et consuetudine, Et qualitate uini definiatur. Non  
ire, Et modicè cibos prolui, optimum est præceptum. Nocet e-  
rrietas omnis, Et maximè assidua, siquidem obsessos neruos  
uotidie remittit: largiorq; potus, acutorum morborum adfert  
utia. Mediocris tamen uinolentia, aliquot diebus, maximè post  
qua potus, utilis: namque modo quodam ex alto euocat, sensi-  
sq; expurgat excretus, Et per cæca corporis ducit spiracula:  
ad aquam post uinolentiam bibere oportet: siquidem ualeitudi-  
is alicuius gratia facta temulentia, remedium affert frigida.  
omphacites nomine peculiariter fit in Lesbo, siccata sole acri V-  
a, paulo ante maturitatem decerpta, triduo aut quatrduo, do-  
ec racemi in rugas contrahantur, expressumq; Vinum cadis in-  
olatur. Vim adstringendi habet. Prodest dissolutis, stomacho,  
Et ilei dolore laborantibus. Item prægnantium malacia, Et  
rudis. In pestilentia quoque sorptum auxiliari dicitur. Huiusmo-  
di Vina non nisi post multos annos bibi possunt. Lora, quam  
Deuteriam, alij Potimon appellant, fieri solet, adiectis metretis  
ribus aqua, in uinacea, quibus triginta Vini metretæ extractæ  
uerint, calcatis uinaceis, expressoq; decocto ad tertias parteis,  
dditis in singulos congios modi eius qui remansit, binis salis  
xtarijs. post hyemem transfunditur in uasa. Lora intra an-  
um utendum: etenim celeriter exolefcit. Conuenit ægris qui-  
us timemus noxam Vini, coacti sepe desiderijs eorum obtem-  
erare. Itam à longa ualetudine se recolligentibus. Fit Et ui-  
um quod Adynamon uocant, Lora uires habens hoc modo: Pa-  
es aqua Et musti mensuræ coquuntur molli igne, donec absu-  
atur aqua: quod, ubi refrixerit, elutriatū, picatouase recoditur.  
Etly marina Et cælestis aqua, mellis Et musti pares miscet por-  
tionones



tiones, decapulant, & quadraginta diebus insolant, quo ad annum utuntur ad omnia eadem. Vinum è sylvestri Vua nigrum adstringit. Prodest aluo & stomachi fluxionibus: & ceteris quibus constrictione & contractione opus est.

### Vinum melitides. CAP. VI.

#### NOMENCLATURA.

Græ. μελιτίτης. Lat. Melitites. Ita. Vino

Melitide, Gal. Vin fait du moust de gros vin, & de Miel.

**M**elitites datur in longis febribus, quæ stomachum infirmarunt. Nanque aluum leuiter emollit, urinam ciet, stomachum expurgat. Prodest articulario morbo, renum vitijs, imbecillo capiti, & mulieribus abstemijs. Odoratum siquidem est, & corpus alit. Distat à Mulso quod sit è Vino uetere, austero, & Melle exiguu. Melitites autem adiecto ad quinque congios austeri Musti, Mellis congio, & salis cyatho, cortinis magnis, quò magis ad efferuescendum locus pateat, fieri oportet, sensim asperso sale: cumq; efferuere desierit, in alia uasa transfunditur.

### Mulsum. CAP. VII.

#### NOMENCLATURA.

Græ. δινόμελι. Lat. Mulsum. Ita. Vino Mulso.

Gal. Mixtion de gros vin vieulx & de Miel.

**M**ulsum è uetere Vino austeroq; & bono Melle factum, præfertur: minus enim inflat: ac celeriter id genus in usum uenit. Vetus, corpus alit: media ætate, aluo prodest, urinam pellit, à summo cibo sumptum nocet: & inter initia potum, implet, dein appetendi auaritatem renocat. Fit Mulsum duabus Vini metretis, admixta una Mellis. Aliqui, quò celerius præberi pos-



i, Mel cum Vino coquunt, & ita transfundunt. Alij utilitatis  
ratia, ad sextarios sex musti feruentis, unum Mellis adijciunt,  
& ubi ferbuerit, uase recondunt: dulce autem permanet.

## Aqua mulsa. CAP. VIII.

### NOMENCLATURA.

Græ. μελίκρατος. Lat. Aqua mulsa.

Gal. Mixtion deau & de Miel.

**A**qua mulsa easdem quas Mulsum vires possidet. Cruda  
utimur, cum molliori deiectionem, aut uomitionem inci-  
re uolumus: ut ijs qui uenena hauserunt, ex oleo. Decocta da-  
tur imbecillis, & hominibus elanguescentis pulsus, quos illi di-  
cere microsphyctos: tussientibus, peripneumonicis, & ijs qui  
immodico sudore digeruntur. Iam paratum cōditiumq, quod  
liqui Hydromeli proprie uocant, media etate Adynamo Vi-  
o, aut Lora in recreandis uiribus respondet, & similem uim  
dipiscitur. Quare inflammationibus alicuius membri plus quā  
lora prodest. Inueterati tamen usus damnatur inflammatis, aut  
constrictis, sed laboranti stomacho, aut cibum fastidienti, suda-  
toribusue conuenit. Fit duabus pluuiæ aquæ ueteris ad unā Mel-  
lis partem additis, & insolatis. Alij fontanam aquam adijciunt,  
& ad tertias parteis decoquunt, & ita recondunt. Nec desunt  
qui Hydromeli appellent, quod à Melle elutis aqua sanis confici  
ac seruari soleat: sed meracius confieri conuenit. Aliqui id co-  
quunt. Agrotantibus noxium est, quoniam plurimum ceragi-  
nis sibi uendicat.

## Aqua. CAP. IX.

### NOMENCLATURA.

Græ. ὕδωρ. Lat. Aqua. Ita. Acqua.

Gal. Eau.

S 3

De



**D**E Aquis in uniuersum decernere, propter locorum proprietates, & peculiare naturas, cœlum, & alia pleraque, difficile est. Magna tamen ex parte optima est dulcis, syncera, nullius omnino qualitatis particeps, & quæ ne minimo quidem tempore in præcordijs commoratur. Ad hæc, quæ & facili uia fertur, & citra molestiam. nec inflationes creat, & minime computrescit. Aqua maris calida est, & acris. Stomacho aduersatur, aluum enim conturbat. Pituitam expellit: si uero calida ad fots adhibeatur, elicit & discutit. Nernuorum uitijs, & permionibus, ante ulcera prodest. Miscetur cataplasmatibus ex hordeacea farina, & emplastris, & discutientibus malagmatis. Ad mouendas deiectiones tepesacta infunditur, ad tormina: calida, psoras, pruritus, impetigines, lendes, & mammas rigentes, foueri utile est. Liures fots discutit. Ad uenenatos ictus, qui tremorem & refrigerationem adferunt, salutaris intelligitur, maxime scorpionum, phalangiorum, aspidumq̃. Etiam si quis in calidam descendat, auxiliatur: & malo habitu confectis iamdiu corporibus, neruisq̃, balnea ex ea utiles: hydro picos, capitis dolores, aurium grauitates, feruentis uapor lenat. Syncera, & sine potabilis aquæ mistione reposita, uitus deponit. Sunt qui etiam præcoquant, & ita recondant. Datur ad purganda corpora per sese, aut ex posca, aut cum Vino, aut Melle. uerum post deiectionem, dant gallinæ aut piscium inscula, ad domandam morsus acrimoniam.

### Thalassomeli. CAP. X.

#### NOMENCLATURA.

Græ. θαλασσώμελι. La. Thalassomeli. Ita. Thalassomele. Gal. Mixtion deau de mer & de Miel.

**Q**uod Thalassomeli uocatur, uehementer purgare constat. Temperatur autem æquis portionibus, maris, Mellis, &



, & imbris ex alto, defecatis, & picato uase per canis aestus solatis. Alij ad binas marinae coctae singulas Mellis adijciunt, se cōdūt. Huiusmodi moderatius est aqua marina, & mitius.

## Acetum. CAP. XI.

## NOMENCLATURA.

Græ.  $\omicron\Xi\Theta$ . Lat. Acetum. Ita. Aceto.

Gal. Vinaigre.

**A** cetum refrigerat, & adstringit. Stomacho utile, appetentiam excitat. Erumpentem undecunque sanguinem, tu in se sūue sistit. Prodest alui fluxionibus coctum cum cibis. ruentis uulneribus inditur. Inflammationes arcet, in succidis la aut spongia impositum. Reprimit procidentia sedis, uuluaq; em abscondentes gingiuas, & sanguine manantes. Ad nomas, & ignem sacrum, ulcera quæ serpunt, lepras, impetigines, erygia, cum aliquo conuenienti efficax est. Phagedenas ulcerum, nomasq; fotu continuo cohibet. Podagricis calido fotu, cū sulfure auxiliatur. Sugillationes rapit, cum Melle illitum. Contra capitis ardores cum Rosaceo in succidis uelleribus, aut spongia imponitur. Ad aquam intercutem, grauitatem aurium, & nitus, sibilosq; feruentis uapor proficit. Instillatum quoque aurum uermes necat. Panos coërcet tepidi fotus, aut si imbuta acetum spongia admoueat. Pruritus permulcet. Contra uenenas serpentium ictus, qui refrigerando nocent, calidum commouet fouetur: & frigidum, is quæ exurens uirus eiaculantur. Cadum potum atque uomitionibus redditum, aduersus omnia uenena efficax est, præsertim contra Meconium, & haustam Citatā, cōglobatū in uentre sanguine, lac coagulatū, Fūgos, Ixiā, Taūq; cū sale haustu uoratas Hirudines, si sorbeatur, eicit, tussim eterē mitigat, & recētē lacepsit. In ortopnœa calidū cōmodē sorbetur. Gutturis fluxiones gargariatum inhibet. Anginis &



uæ procidenti conuenit. Contra dentium dolorem, calidum colluitur.

## Acetum mulsum. CAP. XII.

### NOMENCLATURA.

Gr. *Οξύμελι*. Lat. *Acetum mulsum*.

Ital. *Aceto melato*.

**A** cetum mulsum: quod Oxymel uocant, hoc modo temperatur: Aceti heminas quinque salis marini pondo, mellis minas decem, aquæ sextarios quinque pariter coquito, decies efferuescente cortina: atque ubi resfrixerit, diffundito. Sumptum crassos homores extrahere, & ischiadicis, comitialibus, & articularum morbo confluctatis prodesse creditur. Contra morsum eius Viperæ, quam Sepsa uocant, haustum metonium, ixiámue, auxilio est. Anginis utiliter gargarizatur.

## Acida muria. CAP. XIII.

### NOMENCLATURA.

Gr. *Οξύλεν*. Lat. *Acida muria*.

Ital. *Salamonia acetosa*.

**A** cida muria, quam Græci Oxalmen uocant, contra nomas fotu, putrida ulcera, canum morsus, & uenenatos ictus auxiliatur. Sanguinis fluxiones post excisos calculos sistit, si statim calida in uulnus inijciatur. Prociduam sedem reprimat. Dysentericis, si nomas sentiant, infunditur. Oportet autem ex lacte instillare. Hirudines sorbitione aut gargarizatu necat. Fursures & manantia capitis ulcera exterget.

## Thymoxalme. CAP. XIII.

### NOMENCLATURA.

Gr. *Θυμοξύλεν*. Lat. *Thymoxalme*.

Ital. *Thimoxalme*.

Thy



**T** Hymoxalme ueteres utebantur, dabantq; laborantibus imbecillitate stomachi, ternos quateruóque cyathos, aqua diluta dilutos, in articularibus morbis, & inflationibus. Cras- humores, atrosq; trahit. Hoc modo faciliatur: Thymi triti tabulum, salis idem modus, Ruta, pulegi, polenta, singulo- exiguae portiones in uas conijciuntur, aqua terni sextarii, & et terni funduntur, & circumposito linteo sub dio madescent.

## Scillinum acetum. C A P. XV.

### NOMENCLATURA.

Gr. Σκιμνῆϊκος ὄξος. Lat. Acetum scillinum.

Ital. Aceto Scillino.

**C** illicum acetum hoc modo fit: Scilla, quæ candida fuerit, expurgata conciditur, traiectaq; lino segmenta modicis inter- allis ne se contingant, siccantur in umbra quadraginta diebus. Minā eorum in aceti boni sextarios duodecim immergitur, & se diligenter operto septenis diebus in sole madescit. Post eum merum dierum, Scilla eximitur, & expressa abijcitur. De se acetum transfunditur, & reponitur. Aliqui Scillæ minā, inque aceti sextarijs miscent. Alij citra exiccationem repur- gantes, parem mensuram adijciunt, & senis mensibus macera- tiuntur. Id multo magis humorum lentitias digerit, gin- guas humore prægnantes collutione stringit firmatq;, & motos- tentes stabilis, putredines oris, & graues halitus tollit, du- cit fauces sorbitione, & callosas facit, nocem expedit, & lym- pham canoramq; reddit. Datur stomachicis, ægrè cibum con- sequentibus, melancholicis, comitialibus uertiginosis, mente ca- lis: item uuluarum strangulationibus, lienis incremento la- borantibus, ischiadicisq;. Imbecillos admodum recreat, cor-

S S pus



pus sanum reddit, & bonum colorem præstat. Oculorum aciem exacuit, tarditatem quoque aurium infusione purgat. In summa, ad omnia efficax. Cauendum tamen intestinis exulcerationibus, in capitis dolore, aut neruorum uitijs. Datur quotidie ieiunis sorbendum, inter initia exiguum, paulatim adaugendo, ac cyathum usque. Nonnulli binos dant, cyathos, aut largius.

### Scillinum. CAP. XVI.

#### NOMENCLATURA.

Gr. Σκίλλιν & οἶν & . Lat. Vinum Scillinum.

Ita. Vino Scillino.

**S**cillinum uinum fit hoc modo: Dissectam, uti dictum est, Scillam, & sole siccata contundito, minam eius tenui cribro incernito, & linteo raro illigatam, in uicenos sextarios musti recentis ac boni demergito. Vbi trimestri spacio maduerit, elutriatum uinum, obstructo diligenter uase, recondito. Licet quoque sic humida Scilla uti: In orbiculos, Rapi modo, dissectam duplicato pondere, quadraginta diebus insolari oportet, & ualde inueterascere. Alia parandi ratio. Scillæ dissecæ & repurgatæ tres minas, in Italicam metretam musti demittito, & senos menses in uase obstructo macerari finito: post id tempus defecatum & excolatum uinum recondito. Vtile est contra cruditates, & ciborum corruptiones: item is qui reuomunt cibum, & si pituita in uentre, aut stomacho coierit. Prodest lienosis, male habitis corporibus, aquæ intercutem, regio morbo, difficili urina, torminosis, inflationibus, resolutioni neruorum, horroribus longis, uertiginosis, & uulsis, menses pellit, minimè neruos infestat. Hoc uinum uetustate fit melius. Cauendus in febre usus, aut si interanea ulcus sentiant.

### Marina. CAP. XVII.

#### NOMENCLATURA.

Græ.



Gr. θαλαττίο ἰοῖνοι. La. *Vina marina.* It. *Vini*  
*misturati con acqua marina.*

**M**arina uariè faciliuntur. Aliqui enim statim quū de-  
 cerptæ sunt uuæ, aquam maris admiscunt. Alij in area  
 sole siccant: quibus calcatis, marinam adijciunt. Alij passas  
 uuas in dolijs marina aqua macerant, mox calcatas expri-  
 unt. Id magis passi generibus adscribitur. Quæ tamen austerio  
 gustu temperantur, contra febrium aduentantium indicia ua-  
 lent, si modo meliora non adsint. Aluum subducunt, prosunt pu-  
 eris extusis, aut si dura aluus exerceat. Quæ ex A-  
 næis uuis fiunt, caput tentat, stomacho aduersantur, flatu cre-  
 ant. Verum quo plenior habeatur historia, ijs qui huius studio te-  
 rentur, non inutile existimamus uarias uinorum compositio-  
 nes adferre, non quod frequens eorum aut necessarius existat  
 usus, sed ne quid omisisse uideremur, quod ad eorum rationē atti-  
 neret. Sunt autem quædam ex ijs factitia, minoris curæ ac impen-  
 dij, quæ cadunt in usus: uti quæ ex Cotoneis malis, Pyris, Sili-  
 is, item Myrti baccis componuntur.

## Cydonites. CAP. XVIII.

### NOMENCLATURA.

Græ. κυδωνίτης. Lat. *Cydonites.* Ita. *Vino*  
*delle Mella Cotogne.*

**C**Ydonites, nomine alio Melites appellatur, & ita fieri con-  
 suevit: Mala Cotonea exemptis seminibus, frustatim Rapi-  
 do scinduntur, & duodecim minarum pondo, in musti me-  
 tam, triginta diebus macerantur, postea defacatum uinum  
 comitur. Alia faciendi ratio: Oportet ad singulos Mellis sexta  
 denos succi Cotoneorum tusorum pressorumque adycere,



Et ita recondere. Vinum hoc adstringit, prodest stomacho, dysenteriae, hepaticis, renum vitijs. Et urinæ difficultati. Melomeli, quod et Cydonomeli nominant, sic fit: Cotonea mala semibus suis castrata, in quā plurimum Mellis, quo penitus demersa contegantur, coniunguntur. Id post annum mutescit, mulso non dissimile. Præstat eadem quæ superior compositio.

## Hydromelum. CAP

### XIX.

#### NOMENCLATURA.

Gr. υδρόμελον. Lat. Hydromelum.

Ita. Hydromelo.

**F**it Hydromelon duabus mensuris aquæ coctæ, et sub cunicula sydis insolata, additis ad unam Melomelitis, facti ex Cotoneis. Vis huius eadem est.

## Omphacomelites. CAP. XX.

#### NOMENCLATURA.

Gr. Omphacomeli. Lat. Omphacomelites.

Ita. Omphacomole.

**O**mphacomelitis faciendi ratio hæc est: Acerba uua adhuc immatura, et tribus diebus insolata exprimuntur, et ad ternas succi partes, Mellis optimi despumati singulæ partes adijciuntur: et insolatur in uase transfusum. Vim reprimendi ac refrigerandi habet. Stomachicis celiacisq; conuenit. Vis post annum est.

## Apites. CAP. XXI.

#### NOMENCLATURA.

Græ. ἀπίτης. Lat. Apites.

Ita. Apite.

Fit



It & è Pyris, perinde atque Cotoneis, uinum, Apjtes nomine, sed ita ut Pyra non magnoperè maturescant. Ex Siliis etiam, Messilis, Sorbis, simili modo tēperatur. Omnia hæc uera acerba sunt, & adstringunt. Stomacho utilia sunt, atq; pestinas fluxiones cohibent.

## Oenanthinum. CAP. XXII.

### NOMENCLATURA.

Gr. Οινανθίνον. La. Oenanthium. It. Enanthino.

It è feraci uite syluestri, quod uocatur Oenanthinum: Sicci flores minis duabus musti cado macerati, post triginta dies mutantur, mox colatum uinum reconditur. Facit aduersus stomachi imbecillitatem, cibi fastidia, cæliacos & dysentericos.

## Rhoites. CAP. XXIII.

### NOMENCLATURA.

Gr. ῥοίτης. Lat. Rhoites. Ita. Vino de Melagrani.

It è Puniceis malis maturis, quod Rhoiten nominant, succo expresso ab acinis eorum, quibus lignosus nucleus abest, apyrena uocant, ac decocto ad tertias, & ita reposito. Efficax est contra fluxiones internas, & febrim cum alui profluvio extant. Stomacho utile. Adstringit aluum, & urinam mouet.

## Rhodites. CAP.

### XXIIII.

### NOMENCLATURA.

Gr. ῥοδίτης. Lat. Rhodites. Ita. Vino Rosado.

Rhodites sic fit: Rosarum siccarum tusarumq; minam linteolo deligatam, in sextarios octo musti demergito, & post tres menses, defecatum uinum transfundens recondito. Vti-  
e ijs qui febricarent, & ad stomachi coctiones, & dolores à cibo



bo potum, & contra humiditas aluos, & dysenterias. Fit quod ex succo Rosarum, addito Melle, quod Rhodomeli uocant, quod arteria scabritijs conuenit.

## Myrtites. C A P. XXV.

### NOMENCLATURA.

Gr. *μυρτίτης*. Lat. *Myrtites*. Ita. *Vino delle bacche del Mirto.*

**M**Yrtites fit, baccis nigris, quæ maturitatem excefferint, tuis, & organo expressis. Aliqui ad tertias coquunt. Alij baccas prius sole torrent, & quaternis sextarijs contusarum, ternas aquæ heminas adiiciunt, & uini ueteris parem modum postea exprimunt, & seruant. Magnopere astringit: stomacho utile: fluxionibus uentris ac stomachi prodest: & contra intestinas ulcerationes, & profluvia. Denigrat capillos.

## Myrsinites. C A P. XXVI.

### NOMENCLATURA.

Gr. *μυρσινίτης*. Lat. *Myrsinites*. Ita. *Vino Mirteo.*

**M**Yrsinites sic temperatur: Rami nigri Myrti cum suis Baccis & folijs tuis, decem minarum pondo, in tribus musti congijs feruescunt, donec duo supersint, aut certe dimidium. Id uinum colatum ad usus reconditur. Contra furfures, ulcera in capite manantia, eruptiones papularum, gingiuas, tonsillas, & purulentas aureis efficax est. Sudores sistit.

## Lentiscinum & terebinthinum.

### C A P. XXVII.

### NOMENCLATURA.

Græ. *σχίνιν & καὶ ὁ τερμίνθιν &*. Lat. *Lentiscinum & Terebinthinum*. It. *Vino del Lentisco, & del Terebintho.*

Len



Entiscinum similiter ut Myrsinites temperatur, nec secus  
Terebinthinum. Nanque bacciferi eorum rami sumi de-  
nt. Similes insunt uires. Adstringunt, stomacho accommodā-  
, & defluxionibus intestinorum, uesicae, & stomachi, et san-  
guinis profluuio. Ulcera omnia fluxionibus obnoxia, fotu ad ci-  
tricem perducunt. Fluxiones uuluae ac sedis, in seissione cohibet.

## Palmeum. CAP. XXVIII.

### NOMENCLATURA.

ῥ. φοινικίτης. Lat. Palmeum. It. Vino de i Dattoli.

**O** Almulus maturas, quas uocant Chydeas, in urceolū imo  
pertusum, & obstructum picata arundine, demittito: lino  
ramen sit obturatum, & quadragenis sextarijs ternos aquae  
congios infundito. Quod si ipsum ita dulce esse non libeat, quin-  
que congios infudisse satis est. Post decem dies detracto ab arun-  
dine linteo, assumito uinum crassum & dulce, & reponito. Sua  
illud quidem, sed capiti noxiū. Contra fluxiones, propter ad-  
dictoriam uim, efficax. Stomachicis, celiacis, sanguine expue-  
ntis conuenit. Aliqui idē addita aqua iterum capiunt, & tertio,  
quarto, quinto, sextōne faciunt, quod tandem acore uitiatur.

## Catorchites. CAP. XXIX.

Græ. κατορχίτης. Lat. Catorchites. Ita. Vino  
de Ficchi secchi.

**C**atorchites, aliquibus Sycites uocatur, in Cypro fit: ita ut  
Palmeum. Sed hoc interest, quoniam pro aqua tantundē  
humoris adijciunt, in quo recenter pressa uinacea maduerint. Ca-  
pax quae Chelidoniae aut Phœniceae appellantur, praesertim  
græ macerantur, uti diximus, & post decem dies humor  
excipitur: atque iterum aut tertio, idem modus aquae in qua ui-  
nacea maduerint infunditur. Simili modo intercedente spacio,  
quarto aut quinto assumitur. Demaceratarum liquor, non secus  
aco



acorem contrahit, & aceti usum præbet. Id tenue est. Flatus gignit, stomacho aduersatur, fastidium parit, alio tamen prodeſt urinam ciet, menses trahit, lactis ubertatem facit, uitiosum sanguinem creat, & elephantiasin adfert, ut potio quem Xytho appellamus. Aliqui sex amphoris, decem salis sextarios adijciunt. Alij niuria amphoram, quod non facile uitiat, & alio idoneum fore censent. Alij Thymum et Fœniculum imo subiiciunt & Caricas superponunt: & ita uicissim, donec uas expleuerint. Fit & Sycomoris eodem modo uinum, sed in acetum acre de generat, quoniam non ita præualet uis eorum, ut fluentis liquoris dulcedinem retinere possit.

### Resinatum. CAP. XXX.

#### NOMENCLATURA.

Gr. ρητινίτης. Lat. Resinatum. It. Vino resinato.

**R**esinatum uinum populatim faciliari solet. Copiosum in Galatia: quoniam uinum illic coacescat, uua non maturescens, ob cæli algorem, nisi Picea resina temperetur. Resina autem cum cortice tunditur, & amphoræ dimidiata hemina permiscetur. Aliqui ubi efferbuit, excolant, separantes resinam: alij relinquunt. Hac uina uetustate dulcescunt. Omnia capitis dolorem, & uertigines faciunt. Concoctionem tamen adiuvant, urinam ciet, tuſſientibus, ac destillatione uexatis conueniunt. Item cæliacis, dysentericis, & hydropicis, & feminis fluxione uulue laborantibus. Altis exulcerationibus infunditur. In hoc autem genere nigricans, magis albo constringit.

### Strobilites. CAP. XXXI.

#### NOMENCLATURA.

Gr. Στροβιλίτης. Lat. Strobilites,

Ita. Vino delle Pine.

Strobili



Trobilites fit maceratis in musto nucibus pineis, recentibus, fractis, prabetq; resinati effectus. Si quis madesactas nuces in musto decoquat, potum assaiim conuenit ijs qui tabitudine inficiuntur.

## Cedrinum. CAP. XXXII.

### NOMENCLATURA.

Græ. Κεδρίν. Lat. Cedrinum. Ita. Vino del Cedro.

Cedrinum, Iuniperinum, Cupressinum, Laurinum, Pineum aut, Abiegnum, simili ratione fiunt. Diuisos recenter ramos, cum fructum adunt, aut soli, aut balneo, aut igni, admoueoportet, uti consudent, congiorq; uini minam unam permisce, & post duos menses transfundere, & antequam recondant, insolare. Factitiorum uinorum uasa impleri debent: namque in plenis uasis, uina in acorem corrumpuntur. Medicata autem uina, recte ualentibus insalubria. Omnia excalfaciunt. Vriam cient, & substringunt. Laurinum tamen uehemētius excalfacit. Fit quoque e fructu Cedri maioris uinum, congio musti electa tusarum baccarum selibra, diebus quadraginta insolari debet, & desecatum in uasa transferri. Fit etiam uinum e bacis Iuniperi, non aliter quam Cedrites, & ad eadem uales. Cedrites hoc modo fit. Cedriam dulci aqua lauant, & singulas amphoras singulis cyathis diluunt, & ita musto replent. Hoc uinum excalfacit, extenuat. Tussi antiqua utile sine febre, floris laterumq; doloribus, torminibus, uentris & interaneo ulceribus, purulentis excreationibus, mulieribus uulua cancrijs, hydropicisq;. Facit aduersus uentris tineas & horrores. Contra uenenatos ictus auxiliatur. Serpentes necat. Aurium doloribus instillatum medetur.

## Picatum. CAP. XXXIII.

### NOMENCLATURA.

T

Græ.



Græ. ΠΙCOTΗΣ. Lat. Picatum. Ital. Vino impeciato

**P**icatum ex liquida pice & musto temperatur. Picem autem primum marina aut muria tantisper eluere oportet dum in albuerit, & syncera maris aqua defluat, mox aqua duci proluenda. Congijs octo musti, uncia picis una aut altera adijcitur. Vbi efferbuerit & constiterit, in uasa diffunditur. Hogenus uiui excalfacit, concoquit, purgat, abstergit. Vtile doloribus pectoris, alui, iecinoris, lienis & uulua, si sine febre sint, ueteri rheumatismo, exulcerationibus in altum recedentibus, tussis, suspirijs, concoctionibus tardis, inflationibus, & luxatis, praesertim in succida lana impositum.

## Abinthites. CAP. XXXIIII.

### NOMENCLATURA.

Græ. ΑΨΙΘΙΤΗΣ.

Lat. Absinthites. Ita. Vino d' Assenzo.

**A**bsinthitæ faciundæ ratio euariat. Aliqui enim duodequingua sexarys Italicarum amphorarum, admiſtam Absinthij Pontici libram decoquunt ad tertias: & ubi infuderint sex aceti sextarios, & Absinthij ſelibram, ac diligenter permiscuerint, diffundunt in uas: dumq; conqueuerit, defecant. Alij Absinthij minam in amphoram demittunt, tussamq; & raro linteo deligatam, in cado musti macerant, binis mensibus. Alij Absinthij quadrantem, & Nardi Syriacæ, Cinnamomi, Casia, floris Iunci odorati, Calami, Elatæ, Palmarum, singulos sextantes inijciunt in metretam musti, & tundentes prius pila, obstrueto uasis spiraculo, binis ternisue mensibus dimittunt: postea defecatum uinum transfundunt ad usus. Alij addunt in musti cadum, Celticæ Nardi drachmas quatuordecim, & Absinthij drachmas quadraginta, linteo inuolutas, & post quadragesimum diem elutriant, Alij in senos sextarios

rios



is musti, Absinthij libram, & sicca Pini resina sextantem  
mittunt, & post decem dies excolat, & recodunt. Vtile est  
macho. Vrinam cit, tardam concoctionem accelerat, hepati-  
regio morbo, & renum vitis auxiliatur, fastidia discutit. Ijs  
odest quibus stomachus negotium exhibet. Valet contra lon-  
m prae cordiorum distentionem, & inflationes, teretesq; uen-  
s tineas, & remoratos menses. Contra hausta Ixia uenena  
amplurimum potum, & uomitionibus redditum, auxiliatur.

## Hyssopites. CAP. XXXV.

### NOMENCLATURA.

Græ. Ὑσσωπίτης.

Lat. Hyssopites. Ita. Vino d' Hissopo.

**H**ysopites e Cilicio hyssopo maxime laudatur. fitq; simili-  
ter, foliorum Hyssopi tusorum libra in amphoram musti  
niecta, linteolo raro, cum quibusdam lapillis, folia inuoluun-  
r, ut de grauatius pondusculo fasciculus sidat. Vinum post qua-  
raginta dies defecatum elutriatur. Contra pectoris, laterum,  
pulmonis vitia, ueterem tussim, & suspiria prodest. Vrinam  
T. Torminibus & horroribus febrium circuitu repetentibus  
auxiliatur. Menses mouet.

## Ex diuersis plantis facta. Ca. XXXVI.

### NOMENCLATURA.

Græ. οἶνοι ἐξ ποικίλων φύτων πεποιημένοι.

Lat. Vina ex diuersis Plantis facta.

Ital. Vini fatti di diuerse piante.

**S**imili modo Chamadrytes fieri solet. Excalfacit, discutit.  
Conuulsis, regio morbo, uulua inflationibus, tarda conco-  
ctioni, incipienti aqua inter cutem, subuenit. Inueterascens me-  
us redditur. Stœchadites non secus temperatur. Congijs sex

T 2

Stœch



stœchadis minam addere oportet. Crassitiem, inflationem, laterum, nervorumq; cruciatus, & perfrictiones discutit. Comitibus commode datur, cum Pyrethro & Sagapeno. Fit ad ead acetum è Stœchade herba, ut paulo antè diximus, aceto macerato, quod eosdem implet effectus. Fit uinum è Betonica, quã Cestron Psychotrophon appellant. Herbam semine maturo pregnantem, cum suis ramulis minæ pondo, congijs duobus uini macerant, & post septimū mensem transfundut. Ad multa interaneorum uitia, ut frutex ipse, pollet. Et ut in uniuersum dicatur, factitia uina sibi misturarum uires adsciscunt. Quare non difficile fuerit, is qui illarum naturas norint, uinorum uires coniectura quadam consequi. Veruntamen uinorum usus febricantibus abdicandus. Fit etiamnum è Betonica acetum ad eadē uitia utile. Tragoriganites fit quaternis Tragorigani drachmis linteolo colligatis, in quaternos musti sextarios coniectis, & post tertium mensem transfusis. Prodest torminibus, uulsis, ruptis, laterum doloribus, spirituum discursationi, agris concoctionibus. E Napis fit uinū, nomine Bunites, drachmis duabus tusi Napi in sextarios duos musti additis, & ceteris eodem modo factis. Prodest stomachicis, & dimicatione, aut longo equitatu fatigatis, Dictāni drachmas quatuor, macerato, quaternis musti sextarijs. Facit aduersus stomachi fastidia: menses, & purgamentū à partu subducit. Marrubij adulii folia tundito: & sextarios octo in musti metretam demittito, & reliqua consimiliter facito. Conuenit hoc uinum pectoris uitjs, & omnibus quibus Marrubium. Thymi tusi & cribrati uncias centū linteo colligatas, in amphoram musti adycito. Valet contra agras coctiones, fastidia, dysenteriam, nervorum & præcordiorū dolores, hybernos algores, & uenenata animalia, quorum morsus frigus insequitur, aut putrescit locus. Simili modo è Satureia uinū fit, quod eadem quæ Thymites præstat. Sic quoq; Origanites ex  
Her



eracleotico Origano conficitur similiter cum supradicto. Facit  
de qua Thymites. E Calamintha, Pulegio, & Abrotono ui  
fiunt eodem quo Thymites modo. Prosunt stomachicis, cibū  
stidentibus, & regio morbo, quod urinam moueant. Fit itē e  
onyza uinum, contra uenenata ante alia efficax.

## Aromatites. CAP. XXXVII.

### NOMENCLATURA.

Græ. Ἀρωματῖτις. Lat. Aromatitis. Ita. Aromatite.

Aromatites ita fit: Palma, Assalati, Calami, Nardi Galli  
ci, singulorum quatuor sextarios sumito, postquam con  
iueris, passo subigito: coactis ingentibus offis, & in sextarios  
duodecim austeri musti deiectis, operculato uase, quadragin  
diebus quiescere finito: deinde ubi sæce expurgatum fuerit,  
condito. Alia eius ratio: Calami uncia, Phu drachma septē,  
osti drachma due, Nardi Syriaci drachma sex, Casia uncia,  
roci drachma quatuor, Amomi drachma quinque, Asari  
drachma quatuor: omnia simul trita & linteo colligata in ca  
m musti demerguntur, & postquam uinū deferbuerit, trans  
nditur. Facit ad pectoris, & laterum, & pulmonis dolores.  
difficili urina, horroribus, retardatis mēsis, atque ijs qui per  
igora iter faciunt, potum cōuenit, pituitæ crassitiem extenuat.  
dolorem alit, somnum conciliat, dolorem finit, renum & ue  
æ uitjs auxiliatur.

Ex diuersis odoramentis facta.

## CAP. XXXVIII.

### NOMENCLATURA.

Græ. οἶνοι ἐξ ποικίλων αρωμασδωρ.

Lat. Vina ex diuersis odoramentis.

Ital. Vini di diuersi odoramenti.

T 3

Fit



**F**it & uinum ad destillationes, cruditates, tuſſim, inflatic  
 nes, & ſi humor in ſtomacho coijt. Myrrhae dua drachm  
 Piperis candidi drachma una, Iridis drachma ſex, Aniſi dra  
 chma tres, omnia plenius tuſa & linteolo inuoluta in ſex un  
 ſextarios conijciuntur: uinum poſt triduum colatur, & in lage  
 na reconditur. Datur poſt deambulationem, meraculum, cya  
 thi unius menſura. Fit quoque Neſtarites ex Helenio herba, ri  
 dice ſicca pondo quinque drachmarũ linteolo colligata, & in  
 cõgios ſex muſti addita, & poſt tres menſes effuſa. Facit ad ſto  
 machi & pectoris uitia. Urinam pellit. E Syriaca Nardo, &  
 Celtica, Malabathroq; uinum factitatur, hac ratione: Singulo  
 rum ſelibram in binos muſti congios mittito, poſt menſes duo  
 colato. Datur cyathus unus cum tribus aqua. Hoc uinũ efficax  
 eſt contra uitia renum, hepaticos, regium morbum, & urinae  
 difficultatem. Prodeſt ſtomachicis, atq; ijs quos pallor decolo  
 rat. Alij uncia aut ſextantem Acori, & Celticae Nardi qua  
 drantem, in muſti amphoram adijciunt. Aſari quadrantem in  
 ſenos muſti ſextarios itidem demittito. Id uini genus urinã ciet.  
 Hydropicis, & regio morbo laborantibus, hepaticis, iſchiadi  
 cisq; conuenit. Radicis Sylueſtris Nardi recentis & tritæ cribra  
 teq; beſſem in congiũ muſti cõycito, duos mēſes quieſcere finito.  
 Utile eſt hepaticis, difficili urinæ, inflationibus ſtomachicis.

### Ex diuerſis herbis facta. Ca. XXXIX.

#### NOMENCLATURA.

Græ. οἶναι ἐξ ποικίλων βοτάνων.

Lat. Vina ex diuerſis herbis.

Ita. Vini di diuerſi ſorti d'herbe.

**R**adicis Dauci contuſæ drachmas ſex, in muſti amphorã  
 imponito, & ſimiliter trãſfundito. Facit ad dolores tho  
 racis præcordiorum, & uulnæ. Menſes pellit, ruclũs ciet, &

urin



inā. Prodest tussi, ruptis, uulsisq; Salvia uncia in musti ampho-  
 m, quod idem cum ceramio est, mittito. Valet contra renum,  
 fica, & laterum dolores, reiectiones sanguinis, tussim, rupta,  
 lsa, & suppressos mēses. Panacis uncia in musti congiū mitti-  
 & transfundito. Prodest ruptis, uulsis, cōtusis, orthopnæa, lie-  
 s craſtitiem extenuat. Cōtra tormina, coxendicū dolores, effi-  
 x est tardas concoctiones accelerat. Mēses & partus extra-  
 t. Aquæ inter cutē, & serpentū iclibus auxiliatur. Vina ex  
 eto & Dulci radice cōsimili modo fiūt. Oportet enim singulo  
 uncias octo in senos cōgios mittere. tribus mēſibus macerare,  
 ox in uas trāsferre. Faciūt ad pectus, & latera, & urinā mo-  
 nt. Seminis Apij recentis, maturi & cribrati uncia nouē in  
 ateo colligatæ in musti amphorā demittātur. Appetitum exci-  
 t. Stomachicis, & difficili urinæ auxiliatur. Faciles spiritus fa-  
 t. Ex Fœniculo, Anetho & Petroselino, uina eodē modo fiūt  
 & ad eadē efficacia. Fit & è flore salis uinū, multo ad purgan-  
 u efficacius, quā uinū aqua marina tēperatū. Fauces uesticam  
 enes & stomachū infestat: quare neq; in secunda, neq; aduersa  
 aletudine prodest. Fit etiā uinū quod Phthoriū uocat, quoniā  
 artus necat, & abortus facit, Veratro aut Scāmonia, aut sylue-  
 ri Cucumere, iuxta radices uitiū sato: siquidē uites sibi illorum  
 res adſciscunt. Id uinū partus enecat. Datur ieiunis mulieribus  
 uæ antē uomuerūt, cyathorū octo mēſura dilutū. Ramorū Ty-  
 elæa cū suis folijs & fructu triginta drachmas mittito in con-  
 ios tres musti, & leui igne coquito, donec cōgy duo supersint,  
 efecatuq; recōdito. Aquosa purgat excremeta, & lienē absu-  
 nit. Chamelea dū floret, cū folijs tusa & cribrata decē drach-  
 narū pōdere in musti cōgiū addit. Post duos mēſes, uinū in uas  
 rāsferitur. Aquæ inter cutē hepaticis: & lassitudine cōfractis:  
 fficax est. Iterū mulieribus: quæ à partu egre purgantur. Cha-  
 nepityinum simili modo fit, ad eadem conueniens: urinam

T

4

quoq;



quoque ciet. Libram radicis Mandragoræ concidito, segment  
 Lino trajcito, quod selibram æquat in musti cadum dimittito  
 ibiq; esse finito ad mēses treis, deinde transfundito. Media potio  
 hemina dimidium. Bibitur, passo in duplum addito. Aiuunt he  
 minam uini congio mistam, potu soporē adferre. Cyathus unu  
 cum sextario uini potus, enecat: Mediocris usus eius, doloris sen  
 sum adfert. Fluxiones incrassat. Olfactu, potuq;, & cum indit  
 tur, idem præstat. In congiū musti aqua marina diluti, drach  
 mas duodecim nigri Veratri triti in linteo mundo, mittito: dūq;  
 efferbuerit, in marina aqua congios quatuordecim aut quindec  
 im, ubi pleniuscule fregeris, inycito. Post aliquot dies colato,  
 & utitor. Dato cyathum unū ex aqua balnei in potu, ad aliu  
 soluendam ijs qui euomuerunt à cœna. Alia ratio: Veratri dra  
 chmas uiginti, Iunci odorati uncias duodecim, spica Syriacæ un  
 cias tredecim, cribratas & linteo colligatas, in septem uini Coi  
 sextarios, diebus quadraginta macerandas indito, postmodum  
 colato. Dabis in potu sesquiheminam. Aliter: Decocta marina  
 aqua ex alto petita sextarios duodecim, Veratri candidi libras  
 sex, in musti amphora quadragesimo die quam madefeceris,  
 colato, & utitor. Alia ratio: Veratri drachmas duodenas, &  
 aphronitri quaternas in senis musti sextarijs, diebus quinisdenis  
 macerato, mox colato: & semestri exacto, utitor. Id uini genus  
 abortus facit, & partus necat. Aut uuas in sole siccatas, imponi  
 to in musti metretam (implet autē metreta congios duodecim)  
 & gypsum, in uinum mittito, pondo drachmarum uiginti, &  
 biduo residere finito, conycito Veratri nigri drachmas trigin  
 ta, Iunci odorati, Calami singulorum drachmas triginta, bac  
 carum Iuniperi sextarios duos & trientem, Myrrhæ & Cro  
 ci singulorum drachmam, inuoluens lintcolo diebus quadra  
 ginta appendito, postea colato. Dabis heminas treis aut duas  
 dilutas. Purgat à partu & abortu feminas. Fœtus extrahit.

Con



contra strangulatus uulua efficax. Scammonites sic fit, Radi-  
scamoniae per messes effossae, tritae, & linteo colligatae drach-  
mas quinque in musti cogium mittito: ad dies triginta. Aluum  
ergat, bilem & pituitam extrahit.

Diuersa pro caeli & soli ratione Vitis differentia. Has recensere non  
admodum ad rem fecerit, & ex Plinio & Theophrasto poterit  
quis lector haurire, quo vel morosa cupiditati satisfaciat. Labrusca ea  
cum Vite est, nisi quod non colatur, solo hoc discerniculo ab illa dis-  
tinguitur. Vuae passas, Galenus & veteres omnes, non pusillas has tantum  
intelligit, quae ex Oriente & gracia Venetijs afferuntur, sed om-  
nes pusillas aut grandes, quotquot insolatae, farina, ficuum more con-  
feruntur. Siquidem solus eidem gustus differentiam prodit. Tribit Dama-  
scum, Candiacum, Cyprium Vuae passae numerum subibit. Vuae pas-  
sae cum acino astringit: his priuata, lenit, & tribit quae nil penes  
exter corticem & acinum habet idonea tantum restringendo corpori  
roborando stomacho. Quod si lenitudo ex his mollienda, agris sua-  
dum ut acinos expuat, quin & huius Vuae passae praescribendus usus,  
sine acinis nascitur. Hoc tamen in negotio cauedum, ne Vuae passa  
sola aut austera, sit, quod ea, & cum, & sine acinis, frigidiores sunt,  
astringunt, stomachum roborant, & parum nutriunt. Oenan-  
the, secundi Labruscae generis, flos, pulchre & absolute à Dioscoride des-  
cribitur. Thasia aut Aminea loco, nunc vuis immaturis od Omphacium  
sciendum utimur. Vini natura, & usus tum commodus, tum incommodus satis  
hoc authore & alijs multis descriptus. Hoc tantum dixisse sufficiat, Ga-  
lenum Vini per aestate arte profrigefacti usum reprobare. Nam quam-  
vis in iuuenum corporibus lasio manifesta non appareat, aetatis tamen  
processu, sub ineuntem senectutem se prodit malum, ac inde nerui, iun-  
turae, & interiora laesionem sentiunt, quae aut nullatenus, aut egrè ad-  
iudum curetur. Vinum Melitites, & Mulsum raro & paucis in locis  
paratur. Melicraton, seu Aqua mulsa, ex tempore fit, ex melle & aqua  
mulsa, ex tempore fit, ex melle & aqua simpliciter. Hydromeli ultra  
uam & mel, adduntur quae diurnitatem concilient. Aquarum  
natura cuius patet, è caeli, soli, fluxus, bonitate vel malitia concepta.  
etiam indigenarum vultus coarguit. Qui supersunt capitum contex-  
tus, de Aceti & Vini varia confectio, clari sunt, & sane magna pars  
nostro tempore non paratur, quae tamen si pararentur aut priuatis in-  
firmis aut seplasis, id maximum in modum agris proficeret. Quapropter  
Matthioli opinio est, Vinum è ligno sancto frigidis morbis magna fa-  
cilita



cilitate egros exoluere, per pello in compluribus sanitati redditis successus argumento.

## Metallica omnia, & primum cadmia.

### C A P. X L.

#### NOMENCLATURA.

*Græc.* πᾶς λίθος μεταλλικός, καὶ πρῶτον καδμία.

*Lat.* Metallica omnia, & primum Cadmia. *Ital.* Tutte le Pietre Metalliche & prima della Cadmia.

**E**x Cadmia generibus optima est Cypria, Botritis nomine densa, modicè grauis, & in leuitatem magis declinans racemosa facie, colore Spodij, quæ fracta cinerulenta est, & æruginea. Proxima habetur foris cærulea, intus candidior, internatis uenarum discursibus, Onychitæ lapidi similis, cuiusmodi sunt quæ è ueteribus metallis effodiuntur. Quædã etiam Placodes, id est, crustosa, dicitur, segmentis quibusdam perinde quasi zonis cincta, ob quod eam zonitin appellauere. Alia Ostracitis nominatur. gracilis, & magna ex parte nigra. Sed quæ testaceam faciem habet terram amplexa est. Improbatur candida. Oculorum medicamentis Botrytis nomine, & Onychitis, utilis: reliquæ ad emplastra, & farinas quæ cicatricibus inducendis insparguntur. Ad eadem Cypria prodest. Ex Macedonia uerò, Thracia & Hispania delata, improbantur. Cadmiæ effectus astringere, cana explere, sordes expurgare, exiccare, corporis meatus inficere, excrementa in carne coercere, crustas creare, & ulcera quæ cacoethe uocantur, ad cicatricem perducere. Gignitur Cadmia ex ære in fornacibus candente, fuligine egesta flatu, & lateribus cameris fornacum inherente. Prægrandes autem ac ferreæ sunt rudes, ab officinis appellatæ Acestides, per summa fastigia connexæ & concameratæ, ut quæ ab ære iactantur sursum corpuscula cohæreant, & inibi detineantur.

Quæ



et cum spissius insident, in corpus concreescunt, & modo generum eius: modo duo, modo omnia perficiunt. Extrahitur & Cadmia in Cypro è monte qui Solis incumbit, cremato lapide Pyrite cognomen est, in quo etiam monte quedam quasi Chalchitis, Asifos, Soreos, Melanteria, Cerulei, Chryso-  
la, Atramenti sutorij Diphrygisque inueniuntur. Nec desunt Cadmiam in lapidum fodinis inueniri tradant, falsi quadam idum cognatione. Qualis inuenitur & apud Cumas lapis, illam sui uim ostendens. Si eo deprehenduntur, quod sunt Cadmia leuiore, nullumque alienum mudentibus saporem exhibent. Si manducatus item lapis, dentes offendit. Cadmia, utpote cumulat, esum non respuit. Alio autem discerni possunt argumento: Cadmia in farina detrita, & aceto subacta, atque in sole siccat, coit: quod in lapide non accidit. Item tritus & igni appositus, profilit, & fumum igni similem ei aculatur: Cadmia uero uicta manet, fuliginemque luteo colore aut aereo splendentem respuit, uario zonarum discursu. Insuper lapis ignem expertus, que refrigeratus colorem mutabit, ac leuior multo fiet: sed Cadmia nihil euariat, nisi quis eam multis diebus cremauerit. Et in argenti fornacibus candidior, ac minus ponderosa: sed tribus nequaquam comparanda æraria. Vritur Cadmia superior carbonibus obruta, donec translucida spectetur, & ferrei mercuris modo bullet. Mox extinguatur uino Aminæo, que ad emplastra preparatur: sed que ad psoriarum medicamenta præparatur, aceto. Alij hoc modo exustam conterunt in uino, et sumque fictili crudo torrent, donec pumicosa uideatur: iterumque tritam ex uino, tertio urunt, donec prorsus in cinerem redigatur, nihil scabritie retinens. Hac Spodij uice utuntur. Latatur autem in mortario trita, effusa subinde aqua, dum sordidum nihil emergat. Dein coacta in pastillos reponitur.

Cad



**C**admia duplex. Faclitia, & natura fodinis innascens. Faclit in fornacium, ubi as eliquatur, summo, in massas. nunc racen-  
sas, nunc crustaceas, alias lineares, aut testaceas, eo quo Dioscorides per-  
scribit artificio & lapide, inspissatur. Quo verò, hinc Cadmia, inde  
conficitur, nihil interest terram an lapidem voces. Fit & ex Argent-  
dinis, secretis materiarum partibus. Natina sine fornace, olim in Cyp-  
reperiebatur, hacque impunè vocari lapis potest. Id lapidis genus, à C-  
leno Cypri tum agente, in montibus & torrentibus inuentum, peritio-  
nè temporis iudicio, præ cæteris Cadmijs palmam tulit. Cremata Cadmi-  
Vna Botrytis, quæ tenuioribus, Alte. a Placites, ponderosioribus part-  
bus constat. Tridentinae fornaces in Peræne (sic locum susorium vocant)  
& in Sboxzo Germania, ubi ingens æris copia, excolatur. Hæc eadè e-  
cum Thutia Alexandrina, quæ falso pro vera Thutia habita, ipsissim-  
Dioscoridis est Cadmia. Nec mirum si nomen illi suum deperit, cum Dio-  
scoridis seculo Spodij vicem suppluerit, quod & ipsum Thutia est im-  
perfecta, & præterea nihil.

## Pompholyx. CAP. XLI.

### NOMENCLATURA.

Græ. *Πωμφολυξ*. Lat. Pompholix. It. Pompholige.

**P**ompholyx specie sola, non genere, à Spodio distat. Siqui-  
dem Spodos nigricat, & plerunque ponderosior est, pi-  
lorumq; plena, quasi purgamentum quoddam, quod ab ærariarum  
offinarum pavimentis & fornacibus euertritur: Pompholyx  
verò pinguis est, & candida, usque adeo levis, ut in auras enola-  
re possit. Cuius duo fluxerunt genera: Vnum ad aeris colorem  
uergens: subpingue. Alterum magnoperè candidum, summamq;  
leuitatem nactum. Candida sit Pompholyx, quoties in perficiun-  
do ære, fabri præstantiorem facere uolentes, detritam Cadmiam  
cumulatiuis insparserint: nanque tenuissima fauilla, quæ effertur,  
in Pompholygè coit. Cæterum Pompholyx non ex æris mo-  
do materia & fabrilis industria faclitatur, sed ex Cadmia quo-  
que, ad gignendam ipsam, eximie follibus proflata. Cuius faci-  
unda ratio hæc est: In domo, gemina contignatione operta, for-  
nax extruitur, iuxta quam mediocris fenestra ad tabulatum à  
supe



his partibus pateat. Domicilij paries fornaci proximus, tenui  
mine ad fornacem usque perforetur, ad excipiendam solis  
rem. Ostium mediocre habeat pro exitu ingressuq; artificis fa-  
ciendum. Domuncula altera huic coniuncta sit, in qua &  
flator suo munere fungantur. Deinde carbonibus in  
furno succensis, assidens artifex Cadmiam particulatim fra-  
gmenta inspargit, a locis supra infurnibulum extructis. Idem nego-  
cio obit inferne artificis minister, simulq; carbones adijcit, usq;  
indita Cadmiae copia prorsus absumatur. Itaque egesta sus-  
tenuis pars & levis materia, in summam domum euolat,  
parietibus, tectis, fornicique adhaerescit: conflatum autem inde  
opus, inter initia erumpentibus aquarum bullis simile prodit,  
atque minus incrementum capeffens, glomusculis uellerum simi-  
li redditur, ponderosius autem in ima loca se recipit. Sed hoc for-  
mibus offunditur, illud domus pavimento coheret: quod tenui-  
deterius existimandum est, ideo quod multum terrae colle-  
git, & spurcitia in acervatione reseruiatur. Sunt qui hoc mo-  
dum fieri Spodium arbitrantur, de qua antedictum est.  
Tima creditur Cypria, quae accepto aceto halitum aris praestat  
ore aliquantum piceo, sapore caeni horrido, & si fraudem non  
perta flagranti carbone inferuescit, aereum colorem contra-  
hit. Antedictis autem notis diligenter attendendum est, si qui-  
dam a nonnullis adulteratur, taurino glutine, ouillo pulmone, aut  
aurino, aut crematis grossis, & quibusdam consimilibus. Quod  
cognitu fuerit: quippe nihil in iis probandis inuenietur eo-  
rum quae ante dicta sunt. Pompholygem in commune ita lina-  
oportet: Ligatam linteo mundo modiceq; raro, aut siccam, aut  
uam respersam, in labellum demittito, quod imbrem contineat,  
huc atque illuc facisculum deferens, immergito. ita enim li-  
nosa pars eius ac utilis effluet, & omne sedimentum in linteolo  
manebit. Postea residere sinens, aquam cum cinere colis incer-  
nito,



nito, & nouam infundens, agitato: & effundito: mutata tantisper aqua, & colata, dum arenosi nihil fidat. Demum aqua exprimito, & siccatum cinerem recondito. Alij quantum maxime fieri potest siccant, & manibus in aqua conterunt, dum Mellis crassamentum imitetur. Deinde linteo faucibus excepturi uasis obteto, aut laxius illigato, colant, & quo facilius transeat, infusa per lintheum largiore aqua, cinerem conturbant. Mossuosum, quod traiectum est: & supernatat uasi, concha excipiunt: & fictili nouo ad usus recondunt. Quod uero resedit sensim cribratum, in aliud uas transfundunt, relicto arenoso quod pessum ierat. Rursus lapidosa sidere patiuntur, & in uas alia excolant. Hoc identidem faciunt, donec cinis merus & arena expers inueniatur. Alij paulatim integram in aqua respergunt, arbitrati arenas lapillosque suo podusculo degrauiatos, pessum ire, pilos autem & paleas leuitate sua in sublime attolli. Ceterum cinerem medium separant, & in pilam coniectum, ut Cadmia, eluunt. Quinetiam lauatur uino Chio aqua marina diluto, modis quos supra diximus: & ita redditur adstringentior, quam aquis elota. Vis Popholygis astringere, refrigerare, explere purgare, obstruere, & aliquantum exiccare: inter medicamenta numeratur, quae leniter crustas obducunt. Quod si Spodio torrere libet, diligenter tritam & irrigatam aqua colliges in pastillos, fictilique nouo, subiectis leuibus prunis, orbiculos continuo uersabis, dum assiccati fuluescant. Neque ignorandum, ex auro, argento, plumboque fieri Spodion: uerum post Cyprium plumbeum maxime commendatur. Quonia Spodios saepenumero desideratur: necesse est ostendere, quae simili uirtute polleant, ut in Spodij locum suffici possint, Antispodia uocant, quoque modo sumi debeant. Folia itaque Myrti cum floribus & baccis immixturis, in fictile crudum coniecta, indito operculo continua foramina habente, uruntur fornacibus, donec figlinum percoquatur. Iterum in  
fictile



le aliud crudum transferuntur: quod ubi perassatum fuerit, impta lauantur ad usus. Idem quoque fit e termite sylvestris, si habeatur: sin secus satiuæ cum suis floribus, aut malis, conis dissectis, & detractis ossibus, aut Gallis, aut laceratis ocolis: item ex Moris immaturis, id est candidis, in sole prius factis, aut Terebintho, aut Lentisco, Oenanthe, aut mollibus, si folijs, uel e Buxi coma, uel Pseudocypero cum flore. Alij lineas frondes in sole antea siccatas, eodem modo parant. Alij taurinū gluten. Alij succidas lanas asperas, pice aut Melle gatas, Quæ omnia in Spodij uicem usurpantur.

Thutia vulgaris, quæ eadem cum Cadmia est, Lapidis duritiem contrahit: pompholyx leuissima fauilla est. porro in ipsis Aeris conibus atque adeo Cadmia fornaci iniecta, bullæ emergentes tenuissimum ac leuissimārū fauillarum effigie, quæ summis fornacum caminis adheret, pompholygem faciunt. Spodiū verò, pompholygis extincta illa est, quæ pondere denuò decedit, & circa fornacē pauimentūque igitur. Ceterum vera Thutia, Quod antispodium vocamus, vim parum Spodio obtinet, neutrum tamen intra corpus sumitur, & per se arabum Spodium, hepatis non est confortando. Elota pompholyx lentissimum, inter ea quæ sine morfu desiccant, remedium est, & ideo gadanis & malignis vlceribus conuenit. Collyrijs inditur, in oculorū acie & pustulas. Sedis & genitalium vlceribus summè prodest.

## Aes ustum. CAP. XLIII.

### NOMENCLATURA.

Græ. Κεκαύμενον & χαλκον.

Lat. Aes ustum. Ita. Rame abbrusciato.

**A**Es ustū probatur rubrū, & quod cōtritū colore Cinna-  
barim imitetur. Nigrū uerò plusquā deceat exustū est.  
autē e clauis solutarū nauū, fictili crudo cōpositis: subperso  
phure cum sale pari, omnibus uicissim insparsis: fictile, cir-  
cūlito figulari creta spiramento, fornacibus inditur, donec  
linum percoquatur. Quidam pro sulphure & sale Alumen  
inspa



inspargunt. Alij sine sulphure ac sale, fictili multos die urunt. Alij sulphure solo utuntur. Fuliginem tamen excutunt. Alij oblitos scissili Alumine clauos, cum sulphure & aceto, fictili coado cremat. Alij in aenea olla aceto respersos urunt, & iterum tertio idem efficiunt, postea recondunt. Principem locum tene in Memphide combustum: proximum, in Cypro. Adstringit, exiccat, reprimat, extenuat, attrahit, ulcera purgat, & ad cicatricem perducit, uitia oculorum emendat, ex crescentia in carne consumit, nomas cohibet. uomitus ciet, Cum hidromelite potum, ac cum Melle delinctum, illitumue. Lauatur ut Cadmia, mutata quater die aqua, donec nulla prorsus sordes emergat. Aeris recementum, stercusue, quam Scoriam uocant, eodem modo lauatur, & eandem uim, sed imbecillio rem, habet.

Improbatur duci poterit Aesustum officinarum, quod nigrore nimio rustionem representet, sitque non rubens, ut postulat Dioscorides. At in erroris emendabit diligentia, quae Dioscoridis praescriptionem sequetur. Et huic consiciendo, vetus quodlibet Aes, cuprumue sufficerint. Nam in ferro auro nauium clauis, quod longius perdurent, e ferro consciuntur. Aesustum acre est, & astringitorium: at elotum, per pulchre cicatrices inducit, quod etiam ante lotionem maxime in carnibus duris efficiet: elotum tamen in carne molli praestantius operabitur.

## Flos. CAP. XLIII.

### NOMENCLATURA.

Gr. Αὔρα καλκός. Lat. Flos aeris. It. Fiore del Rame.

**F**los aeris, quem nonnulli clauorum ueterum psegma, quasi resegmentum aut segmentum, nominarunt, optimus est friabilis, in atritu fuluescens, Mili effigie, & numero, brevis, ponderosus, modice splendens, atque constringens, qui delimatam aeris scobem non recepit, qua saepe adulteratur. Sed id facile deprehenditur, cum dentium illisu, dilatantur ramenta. Fit autem, cum aes fornacibus fusum, in receptacula dilabatur: per cola fistularum ad ea pertinetium. Tum huic negotio addicti ministri: sordes ex



s expurgantes, aquam clarissimam infundunt, refrigerandi  
opposito. Itaque repentino concretu, ac addensatione, uelut ex-  
ititur & erumpit antedictus flos. Adstringit, & ex crescentia  
erectet. Offusam oculis caliginem emendat, sed magnoperè mor-  
t. Quaternum obolorum pondere datus, crassum humorem  
trahit. Carnosa narium & sedis uitia absunit. eruptiones pa-  
larum cum uino cohibet. Candidus contra diuturnas aurium  
auitates tritus, in eas per fistulam flatu impellitur. Vuam, ton-  
lasq; reprimat, farina eius cum melle admota.

Loris Aeris à se coll: Et, hanc rationem tradit Matthiolus. Statim à  
percolato Aere, in receptacula illi excipiendo preparata, priusquam  
se coalesceret, lymphida & gelidissima aqua situlam ingentem super-  
ijciebat, ac inde confestim ingenti cum fragore ex Aere prodeūti præ-  
enso fumo, tantisper dum hic vapor & fumus perdurant, palam su-  
r Aes, aqua affusum, continebat. Hæc cum defussent, palam supernè  
tam minutissimis & rubentibus granis, Aes colore cum quodam splē-  
ore referentibus factum comperit. Id eō factum est, quod per vaporem  
ertracta in sublime tenuiore metalli parte, cum ob aeris frigiditatem  
minutissima grana cōgelasceret, in inferiora decidens, palæ ferreæ  
perincumbebat. Hoc semper apud se retinuit: quod seplasis eius vice  
erugo, & non flos Aeris ueneant. Aeris flos subtilioris, quam Aes  
um, aut Aeris squamma, essentia est.

## Squamma æris. C A P.

### XLIIII.

#### NOMENCLATURA.

Gr. λέπτις. La. Squamma æris. It. Squama del Rame.

Squamma æris, excussa ex Cypris Officinarum clauis, cras-  
sa quidem ipsa, præstantior, quæ Helitis, id est clauaris, no-  
minatur: sed ex uili promiscuoq; ære, aut candido, uitiosa intelli-  
gitur: quam, ut potè tenuem & inuolidam, damnamus, maxi-  
mè approbantes crassam, ruffam, præsertim si aceti respersu, æru-  
minem contrahat. Vim habet adstrictoriam, extenuantem, re-  
primen



primentem, & erodentem. Nomias coërcet. ulcera ad cicatricem perducit. Pota ex aqua mulsa, aquam trahit. Aliqui farina subactam, dant in catapotio. Additur ad oculorum medicamenta. Genarum scabritiam absumit, & fluxiones exiccat. Lauatur hoc modo: sicca aris squammæ expurgata selibra, cum nitida aqua in mortario manu diligenter cōturbatur, quousque pessum ierit. Abijcitur quod subsidit, & effusa aqua, hemina cœlestis imbris adijcitur, & distenta manu, squamma quasi destringenda sit, uehementer confiricatur, dumq̃ lentorem emitte-  
tere cœperit, aqua sensim ad sex heminas usque superinfunditur, terendo ualide. Squamma ad latus mortarij colligitur, ibiq̃ apprimitur. Quo factō, expressus humor pyxide, ex are rubro facta, excipitur. Hoc est enim uelut flos squammæ, ualens uiribus, & ad ocularia medicamenta cum primis efficax. Inutile imbecillumq̃ quod superest, lauatur donec nullam prorsus lenti-  
tiam excernat, & linteo Opertum biduo conquiescere finitur, effusaq̃ extante aqua, ubi siccatum erit, reconditur pyxidicula. Alij ut Cadmiam lauant, & reponunt. Squammæ, ex acie, aut mucronibus decussa, quam uocāt stomoma, eadem uis. Lauatur modo simili, & reconditur: sed ad moliedam alui deiectionem, inefficacior est.

**S**quāma Aeris, quæ ex tuso & detrīto Aere profilit, medicina utilis est. Repperitur & ferri squāma, & Stomomatis. Omnes potenter desiccant, quanuis diuersè pro suo quæque modo. Squāma Aeris alijs potentius desiccet, quod essentia sit tenuioris, ac in se aliquantum aruginis contineat. A tenim ferri squāma magis astringit, & ab ea Stomomatissquāma. Eo fit ut hæc posteriores in vlcera medicatu contumacia plus polleant, quam Aeris squāma. Hæc carnem consumit & eliquat, & maximè Helite. Squāma omnes, magnā uehementia mordicant, Qui liquet qua constituuntur essentiam, non tenuem esse, sed ponderosam. Stomoma non ex Aere aut ferro prodit, sed ex Chalybe, quem Acrem uocant, tum maximè cum malleo super incude tunditur, conficiendis armis bellicis, & rusticis instrumentis. Ex Aetio, & Actuatio patet  
Sto mo



*Stomoma non ferrum, sed Chalybem sonare.*

## Aerugo rasilis. C A P. XL V.

### NOMENCLATURA.

Gr. ἰοὺ ξύσου. Lat. *Aerugo rasilis. Erugine rasile.*

**A**erugo rasa fit ijs modis: In cadum, aut aliud consimile uas acetum quam acerrimum infunditur. Superponitur inde inuersum aneum uas, praesertim concameratum: sin minus, planum: sitq; obstructum, nullumque habeat spiramentum, exempto, quo doliolum obturaueris operculo. Decimum post diem insidens Aerugo deraditur. Aut eris lamina in cadis super acetum ita suspenditur, ne ipsum attingat, & totidem post dies raditur. Aut massula eris, aut lamina una pluresue, uinaceis non recentibus, sed iam acescentibus conduntur, & simili modo uersantur. Quinetiam ex delimitata eris scobe Aeruginem facere licet, necnon e laminis, quibus bractea auri conclusa malleo ducuntur, si quis eas aceto respargat, & ter aut quater uerset, donec Aeruginem contrahant. Tradunt Aeruginem in Cypris metallis gigni, lapidibus quibusdam nonnihil eris habentibus, quibus Aerugo efflorescit: adduntq; per canicula estus e quodam specu manare: sed illam paucam & optimam esse: hanc speluncis effluentem, copiosam quidem, & boni coloris, sed uiciosam, quod lapides multos collegerit. Pluribus autem modis adulterant aliqui Pumice admisto, alij Marmore, alij Atramento sutorio. Sed deprehendemus Pumicem aut Marmor, dum pollice sinistrae manus madefacto, Aeruginis portiunculam altero atterimus: siquidem eam diffundi constat. Marmoris autem pumicisq; partes coeunt non dissipata, demumq; traelatione crebra & humoris complexu dealbescunt, quin & dentium appressu: siquidem sincera cedit, lauis, & sine asperitate. Atramentum uero sutorium ignecoarguitur. Namque si fictile, aut lamina adulterata Aerugine illinatur, & seruati cinere aut carbonibus



incaleſcat alterutrum, mutabitur, rubeſcētque id quod A-  
 tramentum ſutorium acceperit, quod id uſtum, ſuapte natura  
 talem ſortitur colorem. Aeruginis quam uocant Scole-  
 ciam, duo ſunt genera. Quædam foſilis eſt, altera factitia ad hunc mo-  
 dum: In mortario Cyprij æris dimidiam heminam aceti albi a-  
 criſq̃, piſtillo cupreo conterito, donec ſtrigmenti craſſitudinem i-  
 mitetur: deinde aluminis rotundi drachmam unam, cum ſalis  
 foſſit, tranſlucentis, aut marini quàm albiſſimi, ſolidiq̃, aut cer-  
 te cum Nitri pari pondere, terito in ſole, æſtuoſiſſimis diebus, ſub  
 ſydus canicula, donec colorem Aeruginis contrahat, & con-  
 cretu ſtrigmentofum fiat. Vbi autem ſe in uermiculorum Rho-  
 diacis ſimilium ſpeciem coëgerit, recondito. Efficax, & ualde  
 boni coloris redditur, ſi duas partes urinae ueteris, cum una ace-  
 ti adiaceris, & alia quæ dicta ſunt, peregeris. Sunt qui Aeru-  
 ginem raſilem, quæ in apparatu non reſpondit, gummi miſto di-  
 gerant in formas, & ita uendant. Quod genus, ut uitioſum, im-  
 probatur. Fit & quædam Aerugo ab aurificibus, mortario  
 & piſtillo Cyprij æris, cum urina pueri impubis, qua aurum fer-  
 ruminant. Antediſta Aeruginum genera, uſto æri omnino  
 reſpondent, ſed magis effectu ualent. Sciendum foſilem Scole-  
 ciam præſtantiſſimam eſſe: deſaſam ſequi, poſtremo loco facti-  
 tiam, mordaciſſima tamen eſt hæc, & magis adſtringens. Au-  
 rificum autem ærugo raſa reſpondet. Aerugines omnes adſtrin-  
 gunt, extenuant, excalfaciunt. Oculorum cicatrices emendant,  
 lachrymas cient, nomas ſiſtunt, uulnera ab inflammatione tue-  
 tur, ulcera ex oleo ceraq̃, ad cicatricem perducunt, callos & ſor-  
 dida ulcera purgant. Cum melle coctæ, callum fiſtularum ero-  
 dunt, cum Ammoniaco, collyrij modo, in eas adaectæ. Ad gin-  
 giuarum autem excreſcentias, & extuberationem utiles. Ma-  
 gnopere extenuant genarum craſſitiem, cum Melle illitæ. Ve-  
 rum poſt illitionem ſpongia ex aqua calida locus ſouendus eſt.

Refina



Resina terebinthina excepta, cum are & nitro lepras abigunt. Vritur Aerugo, quacunque uelis minutissime fracta, comminutaq; in fictili patina, flagrantibus prunis superposita: uersaturq; donec se mutet, & colorem cinereum concipiat. Postea refrigerata reponitur ad usum. Sunt qui cruda olla eam urant, uti dictum est: sed non prorsus eundem colorem cremata reddit.

### Rubigo ferri. CAP. XLVI.

Græc. ἰὸς σκῆληρον. Lat. Rubigo ferri. It. Ruggine del Forro.

**R**ubigo ferri restringit. Sistit scaminarum profluvia admota: potuq; præstat ne concipiant. Illita ex aceto, ignibus sacris, & papularum eruptionibus medetur. Perquam utilis ad scabritias genarum, reduuias, & pterygia. Condylomatibus prodest, gingiuas firmat, podagras illita lenit, alopecias replet. Vinum aquaue, in qua candens ferrum sit restinctum, potu celiacis, dysentericis, lienosis, cholera laborantibus, & dissolutis stomacho auxiliatur. Stercus ferri, quam Scoriam uocant, eadem potest quæ Rubigo, sed inefficacius. Aconito, ex aceto mulso potum, opitulatur.

**A**erugo, quæ Aeris rubigo est: ut in ferro ferrugo, seplasis & recentibus medicis, Viride Aeris, magna abundantia in omnibus pharmacopolijs habetur, licet syncera sit parum, adulterata ingens copia. Nam cum Aerugo, aut fossilis sit, aut factitia: fossilis quod fodinis innascatur, & quod non raro Vermilorum speciem contrahat, Græcis, Ios scolex nominatur. Hæc ex Cypro nostro tempore in Italiam non affertur. factitia præparanda multi sunt modi. Nam & e laminis æreis deraditur, & derafa in massas formatur, ac inde Græcis, Ion xiton dicitur. Hodie cum optimi copia non sit, mediocri utimur, quod cum aceto sit & vinaceis. Nam Scollecia nostro auro haud dum in usus recepta, sicut nec Germanica fossilis Aerugo. Errant qui Aerugine, pro squama Aeris utuntur, sed iam detectus error, & in totum tollendus. Ferrugo, seu ferri rubigo, & stercus ferri, seu scoria res notissima sunt, caueant tamen imperitiores, ne squammâ ferri, quæ tusione excussa, in massam unde



# DIOSCORIDIS

It rursus indi potest, cum stercore seu recremento confundant, quia  
est, è ferro ignito exiliens.

## Plumbum elotum. CAP. XLVII.

### NOMENCLATURA.

Gr. πεπλόμεν & μόλιβδ &. Lat. Plumbum  
elotum. Ita. Plombo lauato.

**L**otura Plumbi sic fit: In mortarium plumbeum aquā inj-  
ciens, pistillo plumbeo terito, donec nigrescat aqua, & li-  
mi modo crassescat, aut lutulenta reddatur. Linteolo deinde co-  
lato, aquam superinfundens, quo facilius quicquid est resolutū  
incerni possit. Hoc iterum facito, usque dum satis tibi habuisse ui-  
deatur. Vbi confederit, priore aqua affusa, nouam adiiciens, ut  
Cadmiam lauato, donec nulla extet nigriria. Postea in pastillos  
cogens, reponito. Quidam scobem mundi Plumbi lima quesi-  
tam, mortario pistilloq; lapideis terunt, aut manibus cum aqua  
paulatim adiecta fricant, donec nigrescat. mox ubi id pessum ie-  
rit, effusa aqua, colligunt in pastillos. Nam trium uehementer,  
Ceruse simile redditur. Alij elimata scobi modicam Plumba-  
ginem adiiciunt, affirmantes ita elotum Plumbum præstan-  
tius esse. Potest refrigerare, adstringere, inducere, mollire, ex-  
plere cana, sistere oculorum fluxiones, & ulcerum excrescen-  
tia. Sanguinem supprimit, prodest contra sedis ulcera, condylo-  
mata, & hamorrhoidas, ex rosaceo. Item, ad ea quæ agrè cica-  
tricem ducunt: & in totum spodij effectus præbet, nisi quod nō  
obducit crustas. Syncerum Plumbum, astrictu, marini scorpio-  
nis draconisq; plagis auxiliatur.

## Plumbum vstum. CAP. XLVIII.

### NOMENCLATURA.

Græ. μόλιβδ & κεκαύμεν &. La. Plumbum vstum.  
Ita. Plombo abbruciato.

Vritur



**V**ritur Plumbum sic: Super quàm tenuissimas plumbi laminas, fictili nouo inditas, sulphur inspargito: additisq; alijs rursus laminis, interiecto semper sulphure, usque dum uas expleneris, succendito. Flagrante autem Plumbo, ferrea rude uersato, donec perfecte redigatur in cinerem, nihilq; è Plumbo non ustum hæserit: tum demum, obstructis naribus, eximito: alioquin halitus plumbi noxius sentitur. Aut elimatam plumbi scobem in olla sulphure urito. Alij laminas in fictili crudo, ut dictum est, imponunt fornaci, aut foco, & circumlinentes operculum, dato exili spiramento, urunt. Alij pro sulphure Cerusam aut Hordeum inspargunt. Alij integras laminas imponentes, acrigine utuntur, & rudicula ferrea continuè mouent, dum in cinerem soluantur. Sed difficilis huiusmodi ustio, & si uehementius uratur, contrahit spumæ argenti colorem, Magis tamē nobis placet prima urendi ratio. Plumbū ustum lauatur ut Cadmia, & reconditur. Eosdem effectus habet, quos Plumbum e-lotum, sed multò acriores. Recrementum Plumbi, quod Scoriā uocāt, optimum est, densum, fractu contumax, Cerusam planè representans, nihil plumboſi habens, quod ad luteum colorem accedit, & uitri splendorem imitatur. Eadem quæ Plumbum exustum potest, sed magis adstringit. Lauatur in mortarijs infusa aqua, & refusa summa aquæ parte, quæ luteum colorem duxit: idq; sæpius, dum recrementum absumatur. Dein ubi conſederit crassamentum, aqua effusa, digeritur in pastillos. Molybdoites lapis à Plumbi similitudine dictus, respondentem recremento uim habet, & eodem modo lauatur.

## Stibium. C A P.

## XLIX.

## NOMENCLATURA.

Græ. στίβιμ. Lat. Stibium. Ita. Stibio.

V 4

Stim



**S** Timmi optimum, quod splendidissimum est, modoq; nitedu-  
larum emicat, confractu crustosum, nihil terræ aut sordidi  
habens, friabile, quod Stibi appellant, alij Platyophthalmion.  
Vis eius astringere, meatus obstruere, refrigerare, ex crescentia  
in carne cohibere, ulcera ad cicatricem perducere: sordes & ul-  
cera oculorum expurgare. Sistit & sanguinem e cerebri mem-  
brana profluentem. Et ut in uniuersum dicatur, uis usto plumbo  
similis est priuatim, ambusta igni, in pustulas crumpere non pati-  
tur, cum adipe recenti illitum, crustosas exulcerationes ad cicatri-  
cem perducit, cum cera & exigua Cerusa. Torretur pinsita fa-  
rina circumlitum, & carbonibus obrutum, donec carbuncule-  
tur crusta, exemptumq; restinguitur mulieris lacte, quæ marem  
peperit, aut uetere uino. Vritur etiam carbonibus succensis effla-  
tum, quoad igni deflagret. Si enim paulo magis concremetur,  
Plumbum fit. Lauatur, ut Cadmia & æs. Sunt qui ut Plumbi  
recrementum eluant.

## Molybdæne, seu Plumbago.

### C A P. L.

#### NOMENCLATURA.

Gr. *Μολύβδαινα*. Lat. Plumbago.

Ital. Piombagine.

**M**olybdæna optima est flaua, argentea spuma emula, mo-  
dicè splendens: cum teritur, rufa. Decocta cum oleo ioci-  
noris colorem trahit. Vitiosa est, quæ aërem aut colorem Plum-  
beum refert. Gignitur ex Auro & Argento. Est etiam quæ-  
dam fossilis, ad Sebastiam & Corycū inuenta. Quo in genere  
probat, quæ lapidosa non sit, aut recrementosa, sed nitens &  
flaua. Vim habet spumæ Argenti, aut recremento Plumbi si-  
milem. Vritur lauaturq; eodem modo. Miscetur conuenientis-  
sime medicamentis quæ Liparas uocant, atque emplastris minimè  
mor



mordentibus. Carnem recreat, & ulcera ad cicatricem perducit. Glutinantibus tamen medicamentis, aut abstergentibus non conuenit.

**P**lumbum nigrum est, & candidum. At elotum Plumbum, è nigro fit tantum. Porro Plumbi recrementum seu scoria, non id est quod cū liquefit plumbū, imo vasis insidit cū mihit aliud sit quā Plumbū, qđ (vt ita dicā) calcinari incipit, & facile in plumbi naturā rediret, vt mīsto Lithargyrio fit: sed spuma illa, quæ supernè expuitur, tum cum in fornace ingens fossilis Plumbi massa percolatur. Hæc densa est, dura, rubescens, vitri transparentia, visiturque è Tridentinis & Germanicis fornacibus magnis aceruis à metallicis eiecta. Plumbarius lapis, si Marquesita vulgaris nō est lapis est profecto, vt bona simpliciariorum partē videtur, è quo Plumbum excoquitur. Est etiam argenti simul & plumbi ferax vena. Stibium, quod Arabum sectarijs Antimonium in Germanicis maximè fodinis, in Italicis & Gallis etiam reperitur. Stibium cum quo lubuerit metallo in vasculo fusorio permixtum, etiamsi ferum sit aut chalibis, celerius eliquandi materiam præbet. Laudatur scintillans, fragile, quod in longas fissuras rumpitur, non in rotundas particulas. Id femina vocatur. Mas verò, aridius & magis est scabrum, minusque ponderosum & scintillās, & arenosius. Plumbago factitia est, & natia. Factitia in fornacibus procreatur, in quæis Aurū & Argentum eliquantur, nempe cum fodina non tantum in se Plumbi contineant, quantum eis percolandis sufficiat, vbi eis vena Plumbi, aut Plumbum purum adijcitur, nunquam non in fornacis fundo Plumbum calcinatum, simile Lithargyrio reperitur. Natia, ea planè est vena, quæ Argentum simul & plumbum continet.

## Argenti recrementum. C A P. L I.

### NOMENCLATURA.

Græ. Αργυρος σκόρια. Lat. Argentum recrementum.

Ital. Scoria d'argento.

**R**ecrementum Argenti, quod Scoriam uocant, aut Helcysma, aut Encauma, Molybdæna uim habet. Quare emplastris quas phæas appellant, additur, ac medicamentis quæ cicatricem obducunt, ut potè cūm adstringat, extrahátque.

P S

Spu



**A**rgenti scoria seu recrementum, sacilitio, Esmalto, è vitro (sic dicunt) simile, ac diuersorum est colorum. Quod euenit ubi argentifodina adiacentes habeat aliorum metallorū fodinas, maxima tamen ex parte nigra est, ceruleis & viridibus lineis distincta, quāuis & quadam in totum cerulea, quadam virides sint, vt Esmaltum, perlucida.

## Spuma argenti. CAP. LII.

### NOMENCLATURA.

Gr. Ἀργυρῶς. Lat. Spuma Argenti.

Ita. Lithargirio.

**S**puma Argenti quadam gignitur ex arena, quam Molyb-  
ditin uocant, in fornacibus conflata, donec perfecte igni in-  
candescat. Altera ex argento, Tertia ex Plumbo. Probatissima  
est Attica. Secunda Hispaniensis. Has sequitur quæ sit Dicear-  
chia, id est Puteolis, Baijs, in Cāpania, & Sicilia: plurima enim  
hiscæ locis è flagrantibus laminis plumbeis gignitur. Quæ flauo  
colore splendet, Chrystitis appellatur, omnium optima: quæ in  
Sicilia, Argyritis: quæ ex argento, Calabritis. Vis autem ad-  
stringere, mollire, explere caua, excrescentia in carne reprime-  
re, ad cicatricem ducere, refrigerare, & occludere. Vritur argē-  
ti spuma, confractis partibus ad magnitudinē iuglandiū, prunæ  
superpositis: ita accensa foliis, ut coflagret, abstergitur insides  
spurcitia, & reconditur. Aliqui ter aceto aut uino restinguen-  
tes, rursus urunt, & eadem prosequuti, reponunt. Lauatur ut  
Cadmia. Vi Argyritidi nominata, aut, si desideretur, alteri can-  
dor detur, ea in parteis magnitudine fabarum confracta, chœni-  
cis attica mensura, fœteli nouo supersusa aqua, addito cādidi Tri-  
tici pari pondere, priuatimq; pugillo Hordei, linteolo puro, raro,  
ansulis uasis alligato, coquitur, donec Hordeum fractum dissili-  
at: deinde omnia in nouum craterem oris ampli transfunduntur.  
Triticum abicitur. spuma Argenti uehementer manibus affri-  
cando infusa aqua lauatur, assiccataq; in Thebaico mortario te-  
ritur



itur, affusa feruente aqua, donec soluta fatiscat. Excolata aqua, terū tota die teritur, & uesperī infusa calida aqua finit. Manē olis excernitur, alia infunditur, atque ter die excolatur. Id se-  
 tē diebus fieri solet. Postea additis ad singulas minas spumæ  
 Argēti, quinis salis fossilis drachmis, infusaq; calida aqua, ter-  
 lie teritur, & addita aqua excolat: cumq; in albuērit, calida in-  
 fusa, idē facito, dum nullā prorsus salsedine resipiat. Demū ardē-  
 ussimo sole siccata, eiecto prius humore, recondit. Sin minus, mi-  
 na spumæ Argyrutidis diligēter teritur, addito sale fossili trito,  
 triplicato pondere, in fictile nouū conijcitur, aqua infunditur, ita  
 ut superemineat. Mouetur quotidie manē & uesperī, aquaq; su-  
 perfundit, priore nequaquā effusa. Hoc fit triginta diebus: naq;  
 nisi moueatur, crassescit, usque in duritiem testæ. Post hæc effusa  
 leniter muria, in Thebaico mortario spumæ Argēti teritur, con-  
 iecta q; in fictile aquā continens, manibus diligēter agitāt, muta-  
 ta subinde aqua, donec nullū salsuginis indicium præbeat. Deinde  
 quod ex argēti spuma candidū apparet, in uas aliud transfert,  
 & redactū in pastillos, plūbea pyxide condit. Alij spumā Ar-  
 genti in fabarū magnitudines cofractā, in uentre iuillo crudo ex  
 aqua coquūt, dum uiscus eliquesces cōtabescat. Exemptamq; cū  
 sale pari terūt, & ut suprā dictū est, lauāt. Sunt qui salis libram  
 unā, & spumæ Argēti tantandē, in sole terāt, aqua cōtinuē mu-  
 tata, dū cādor ei detur. Alia ratio: Sumito quātūuis Argēti spu-  
 mā: ubi lana cādida inuolueris, fictili nouo indita aqua, cū pugil-  
 lo fabarū recētū repurgatarūq; decoquito. Cūq; fabæ disruptæ  
 dehiscēt, lanāq; nō demigret, exceptā Argēti spumā, et altera la-  
 na inuolutā, iterū coquito, cyathū aquæ & parē fabarū modū  
 adijciēs. Eadē tertio, q; suprā, facito. In summa, tantisper, dum la-  
 na iam nō inficiatur. Insuper trāsfundēs in mortariū, ad singulas  
 salis fossitij libras, adijcito octogenas spumæ Argenti drachmas  
 Atticas, et terito: intermittēs q; Nutri quā albißimi cū aqua di-  
 luti



luti drachmas quadraginta septem indito : iterum terito, donec satis candoris contraxisse uideatur. Ita autem fundens eam ex alto in fictile oris ampli, adiecta largiore aqua, ubi cōsidere defuerit, colato. Tum nouam superadiiciens aquam, manibus probe uersatam, finito ut confidat, ac rursus per colum adycito. Alternis eadem prosequere, dum pura aqua dulcisq̃, effluat, & nullā salsedinem præ se ferat. Postremo in fictile nouum translata, colato sensim omni humore, soli quadraginta diebus sub canicule hydus exponito, & siccata utitor. Elotam autem constat ad oculorum collyria prodesse, & ad cicatricum scēditates tollendas, ad rugosas facies, & cicatricosas, laceratasq̃, & macularum plenas.

**A**rgenti spuma aut Lithargyrium fit in fornacibus ubi Argētum depuratur, è plumbo nigro, à coctionis diuturnitate, & metallorum aliorum exhalatione ea forma concepta. Porro color quo obducitur aureus vel argenteus, non ex Auri vel Argenti spuma profilit, ut seplafis visum est, sed ut plus, minusve Aeris, defecando Argento, immittatur. Nam si maxima pars Aes sit, aureo colore Lithargyrium imbuetur, sin modicum, aut nihilum sit Aeris, argenteo inducetur. Et reuera Lithargyrium, nihil aliud est, quam Plumbum Aeri, aut aliquando Argento, depurantium indiligentia permixtum.

### Cerusa. CAP. LIII.

#### NOMENCLATURA.

Gr. *ῥιμυθίου*. Lat. & Ita. Cerusa.

**C**erusa fit hoc modo: Infuso in urceum oris lati, aut fictile labellum quàm acerrimo aceto, laminam plumbeam supra fictilis spiraculum, subiecta prius arundinea tegete, firmato: superiectisq̃, uelaminibus, ne halitum expiret acetum, ubi resoluta fuerit, defluensq̃, deciderit, humorem purum ad summa delatum colato, crassamentumq̃, transfundito. Debet quoque siccari in sole, mox trusatili mola teri, aut alias tritum cibrari. Postea quod superest duri, in tenues partes redigendum cribrandumq̃.

Vicij



Vicissim eadem tertio quartoq<sup>3</sup> facienda. Melior, quæ primò cribrata est, & medicamentis oculorum assumenda. Secundum locum tenet sequēs, & reliquæ suo ordine. Nec desunt qui ligneas rudes in medio vase appendant, & derafo ceu situ imposito, ita ut acetum non contingat, inditoq<sup>3</sup> operculo circumlinentes dimittunt. Post dies decem, laxato obturamento uisunt. Cumq<sup>3</sup> resoluta materia fuerit, reliqua, ut supra diximus, exeuntur. Si aut quis in pastillos uelit digerere, aceto acri subacta, diuiditur in pastillos, qui in sole siccantur. Aestate tamen supradictum opus ob-eundum est: ita enim candida atque efficax redditur. Quinetiā hyeme paratur, urceis supra furnos, balnea, aut fornaces impositis: ascendens enim calor, idem quod sol præstat. Laudatissimam fieri putant Rhodi, & Corinthi, aut Lacedæmone, proximam Puteolis. Torretur hoc modo: Flagrantibus igni carbonibus, sitili nouo, maxime Attico tritam Cersam imposito, & assidue uersato, cūq<sup>3</sup> cinereum colorem traxit, eximens refrigerato, & utitor. Est & aliud urendi genus: Trita patinis nouis supra prunas imponitur, & ferulacea rude mouetur, donec colore similis Sandarachæ fiat: extractaq<sup>3</sup> ad usus ministratur. Quæ uerò ita parata est, Sandyx à quibusdam dicitur. Lauatur Cersa Cadmiæ modo. Vis ei refrigerare, occludere, emollire, explere, extenuareq<sup>3</sup> in super excreſcentia leniter reprimere, & ad cicatricem perducere. Miscetur ceratis, & emplastris quæ Liparæ uocantur, pastillisq<sup>3</sup>. Est autem letalis eius potus.

**C**ersa, plumbum est acerrimi aceti halitu in crassamentum, post in trusatili mola tritum, denuò cribratum, in pollinem resolutū. Ea exusta, donec rursus colorem imbuat, Scandicem facit. Officinarum Minium, & Scandix, una & eadem res sunt.

## Chrysocolia. CAP. LIIII.

### NOMENCLATURA.

Græ.



Græ. χρυσocolμα. Lat. Chrysocolta. Ita. Borrace.

**C**hrysocolta laudatissima Armeniaca, colorem Porri quæ  
simillimè reddens. Secundum locum sibi uendicat Macedo-  
nica, & proximum Cypria, quo in genere præfertur pura: dan-  
natur, quæ terram, aut calculos collegerit. Ratio lauandi hæc est.  
Tusam infusa aqua, mortario expassa manu ad pilam ueheme-  
ter fricato, & statim quàm confederit, colato. Alteram infun-  
dens aquam, rursum terito. Hæc uicissim prosequere, donec pur-  
pura sinceraq; spectetur. Dein siccato in sole, & ad usus recondito.  
Quod si urere uolueris, ex ea terens quod satis esse uidebitur, per  
tinis supra carbones adponito, & alia facito quæ supra dixi-  
mus. Dos Chrysocoltæ ad purgandas cicatrices. Excrescentes  
carnem coercet. Adstringit, purgat, excalfacit, & modicè cor-  
pus mordendo exest. Inter medicamenta intelligitur, quæ uomi-  
tiones concitant, & necem inferre possunt.

**C**hrysocolta in fodinarum cauernis inuenitur, foras per auri uenam  
exudans, limo per frigus hybernium, ad punice duritiem condensatur.  
Laudatior quæ in Aeris fodinis: secundum ab ea locum obtinet, quæ  
in Argenti cauernis, reperitur. Quæ ex plumbi cauernis, improbatior  
illa est, quæ ex aurisodinis extillat. Facilita fit, aqua per totum ver-  
tempus imbuta uena ad Iunium usque, ac postea Iunio & Iulio mensibus  
resiccata, in Chrysocoltam euadit, quæ profecto, nihil est aliud, quàm uena  
putrefacta. Officinarum Borrax, nã ita Chrysocoltam Officina vocant.  
magna ex parte sincera non est, colore in eo ut plurimum nigricante, non  
in viridi obscuro, ut par erat. Quinetiam magna copia est facilitie, e-  
alumine rupeo, vi ignis, & armeniaci sale coalita. Ad Borracem refacti  
vocat. Plus de virore concipit, quæ ex arisodinis, nigrore quæ è plumbi  
cauernis: albedinem, quæ ex Argentisodinis condensatur. Auro ferrum  
nando lutea, quæ aurisodinis præstatio: medicina, viridis ex arisodinis.

Lapis Armenius. CAP. LV.

NOMENCLATURA.

Gr. Αρμενίος λίθος. Lat. Lapis Armenius.

Ita. Pietra Armenia.

. Armenius.



**A**rmenius lapis præfertur levis, colore cœruleo, perquam æquabilis, calculo carens, & friabilis. Eadem quæ Chrysocolia præstat, sed inefficacius. Quinetiam usum habet ad pilos in palpebris alendos.

**A**rmenius Lapis colore Chrysocoliæ refert. Selectissimus est qui summe viret, & propè ad casium accedit. Qui in pluribus Germaniæ locis reperitur lapis, conficiendo colori quæ propriè, è viridi casium vocant. Matthiolo verus esse ducitur, Armenius lapis. Nec obstant natales. Si quidem manifesto videre est, seplasijs Cadmiæ, Thutia: Spodij, diuersa Antispodia: & floris æris, viride æris vicè referre: cum tamè hæc singula in fodinis reperiantur. Porro si is lapis in officinis non reperitur, non statim sequitur in metallicis fodinis non reperiri. Lapis armenius per Traliani humores melancholicos expurgat, impunè, nec dispari ab Elleboro albo virtute. Per Aetium pueris cõfert quibus strictum est pectus, prouocandoq; vomitui peculiaris. In epilepsia sine noxa ad tertia vncie partē offertur, cum decocto Centaurij minoris. Galeno lapis armenius virtutis est absterforiæ cum leui quadam acrimonia, & leuissima vi astrictoria.

Cœruleus.

CAP.

LVI.

NOMENCLATURA.

Græ. κῠαῦ &amp; . Lat. Cæruleus. Ita. Lapis Lazuli.

**C**œrulei origo ex ærarijs metallis in Cypro, copiosior ex arena littorali: secundum quosdam sub cauatos specus maris inuenitur, qui magis probatur. Eligi debet inebriatus. Vritur ut Chalcitis. Lauatur ut Cadmia. Vim habet reprimentem, & modicè erodentem. Crustas gignit, & exulcerat.

**C**æruleus, siue Lapis Lazuli, probatissimus qui scintillis aliquot aureis emuet. Arabum sectarij Cæruleum, & armenium lapidē quod quadantenus cognati sunt, viribus et specie confundunt. Et sanè in Germanicis fodinis inuicem & in vna sæpenumero massa adnati reperiuntur, ab eaq; coloris propinquitate, eandem & vim & pretium apud plerosque obtinere. Attamen Lapis Lazuli venenatus non est, sed per Mandu, diligenter clotus, purgat innoxie, humore præcipuè melancholicū, quātum



quātumuis Auicēna putrefactorium dicat. Siquidem acrimonia putrefacit, quā lotio commoda emendat. Porro Germanica fodina, auro notatū non procreant, namq; sic distinctum in aurifodinis tantum, & ē quibus argentum simul & as extrahuntur, & alibi nascitur nusquam. Quocirca bonitate & precio præcellentissimus Lapis Lazuli, qui ex aurifodina educitur, quoq; vltamarinum (sic vocant) Azurum fit. Maritimis littoribus innascens, inspissata arena non absimilis, vix, aut nullatenus, nostro æuo reperitur.

## Indicum. CAP. LVII.

### NOMENCLATURA.

Græ. Ἰνδὶκὸν & λίθον. Lat. Indicum. It. Indico.

**I**NDICI duo genera. Vnum sua sponte nascitur, tanquam spuma, germinatione Indicis arundinibus exiens. Alterum insectoria dant officina: & est spuma purpurea innatans cortinis, quam detractam artifices siccant. Optimum existimatur, quod cœrulei speciem præbet, succum suum sorbet, & leue. Inter medicamenta est quæ leuiter adstringunt, & inflammationes, tumoresq; rumpunt. Purgat & reprimat ulcera.

**P**Linianum Indicum, quod in insectorijs officinis ē Purpura spuma confieri scribit, aliud est à nostro, quod ex Isatide, seu Guado fit quoq; pictores vtuntur inducendo (sic loquuntur) cœlesti obscuro, alijsq; coloribus, & quod Auripigmento permixtum, colorem viridem pulcherrimum facit: & perinde à Dioscoridis Indico discrepans, quod spumans facit, ex Indicarum arundinum germinatione.

## Ochra. CAP. LVIII.

### NOMENCLATURA.

Gr. ὀχρα. Lat. & Ita. Ochra.

**O**Chram leuissimam, & omnino luteam eligere oportet, saturatam, non lapidosam, friabilem, natione Atticam. Vritur hæc, & lauatur Cadmiæ modo. Vis eius adstringere, erodere, collectiones & tubercula dissipare. Excrecentia in carne reprimi.



reprimat caua cum cerato explet, & articulorum tofos com-  
minuit.

**O**chra lutei coloris terra in pictorum vsus cadens, è cauernofo fo-  
dinarum plumbi vapore, eiusmodi colorem imbuat. Nam Athe-  
niensis Ochra memoria perijt.

## Cinnabaris. CAP. LIX.

### NOMENCLATURA.

Græ. κινναβάρη. Lat. Cinnabaris.

Ita. Cinabro.

**H**allucinantur qui Cinnabarin Minio eandem esse exi-  
stimant. Minium enim in Hispanijs ex lapide quodam  
argenteæ arenæ permisto, temperari solet, alioquin non dignosci-  
tur. Fornacibus autem in florentissimum flagrantissimumq; co-  
lorem permutatur. In metallis uerò strangulantem halitum eru-  
elat, Itaque facies incola uescis obuelant, ut per illas spectet, nec  
respirando noxium aërem attrahant. Eo pictores ad sumptuosa  
parietum ornamenta utuntur. Cinnabaris uerò ex Aphrica  
defertur, & magno constat. Hactenus inuenitur, ut uix uersico-  
loribus pictorum lineis satisfaciat. Intento colore nec diluto præ-  
ditum: quare quidam sanguinem esse draconis existimauerunt.  
Vim habet Cinnabaris Hematitæ lapillo eandem. Conuenit ad  
oculorum medicamenta, uerum efficacius, magis enim adstrin-  
git & sanguinem cohibet. Ambustis igni, & papularum eru-  
ptionibus cerato excepta, medetur.

**C**innabaris quo seplasia & pictores utuntur, longè distat à Diosco-  
ridis Cinnabari. Nam noster & factitius est, & fossilis, venenatus,  
& exitiosus. At Dioscoridis Cinnabaris ex Africa affertur, modica quã-  
titate, vi eadem qua lapis Hematites, non foris tantum applicitus, sed  
etiam intra corpus sumptus. Quod vulgari nostro Cinnabari non con-  
uenit, nempe erodenti, exulceranti, venenato, oculorum ac interiorum  
inimico. Plinius sanguinem putat esse draconis in pugna cum elephante  
contusi. Sed id falsum est. Per Cadamostrum in affricanæ navigationis

X

historia



historia cap. 4. Sanguis Draconis, lachryma est gummosa & liquida, quæ ex Africana arbore distillat, colore purissimi & summè naturalis sanguinis. (Hic hodie Italis dicitur, Sangue di Drago in lagrime.) Incola quo maior sit copia, corticem ferro incidunt, & collecto liquore, ahenis igni incoquant, & sanguinem Draconis vocant. Liqueor hic ex Africa allatus, pauca quantitate, in pictorum vsus inducendis umbris, & deliniendo rubro claro, (ut vocitant) adde his quod experientia cognitus est Hematiti virtute consimilis, & astringentius, non dubiam fidem facit, Dioscoridis Cinnabarin, idem esse cum hoc Africano liquore. Ceterum Cinnabaris fossilis, rubens est lapis, non extrema duritie, at perderosissimus, & non rarò argento viuo intantum factus ut spòte extillet, haud aliter, quàm arte & vi ignis educitur. Facilius fit ex Argento viuo & sulphure per viam sublimitationis. Minium quod hoc capite scribit Dioscorides, noster est Cinnabaris fossilis. Minium vulgare, nihil aliud est, quam Sandix.

## Argentum viuum. CAP. LX.

### NOMENCLATURA.

Græ. υδραργυρος & . Lat. Argentum uiuum.

Ita. Argento uiuo.

**A**rgentum uiuum fit ex Minio, quod abusiue Cinnabaris dicitur, patinis fictilibus, imposita ferrea concha Cinnabarin continente, & calice cooperta, argilla superlita, carbonibus succendunt. Siquidem deterfa fuligo, quæ calici insidet, refrigerata in Argentum uiuum coit. Quinetiam inuenitur in argentifodinarum tectis, stillatim concretum. Alij per sese in metallis inueniri tradunt. Seruatur in uitreis, aut plumbeis, aut stagneis, aut argenteis uasis: siquidem aliam materiam omnè exedit, & defluere facit. Potum uim pernicialem habet: suo enim pondere interna exest. Remedio est lac multum subinde potum, & uomitionibus reiectum, aut uinum cum Absinthio, aut Apij decoctum, aut semen Ormini, aut Origanum, uel Hyssopum cum uino, Auri limati scobs, id est, ramentum quàm tenuissimum, epotum, mirabili est auxilio.

Argenti



**A**rgenti viui vena, & sola, & cum marmore repperitur. Montes aliquot qui à Goritia vnus diei interuallo distant, caueas habet minerales, vbi abundantissima copia repperitur. Huius conficiendi facilis est ratio. Cinnabaris fossilis, longè amplius Argentum viuum exudat. Id philosophi alchymistæ metallorum omnium semen & originem fecere, eamque causam esse cur condensari non possit. Attamen contra eorum opinionem, argento & auro, quàm omni alio metallo citius vnitur. Siquidem metalla omnia quæ Argento viuo immittuntur, innatant, præter aurum quod ilicò fundū petit, quod ei cæteris citius implicetur.

### Rubrica Sinopica. CAP. LXI.

Gr. *μίλτ & σινοπικη*. La. & It. Rubrica Sinopica.

**R**ubrica Sinopis maximè probatur grauis, densa, ad iocinoris imaginem uergens, calculorum expers, concolor, cum diluitur impendit fusilis. Effoditur in Cappadocia, speluncis quibusdam, expurgataq; desertur in Sinopem urbem, in qua uenditur: unde cognomentum accepit. Vim habet exiccatoriā, quasi inducendo obstruentem & adstrictoriam. Quapropter vulnerarijs emplastris, & pastillis exiccantibus, & adstrictorijs commisceri solet. Alium sistit, in ouo sumpta aut chystere infusa. Datur iocinoris uitio laborantibus.

### Rubrica fabrilis. CAP. LXII.

Gr. *μίλτ & τεκτονικη*. Lat. Rubrica fabrilis.

Ita. Rubrica fabrilis.

**R**ubrica fabrilis, ad omnia Sinopide inferior est. Optima Aegyptia & Carthaginensis, lapidum expers, friabilis. Gignitur etiam in Iberia, quæ ad occidentem spectat, Ochra exusta, & degenerante in Rubricam.

**R**ubrica Sinopica, vt ex Dioscoride apparet, olim è Cappadocia asferebatur. Nunc verò, eius vsus perijt. Rubrica fabrilis rufa est gleba, quam Bolum nostro æuo nuncupant.

### Lemnina terra. CAP. LXIII.

Græ. *λημνικα γη*. La. & It. Terra lemnina.



**L**emnia terra, cuniculoso in specu nata, è Lemno insula, palustri loco defertur, imbi electa, & caprino sanguini permista: quam incolæ cogunt in pastillos, & imagine capræ signant unde & sphragida ægos, hoc est, sigillum capræ, appellauere. Vim antidoti habet contra perniciofa uenena singularem. Pota cum uino, & præsumpta, euomi uenena cogit. Contra ictus morisq; animalium, quæ exitiale uirus ei aculantur, prodest. Antidotis familiaris. Sunt qui hac ad sacrificia utantur. Est & dynteria utilis.

**L**emnus insula, unde terra Lemnia olim exportabatur, vulgo hodie Stalimene dicitur. Quæ nostro tempore sigillo impressa Turcico, Terra sigillata ad nos assertur, vera non est & impermixta terra Lemnia, cum hac supramodum sit rubens, terra vero sigillata dilutius rubeat, quod cum alia terra mitionem coarguit. Porro è doctorum hominum censura, quem Bolus armenium Orientalem vocant, insucata & inadulterata est, Lēnia terra. Non enim ex armenia, ubi verus & sincerus Bolus repperitur, is Bolus assertur, sed ex Lēno insula. Siquidē Bolus armenius Ochra in more pallescit, nō rubet. Id Lemniensium mercatorū fit dolo, qui quo res diuersas mentiantur, ex vna & eadem Lēnia terra, cum pura est, in armenium Bolum quæstum faciunt: hac vero mista & adulterata, in terram Lemniam compendium faciunt.

## Atramentum futorium. C A P.

### LXIIII.

#### NOMENCLATURA.

Gr. χαλκάνθη. La. Chalcanthum. Ita. Vetricolo.

**A**tramentum futorium genere quidem, unum & idem est mole & concretum: sed in specie differentias treis habet. Vnum namque humoribus stillatim in cuniculos quosdam colatis, concreuit: quare ab ijs qui Cypria metalla perficiunt, stillatitium appellatur. Petesius ipsum Pinarion uocat, alij Stalacticon, id est, stillatitium. Alterum simplici ratione fit in speluncis: postea transfusum in excauatos scrobes, concrementum capessit.



ssit, quod *Peñton*, id est, *concretitium*, propriè nominatur. Tertiū dicitur *coctile*, & in *Hispania* fieri solet: sed inutile ac inualidissimum esse constat. Ratio parandi hæc est, *Aqua* madefactum decoquunt, mox in *piscinas* transfundunt, & residere patiuntur. Hoc certis diebus coalescit, in complureis formulas digestū, *tesserarum* speciem reddentes, quæ racematim inter se coherescunt. Optimum esse creditur, *cæruleum*, graue, concretum, translucent: cuiusmodi *stillatitium* est, ab alijs *Lonchoton* nominatū. Proximum, *concretitium*. *Coctile* uerò ad infectus & denigrationes, aptius cæteris esse compertum est. Sed ad medicinæ usum inualidius esse, exprimēta docent. Valet adstringere, calfacere, & crustas inducere. *Latas uentris tineas* necat, *drachmæ pondere deuoratum*, aut cum *melle linctum*. *Vomitibus* ciet: aduersus *hausta fungorum uenena*, ex *aqua potum* auxiliatur. Purgat caput, *aqua dilutum*, & in uellere naribus instillatum. Vritur ut paulo post in mentione *Chalcitis* ostendemus.

**C**alcāthum, quod *Atramentum sutorium* est, & vulgò *Vitriolum*, duum est in *Italia* specierum. Vnum natium, quod *Coppam rosam* vocant, id validius est. Alterum, factitium. Istud è fodinis, & natui loci natura, plus minusue robustius est. Romanum, quantumvis liuidius, factitiorum validissimum est. Secundum ab eo locum obtinet *Cypriacum*. Nam *Germanicum*, colore licet sit pulcherrimo cæruleo, oculisque magis adblandiatur, attamen cum ex eo, aut educenda *aqua fortis*, aut inficiendi panni, re ipsa inualidius proditur. *Vitriolum* essentia fossili cum *alumine* conuenit. Mordet gustu, asperum est, pungit, & astringit: operatione, *alumen*: *acrimonia*. *Salnitrum*, siccitate sal exprimens. Huius fodinæ non longè absunt à *Massa*, *maritima* *Senensium*, vrbe. Huius minera terram potius, quam lapidem refert, coloris in cæsisio luuescentis, & maculis aliquādo æruginis, aliquando viridibus, viridis æris in morem. Ex hac subtertanea, sœtidissimus & acerrimus odor exhalat, sulphuri similis, ob idq; cauea aperta effoditur, alioqui breui perituris metallicis operarijs. Recens conficiendi *Vitrioli* ratio à *Galeni* ca differt. Ista è *Galeno* patet, illa quotidie visitur. Id tamen sciendum, *Cyprium Galeni Calchanthum*, materiam esse coalitam, eaq; subtiliori-



bus Chalcitis, Misi, Pforici, & Aeris partibus compositam. Quod, ut conuenit, intellectum, Galenum satis superque ab inaduerentia tueretur. Coppa rosa quam natuum Chalcantum diximus, saepenumero supra montes fodina Vitrioli congelata repperitur, corticis cristallina effigiem referens. Acerrimum, quod per alembicum à vitriolo, oleum extrahitur, & pariter Coppa rosa, preparata aut dissoluta in aqua rosata, collata, ter quaterne inspissamento repetito, valent in multis in medicina usus, quos mystæ norunt. Nam amystis sacra prodere nefas.

## Chalcitis. CAP. LXV.

### NOMENCLATURA.

Græ. χαλκίτις. Lat. Chalcitis. Ita. Chalciti.

**C**halcitis præfertur similis æri, friabilis, nec lapidosa, nec inueterata, intercurfantibus oblongis uenis, splendentibusque. Huic absterforia uis inest, & excalfaciens, & crustas ulceribus obducens. Purgat quæ oculis & eorundem angulis hærent. In genere leuiter excedentium est. Ad ignem sacrum, & uicera quæ serpunt, efficax est. Sanguinem è uulua & naribus erumpentem, cum succo Porri sistit. Gingiuarum uitia, de pascencia ulcera, tonsillasque, eius farina compefcit, uista, & cum melle trita, oculorum medicamentis longè utilior redditur. Callum genarum & scabritiam absomit, abstergetque. Fistulas tollit, collyrij modo in eas adacta. Fit ex Chalcite medicamentum, quod Pforicon uocant, duabus eius partibus cum una Cadmiæ additis, & ex aceto tritis. Oportet autem in fictili obruere simo, diebus quadraginta, per canicula ardore: sic enim fit acrius. Idem quoque Chalcitis potest. Alij pares utriusque portiones in uino terunt, & eadem prosequuntur. Vritur Chalcitis fictili nouo, uiuis carbonibus superposito. Modus autem uestionis in humidioribus est, dum ipsa Chalcitis bullas excitare desierit, & perfecte inaruerit: in reliquis uero, dum mutata in floridum colorem fuerit, & sanguinem aut miniatum colorem contraxerit, tum demum ex menda est: insidens autem spurcitia, flatu expellenda, mox repomenda.



nenda. Torretur etiamnum perflatis carbonibus, usquedum luteo colore palleſcat: aut fictili ſubditis candentibus prunis, ſubinde uerſata, donec igni conflagret, & colorem mutet.

### Miſy. CAP. LXVI.

#### NOMENCLATURA.

Græ. μίση. Lat. Miſy. Ita. Miſi.

**M**iſy aſſumendum natione Cyprium, Auri ſimile, durum, quod friando Auri colorem imitatur, & ſtella modo ſplendet. Vim habet & uſtionem cum Chalcitide eandem, præterquam quòd Pſoricum ex eo non conficitur, exceſſus deſectusque ratione tantum differens. Aegyptium autem cæteris præſtat, utpotè quod efficacius habeatur, ſed ad ocularia medicamenta multò ſupradictò inferius.

### Melanteria CAP. LXVII.

#### NOMENCLATURA.

Græ. μελαντήρια. Lat. & Ita. Melanteria.

**M**elanteria gemina eſt originis. Quædam in faucibus cuniculorum, quibus æs eruitur, ſalis modo concreſcit. Alia uerò in ſumma facie ſupradictorum locorum coit, quæ terrena eſt. Quinetiam inuenitur in Cilicia, & alijs quibuſdam regionibus, foſſilis quædam. Præſtat, quæ ſulphuris colorem trahit, leuis, pura, æquabilis, & quæ contactu aquæ conſeſtim nigreſcit. Vim cauſticam eam obtinet, quam & Miſy.

### Sory. CAP. LXVIII.

#### NOMENCLATURA.

Græ. σῶρι. Lat. Sory. Ita. Sori.

**S**ory exiſtimarunt aliqui Melanteriã eſſe, aberrantes. Siqui de ſui generis eſt Sory, ei nõ abſimile. uerũ Sorei uirus ineſt

X 4 graue



græue, & nauſeam mouens. Inuenitur etiam in Aegypto, & alijs quibusdam regionibus, ut in Libya, Hiſpania, & Cypro. Præfertur Aegyptium, quòdque frianti nigrius apparet, in multa foramina dehifcens, ſubpingue, in ſuper adſtringens, & olfactu deuorationeque magnum uirus olens, ita ut ſtomachus in uomitiones effundatur. Quod autem friatum ſcintillas Miſyos modo non emittit, & alterius generis eſſe, & inualidum cenſendum eſt. Vim & uſtionem ſupradictis ſimilem habet. Dolori dentium cauernis inditum medetur, eoſq; labantes firmat. Iſchiadicis ex uino infuſum auxiliatur. Illitum cum aqua, uaros extinguit. Medicamentis admifcetur, quæ capillos denigrant. Hæc autem ſerè omnia & alia quæ uſtionem experta non ſunt peruſtis ualidiora eſſe exiſtimantur, præter ſalem & uini ſecem, Nitrum calce, & conſimilia, quæ cruda remiſſiora ſunt. combuſta enim, uiribus efficaciora redduntur.

**C**halcitis, Miſy, Sory, in Italiam, & proinde in Gallia nò aſſeruntur. Quin Matthiolus aſſerit, ſe in fodinis Germanicis vnde Aes effoditur, his repperiundis plurimum laboraſſe, ſed fruſtrata opera, non ſuccedente effectu, nulloque ſeſe promente veſtigio. Melanteriam verò in cuniculorum faucibus & cauernis ſapè vidiffè, quam tamen metallici operarij non adinaduertent. Porro iam detectus eorum error, qui Miſy, Vitriolum Romanum putauere. Siquidem Vitriolum colore aureo non conſtat, nã friatum nam in aurum, ſed in vitrum ſcintillat. Porro è Galeni teſtimonio, Miſy minerale eſt, quod a ſeſe ſpontè terra uifceribus innaſcitur, nec faclitium eſt. Idemq; de Chalciti & Miſy eſſe ex euſdem libri noni, De facultate ſimplicium, capite de Chalcanto, ſub finem, intelligitur. Item Chalcitim in Miſy transformari, non Miſy, in Chalcitim. Vitriolumque Romanum vetuſtate in Chalcitim tranſire, ob idque Miſy eſſe non poſſè, ſed potius ad Sory naturam accedere: quòd quèadmodum Chalcitis in Miſy transformatur, ita Sory in Chalcitim conuertitur. Tria hæc medicamenta Sory, Chalcitis, & Miſy, euſdem in genere facultatis & naturæ ſunt, eſſentia tamen tenuioris aut craſſioris differentiam ſortita. Sory omnium craſſiori eſt eſſentia, Miſy tenuiori, hæc inter mediat Chalcitis. Ad hæc Miſy in corporibus duris Chalciti (nempè ob ternuitatē partium) plus mordet, cumque amba in decoctio



decoctionibus dissoluatur, magis tamen Chalcitis, quam Misy. Sori non eliquatur, ut quod compactius, plus ad saxi naturam accedat: Haud aliter quam Misy, per natium calorem extenuatum, ob idq; Chalciti siccus non facile liquefit.

## Diphryges. C A P.

## L X I X.

## N O M E N C L A T V R A.

Gr. Διφρυγες. Lat. Diphryges Ital. Diphryge.

**D**iphrygis tria genera esse creduntur. Quoddam enim metallicum est, quod in Cypro sola gignitur. Lutosum nante extrahitur, ex luto cuiusdam inibi specus: extractum, sole siccatur, mox circumpositis sarmentis uritur. Diphryges ideo uocatum est, quod & à sole & à sarmentis uratur, are scat, et ferme torreatur. Alterum perfecti æris, quasi subsidens sax est. Siquidem post frigide aquæ offusione, ut supra retulimus, cum de flore æris differeremus, sublato ære, fornacum ima parte coherens id genus inuenitur, & adstrictionem & gustum æris habens. Tertiū sic fit: Lapidē Pyriten, ut calcem multos dies cremant in camino: cumq; colorem Rubricæ contraxerit, eximētes recondunt. Quidam tradunt hoc, ex sola materia, quæ lapidem æris gignit fieri quando in dictis areis assata, & in scrobes translata peruritur: tunc enim ambientem scrobis locum comprehendit, & exemptis lapidibus nihilominus inuenitur. Præfertur quod saporem æris reddit, eruginisq; adstringens, & uehementer exiccans linguam. Quod sibi exusta Ochra non uendicat, quæ cremata Diphrygis uice uenit. Vis eius adstringere, siccare excrementia: consumere, ulcera serpentia, & quæ cacoethe uocant, ad cicatricem perducere. Suppurationes, Terebinthina aut cerato exceptum discutit.

**M**etallicum & Cyprinū Diphryges, nostro tēpore nec affertur, nec ostēditur. At secundū genus, quod perfecti æris in fornacibus ab eo

X S perco



percolato sedimentum est, in Italia in Perzene fodinis reperitur, & in pluribus per Germaniam locis. Quod ex lapide Pyrite fit, aut ex sola materia quæ Aeris lapidem procreat, nobis est incognitum. Goslaria per Cordum, Exilit è terræ cuniculis materia quæpiam luti amula, figulina cretæ effigie, lenta et glutinosa substantiæ, sed licet paulatim expuatur, eo tamen emergit impetu, ut etiam lapillos prodiens sursum attollat, natura & facultate Misy respondens. Hanc nativum & Cyprium ille Diphryges existimat.

## Auripigmentum. CAP. LXX.

### NOMENCLATURA.

Gr. Ἀρσενικόν. Lat. Auripigmentum.

Ita. Orpimento.

**A**uripigmentum in eisdem metallis, quibus Sandaracha agnitur. Optimum existimatur crustosum, aureo colore micans, nulli materiæ permixtum, in squammas fissile: quale in Mysia Hellesponti nascitur. Huius duo genera fluxerunt. Vnum supradictum est: alterum glandis effigie, pallidum & colore Sandaracham imitans, glebosum, ex Ponto & Cappadocia deferretur: quod etiam secundum locum tenet. Torretur in testâ novæ vivis carbonibus subiectis, assiduoq; versatur, donec igne flagret, & mutet colorem: deinde refrigeratum, tritumq; reconditur. Vim habet adstrictoriam, & erodentem. Crustas cum vehementi uredine, & violento morsu excitat. Reprimit quæ crescunt, & capillos euellit.

## Sandaracha. CAP. LXXI.

### NOMENCLATURA.

Græ. Σανδραχα. Lat. & Ita. Sandaracha.

**S**andaracha probatur rufa, & saturatior, & aliena materia uacans, friabilis, Cinnabaris colore, sulphuris uirus redolens. Dos eadem & uestio, quæ Auripigmento. Explet alopecias, resina excepta. Scabros ungues cum pice eximit. Contra

phthi



phthiriasin ex oleo efficax est. Tubercula cum adipe discutit. Prodest ad narium orisq; ulcera, & ceteras papularum eruptiones cum rosaceo: item condylomata. Datur ex mulso, purulenta extusientibus. Suffitur quoq; cum resina, aduersus ueterem tussim, rapto per fistulam nidore. Vocem expedit, cum Melle delincta, suspiriosis cum Resina in catapotio optimè datur.

**A**uripigmentum & Sandaracha mineralia, eiusdem virtutis et naturæ sunt, nec aliò differunt, quàm quod vnum magis excoctum est, alterum minus, per æquè ut facultate vnum altero subtilius. Proinde Sandaracha, nihil aliud est quàm Auripigmentum, quod in terræ visceribus ampliorem & coctionem & colorem contraxerit. Quod eò patet. Auripigmentum in testaceo vase super carbones incoctum, summè rubens & flammæ apparet, qualis reuerà est Sandaracha, eoq; magis, quò maiore artificio colorem imbuat, quàm naturà, Sandaracha. Venetis inter Auripigmenti portiunculas, Sandaracha summè rubens inuenitur. Quàm Vernicem scriptorum vocant, gummi est Iuniperi, non Sandaracha. Error fecit, dictio Sandarax, quæ Arabibus istud est gummi. Eapropter ubi apud Arabes Sandaracha legitur, Vernix scriptorum intelligenda, ut in Græcis authoribus, id, quo de agimus, minerale. Sandaraca & Sandicis nomina, quidam pro Cerusa vsta, quòd admodum rubida sit, accipiunt, & hac nihilominus, ipsum est Serapionis Minium, & maxime eius pars, qua hodie seplasia vtuntur. Caterum Arsenicum crystallinum & album, non ex Auripigmento fit, per sublimationem, ut aliqui opinantur, at eisdem ex sese queis Auripigmentum & Sandaracha caneis innascitur. Risagallum per sublimationem fit, æquatis ex Arsenico & Auripigmento partibus.

## Alumen. C A P. LXXII.

Græ. στυπτήρια. Lat. Alumen. Ita. Alume.

**O**Mne Aluminis genus ferè in Aegypto, & in eisdem metallis inuenitur. Etenim scissile quoddam, quasi flos glebosi intelligit. Gignitur & in alijs quibusdā locis, in Melo, in Macedonia, in Liparis, Sardinia, Hierapoli Phrygiæ, Aphrica, Armenia, et plerisq; alijs regionibus, sicut et Rubrica. Plurimæ eius species. Verum ad medendi usum, scissile, rotundum, et liquidum expetunt.

Opti



Optimū est sciſile, præſertim recens, candidiſſimū, guſtu per quā adſtringēs, graue olens, calculorū expers, nec glebulōſe aut aſſu-  
loſe cōpactū, ſed ſigillatim in capillamēta quādā caneſcētia de-  
hiſcens, quale eſt quod Trichites, quaſi capillare nominatur, in  
Ægypto natum. Reperitur quoq; lapis huic Alumini perſimi-  
lis, qui guſtus iudicio dignoſcitur, quōd non adſtringat. Damna-  
tur in rotundi genere, quod manu conſectum eſt: ſed ex figura  
deprehenditur. Aſſumendum autem ſuapte natura rotundum,  
bullis turgens, albo propius, atque ualidius adſtringens, præter-  
ea nonnihil palloris cum quādā pinguitudine præ ſe ferens, ſine  
arenis, friabile, natione Ægyptium, aut ex inſula Melo. Liqui-  
di probatio, ut ſit lymphidum, lacteum, æquale, & ſemper ſucco  
madens, ſine lapidibus, atque quendam coloris igniculum expi-  
rans. Vim habent excalfaciendi, ſtringendi, & expurgādi, quæ  
caliginem pupillis oculorum offundunt: genarum carnem, cate-  
rasq; excreſcentias extenuāt. Sciſile rotundo efficacius intelli-  
gitur. Vri & torreri Chalcitidis modo debent. Putreſcentia ulce-  
ra compescunt. Sanguinis fluxiones inhibent, gingiuas humore  
prægnates comprimunt, motus dentium cum aceto et melle fir-  
mant. Proſunt cum melle ulceribus oris, eruptionibus papularū,  
& fluxionibus aurium, cum ſanguinalis herbe ſucco. Lepris cō-  
ueniunt cum Braſſicæ folijs aut Melle cocta. Item pruritus, &  
unguium ſcabritijs, pterygijs, & pernionibus, aſperſa cū aqua.  
Valent cum aceti ſece, & Galla, pari pondere cremata, ad pha-  
gedenas ulcerum, & cum ſalis duabus partibus, ad uitia quæ  
paſcunt. Furfures cum Eruo & pice illita abſtergunt. Ad len-  
des, pediculos, ambuſta, cum aqua illita auxilio ſunt. Contra tu-  
mores, & graue alarum inguinumq; iarus, illinuntur. Ex Me-  
lo autem aduectum, mulieribus præſtat ne concipiat, ante coitū  
ori uulue inditum. Partus quoq; extrahit. Gingiujs, ſi caro ex-  
creuit, uulue ac tonſillis accommodantur. Ori, auribus & ueren-  
di



*dis cum Melle illinuntur.*

**T**Ria tantum Aluminis genera recenset Dioscorides, nostro verò tempore compluribus vtimur. Nempè alumine rupeo, alumine pluma, alumine facis, alumine catino, alumine squamoso, alumine Zuccherino. Horum omnium nullum ad Dioscoridis descriptionē attingit, præter alumen pluma, quod ipsum est Dioscoridis, omnibus consentientibus notis, alumen scissile, nā alumen rupeum, id non est, quod alumen rupeum vulgò dicitur. Id enim non è terra fit liquida, sed præduro ex lapide, quique quò magis rubescat, eo durior fit. Quod ex eo fit alumen, plus alijs rubet, maiori acrimonia præditum. Fit etiam è lapide eximiè candido, primo friabiliore & teneriore, quoque alumen fit candidū, crystalli in morem transparens, minori à priore acrimonia. Huius vsus ad intingenda serica, & subtilissimas lanas & pamos. Accedit ad hæc, alumen rupeum succo Mali Punici imbutum, nigrorem non contrahit: at lucidior, clarior, & transparentior euadit, magisque crystallum refert. Alumen Zuccherinum, fit ex alumine rupeo crudo, albumine oui, & aqua rosacea. alumen Catinum, cuius in vitreis fornacibus est vsus, quò perspicuum vitrum exeat, è cinere herba, quæ Thuscis, Soda, dicitur, & in Senæ maritima nascitur, & loco qui extrà Venetias, Lio vocatur. Ex hac etiam fit Sal alchali, nam istiusmodi herbam Chali arabes vocant. alumen facis, è facie fit vini perusta, primum in globis, ad candorē vsque, insolata, desiccataque. alumen squamosum, è squamoso & transparente fit lapide, (Specchio D'asino Thusci nuncupant) ambusto igni, aut supra ignitas ferri laminas.

## Sulphur. CAP. LXXIII.

### NOMENCLATURA.

Gr. οἷον. Lat. Sulphur. Ita. Solfo.

**S**ulphur optimum existimatur uiuum, quod Apyron uocāt, snitedula modo splendidum, perlucens, minime lapidosum. Probat in genere Sulphuris ignem experti, quod uret, ac præpingue spectatur. Plurimum in Melo & Lipara gignitur. Supradictum Sulphur calfacit, discutit, & celeriter concoquit. Prodest tussibus, suspiriosis, purulenta extussietibus, in ouo sumptū, aut sisygitum. Præterea partus, usti nidore extrahit. Lepras, lichenas, scabros ungues, cum resina Terebinthina mistum, aufert.

Cum



cum autem illitum, ad lepras efficax est. Vitiliginis tollit: scorpionis ictibus, addita resina, medetur. Cum aceto uero, draconis marini scorpionisq; plagas sanat. Pruritus toto corpore erumpentes, cum Nitro detersum, sedat. Regium morbum emendat, inspersum fronti cochlearis mensura, aut in sorbili ouo sumptum. Facit ad grauedinem, & destillationes. Sudores quoque conspersum inhibet. Podagricis, cum aqua & Nitro illitum, conducit. Grauitatem auditus, suffiti nidore raptim per fistulam hausto, sanat. Lethargicos suffitu excitat. Erumpentem undecunque sanguine sistit. Contusis auribus, cum uino aut melle illitum, medetur.

**S**ulphur, fossile est notissimum, ex essentia procreatum terrestri, uentosa, valide calida, igni adprime consimili. Natura sic in caliditate & siccitate prapotentia, ut tamen in mistione alia humiditate nil ei sit opus. Sulphur vim habet attractoriam. Temperamento est calido, & tenuium partium essentia.

### Pumex. CAP. LXXIIII.

#### NOMENCLATURA.

Gr. κίσσους. Lat. Pumex. Ita. Pumice.

**P**umicis probatio, ut magnoperè leuis, spongiosus, scissilis nec arenosus, item teri facilis, & candidus. Crematur flagrantissimis carbonibus obrutus: & ubi canduerit, extractus, uino restinguitur odorato: iterumq; incensus extinguitur: et tertia uisione exemptus & per se refrigeratus, ad usus conditur. Vis eius adstringere, gingiuas abstergere. Purgat cum calfactione, quæ caliginem pupillis offundunt: explet ulcera, & ad cicatricem perducit. Excrecentia cohibet. Fit ex farina eius dentifricium. Corpori crustam obducit. Auellendis capillis aptus. Theophrastus autor est, si quisquam in bublientem urceum uini, Pumicem iniecerit, feruorem statim sedari.

**P**umex, nulli non notus, ambustus est lapis, è vapore flammæ à monte Aethna, & Vesunio Campania profiliens. Hic mens nostro, non aliter



aliter quam Plinij tempore, totus arsit, ingenti Puteolanorum incom-  
modo. Pumex mari propter substantia raritatem innatat, & à præter  
nauigantibus, sed falso, spuma maris creditur.

## Sal. CAP. LXXV.

Græ. ΑΛς. Lat. Sal. Ita. Sale.

**S**al fossilis efficacior est. Communiter, si est candidus, calcu-  
lis uacans, & perspicuus, densus, æquali compage. Peculiari-  
ter Ammoniacus natione laudatur, si modo findi facile possit,  
& in recta segmenta diduci. In marino Sale eligendus est candi-  
dus, æqualis, densus. Probatissimus in Cypro fit, & Salamine  
Cypri, & Megaris, in Sicilia & Aphrica. Sed inter dicta Sa-  
lis genera lacustris præfertur: sed multo ualidissimus est Phry-  
gius, nomine Tapeus, aut Tritæus, aut Gantæus. Salis natura in  
comune per quam utilis est. Adstringit, absterget, expurgat, dis-  
sipat, reprimat, extenuat, & crustas inducit. Sed hoc interest,  
quod alius alio sit præstantior. Quin & à putredine uindicat.  
Admiscetur medicamentis psoras abstergentibus, excrescentia  
in oculis reprimat, & pterygia consumit, ceterasq; carnis extu-  
berationes tollit. Clysteribus infunditur. Discutit lassitudines ex  
oleo illitus. Contra hydropicorum tumores auxiliatur. Dolores  
in saccis fotu mitigat, et pruritus sedat, ex oleo et aceto infriktus  
ad ignem, donec sudent. Item lichenas, lepras, psorasq;. Anginam ex  
Melle, aceto, & oleo illitus leuat. Tonsillis uuaq;, cum Melle to-  
stus: ulceribus in ore manantibus, gingiuis quas humor uexat, et  
phagadenis ulcerum, cum polenta crematus illinit. Aduersus scor-  
pionum ictus, cum Lini semine: contra serpentium morsus, cum Origano,  
Melle, Hyssopo: aduersus Cerasten, cum pice, aut Cedria, aut Mel-  
le auxiliatur: contra scolopendræ morsus, cum Melle & aceto:  
aduersus uestigium ictus, & teredines, albidasq; capitis pustulas,  
thymos & tubercula, cum seuo uitulino: furunculos cum uua  
passa, aut suillo adipe, aut melle discutit. Testium tumo-

res



res cum Origano & fermento maturius concoquit. Crocodilorum moribus auxiliatur, tritus, in linteolo, & intinctus aceto, ita ut uinculis loca constringantur. Prodest ad bestiarum morsus, sugillationes in facie, ex Melle. Contra haustum Opium & Fungos, cum aceto mulso bibitur. Luxatis imponitur cum farina & Melle. Ambustis igni cum oleo impositus, pustulas erumpere non patitur. Podagricis itidem imponitur, & aurium doloribus cum aceto. Ignis sacros, & ulcera quæ serpunt, cū aceto aut Hyssopo illitus sistit. Vritur fictili, diligenter opertus ne exiliat, cōditusq; prunis, usquedum effervescat. Aliqui fossilem subacta polline obliniunt, & carbonibus subijciunt, usquedum eius crusta exuratur. Solet & sal communis hoc modo uri: Aqua semel abluitur, & siccatus in ollam coopertam mittitur, subdito igne, moueturq; donec iam nō exiliat. spuma salis, spumosi maris lanugo siue ramentum est, in exilibus petris inuentum, cuius eadem quæ sali.

### Muria. CAP. LXXVI.

#### NOMENCLATURA.

Gr. Ἀλμ. Lat. Muria. Ita. Salamuoia.

**M**uria effectus salis præbet, abstergitq;. Dysentericis infunditur, etiam si nome intestina corripit: & ischiadicis veteribus. Ad fetus, aquæ marinæ usus præstat.

### Flos Salis. CAP. LXXVII.

#### NOMENCLATURA.

Græ. Ἀλμὸς ἁλὸς. Lat. Flos salis. Ita.

Fior del Sale.

**F**los salis flumine Nilo defluit. Lacubus tamen quibusdam innatat. Assumendus qui crocei coloris est, odore ingrato seu gari. Interdum longè magis uirus olet, gustuq; mordacior



Et pinguius lentus. Fucatus autē Rubrica, aut scrupulosus, improbat. Præterea Sincerus non nisi oleo resoluitur: adulteratus nonnulla ex parte, etiā aqua, diluente facilius colorem. Ad ulcera quæ cacoethe uocantur, Et phagedænas, genitalium nomas, Et purulentas aureis, efficax est. Oculorum hebetudines, cicatrices, albuginesq; tollit. Emplastris unguentisq; coloris causa, ut Rosaceo, miscetur. Sudorē cit. Aluum turbat, in uino aut aqua sumptus. Stomachum malè habet. Additur acopis Et smegmatis, quæ albandi capilli gratia componuntur. Et in uniuersum acris est, Et feruentis naturæ, ut Sal.

## Nitrum. CAP. LXXVIII.

## NOMENCLATURA.

Græ. Νίτρον. Lat. Nitrum. Ital. Nitro.

**P**Resertur Nitrum leue, roseo colore, aut candido, in foramina dehiscēs, perinde quasi spongiosum quiddā, quale ex Bunis affertur, Humores euocat, qui in alto cōcreuerunt. Spuma Nitri optima esse putatur leuissima, glebosa, friabilis, colore penè purpureo, aut spumosa, Et mordens, qualis ex Philadelphiæ Lydiæ defertur: secunda est Aegyptia. Quin Et in Magnesiæ Cariæ gignitur. Vim Et uestionem Salis habet, tam Nitrum quam spuma eius: præterea Nitrum tormina sedat, si tritum cū Cumino bibatur, in hydromelite, aut sapa, aut aliquibus quæ inflationes discutere possunt, uti Ruta, uel Anetho. Febris circuitu redeuntibus illinitur, ante suspectā accessionem. Miscetur emplastris, quæ extrahunt, Et discutiunt, extenuāt, Et lepras abstergunt. Cum aqua autem calida, aut uino infusum, inflationes, purulentas aureis, Et sonitus earundē sanat. Sordes expurgat, cum aceto instillatū, canum morsibus ex asinino adipe aut iuillo medetur. Resinæ Terebinthinæ admistum furunculos aperit. Aquæ inter cutem cum fico illinitur: oculis ad claritatē ui-

T

sus



*sus cum Melle succurrit: & uenenis Fungorum, ex posca potum: aut si Buprestis momorderit, ex aqua: ijs uero qui taurinum sanguinem biberint, ex Laserpitio: ijsq; qui cibum non sentiunt, utiliter obducitur: opisthotonisq; iam remissioribus, & luxatis, cum cerato. In resolutione linguae, pani commodè permiscetur. Aliqui supradicta carbonibus urunt, subiecta prius testa noua, donec incandescant.*

**N**itrum & spuma Nitri, quorum apud veteres amplissimus fuit in medicamentis vsus, nec agnoscuntur, nec afferuntur hodie. Salnitrum, quo in bombardarum pulueres, vtuntur, & conficiendam aquam fortem, ad disgregandum ab auro argentum, Nitrum non est, quod Theophrastus, Dioscorides, Galenus, & Plinius describere, vt ei qui hos diligenter legerit, facile clarescet. Atenim quòd suis quibusdam partibus, Nitro sit simile, eò tamen audacia non procedendum, vt verè Nitri in medicina succedaneum faciamus.

## Fæx. CAP. LXXIX.

### NOMENCLATURA.

Græ. Τεύξ. Lat. Fæx. Ital. Feccia.

**F**ligenda Fæx maximè à uino uetere, Italico: sin minus, ab alio consimili. Fæx aceti uiribus longè acrior est. Crematur ut Alcyonium, antè diligenter siccata. Sunt qui noua testa igni largo urant, usquedum penitus incendatur. Alij uiuis carbonibus Fæcis glebam obruunt, & idè opus prosequuntur. Ex perimentum est legitimæ ustionis, ut aerio nitore inalbescat, linguamq; tactu urere uideatur. Eadem urendæ Fæcis aceti ratio. Vis ei: supræ modum urens, & abstergens. Vlcera ad cicatricem perducit: adstringit, uehementer exest: siccâtq;. Sed recenti utendū est: quonia celeriter exanimatur. Proinde non nisi in reconditorio, & uase aliquo reponi debet. Lauatur, ut Pompholyx. Quæ ustionem experta non est, tumores & per sese, & cū Myrto cohibet. Ventris stomachiq; fluxiones illita sistit. Muliebre profluuium, imo uentri aut genitalibus imposita, mitigat.



tigat. Panos discutit nondum exulceratos, & tubercula. Rigen-  
tes mammas, suiq; lactis impatientes, cum aceto peruncta extin-  
guit. Cremata uero, ungues scabros cum Resina aufert, addito  
Lentiscino oleo, illita nocte tota, rufat capillum. Elota oculorū  
medicamentis, ut Spodos, adijcitur. Cicatrices eorum & caligi-  
nes eadem abstergit.

**F**Aex Vini, nulli non, cui Vinum, perspecta. Fit ex ea, quemadmodū  
suprà commonstrauimus, Alumen Facis. Porro resina hac qua va-  
sis vinaris adglutinetur, quam Itali Greppola vocant, soluit aluum.  
Ea in puluerem redacta, cum modica quantitate Mastiches, & Saccha-  
ri, iuri gallinæ insumpta leuem subductionem molitur. Potentius opera-  
bitur Senæ infusio, si in eam, Facis puluis indatur.

## Calx uiua. CAP. LXXX.

### NOMENCLATURA.

Græ. Ασβες. Lat. Calx uiua. Ital. Calcina uiua.

**C**alx uiua hoc modo fit: Marinorum Buccinorum testas  
igni condito, aut feruenti clibano, nocte dimittito: postera  
die, si candidissimæ fuerint, extrahito: sin aliter, iterum urito,  
usquedum uehementer inalbuerint. Dein ubi in aquam frigidā  
immersæ fuerint, in fictile nouū conijcito, & exacte pannis ope-  
riens, nocte unā conquiescere finito, manē eam extrahens. Vbi  
perfecto omni opere elaborata fuerit Calx, recōdito. Fit & è lit-  
torabilibus calculis igne crematis, nec nō è uili & fusaneo mar-  
more: quæ cæteris præfert. Vis omni Calci in cōmune ignea, mor-  
dēs, adurēs, & crustas inducēs. Quibusdā alijs immistā, ut adipi  
oleo, concoquēdi uim assumit, mollit & dissipat. Vlcera ad cica-  
tricem perducit. Efficacior existimatur recēs, nec aspersa aquis.

**C**alx vulgò agnita. Priuatim fit è Purpurarum, Buccinorum, Co-  
chlearum, Ostraceorum, & Onorum testis, variante operationis  
modo. Publica & priuata ædificia, id genus Calce, fiunt, in tota Germa-  
niæ maritima. Quæ uero ex albo lapide fit, seu marmore quopiam  
uiliore, primū extincta, post sepius aqua frigida elota, & postremū cū  
cum aqua Rosacea, mirum in modum prodest immissa unguentis vlce-



rum malignorum, sine morfu, deficatorijs. Proinde Vnguenti de Calce  
 vsus erit, in vlcera genitalium, & maximè Gallica, alijsq; ad eum mo-  
 dum malignis.

## Gypsum. CAP. LXXXI.

### NOMENCLATURA.

Græ. γύψος. Lat. Gypsum. Ital. Gesso.

**G**ypsum uim habet adstringendi, obstruendi, sanguinis  
 eruptiones sudoresq; cohibet. Sed potum, strangulationis  
 modo iugulat.

**C**Ypsum & Italiae & Gallijs notissimū, trium est generū. Vnum  
 in laminas fossile, quod non aliud plane est, quam Aphoselinus,  
 qui ipse est, Specularis lapis. Alterū, in pectines oblongos scissile. Tertiū,  
 in ingentes coalescens glebas. Huius minera lapis est albus, squamosus,  
 conficiendique satis nota est ratio.

## Sarmentitius cinis. CAP. LXXXII.

### NOMENCLATURA.

Græ. τέφρα κληματίνης.

Lat. Cinis Sarmentitius. Ital. Cenere de sarmenti.

**S**armentorum cinis urendi uim habet. Cum axungia autē  
 uel oleo illitus, fractis nervis, articulorū collisionibus, &  
 neruorum nodis prodest. Cum Nitro & aceto, excrescentias  
 carnis in scroto reprimat. Serpentium canumq; morsibus illitus  
 ex aceto medetur. Crustas obducentibus medicamentis admi-  
 scetur. Fit ex eo lexinium contra præcipitationes, & Fungorū  
 uenena, cum aceto, sale & Melle.

**S**armenta non ignota sunt. Horum lexinium & Cinis varij in me-  
 dicina sunt vsus. Cinis ē contrarijs qualitatibus & substantijs con-  
 stituta. Nam quædam eius partes terrea sunt, quadā fuliginosa. Ea tenui  
 sunt essentia, siquidem cinere aqua madefacto postea colato, cum aqua  
 secedunt, & restat in cinere terrestris essentia, cui facultas omnis calida,  
 & subtilis deperijt. Cinis omnis, cetera inuicem similis, naturam sequi-  
 tur materiae e qua prodijt.

Alcyon



## Alcyonium. CAP. LXXXIII.

## NOMENCLATURA.

Græ. Αλκυόνιον. Lat. Alcyonium. Ital. Alcionio.

**A**lcyonij quinque esse genera compertum est. Vnum enim spissum, acerbis saporis, spongiosa facie. Item tetri odoris, ponderosum, & picē olens, quod plurimum in littoribus inuenitur. Alterum pinnula oculorum aut spongiæ simile, fistulosum, & leue, odorem algæ referens. Tertium uermiculi forma, & colore magis purpureum, quod Milesium quidam uocant. Quartum succidis uelleribus non dissimile, multis inanitatibus hians, leue. Quintum figura Fungi, sine odore, asperum, parte interna quodam modo pumicosum, foris leue, acre, quod plurimum in Propontide iuxta insulam Besbicon appellatam gignitur, patrio nomine Halos achnen uocant. Duo priora in sœminarum smegmata assumuntur. Contra lentigines, lichenas, lepras, uiriliginis, nigritias, & maculas in facie reliquoq; corpore. Tertium ijs qui difficili urina uexantur, aut arenulas in uesica colligunt, idoneum est. Item renibus affectis, aquæ inter cutem, lieni. Vsti autem, & ex uino illitum alopecias replet. Postremum dealbâdis dentibus aptum est. In alia smegmata, psilotrag; assumitur, cum sale mistum. Si quisquam Alcyonium cremare uelit, cum sale in crudum fictile mittat, & oblinens uasis spiraculum luto, ita fornaci mandet, & cum siglinum percoctum fuerit, extrahens ad usus recondat. Lauatur ut Cadmia.

**A**lcyonium spuma marina genus, multiplex ut ex Dioscoride patet. Huius primum, & postremum tantum genus in Europam asportantur. Alcyonij omnes emundant & digerunt. Calidi sunt & acres, plus minusue, quatenus tenuioribus constant partibus.

## Adarces. CAP. LXXXIIII.

## NOMENCLATURA.

Græ. Αδάρκης. Lat. Adarces. Ital. Adarce.

I 3

Fie



**F**it in Cappadocia quod Adarces appellatur. Est autem tanquam concreta salsilago, humidis & palustribus locis siccitate emergens: & arundinibus ac herbis agglutinata, colore flori lapidis Asij similis, & omni forma molli Alcyonio, & aliquantum cano proxima, ut uideri possit lacustre Alcyonium. Ad euellendas lepras, lentigines, lichenas, & uitia cutis in facie, & similia, accommodatur. Et in summa, uis ei acris. Humorem euocat qui in alto concreuit, & ischiadicis prodest.

**A** Darces salsilaginis cœcretæ genus, Cordo id esse ducitur, quod Itali Pallam marinam vocant, cum hanc doctissimus vir Matthiolus, & Italus, nullum qui in Italia Adarces monstraret, repererit.

## Spongiæ. CAP. LXXXV.

### NOMENCLATURA.

Græ. Σπόγγη.

Lat. Spongia.

Ital. Spugna.

**E** Spongijs alias mares appellauere, tenui fistula, spissas: quarum duriores Tragos nominarunt. Fœminas autem quæ contrarias dotes habent. Vruntur eæ ut Alcyonium. Recentes sine pinguitudine, uulnerariæ sunt, & tumores reprimunt. Recencia uulnera ex aqua poscæue conglutinant. Veteres sinus ex decocto Melle iungunt. Vetustæ autem inutiles. Aridæ ligatæ lino, si penicilli modo adigantur, occlusa ulcera, callosq; laxant. Siccæ recentes & uacue senilia ulcera, quæ fluxione laborant, aut cuniculatim excedunt, impositu siccant. Sanguinis profluum sistunt. Crematarum cinis ex aceto, aridæ lippitudini auxiliatur: & ubi quid abstergere, aut adstringere opus est. Utilius, in oculorum medicamentis lauare cinerem. Omnium cinis cum pice crematarum, profluentem sanguinem sistit. Candida cura



cura fiunt, è molliſſimis recentes, per æſtus tinctæ ſalis ſpuma, quæ petris cohæret. inſolantur inuerſæ, hoc eſt, parte caua ſurſum ſpectante, & qua abſciſſæ, fuerunt, deorſum. Si uerò æſtiua ſerenitate ad lunam ſternantur, perfuſæ ſalis ſpuma, aut maris aqua, maximum candorem referent.

**S**pongia aut rare ſunt, aut denſæ & compactæ, aut quæ vocantur Achilææ. Lapis qui in Spongijs reperitur, renales lapillos cõminuit. Is diſſolutus, lacti ſimilem ſuccum emittit. Quo patet eum ſine calore manifeſtò extenuare.

## Corallium. CAP. LXXXVI.

### NOMENCLATURA.

Græ. Κοράλλιον. Lat. Corallium. Ita. Corallo.

**C**orallium, quod aliqui Lithodrendron appellarunt, marinum eſſe fruticem conſtat, qui alto extracltus, duratur ſtatim atque emergit, tanquam offuſo aere protinus concreſcat. Plurimū inuenitur ad Syracuſas, in promontorio cui Pachyno nomen eſt. Laudatiſſimum, rubens, colore Antherici aut Sandycis ſaturatæ, nec ſecus tereti facile cedēs, æquabili uſquequaq; concremēto, rurſus algæ aut fuci marini odore, quàm ramoſiſſimum, forma fruticis, Cinnamomi æmulū. Quod autē in lapidis duritiā coit, ſcrupuloſum, inane, & lacunoſum, uitioſum exiſtimatur. Adſtringit, & refrigerat mediocriter. Excreſcentia coeracet, oculorū cicatrices abſtergit, ulcerū caua, & cicatrices explet. Cōtra ſanguinis reiectiones magnoperè efficax eſt. Vrinæ difficultati auxiliatur, quin & potu ex aqua lienē abſumit. Quod antipathes uocant, Coralliū eſſe arbitrantur, ſpecie tantum diſtans. Eſt autē colore nigro, arboris figura, ramoſum magis. Vires ſupradicti habet.

**C**oralliū marinus & lapideſcens frutex, piſcatur in quibuſdā maris thyrreni tractibus, nō rubri tātū, & nigri, ſed etiā cādidiſſimi coloris



verumtamen quod tale est, rubro minus & ponderosum, & intus consistatū, spongiosum magis & leue, quinetiā. Id causa ut eo potius utatur medici, cum infigidandi sese offert occasio. Corallium cum ex aqua extrahitur muscosum est totum, nec rubrum cernitur, at artificum industria perpolitur & nitorem acquirit. Fragmenta innumera candidi & nigri Corallij Neapoli visuntur. Occulta quapiam vi epilepsie medetur, medicina est cordialis, siquidē ingentem in animis letitiam parit.

### Phrygius lapis. CAP. LXXXVII.

#### NOMENCLATURA.

Græ. λίθος φρύγιος.

Lat. Phrygius lapis. Ital. Pietra phrigia.

**P**hrygius lapis, quo insectores in Phrygia utuntur, à qua nomen accepit, nascitur in Cappadocia. Optimus habetur pallidus, modicè grauis, non solida corporis compage, intercedentibus albis segmentis, ut in Cadmia. Vritur autem uino optimo perfusus, uiuisq; carbonibus obrutus: perflatur assidue follibus, donec mutato colore rufescat. Rursus extractus eodem uino restinguitur. Hoc iterum & trinis uicibus faciendum. Attendendum tamen, ne minutim confringatur, & in fuliginem euanescat. Vis crudo ustoq; adstrictoria, expurgans. Vlceribus crustas quadantenus inducit. Ambustis cum cerato medetur. Lauatur ut Cadmia.

**L**ycnis lapidis nomine seplasijs duo lapides prostant. Primus longus est & teres, in mucronem desinens. Alter, effigie terra glebam refert, media inter lapidē & terrā essentia fusci in pallido coloris, notis ac si situm contraxisset, candidis distinctus. Hunc Phrygium lapidē Cordus existimat, Matthiolus vero, Italiae testificatur incognitum.

### Asius lapis. CAP. LXXXVIII.

#### NOMENCLATURA.

Græ. Ασίου λίθος.

Lat. Asius Lapis.

Ital. Pietra Asia.

Asius



**A**sius lapis assumi debet Pumicis colore, leuis, fungosus, itē friabilis, scissiles uenas lutei coloris ad imū aētas habens. Eius flos, salsugo subflaua est, summo lapide insidens, compage tenui, colore in aliquibus albo, in alijs Pumici simili, ad luteū uergente. Admotus linguae aliquantum mordet. Vim habet uterq; adstrictoriam, & modicē erodentem. Admixtus liquidaē pici, aut terebinthinae, tubercula discutit. Lōgē ualidior flos existimatur. Decatēro siccatus flos, uetera ulcera & cicatrici repugnantiā sanat. Excrescētia cohibet, tetra ulcera & fungis similia, cū Melle expurgat. Vlcērum caua explet, & expurgat cū Melle: depascentiaq; cum cerato sistit. Fit cataplasma ex eo podagris, misto fabae lomēto: & lienosis, ex aceto & uina calce. Prodest flos ex Melle phthisicis linctus. Podagrici iuuantur, pedibus in folio ex eo lapide excanato inditis. Fiunt quoq; pulueres, qui corpora erodunt, & luxuriantem carnem, & corporum crassitiē absumunt, cum uice Nitri in balneo sparguntur. Si lauare libet Cadmiae modo lauatur.

**L**apis Asius in Naturae minerā amandabitur, non prius agnoscendus, quam per Plutonem prodetur.

## Pyrites. CAP. LXXXIX.

### NOMENCLATURA.

Graece. πυρίτης. Lat. Pyritis. Ital. Pietra Pirite.

**P**yrates lapidis genus est, à quo aes conflatur. Eligi debet aeris similitudine, facile scintillas adens. Vritur sic: Melle irrigatus molli pruna continuo flatur follibus, donec rufescat. Alij in multos carbones igni candentes, lapidem copioso Melle perfusum deijciunt, & ubi ad fuluum colorem uergere cœperit, extrahunt: efflatoq; cinere, rursus madefactum cremant, donec æquabiliter assicatus, friabilis reddatur. Siquidem sepe facies summa solum uritur. Ita crematus, siccatusq; reconditur. Si eloto opus sit, lauare debet ut Cadmia. Tam crudi quam usti uis

Y 5 est



est, excalfacere, abstergere, offusam oculis caliginem expurgare, duritias concoquere, & concoctas discutere. Resina ex-  
p-  
ptus ex crescentia in carne cohibet, sed calorem quendam & ad-  
strictionem parit. Ita ustum nonnulli Diphryges appellant.

**P**Yrites lapis non alius est quam Marchesita vulgaris. In metallorū  
fodinis diuersa effigie & colore repperitur. Raro tamē, quæ metalli  
magnam partem contineat, eaque causa est, ut è caueis fodinarum in  
Germania, res velut inutilis eiciatur, quātūnnis hæc aris, illa auri, ista  
argenti quippiam in se contineat.

## Hæmatites. CAP. XC.

### NOMENCLATURA.

Græ. Αἱματίτης.

Lat. Hæmatites.

Ital. Pietra Hematite.

**H**æmatites optimus habetur friabilis, saturato colore ru-  
ger, durus & suapte ingenio æqualis, nulla sorde admi-  
sta, nulloq; zonarū discursu. Vim habet adstringentem, & ex-  
calfactoriā aliquantum, extenuantemq;. Oculorum cicatrices  
& scabritiam cum Melle purgat: cum lacte autem muliebris  
lippitudini, fractis, & oculis cruore suffusis conuenit. Bibitur cō-  
tra difficultatem urinæ, & fluxiones mulierum in uino. Et ab  
ijs qui sanguinem reiecerunt, cum succo punici mali. Fiunt ex eo  
coticula & collyria, oculorum utijs apta. Vritur ut Phrygius  
sine uino duntaxat. Modus uestionis est, ut modicè leuis fiat, &  
bullis quibusdā intumescat. Sunt qui Hæmatiten ita adulterant  
Densam glebam rotundamq; Schisti lapidis, cuiusmodi sunt quæ  
eius radices uocantur, in urceum figlini operis, qui feruentem ci-  
nerem contineat, cōdunt, paucaq; interiecta mora eximunt, ex-  
periunturq; si trita ad cotem Hæmatitæ colorem reddat. Quod  
si ita res se habet, reponunt: sin minus, iterū obruunt, & subin-  
de conspicientes, periculum faciunt. siquidē in cinere diu dimis-  
sus



lus, colore mutato diffunditur. Coarguitur malè confectus, primum scissilibus uenis: quippe in rectos uenarum discursus refringitur. At Hematites longè secus se in colore habet: namque hic floridum reddit: Hematites uerò saturatiore, atque Cinnabarin imitantem. Inuenitur in Sinopica Rubrica. Fit & è Magnete lapide, uehementer ambusto. In Aegypto sponte naturæ cum metallis enascitur.

**H**ematites lapis in Italia maximè & Germania, ubi nascitur agnitus. Siquidem Hematitis species omnes à plinio descriptæ: præter unā (per Cordum) in Hercinia Saxonia montibus reperiuntur.

### Schistus lapis. CAP. XCI.

#### NOMENCLATURA.

Græ. Σχίς &. Lat. Schistos. Ital. Pietra Sfeffa.

**S**chistos lapis in Iberia Hispaniæ gignitur. Probatur maximè qui Croci colorem emulatur, friabilis, suapte natura fissilis, concremento & alterno coherentium uenarum discursu, pectinum modo. Ammoniaco sali similis. Vim exhibet Hematitæ, sed ad omnia infirmiore. Quin & caua replet muliebri lacte perfusus. Ad procidentia, rupta, item genarum crassitiem, & uuas oculorum, magnoperè efficax est.

**C**um Schistus hodie non habeatur: parisque cum Hematite sit virtutis: substitui eius loco sine noxa Hematites potest.

### Gagates. CAP. XCII.

#### NOMENCLATURA.

Græ. γάγας.

Lat. Gagates.

Ital. Pietra Gagatè.

**I**N Gagatarum lapidum genere, præferendus qui celeriter accenditur, & odorem Bituminis reddit. Niger est plerumque, & squalidus, crustosus, per quā leuis. Vis ei molliendi, & discutiendi. Deprehendit fonticum morbum suffitus, recreatque uul-

ne,



uæ strangulationes. Fugat serpentes nidore. Podagricis medicaminibus, & acopis additur. In Cilicia nasci solet, qua influens amnis in mare effunditur, proximè oppidum quod Plagiopolis dicitur. Vocatur autem & locus & amnis Gagas, in cuius faucibus ij lapides inueniuntur.

## Alij plures lapides. CAP. XCIII

### NOMENCLATURA.

Græ. πολλοι ἄλλοι λίθοι. Lat. Plures alij Lapides.

Ital. Molte altre pietre.

**L**apis Thracias dictus, nascitur in flumine quodam Scythia, cui Ponto nomen est. Vis ei Gagatæ. Traditur aqua accendi, & oleo restingui: quod in Bitumine accidit. Magni lapis optimus est, qui ferrum facile trahit, colore ad cæruleum uergente, densus, nec admodum grauis. Datur cū aqua mulsum trium obolorum pondere, ut crassos humores eliciat. Sunt qui Magnetem crematum pro Hematite uendant. Arabicus lapis maculoso ebori similis. Is tritus illitu hæmorrhoidas exiccat. Eius cinis dentifricio optimus. Galaëtites appellatur, quod lacteum succū resudet: cinerei tamen est coloris, ac gustu dulcis. Ad oculorum fluxiones, ad ulcera conuenienter illinitur. Oportet autem in aqua tritum, pixide plumbea recondere, propter uim guttini, quod ei obhæret. Melitites omnia Galaëtite similis. Hoc tantum interest, quod dulciorem succum remittit. Eiusdem Galaëtites effectus. Morochthus lapis, quem aliqui Galaxianum aut Leucographida uocauerunt, in Aegypto nascitur: quo, uelut potè molli, & facile liquecente, linteones dealbandis uestibuntur. Spiracula corporis obstruere uidetur, conueniēs ijs qui sanguinem expuunt, cœliacis, & uesicæ doloribus, cum aqua tritus. Item fluxionibus uulvæ, & impositus uelleri. Mollior oculorum collyrijs miscetur. Explet enim cana, atque delachrymans



nationes sistit. Idem cerato exceptus, ulcera quæ sunt in tene-  
 ris partibus corporis, ad cicatricem perducit. ~~Alabastrites~~ uo-  
 catus Onyx, crematus, resina aut pice assumpta duritias discutit,  
 stomachi dolores cum cerato leuat, gingiuas comprimit. Lapis  
 nomine Thytes, in Aethiopia gignitur, subuiridi colore Iaspide  
 imitatus. Cum diuiditur tamen lacteum succum reddit. Veho-  
 menter mordet: tenebras, quæ pupillis obuersantur, expurgat.  
 Iudaicus lapis in Iudæa nascitur, glandis effigie, candidus, scita  
 admodum cōfiguratione, lineis æqualiter inter se distantibus quasi  
 industria detornatis, solutus nullam qualitatem manifestam gu-  
 sti repræsentat. Poteſt Ciccris magnitudine tritus ad cotem, ut  
 collyrium, cum calidæ aquæ cyathis tribus, potu difficultati uri-  
 næ auxiliari, & calculos in uesica comminuere. Amiantus la-  
 pis in Cypro nascitur, scisso Alumini similis: quo, utpote flexili,  
 telas & uela tantum spectaculi gratia texunt, quæ ignibus in-  
 iecta ardent quidem, sed flammis inuicta splendidiora exeunt.  
 Sapphirus lapis, percussis à scorpione, potu prodesse existimatur.  
 Contra intestinas exulcerationes bibitur. Excreſcentia in oculis  
 uuasq; & pustulas inhihet, & ruptas membranas cogit. Mem-  
 phites in Aegypto iuxta Memphin inuenitur, calculorum ma-  
 gnitudine, pinguis, uersicolor. Tradunt trito & illito, quæ uren-  
 da aut secanda sunt, sine periculo obſtupeſcere, ita ut non sen-  
 tiant cruciatum. Selenites lapis, quem aliqui Aphroselenon ap-  
 pellarunt, quoniam noctu inuenitur lunæ imaginem reddere,  
 quæ cum ea quidem augetur & decreſcit. Nascitur in Ara-  
 bia, candidus, traslucens, leuis. Huius ramenta comitialibus in  
 potu dari iubent. Eo ceu gestamine ad amuleta mulieres utun-  
 tur. Arbores adalligato eodem frugiferæ redduntur. Iaspidium  
 quædam Smaragdum imitatur, alia Crystallum, colore similis  
 pituita: alia non dissimilis ari, ob id uocatur Aerizusa: alia  
 ueluti fumo infecta, quæ Capnias ex argumento uocatur. Quæ-  
 dam



dam lineis albis & resplendentibus præcingitur, Assyrios ap-  
 pellata. ~~Idem lapis in lineis fidei quæ Tenentibus fidei~~  
~~in pulchro colore generantur. Sicut in~~  
~~effervacibus, acoloris præferebat apparet.~~ Aeti-  
 tes lapis est ueluti prægnans, cum quatitur, alio in utero sonan-  
 te: Grauidis continet partus, cum lubrica sunt uulua & parum  
 tenaces, sinistro brachio alligatus. Sed parturientibus è brachio  
 amoveatur, & feminibus alligetur, ut sine doloribus pariant.  
~~Idem lapis in pulchro colore generantur. Sicut in~~  
~~effervacibus, acoloris præferebat apparet.~~  
~~Idem lapis in pulchro colore generantur. Sicut in~~  
~~effervacibus, acoloris præferebat apparet.~~ Tritus  
 & cerato exceptus. Cyprino, aut Gleucino, aut excalescente  
 comitiales magnificè iuuat. Ophitæ genera multa. Quidam por-  
 derosus & niger. Alter cinereo colore spectatur, punctis distin-  
 ctus. Tertius lineis quibusdam candidis intercinctus est. Omne  
 alligati contra capitis dolores, & serpentium ictus prosunt. Fe-  
 runtur qui lineas habent, lethargo, & capitis doloribus auxi-  
 liari. Lapidés in spongijs inueniuntur, qui uesicæ calculos rum-  
 punt, in uino poti. Lithocolla glutinum, quo lapides coniungun-  
 tur. Conflatur autè ex marmore, lapide Pario, & taurino glu-  
 tine. Potest candente specillo admotum: incommodos oculis pu-  
 los replicare. Ostracites testæ similitudinem habet, crustosus, &  
 in laminas fissilis, quo mulieres ad detrahendos pilos, pro pumi-  
 ce utuntur. Menses drachmæ pondere potus ex uino, sistit.  
 quatuor diebus à purgatione bibitur sicilici pondere, fæmini-  
 præstat ne concipiant. cum Melle autem impositus, mamma-  
 rum inflammationes lenit, & nomas cohibet. Smyris lapis est  
 quo annularij scalptores lapides expurgant, ad erodendum &  
 urendum utilis. Gingiujs, quas humor uexat, prodest. Dentis  
 fricio comédatur. Arena è littoribus sole feruescèta, hydropic-  
 rû tumores exugit, si capite tenuis in ea obruant. Torreri solet a  
 ar



aridos fotus, pro Milio aut sale. E cote Naxia, quod exacuendo ferro deteritur, illitum alopecias ad pilum reducit. Virginū māmas cohibet, nec increfcere patitur. Potum ex aceto, lienem absumit, & comitialibus prodest. Geodes lapis astringit, siccāt, caligines oculorum discutit. Illitus autem ex aqua, testium māmārumq; inflammationes sedat.

**G**agates & Thracius lapis vi & essentia admodum cōsimiles, hoc inter se discremen habent. Gagates, crustaceus: Thracius quaquauer sum sibi æqualis est. Germaniæ montes Gagatis speciem producunt, quo fabri erarij & ferrarij pro carbone vtuntur. Vires, odor, forma, essentia, Gagatem representant. Thracius lapis, ipsum est Succinum nigrum Magnes vi attrahendi ferri preditus, vulgo notus est, & in Germania nascitur, in Misnia montibus, & Hercinia Saxonia, propè Harxiburgum, arcem miliare Germanicum à Gostaria distantem. Arabicus Galaclites, Melitites, Marochtus, ignoti nostro æuo sunt lapides. Galaclites tamen, Cordo, Hildenhemij nascitur. substantia, forma, & viribus nihil à Dioscoride discrepans. In eiusdem territorij montibus Arabicus inuenitur, maculis & cādore ebori persimilis. Alabastrites, hys notus est omnibus qui magnificis signis & adificis insueuere. Thyites nostro æuo est incognitus. Iudaicus seplasis omnibus summè est familiaris scilicet ad cōminuendos in renibus lapillos. amiantus è Cypro affertur, alumini scissili similis (superius demonstrauimus ipsum esse alumen pluma) cādore tamè inferior. ab igne, quantumuis in eo persistat, integer exilit. Venosus est adiantus, ad ligni formā accedēs. Nec desunt qui flexilem producāt, nepe è quo fila & tela cōtexi queāt. Impostorū est pilos Salamādræ dicere. Nā motanus est lapis. Profertur & in laminas fissilis amiantus sed à Dioscoride præteritus. Sapphirus noster, nota gemma, notis aureis nō splēdescit vt vult Plinius, nullūq; aliud discerniculū habet, quā azurini (vt sic loquar) coloris resplendentia. Porro cū vsitatū sit in medicinis cordialibus, instauratricibus prætiosisq; electuarijs, quæ in pestē, venena, & ad vigore cordi excitādū cōponūtur, nō Saphiros tātū, sed etiā Smeraldos, Rubinos, Granatos, & Hiacinthos immittere, & panca seplasia vera, apud se, gēmarū fragmēta habeāt, Medicorū hac in re negotiū erit suæ artis peritos, & probatæ fidei gēmarios cōsulere, ac dein in minutissimum puluerem super Porphyrio lapidē reducere. Siquidem eorum non toleranda ignorantia, seu potius stoliditas, qui Coralium in creis mortarijs molitum, in vsus medicos transferunt, nescij



nesciū brutum hominum genus nihil esse quod aeris & ferri naturam & substantiam magis in se contrahat, quam Corallium, quod miserandis agris aut maturam, mortem, aut molestiam ampliore importat. Memphites, & Solenites, lapides nobis abstrusi, hic in Arabiam, ille in Memphim relegabitur, nisi dicamus hunc Specularem esse lapidem, ut Cordus sentit. Iaspidium diuersum colorati sunt. Quidam candidi, rubeis notis varietati quidam toti rubent, alij in maculis sanguineis virides, alij diuersorum sunt colorum, ut apud gemarios videre est. Aetites diuersorum hodie colorum inuenitur, magnitudine, modo singulari, modo exigua. In Aquila quidem nido repperitur, non ibi nascens, sed in praecipitis montibus, & rupium editissimarum commissuris. Ophites noster, durissimus est lapis, Porphyry penè modo, colore nequicquam nigricante & candido, quod in suo Ophite requirit Plinius, at totus in viridi obscurus, maculis discriminatus in viridi perspicuis. Quo patet nostrum, ab antiquorum Ophite discrepare. Spongiarum testacei lapides, renalibus lapillis effringendis idonei, in coloris lactei colorem resoluntur. Quocirca incidunt sine manifesta caliditate. Clarum quid sit Lithocolla. Nascitur Ostracites apud Hildens hemium, testarum laterumque substantiam, & aspretudinem referens. Pulsus non dissimilem sonitum adit, plana, qua sibi ipsi interfertos ceu lateres habet, coagmētatione coalitus. Smyris miræ cum Adamante proximitatis, siquidem utroque & gemma & arma poliantur. Vitrum etiam Smyris findit. Oculta nunc est Naxia. In Misnia gignitur, haud procul à Dresola, & in Saxonium Hildens hemina.

## Terra. CAP. XCIIII.

### NOMENCLATURA.

Gr. γῆ. Lat. & Ita. Terra.

**O**Mnis terra ad medendi usum recepta, summam & primam vim habet refrigerandi, meatusque obducendi, occludendi; sed specie distat: cum alia, adiunctis quibusdam, ad alia sit utilis. Eretriades duæ sunt. Vna, uehementer alba est, altera Cinericia. Optima habetur ad cinereum colorem uergens perquam mollis, quæ si per eramenta tractim ducatur, lineam violaceam refert. Lauatur ut Cerusa, aut hunc modum: Teritur seorsum, & cum aqua, & ubi pessum ierit, humor leuiter excolatur sicca



siccata solibus, iterū teritur interdiu, adiecta aqua ut uespere  
 confidat antelucanis colo excernitur, & demū in sole trita,  
 si fieri potest, digerit in pastillos. Quod si tosta desideret, pastilli  
 magnitudine Ciceris in fictile perforatū conijciuntur oreq<sup>3</sup> uasis  
 diligenter obturato, supra carbones candentes continenter sol-  
 libus perflantur. Vbi uero cinis in fauillas se conuertit, aut aë-  
 reum colorem contraxit, exempti reconduntur. Vim habet ad-  
 stringentem, & refrigeratorem, leuiter mollientem, caua ex-  
 plet, & sanguinolenta conglutinat. Samia præfertur candida,  
 leuis, tangenti linguae glutinis modo adhærescens, mollis, succo-  
 sa, friabilis, cuiusmodi est, quam aliqui Collyrion uocant. Duæ  
 enim species eius: Vnam ante diximus: Altera Aster appella-  
 tur, crustacea, & cotis modo prædensa. Vritur ac lauatur ut E-  
 retria, uimq<sup>3</sup> consimilem habet. Sanguinis reiectiones sistit. Fæ-  
 minis fluxione uulue laborantibus, cum flore syluestris Punice  
 datur. Testium & mammarum inflammationes, illita ex Ro-  
 saceo & aqua, refrigerat. Sudores arcet. Contra serpentium  
 morsus & uenena, pota ex aqua auxiliatur. Samius lapis in Sa-  
 mia terra inuenitur, quo aurifices utuntur poliendo auro, ut re-  
 splendeat. Probaturn candore, & duritia. Vis ei adstrictoria, &  
 refrigerans. Prodest stomachicis potus. Sensus habetat. Verū  
 ad fluxiones oculorum & ulcera, cum lacte efficax est. Partus,  
 ut tradunt, adligatus accelerat, & conceptus sæminarum custo-  
 dit. Chia eligi debet candida, uergens ad cinereum, Samia simi-  
 lis. Est autem crustosa, albaq<sup>3</sup>, sed fictitijs formis differens. Vis  
 eadem quæ & Samia. Extendit faciem, & erugat, atque splē-  
 didam reddit, colorem in facie & corpore toto commendat. In  
 balneis pro Nitro deterget. Eadem præstat Selinusia: Maximè  
 laudatur, quæ uehementer resplendet, candida, friabilis, & hu-  
 more dilui celerrima. Cimolia duo genera, candida, & ad pur-  
 pureum inclinans. Optima existimatur, quæ innatam habet pin-

Z

guitu



guitudinem, tactuq; frigida sentitur. Vtraque aceto diluta, parotidas, & alia tubercula discutit. Ambusta igni, si statim Cimolia oblinantur, pustulas non sentient. Testium duritias, & totius corporis collectiones cohibet. Igni sacro imponitur. In summa, utraque multum in medicina commendatur, si incorrupta originis, nec spuria assumatur. Quæ pinguis dicitur, colore ferè Eretriæ similis est, grandioribus tantum glebis: manum si quis admoueat, refrigerabit. Tactu linguæ usque adeo glutinosa, ut pensilis hæreat. Cui effectus idem qui Cimoliæ: paulo tamen infirmior. Hanc aliqui pro Eretriæ uendunt. Fornacæ testæ vehementer tostæ, crustas ulceribus obducunt: quare prurigini & papularum eruptionibus medentur. Podagricis prosunt, struma discutit, cerato exceptæ. Fornacæ terra quæ retorrída fuluescit, eiusdem cum testæ effectus. Melia colore cineream Eretriæ imitatur, aspera tactu. Ea digitis friata, deasi Pumicis modo crepitat. Vim habet aluminosam, sed remissiusculam, id quod gustu deprehenditur. Modicè linguam siccatur, purum corpus reddit & colorem commendat, pilos extenuat, uirilignes & lepra abstergit. Piæloribus usum præbet, ut colores diutius perennent. Emplastris uiridibus, quæ chloræ dicuntur, efficaciter inseritur. Ex omni Melia terra & omni alia in uniuersum, eligi debet recens, mollis, non lapidosa, friabilis, quæ cum humorem attigerit facile resoluatur. Ex Ampelitide terra, quæ Pharmacitis nomine, in Seleucia Syriæ nascitur, laudatur in primis nigra, Piceæ longos carbonēs referens, modicè assulosa, æquabili splendore, quæ detríta, accepto oleo, statim eliquescit. Vitiosa censetur candida & cinerea, quæ in liquorem non resoluitur. Vim dissipandi & refrigerandi habet. Ad calliblephara additur, tingendis capillis idonea. Vsus eius ad illinendas uites sub germinationis tempus, utpotè cum in nascentes uermiculos enecet.

Fulig



## Fuligo pictoria. CAP. XC V.

## NOMENCLATURA.

Græ. Ασβόλη. La. Fuligo. Ita. Fuligine.

**F**uligo qua pictores utuntur, ex uitrarijs officinis colligi solet: siquidem ei palma tribuitur. Vis ei ad adstringendum & erodendum efficax. Fraëta cum Rosaceo cerato ad cicatricem perducit.

## Atramentum librarium. CAP.

## XC VI.

## NOMENCLATURA.

Græ. Μέλαιρ ὡ γράφομεν. La. Atramentum librarium. Ita. Atramento librario.

**A**tramentum quo scribimus, Fuligine è Tedis coaëta colligitur. In singulas libras gummis, ternæ Fuliginis unciaë adijciuntur. Fit etiam è resinarum & pictoria Fulgine, de qua paulò antè diximus. Assumitur autem Fuliginis mina, gummis sequilibra, glutinis taurini, Atramenti sutorij, singulorum sequiuncia. Additur conuenienter erodentibus medicamētis ambustis, ex aqua commodè crassius illinitur: sed non antè soluitur, quàm cicatricem induxerit. Sanatis siquidem ulceribus, sua sponte decidit. Cæterum habes, amicissime Aree, serè qua tradenda duximus pro operis modo quem destinauerimus, & materia auxiliorumq; medicinalium copia.

**O**mnès hæ terrarum species, vt veteribus cognita, & in medicamēta usurpata, ita harum, à patrum nostrorum memoria, & vsus, & notitia deperijt. Cordo tamen, Melia Hildenshemij inuenitur, forma & viribus cum Dioscoride conueniens. Itidem Ampelitis, Zuicania, in Misnia finibus, ex montibus eruitur, & in inferiori Germania Aquæ (grani, à fabris lignarijs, Nigra creta appellatur. Caput 95. & 96, è scripto Dioscoridis satis nota sunt.

Finis Quinti Libri.

Z z

Peda



## PEDANI DIO-

SCORIDIS ANASARBEI,

De Venenis, Quoque modo ar-

ceantur, vitenturque, Liber

Sextus, Ioanne Ruel-

lio Suefsionensi

interprete.

*Ad puncta annotationes doctæ &  
compendiosæ.*

## P R A E F A T I O .



V P E R I O R I B V S, amicissime Aree, libris,  
tradidimus de Aromatibus, Oleis, Vnguentis,  
Arboribus, & earundem fructibus, Lachry-  
misq; item Animalibus, Melle, Lacte, Sæuo, Fri-  
mentis, Oleribus, Herbis, Radicibus, Liquamentis, Vinis, Me-  
tallisq;. In hoc uero totius operis ultimo, facultates medicamen-  
torum recensuimus, quæ prodesse nobis, aut officere possunt. V-  
tata igitur orationis prolixitate, opus institutum prosequamur.  
Huiusmodi autem tractatus, cum bisariam distributus sit: In  
partem Venena præcauentem, ita ut ne fallant sumentes: Aut  
quando per imprudentiam dentur, ut tum quoque innoxii  
fiant, irritaq;. Et in rationem ijs succurrendi, qui iam noxiam  
sentiant: Primum differam de præcauendi modo, Quem esse dif-  
ficillimum, pleriq; maiorum arbitrantur, quod dantes clam Ve-  
nena



nena, ita insidias temperant, ut peritissimum quengue decipiant.  
 Siquidem Venena, sua amaritudine, permixtis dulcibus spoliāt:  
 & graue odoris uirus, mistura odoramentorum eximūt. Aut  
 medicamenta immiscent, quæ tuenda sanitatis gratia dari pu-  
 tantur: & præsertim in uale tudine, ut Absinthium, Tragori-  
 ganum, Satureiam, aut Hyssopum, quinetiam Thymum, Irim,  
 origanum, Abrotonum, Castorium, Aut si quid medicamen-  
 tis purgatorijs cognatam habere qualitatem uideatur: aut potio-  
 nibus inserunt: ut uinis asperis, iuribus, passo, mulsa aquæ, mu-  
 sto, succis, ut in cremore lentis, polentis. Aut medicaminibus,  
 aut alijs, quæ assumuntur, edulij speciem referentibus. Quare qui  
 in ea suspitione sunt, conditos cibos uitare debent, omniq; inten-  
 so sapore, dulcium, aut salforum, aut acidorum, abstinere: nec si-  
 tibundi affatim bibere, aut esuriētes uoraciter comesse, semperq;  
 ad saporem horum diligenter attendere, præsertimq; potu, fri-  
 gidam aquā præsumere. Satiato enim appetitu, qualitates æger-  
 rime postea concoquantur. In ægris quidem, facile cauemus po-  
 tiones, auxilij prætextu dari solitas, quas offerunt improbi uene-  
 ficiorum artifices: Itaque ob id, laborantes morbo, non perinde  
 audentium iniurijs patent. Et hæc quidem, ne facile incauti se-  
 ductiq; homines, capiantur dolis ueneficiorum, ratio est & fa-  
 cultas. Sed alia superest expeditior, ut suspiciosi aliqua præsumāt,  
 quæ Venenorum uires habetent, & inefficaces irritasq; reddant:  
 Cuiusmodi Caricæ sunt cum inglandium nucibus maducata, &  
 quæ Cedromela uocant, id est, Citria, seminisq; Napi drachma  
 cum uino, itē folia Calamintha, aut Creta, quæ Lēnia Sphragis  
 appellatur, pondere pari cū uino: Aut Rutæ folia & nucis in-  
 gladis nucleū, aut Caricas duas, & salis callū ieiuni sumāt, &  
 nullo Veneni genere ledetur. Antidota ex uino sumpta, eundē  
 effectum præbent: inter quæ intelligitur magnum Mithridatiū:  
 & quod Scinco, & quod sanguine temperatur. Quin & sæpe



*Venenis* obſiſtunt peculiareſ quidā corporū affectuſ, certo quodā modo conſtitutorū, cum quadā cibi potuſq; qualitate, tū vini copia ita tēperatorum, ut cū *Venenis* diſſentiant. Siquidē ingeſti *Veneni* vires frangunt, atque iam priore alimento farctiſ præcluſiſq; meatib; obſtāt ne mēbratim per digeſtionē inſinuetur. Verū enimvero, quoniā fortuna neceſſitas interdū ſimilia diſcrimina peregrē agētibus affert, abſque ulliſ inſidijs hominū, nonnihil diſſerendū mihi, de hac re neceſſariū duco. Iam primū igitur, culinā apparare loco ſubdiali conuenit, cibosq; & potuſ in huiuſcemodi loco ſtruere. Si id fieri commodē nequit, ſecunda erit conditio hæc, apparandi apponendiq; ſub tecto. Sed tum diligenter laquearia animaduertenda. Frequenter enim à ſuperioribus contabulamētis animalia decidunt, exigua quidē, ſed quæ nō modicā perniciē moliātur, ut *Phalangia*, *Stelliones*, & alia quædam reptilia. Porro uinaria uafa diligenter intueri oportet: Nanque reptilia odore vini illiciuntur, quæ interdū ſorbedo, noxiū uiruſ eruſtarūt, interdū uerò delapſa immerſaq; expirarūt, & exitij cauſas, haurientibus attulerūt. Sed hæc hæcenus dicta ſint, ne cauti & prouidi inſidijs pateāt. Quòd ſi qui ſua ſponte, aut quorundā inſidijs ſumpſerunt, auxiliari primo quoque tempore oportebit. Siquidem dum comiteſ ſingulorū uenenorū nota expectātur, immedicabile fit ueuenū, & pauliſper neglectum, medicamētis agrē cedit. Quare ſi qui pro comperto ſe uiruſ ſumpſiſſe intelligant, & fateantur: aut eorū qui aderāt, teſtimonio conſtet, protinuſ ad idonea remedia trāſeunteſ, facile peculiaris natuæq; conſtitutioni reſtituemuſ. Neq; enim iſ aſſentimur, qui proriuſ auxilia, in huiuſcemodi, fruſtra adhiberi cōtendūt. Quæ enim modo morbi, quorum cauſa ceca, latentēſq; corporib; inſidet, medicinā admittūt, & quæ forinſecus incurrūt *Venena* medēdi rationē aſpernātur? Aequē uerò omneſ morbi, pro cauſarū ingruētū magnitudine, proq; antecedētib; adſectionib; qualitatib;q; quib; ſit opportunū corpus, uel medicabileſ ſunt uel nō.



uel nullis cedūt medicamētis. Quod si qui forsan obmutescētes, aut temulenti, aut nolentes alioqui Venenum à se egeri, nullam nobis eius cognitionē praebeat, tū protinus accedendū ad ea, quae cōmuniter epotis q̄buscūque Venenis, opitulari cōsueuerūt. Alio qui nullū magis in omnia ualēs auxiliū dari potest, quā, ut proximo loco, Virus foras exhauriatur, priusquā inuale scat. Quare si ne mora, calidū oleū ex aqua, aut seorsum, ut uomitare cogatur, dari conuenit. Aut si oleū natura loci negat, butyrū cū aqua calida, aut Malua, aut Lini semine, aut Trago, Vrtica, Fænogracō, aut Halicæ decocto, uicē eius exhibebit. Hæc enim nō modo nomitionibus exigēt, ui illa sua laxatrice, aut nausēa ciente, sed aliū quoque subducēt & corporū inanitione, ita aduersabūtur, ut acrimonias Venenorū hebetēt. Id quod euidenter huiuscemodi argumēto deprehēdere licet: Esto, ut quisquā uina calce, uel fæce, aut Cātharidibus, aut alio quouis acri, corpus exulcerare statuerit: is si ipsum oleo leniter illinat, exulcerationē non accipiet. Atqui neque uehemēter adstringi corpus, neque refrigerari poterit, si antea perūgatur. Quinetia uomitus, nō ob id modō quod uacuet, & noxiū humore excernat, iuuamētū adfert: sed quod assumptū Virus nonnūquā odore, coagulatis grumis, aut colore, prodāt: Quippe cū odore, & amaritudine, Meconiū: colore, Cerusam, Gypsumue: grumis, lac, aut sanguinē, animalis recēs iugulati, ostēdat. Nā grauis odor regestorū, Leporis marini, aut Rubetæ ueneficia deprehēdit, ita ut nōnulla ab ijs remedia peti possint, ad idonea singulorū auxilia trāseūtibus. Oleo etiā, Maluæ decoctū admiscetur, aut Glauciū, aut adeps anserinus, aut p̄guinū carniū iura, lixiuiū lignorū cinere factū. Vbi uero uomitus diligētē citatus fuerit, ne quid in uētre coierit, quæ hæserūt intestinis reliquiæ, chystere acri deuocētur. Facit & Nitrū tritū, & cū hydromelite sūptū, uina uetera liberalius opota, gallinacea iura p̄p̄gues pisces, uetusta carnes p̄guesq̄, & q̄ adipe aut recēti butyro parant: aliū nāq̄ subducūt, uti diximus. Et stomachū resolētia



proniorem ipsum ad uomitionē reddunt, & Venenorum acrimo-  
 nias hebetant: Atque meatus obstruentia, celerem uirium pe-  
 netrationem inhibent. Quinetiam medicamenta dantur, quae  
 cōmuni dote profunt: ut Lemnia terra, Agaricū, Abrotonum,  
 Irio, radix Eriugy semē Pastinacae & calamintha, Nardū Gal-  
 licum, Castorium, Ferula uirentis medulla, flos Rhododendri,  
 succus Marrubij, Laser aut Laserpitium, Sagapenum, Peuce-  
 dani succus: aut panacis, & radix, quam Magudarim appella-  
 runt, Aristolochia longa, syluestris Ruta semen, & Betonica,  
 quam Cestron nominant, folia. Singula cum uino, drachma pō-  
 do sumi debent. Effectum praebet Polij decoctum, & Seseli, &  
 liquida pix linēta. Magnificē ferunt opem antidota, quae in cal-  
 ce scripta operis reliquimus. Communis ratio praestandi auxilij  
 ita se habet. Ceterum ab ijs, quae consueuerunt euenire, com-  
 munia remedia sumptitari possunt. Ferē enim, uires Venenorum  
 quā plurimorum, in affectus consimiles corpustandem redi-  
 gunt. Quam ob causam plerisque communia conducunt auxi-  
 lia. Varia etenim sunt Venenorum genera: communes tamen,  
 nec multi, ijdem affectus oriuntur. Neque fieri potest, ut omnes  
 concurrentesq; casus, quae symptomata uocant, unum Venenum  
 sequantur, alioquin superuacanea fuisset Venenorum singulo-  
 rum traditio, cum suis remedijs ab authoribus descripta. Neque  
 uerō in uno eodemq; promptum est inuenire, ut quis stomachi  
 alui, intestinorum, iecoris, renum, & uesicae dolore uehemente  
 crucietur, ut singultiat, erodatur, contremiscat, refrigeretur  
 obmute scat, cōuellatur, pulsus elanguescat, spiritus difficilis fia-  
 ueterno prematur, uertigo obuer setur, caligent sensus, strāgul-  
 tur, sitiāt, sanguis erumpat, febre confluetur, agrē lotium red-  
 dat, torminibus uexetur, crebrō uomitet, nausea prematur, ru-  
 bescat, liuore sugilletur, palle scat, desipiat, stertat, uiribus defi-  
 ciat: & pleraq; alia faciat, patiaturq;. Singula enim in genera



les affectus deducta, pauca numero, & communia, ea demonstrat, quæ euenire cōsueuerūt. Quare in singulis quæ suprā diximus, non facile fuerit deuoratum Virus cognoscere. Nam oris & linguae erosio, stomachi uentris, uesicæ ac renum inflammatio uehementis urinae difficultas, & interdum cruoris cum eo exitus lancinatio, & in plurimis partibus quidam adustionis sensus, non in Cantharidibus modo potis reperiuntur, sed in Erucis quoq; Pinorū, & Bupreste, & Salamandra. Porro nō modo eos qui Meconium hauserunt, ueterno aut Jopore premi, stertere, liuore sugillari, torpere, refrigerari, stupefcere, toto corpore pruritus sentire, sensu priuari constat, sed eos etiam qui mādragorā aut Cicutam deuorarunt. Delirium non Hyosciamus tātum insert, uerum etiam quæ Toxica appellantur. Itidē Aconitum, & Mel quod in Heraclea Pontica gignitur. Strangulatio non minus in Fungis, quā in sanguine taurino, lacte, Aconito, Cerusa, gypso conspicitur. In summa, difficile unū uni Veneno proprium inuenire signum, quod haustum gustatumq; Virus prodere possit; maximē, quod hæc ceterorum etiam uitiorum, quæ in corpore exoriuntur, communia sequi solent. Ceterum in his quæ celeriter enecant, noxam signis forsitan indicare possis, si ad ea respexeris quæ sumus dicturi. Sed in ijs qui ad longas ægritudines spectant, nihil ad medendi rationem difficile, duntaxat quod pertineat ad indicia noxæ, ut potē cum Venena, statim, atq; præsentaneam uim illam perdiderunt, transmutata in longos adfectus, communia reliquorū uitiorū remedia, cōpositionesq; flagitent, cū Venefica pprietas nō amplius in sit, si uerò lōga sit affectio, in aliquod diuturnorū morborū genus recidet, a quibus facile fuerit medēdi rationē assumere. Sed de ijs quæ generaliter auxiliantur, hæctenus. Cōsequēter quæ priuatim singulis prosunt, scriptis mandabimus, si prius sigillatim exposuerimus: quæ ex singulis ordinibus exitialem aut maleficam



lesicam uim sortiuntur, ut medicina studiosi ea cautè obseruent, quæ ad rationem salutis scripta inueniuntur, quòd nonnulla eorum quibus utuntur, uenenis sint commista. Incuria enim magnas adfert noxas, & sæpe continuo usu eorum, homo in perniciem agitur. Proinde animalia quæ exitiosam uim habent, hæc sunt: Cantharides, Buprestis, Salamandra, Pinorum Eruca, Lepus marinus, Tubera, & Rana palustris muta, deuorata & Hirudines. Semina sunt: Hyoscyamus, Coriandrum, Cicutæ, Gith, Psyllion. Liquamenta: Meconiū, Opocarpason, Thapsiæ succus, Elaterium, Mādragoras. Radices, quas mittit Chamaleo, Aconitum, Thapsia, Veratrum, Ixia, Agaricum nigrum, Ephemerum, quod aliqui Colchicum uocāt, quod in Colchide nascitur. Herbae oleraq; Smilax, quam aliqui Tithymalum appellant, Romani Taxum, solanum manicum, quod & Dorycnium dicitur: Sardinia herba, quæ Ranunculi genus est: corniculatum Papauer, Pharicum, Toxicū, Ruta syluestris, Fungi. Ab animalibus taurinus sanguis recens, coagulatum lac, mel Heracleæ in Ponto genitum. Metalla, Gypsum, Cerusa, Calx, Auripigmentū, duo Sandaracha genera, spuma Argenti, Adarce, Plumbum, & quod Argentum uiuum dicitur. E liquoribus domesticis: uinū abunde post balneas potū, aut passum, et frigida aqua similiter.

**V**enenum omne aut per os sumitur, aut vi extrinseca noxiam adfert. Quod per os sumitur, omni sua operatione cibo alimentari contrarium est. Nam cibus, in sanguinem cōuertitur: partes suas omnes, membris quæ priuatim nutrit, similes efficit, locum subit essentia, quæ iugiter in nobis resoluitur. Contra venenum: corpus & membra omnia in quæ subintrat: in sibi peculiarem venenatam naturam trasmutat, quous loco sese indiderit, deperditam non supplet essentiam: sed eā quæ restat & integram, resoluit & corrumpit: haud aliter quam ignis, momento, omnem paleæ essentiam in se conuertit & conficit. Siquidem totius corporis coalitio, & consistentia veneno destruuntur. Porro venenū omne trium est generum. Aut enim è plantis, aut ex animalibus, aut ex mineralibus. Vnumquodque eorum ab ea, quam cum cibo habet, differētia



rentia discernitur. Id in plantis videmus, Elleboro, Aconito, Napello, Cicuta, Sardonias herba, Nerio. In animalibus, Viperis, Aspidibus, Basiliscis, Lepore marino, Scorpione, Phalangio, Tarentola: rabidis animalibus: piscibus & carne tostis: & statim in escario vase: præclusa exhalatione: suffocatis: morticinis: à fulgure: aut à venenatis & rabidis animalibus occisis. In mineralibus Argento viuo, Arsenico: Sandaracha: Auripigmento: Magnete: & similibus. Venenatorum animalium morsus: ictus: sibilus: contactus: visus: mortifera. Morsu & transfixu occidunt, Aspides: rabidi canes: Scorpiones: Phalangij: Tarentole: Pastinata marina: & consimilia. Visu & sibilo Basiliscus. Est & quod contactu perimat: vt ex Auicenna scriptis apparet: qui militem dicat: cū lancea strenuè bestiam transfixisset, proserpente per hastile veneno, congelata primum manu, deinde & toto perfricto corpore: mortuum. Id per æquè nostri sæculi experientia claruit in Tridentino ciue. Venena etiam odoratu perimunt. Venenorum & venenatorum variant effectus, pro cali & soli ratione: & quemadmodum sumentes icti aut percussi: in se totis: & in particularibus suis & affectibus & qualitatibus coaluerint: vtq; aut calida: aut frigida: aut sicca: aut humida fuerint. Calida duobus modis conficiunt. Aut enim sumpta per os: excalfaciunt & corrodunt ad ipsum cor: quod ex Euphorbio: & Veratro contingit: aut extrinsecus applicata: exadunt carnē: ad ossa vsque: quod in Lepore marino fit. Frigida duplici itidem ratione necant. Nam aut ex nimia sua frigiditate: Pupidum ad eū modum corpus reddunt, vt cor etiam ab eis congelascat, quæ Opj operatio est: aut anhelitum comprimunt: suffocant: & strāgulant, quod Plumbum vstum, & Fungi malefici conficiunt. Sicca dupliciter mortifera. Aut enim quæ in corde est, humidam sanguinis qualitatem absument: quod calx vna conficit: aut partes corporis ab inuicem segregant & dispartiuntur: ad integrā omnium membrorum separationem, & insectilem diuisionem: ad cor vsque: quod Risagalli proprium est (Id per sublimationem fit: æquis partibus ex Arsenico & Auripigmento) Humida: quāuis persuasum sit temperamentum nullum esse: quarti in humido excessus: eius tamen exemplo: cui (referente Gilberto Anglico) brachio à familiari quopiā (quò plus iusto dormientem excitaret) valentius peruulso: caro in terrā putrefacta cecidit: ossibus: interim: in totū carne nudatis: extremæ humiditatis venenū esse docebimur: qua natura præditus serpens ille nocturnus fuit: qui miserādū illū cōfecit. Dioscoridi, potius Salamādra puluis: idem operatur. Morsus item Ceneri serpentis. Quinetiam Argentum viuum: summa sua humiditate: naturalem non raro cordis humiditatem absument: vt in eis liquidò conspicitur. qui  
huius



huius vnctū vtuntur in morbum Gallicum percurandum. Atenim anti-  
 dota totam hominis consistentiam, in bonam habitudinem alterant, vt  
 venena in prauam & exitiosam. Sed præsumpta magis iuuant, quam si  
 à lue contracta sumantur. Siquidem venena quædam, & occultis suis &  
 manifestis qualitatibus nocent: haud aliter quam illorum quidā, vni  
 membro, alij alteri noxia sunt, & non omnia priua sua operatione no-  
 cent cordi, itidem vt inter medicamenta, alia cor speciatim confortant,  
 vt Crocum & Hyacinthus: alia cerebrum, & caput, vt Smaragdus,  
 Stachas, Betonica: alia stomachum, vt Corallium, Cinnamomum, Gingi-  
 ber, & alia itidem, alia corporis membra. Smaragdus, Hyacinthus, Ga-  
 gates, Sapphirus in tenuissimum puluerem moliti, à morte quidem, qui  
 venena hauserunt, tuentur, quod natura cordi subueniant, sed si gestan-  
 tur tantum, eadem vis non est. Arabes in venena valere scribunt, Casta-  
 neas, Mespila, Pistacia, Alium, Raphanum, Auellanas, optimam Theria-  
 cen. Caterum quæ calidi excessus sunt venena, breui membra omnia in-  
 teriora inflammant, feruentissimam sitim inducunt, flammeos oculos  
 reddūt, maniam perpetuam, & continuum sudorem excitant. Quod si  
 vltra illum caloris excessum, corrodant etiam & putresciant, vt est  
 Arsenicum, Auripigmentum, & Risagallum, punctiones & dolores in-  
 tolerandos, in stomacho & intestinis, cum totius corporis murmure pro-  
 creant. Hæc accidentia sequuntur sæpenumerò vomitus, nauseæ, sudores  
 modo frigidi, modo calidi, & variæ subindè colorum formæ. Quæ frigi-  
 da sunt, profundissimum somnum inducunt, vt vix excitentur: Alias  
 cerebrum ad eum stupefaciunt modum, vt agri sexcentos extraneos mo-  
 tus inducant, nunc toto corpore, nunc oculis, nunc ore, nunc alijs mēbris,  
 vt simpliciter insanire, aut ebrij videantur. Ab his summum toto corpo-  
 re frigus ex oritur, sudoresq; frigidi, faciei color lividus & horrificus, to-  
 tius hominis stupor. E sicis venenis, ingens in lingua siccitas provenit,  
 sitisq; quæ extingui non queat, guttur occupat, fit stipticum corpus,  
 siccitas in omnibus membris, & longissima vigilia excitantur. Humi-  
 da, sequuntur tandem profundissimi somni, corporis fluxus, luxantur  
 iuncturae, laxantur nervi, vt diductis aliquando oculorum musculus &  
 nervus, foras exiliant à seipsis pensiles, nec raro extrema corporis mēbra  
 putrescunt. Quod verò ad viciū & medendi, in genere rationem atti-  
 net, è Dioscoride patet. Antidotum tantum Matthioli, in omnia venena  
 præstantissimum & iuxta nobilissimum in medium producā, tum  
 Quintam essentiam, quæ ex eo componitur, postremò Oleum, miranda  
 in venena, maxime serpentium & animalium, virtutis. Porra Antido-  
 tum

tum



rum sic habet: Reubarbari, Cipèri, Quinquefolij, Tormentillæ, Aristolochiæ rotundæ, Pæoniæ, Reupontici veri, Radicis Valerianæ, Acori (Calamum aromaticum vocant) Inulæ, Costi, Iridis, Chamæleontis albi Singulorum. 3. 3. Galangæ, Imperatoriæ, Dictamni albi, Angelicæ, Millefolij, Filipendulæ, Doronici, Zedoariæ, Zingiberis. Singulorum. 3. 2. Agarrici. 3. 3. Seminis Cedri, Viticis, Iuniperi, Grani fini, Fraxini, Acetosæ, Pastinacæ sylvestris, Napi, Nigellæ, Pæoniæ, Basilici, Irionis, Thlaspi sceniculi, Ammi Singulorum. 3. 2. Baccarum lauri, Hedera, Smilacis asperæ, Iubebarum, Singulorum. 3. 1. 3. Frondium Scordij, Chamædryos, Chamæpytios, Centauræ minoris, Stachadis, Spicæ Celticæ, Calaminthæ, Rutæ, Menthæ, Betonicæ, Verbænæ, Scabiosæ, Cardui Benedicti, Milissæ, Singulorum. 3. 1. 3. Dictamni Candiæ, 3. 3. Maioranæ, Hyperici, Iunci odorati: Marrubij: Rutæ caprariæ: Sabinæ: Pimpinellæ: Singulorum. 3. 2. Ficuum siccorum, Nucis communis: Pistatiorum Singulorum. 3. 3. Myrabalanorum embellicorum: 3. 4. Florum cordialium: Rosarum: Lauandulæ: Saluiæ: Rorismarini. Singulorum. 3. 4. Croci. 3. 3. Casiæ odoratæ (Cinnamomum hodie vocant) 3. 10. Caryophyllorum: Nucis muschatæ: Macis Singulorum. 3. 1. 3. Piperis nigri: Piperis longi: Santalorum omnium: ligni Aloes: Singulorum. 3. 1. 3. Cornu Cerui crudi. 3. 4. Vnicornis. 3. 1. Ossis cordis Ceruini: Scrobis Eboris: Virgæ Cerui, Castorij: Singulorum. 3. 4. Terræ Lemniæ. 3. 3. Opj. 3. 1. 3. Margaritarum Orientalium: fragmentorum Smaragdi, hyacinthi: Coralli rubri. 3. 1. 3. Camphoræ. 3. 2. Mastichis: Thuris: Styracis: Gummi Arabici: resinæ Terebinthinæ: Sagapeni: Opopanacis: Laserpitij. Singulorum. 3. 1. 3. Muschi odorati: Ambre griseæ. Singulorum. 3. 1. Olei Vitrioli. 3. 4. Specierum cordialium temperatarum: Diamargariti: Diamuschi: Diambræ: Electuarij gemmarum: Trochiscorum Camphoræ: Vipera: Scillæ: Singulorum. 3. 2. 3. Succi Acetosæ: Cicerbitæ: Scordij: Echij: Boraginis: Melissæ. Singulorum. lib. 3. Hypocistidis, 3. 2. Theriacæ electæ: Mithridati optimi. Singulorum. 3. 6. Vini veteris odoriferi: lib. 3. Sacchari de Medera: aut selectissimi Mellis. lib. octo & dimidia. Omnibus his perquisitis & delectis vt quæ diligentissimè: artificio fiat electuarium: eo quo Theriaca & Mithridatum componuntur modo. Antidotum hoc, diuina quapiam operatione in venena confert quæ per os sumuntur: in mortiferos animalium morsus: & in pestem mirandè operatur, & præcipuè ad præseruandos sanos. Quod si cui in animo fuerit: vt præsentaneè operetur: sic agat. A sumpta libra vna superioris Antidoti, vna Syrupi corticum Citri: & quinque Aquæ vitis, cum electissimo vino confectæ, & toties

alam



alambicata. vt Quinta essentia speciem inducat, omnia hæc in vas vitreum indantur, capacitatis à rebus iniectis dupla, obturatoq; sedulo ore, summa dexteritate aqua cum electuario tandiu in vase agitetur, donec totum id corpus simul confundatur, ac tum in mensem integrum vas seponetur, agitando tamen binis in ebdomada diebus, vt antea dictum est. Qui fiet vt electuarium persacile fundum petat, & exacto tempore, colorata aqua electuario supereminens inuenietur, vi illius omni in se contracta. Tum aperto vase, in vas aliud limpida aqua paulatim effundetur, cuius os cum cera & membrana accuratè obturabitur. Alioquin diei spacio apertum, omnis in sumum euanesceat. Habet hæc aqua intantum virium, vt quattuor drachmarum pondere cum pari vini quantitate, aut cum stillaticia qualibet aqua, quæ huic negotio conueniat, aut per se sumpta, à demorso aut iccto à summè venenato animali (quæcumque nihil sentiat aut loquatur) egrum à longo velut somno ingenti spectantium admiratione, suscitabit, ac vomitu ingentem insectorum humorum copiam educet. Siquidem momento in omnes corporis venas permeat, adeo subtilis, efficax, & peruens est. Valet & in alios morbos, quæ prudens medicorum doctrina censebit. Porro Oleo miscendo, istiusmodi temperamentum obseruabitur. Sub ineuntem mensem Maium, summentur Olei communis centum annorum, aut si minus sui sæculi vetustissimi, lib. 3. Hyperici recentis in herba, M. 3. Oleum in vas vitreum indantur, duplè à contento capacitatis, in hanc Hypericum infundetur, paulatim antea contusum, tum opertum vas medium in subtilissimam arenam condidetur, loco aprico & diem totum insolato, ac inibi sinetur ad decem aut duodecim dies, hisq; transactis in Mariæ balneum ad viginti quattuor horas immittetur, quibus transactis oleum ab aqua exprimetur. Hoc facto, sumetur Hyperici, Chamædryos, Calaminthæ, Cardui benedicti, Singulorum Manipulum vnum. Tundantur, infundantur, & immittantur in balneum continuo triduo. extrahantur postea, colentur, & vt dictum est, exprimantur. Sumantur dein florum Hyperici manipuli tres, hi à caulibus probè repurgati, & tusi infundantur in iam dictum oleum, ac in idem balneum triduo continuo reponantur, postea extrahantur exprimantur, vt primum, ad eundemque modum ter aut quater fiet florum repetita infusio, quousque oleum rubidum euadat, vt sanguis. Hoc factum sumatur ex Hyperico quod iam defloruit, sublatisque à cyma granis illis viridibus, quæ Hordei grana similia, grana in se continent, manipuli ex eis tres conferti efficiendi, quæ tuis & vino albo aliquantum suffusis, in oleum prædictum infunduntur, & cum assucto vase insolanda

sep



sepeliuntur in arena diebus octo continuis, & ab his tridui spacio in balneum immittuntur, post colantur, & exprimuntur, vt primum dictum est, tertium vel quartum reiterata simili cum dicto semine infusione, ad integrè imbutum colorem qui sanguineus est obscurus. Ab hoc sumenda, Scordij recentis, Calaminthæ Centaurij minoris, Cardui benedicti, Verbenacæ, Dictamni Candiæ, singulorum medium Manipulum. Tundantur, infundantur, immittantur in balneum per biduum continuum, dein colentur, & exprimantur vt supra. Post sumenda Zedoariæ, radicis Dictamni albi, Gentianæ, Tormentillæ, Aristolochiæ rotundæ, Singulorum. ʒ. ʒ. Scordij recentis Manipulum vnum. Tundantur, infundantur, immittantur in balneum per triduum continuum, colentur, & exprimantur. Infundantur denuò Styracis Calamitæ, Belgoini (Laserpitium Græci vocant) singulorum. ʒ. ʒ. Baccarum Iuniperi. ʒ. 4. Nigellæ. ʒ. 3. Casiæ odoratæ. ʒ. 9. Santali albi. ʒ. 4. Squinanthi, Cyperi, Singulorum. ʒ. 1. ʒ. Tundantur, infundantur, per triduum continuum in balneum immittantur, colentur, exprimantur, quo dictum est modo. Ab his sumantur trecenti scorpiones viui, diebus canicularibus collecti, calido cineri in vase vitreo superponantur, & cum è calore sudarint & contraxerint sese, superinijce omne iam dictum oleum, calidum, precauendū tamen ne nimio calore vas disrumpatur, & confestim obturato vasis ore, in balneum per triduum continuum immittatur, coletur, exprimatur, proyiciantur scorpiones cocti, ac iteratō in oleum infundantur, Rheubarbari selectissimi, Myrrha cōmunis, Aloës hepaticæ, Singulorum. ʒ. 3. Spicæ Nardi. ʒ. 2. Croci. ʒ. 1. Theriacæ electæ, Mithridati perfecti. Singulorum. ʒ. ʒ. Tundantur, infundantur, in balneum immittantur per continuum triduum, demum non colando deinceps, assèruetur ac si esset Balsamum, nimirum mirandi in venena remedij. Antidota Mithridatium, è Stinco, & è Sanguine, ideò non ascripsimus, tum quòd è Galeno pateat, tum quòd quorundam & eorum selectissimorum simplicium penuria, exactè conficiendorum viam præcluserit, doctorumque in medicina hominum diligens industria ad nostri sæculi cautionem, modū, sympathian, & naturalem nexum attemperare poterit. Caterum noscitiandi venenā in genere, precauendi, ferendique auxiliij rationem, satissuperque hæc Dioscoridis præfatio indicat. Proinde ad particularia prodeundum.

Can



## Cantharydes. CAP. I.

## NOMENCLATURA.

Græ. κανθαρίδες. Lat. Cantharides.

Ita. Cantarelle.

**Q**uibus data sunt Cantharides, signa eueniunt grauissima. Ab ore enim ad uesicam usque cuncta erodi sentiuntur. Picem, aut simile quiddam cedria resipiunt. Dextra præcordia inflammantur. Urinam ægrè reddunt, & subinde cum lotio sanguinem emittunt. Strigmenta non secus atque dysentericis, aluo deferuntur. Fastidia urgent, animo linquntur, abortaq; uertigine concidunt. Postremo mente abalienantur. Ergo antea quam tale nonnihil accidat, dato oleo, aut supradictorum aliquo, uomere cogantur. Mox ubi uomitione plurima reiecerunt, Halicæ aut Orizæ, Tragi aut Ptisanæ cremor, ad decoctum Maluæ, aut seminis Lini, aut Fœnigræci, aut radicem Althææ, quæ Latinus sermo Ibiscum appellat, clystere infundatur. Præterea Nitru eisdem dandum, ex hydromelite, ut quæ stomacho adhuc aut intestinis adherent, eluendo excernantur, ac descendant. Quæ nisi sic discutiantur, ingesta in aluum ex Nitro aqua mulsa, uacuari debent. Detur deinde uinum aut passum, in quo pineoli nucleï, aut Cucumeris semina contrita sint, aut ex lacte, aut mulsa, aut anserinus adeps in passo liquefactus. Inflammata aut partes, Hordei farina cum mulsa decocta perungantur. Ab initio admota cataplasmata nocent, quod citatus ab eis calor, illapsum uirus ita remoratur, ut in principes se partis insinuet. Ipsa tamen interiecto tempore, molestissimis inflammationibus opitulatur, utpote quæ dolores & permulceant & leniant. Tum ubi corpus calfaciente oleo inunctum fuerit, in solum descendere oportet, ac lauare, ut per cutem summam, quæ corpori noxia inhæserunt, etiam excernantur, & deiectiones multifariâ moliri oportet.



tet, ne affectus infigatur, & stabilitatem capeſſat. Gallinaceis carnibus & hœdinis, aut ſuillis catulis maxime pinguibus & tenerrimis, ac cum Lini ſemine coctis uſci debent: ſiquidem aluum cient, atque uenenorum acrimonias hebetant. Vnum dulce liberalius ebibatur. Prodeſt Thuris cortex, & Samia terra, quæ Aſter appellatur, ſi quaternæ ſingulorum drachmæ cum paſſo ſumantur. Item Pulegium ex aqua tritum. Irinum aut roſaceum, cum Rutæ decocto. Recentes uitis ramuli, cum paſſo detriti. Longè omnium potentiſſimè antidota auxiliantur, cum aqua muſſa, drachmis quatuor pota.

## Pinorum Erucæ. CAP. II.

### NOMENCLATURA.

Græ. *πιττονκμα*. La. Pinorum Erucæ.

Ita. Brucho de pino.

**I**s qui Erucas pinorum hauſerunt, illico dolor in ore & palato exoritur. Vehemens alui linguæ ac ſtomachi inflammatio torquet. Inteſtina dolor excruciat, ita ut pruriginem ſentire uideantur. Corpus totum exaſtuat, ſaſtidium urget. Quibus eſt ſuccurendum remedijs, quæ deuoratis Cantharidibus dantur. Peculiariter tamen pro ſimplici oleo & Irino, Melinum, quod è Cotoneis pomis & oleo temperatur, accipiemus.

## Bupreſtis. CAP. III.

### NOMENCLATURA.

Græ. *Βούπρεσις*. Lat. Bupreſtis.

Ita. Bupreſto.

**Q**ui Bupreſtin biberunt, non diſſimile Nitro uirus ſapiunt. Stomachi uentrisque uehemens dolor inſequitur. Tam uenter quàm ſtomachus mirum in modum, ut in aqua inter cutem, diſſlatus inturgeſcit. Vniuerſa corporis facies contunditur, urina ſupprimitur. Quibus eadem quæ potis Cantharidibus au



bus auxiliatur. Priuatim post uomitus & uacuationes, quas clysteribus molimur, arida ficus profunt. Item earum decoctum, ex uino. Vbi uero iam ferè pericula inclinatur, Thebaicarum palmularum cibo, aut earundem tritarum, in mulso, aut lactis potu, iuuatur. Pyrorum etiam omne genus esse, & lac humanum bibere conuenit.

**C**antharides, quod excalfacientium quarti, & desiccantium secundum sunt ordinis, venenata, exulceratrices, & erodentis sunt nature. In speciem urina nocent, & urinarum meatibus. Nec tantum cum per os sumuntur, sed etiam extrinsecus, partibus vesicae propinquis in vesicariis (sic nominant) ut in scyatica, applicata. Et quod ad primum accidentium attinet, quo perpetuam ab ore ad vesicam erosionem pariant, id eo fit, quod exulceratrices sint & venenata, qua vi malignante, exulcerant, pustulas inducunt, quacunque permeant, erosionem suscitant, qua sanguinem erosio uenis urina reddit, & subinde abscessus in uirga testiculis, imo ventre, vesicae collo, subnascuntur, ac ex eo urina difficulter, nec nisi guttatim redditur, tormento & dolore non tolerando. Cedria odor, ex adustis, in stomacho & iocinore nimia caliditate, humoribus, prouenit. quorum confusio saporem primum, dein gustum & odoratum inficit. Dextra praecordiorum partis inflammatio, inde oritur quod in iecur, non in lienem operentur. Dysenterici affectus oboriuntur, quod in stomacho in intestina prolabentes, quacunque permeant, exulcerant, & erodunt. Fastidia & animi deliquia pariunt. Dolor, ardor, intoleranda inflammatio, qua facultate in eis venenata prodeunt, resoluti fiunt, & infecto vitali spiritu, & proinde uicordis dilapsa. Vertigo & mentis abalienatio, ex venenatorum humorum abundantia, quorum fumus dissolutis inferioribus, membris, cerebrum inscendit, eoque pacto sensus intellectum, & rationem inficiunt. Iam est praefatione didicimus elicendum (venenatorum in genus remedio) uomitum, & acri clystere deiectionem moliendum, quae uenenum est corpore elicitum, expeditiorem accidentium medicandi vim proferat. Porro exterioribus membris & maxime vesicae, exulceratis, inflammatis, & erosis, profunt frigida, viscosa & unctuosa. Frigida inflammationes restingunt, & dolores sedant. Vinctuosa, ueneni acrimoniam obtundunt. Viscosa, quod interaneis agglutinentur, non remediorum tantum uirtutem in locis affectis cohibent, quin & tuentur membra, in quae nondum uis ueneni penetravit. Hoc in negotio lac humanum ex ipsis mammis suclum probatur, butyrum rebitens deglutitum. Mucilagines seminis Psyllij, mali Cotonei, & Maluae Syrupi, Violatus, Nenupharinus, Papaueriuius. Succus, Portulacae, Cucurbitae.



æ, Lactuca, Citrij, Stacles, Papauerini seminis, Melonij, Citrini, Cucurbertini, lactuca extracti cum aqua Violarum, radicis Altheæ, aut Halicacabi. Huius itidem semina numero decem aut duodecim, deuorata, presentaneum remedium asseruntur, tantum si primum in aqua Portulacæ, aut Hordei macerentur. Oleum Amygdalarum dulcium potum dimidia libra pondere. Eo potentius Oleum è Strobilis recentibus: potetissimum, si duobus his permistis, conficiatur. Nam hoc posterius præter innatam crassitiem, speciatim inflammationes, & veneni acrimoniæ reprimat, dolorem omnem acutum sedat. Aquæ radicis Altheæ, florum Maluæ, Cucurbitæ, confectæ in balneo, vi propria vrinæ ardorem infrenant, & interiores inflammationes tollunt. Dysentericis affectibus medicantur iura crassa, senum hyrci & cerui, in clysterem immissa, pari ratione oleum Omphacinum, elotum cum aqua Plantaginis, aut Portulacæ. At enim Cordiales & Theriacales medicina, per os sumpta, fumo cerebrum inscendenti medicantur, siquidem sua vi humorum putrefactionem cohibent, ad eundem modum succi & emplastra frigida, commissuræ capitis, quem coronalem vocant, & fronti applicata. Extrinsecus verò, pecten inungere oportet, testiculos, virgam, si quæ inflammatione vexentur, Nempe Rosaceo & Omphacino Oleis, Violato & Nenupharino, illoque qui è fructibus conficitur, quos Itali, Balsamini, & Caranxi vocant. Prodest etiam cum syringa per virgæ canalem immittere ouorum albugines multum ante rudicula agitata cum supradictis oleis, aut cum eo qui è semine Papaueris exprimitur, aut cum succo Portulacæ, aut Sèperniui, aut lactucæ. Iuvat etiā agrum immittere in balneum decoctionis radicis Altheæ, foliorum Maluæ, florum Violarum, seminis mali Cotonei, Psyllij, Fœnigraci, Hordei, frondium Iusquiami, huicque per tres horas infideat. Ceterum quò penitus malum id eradicetur, lassique mēbris pristinum robur & natiuus vigor subinsinuēt sese, hoc electuario utemur. Strobilorum emūdatorum li. 3. Nucis Indicæ recētis, ʒ. 2. Pistaciorum, ʒ. ʒ. Seminis Melonis, Cucurbitæ, Citrij, Cucumeris, Papaueris, Maluæ. Singulorum, ʒ. 4. corticis Thuris, ʒ. 3. Margaritarum, Coralij, Sātali albi. Singulorum, ʒ. 1. ʒ. Sciciliquiritiæ, ʒ. 2. Baccarum Iumperi, ʒ. 1. Gummi Arabici, ʒ. ʒ. Terra Lēniæ, ʒ. 6. Succu halicacabi, Portulacæ, Singulorum, ʒ. 6. infusionis Violarum, ʒ. 8. Mucilaginis seminis Cotonei, cum aqua Violarum cōfecti, ʒ. 4. Sirupi Violati, Nenupharini, Papauerini. Singulorum, ʒ. 10. Ex his omnibus fiat electuarium artificio diligenti & probato. Eo cum lacte muliebri Asinino, aut Caprino dissoluto, in longum tempus ager utetur, bis quotidie, vncia in singularem usum pondere. Pinorum & Buprestium venena, iisdem quibus Cantharides, remedijs curantur.



## Salamandra. CAP. II II.

## NOMENCLATURA.

Græ. σαλαμάνδρα. Lat. & Ita. Salamandra.

**S**i salamandram hauserunt, lingua inflammatio consequitur. Mens & sermo præpeditur. Tremor cum torpore, aut horrore quodam ac exolutione accedit. Partes nonnullæ corporis liuoribus circumquaque sugillantur: sæpeq; diutius immorantur ueneno, putrescentes defluunt. Quibus præstabimus cuncta, quæ potis Catharidibus. Peculiaria uero remedia, resina Pinus, aut Galbanum ex Melle linctum, & Aiuæ decoctum, in quo nuclei Pinei conterantur: Vrticæ quoque folia, cum Lilijs & oleo decocta. Prosunt etiam oua Testudinis marinæ aut terrestris, cocta: item Ranarum ius, cum quibus Eryngæ radix incocta sit.

**S**alamandra cibo morsu, salina, spuma, mucosum quod ei è toto corpore resudat, conficit. Siquidem & tota emortua familie, quæ panem estarint furuo incoctum, qui lignis ea infectis concaluisse. Aetio Salamandra, præter Dioscoridis signa, candidis maculis totum corpus inspergit, quæ breui rubent, & demum nigra, integrum hominem deglabrant. Quod uero Dioscorides eadem facit Salamandræ (quæ frigidissima & humidissima est) cum Cantharidibus, (quæ calidissima & sicca sunt) medicandi remedia, de generalibus intelligendum: Nempè de eliciendo è stomacho & intestinis, per vomitum, & acrem clysteram, ueneno, d Theriaca, Mithridatio, alijsque antidotis, quæ cor à lue illa tuentur. Quin & generalis methodus in capite primo tradenda fuit, ne eadem traditio, singulatim tradita, fastidium pareret. Auicenna in Salamandram & Opium (nam eiusdem temperamenti sunt) præter supradicta laudat resinam Terebinthinam, Styracem, Cupressi frondes, & Vrticæ semen. Incedunt Salamandræ in Germania, via, per sylvas paludosas publica, superiori parte in Oleserici formam nigra, inferiori rubra, quæ admodum in quibusdam Italiæ lacubus Stinci uisuntur, parui & nigri, ab his admodum diuersi, qui ex Alexandria afferuntur, & lacerati in Arabia cubitum longæ, & in Indiæ monte Nisa, diuersicolores, & ginti quattuor pedum longitudine. Et in Fortunatarum insulis, eam quam Caprariam vocant, ingenti magnitudine & copia uisuntur.

Ephem



## Ephemerum. CAP. V.

## NOMENCLATURA.

Græ. ἐφμερο. La. Ephemerum. Ita. Ephemero.

**S**umpto Ephemero, quod aliqui Colchicon, aut sylvestrem Bulbum appellant, pruritus in toto corpore excitatur, non secus atque ijs qui Vrtica aut Scilla laceffuntur. Interna rosione sentiunt. Stomachus cum ingenti grauitate exæstuat. Caterum inualefcente morbo, cruor strigmentis admistus, per aluum exitur. Quibus, ut ijs qui Salamandram hauserint, uomitione aut clysteribus auxiliari conueniet. Sed antea quàm uenenum inualefcat, dandum est decoctum frondium Quercus, aut glandium, aut Malicorij. Lac bibere prodest, in quo Serpyllum sit decoctum. Item succum Sanguinalis herbe, aut ramorum uitis, aut Rubi, aut medullæ recentis Ferulæ, aut Myrticum uino: Baccæ autem Myrti tusa tritaq; & aqua macerata, ut liquor inde sumatur, opem ferunt. Media Castanearum tunica, similem effectum præbet, si cruda in aliquo supra dictorum succo sumptitetur. Organum quoque cum lixiuo epotum. Eximiè iuuantur asinini lactis aut bubuli calidi potu, etiam si in ore contineant: ita ut quibus copia lactis huius adsit, non aliud desideretur.

**E**phemeræ remedia planè describit Dioscorides. Post vomitus itaque & clysteres, descriptis particularibus utendum, maxime asinino & vaccino lacte, generalibusque quæ iam tradita sunt antidotis.

## Dorycnium. CAP. VI.

## NOMENCLATURA.

Græ. δορύκνιον. Lat. Dorycnium.

Ita. Doricnio.

**D**orycnion, quod aliqui manicon Solanum appellarunt, epotum, lactis saporem in gustu refert: continentes singulis

Ad 3 gulus



gultus ciet, humor linguam uexat, sanguis confertim reijcitur. Mucosa quædam perinde quasi dysentericis, aluo egeruntur. Itaque antequam aliquid ex ijs eueniat, auxilio sunt antedicta, uomitus, clyster, & quæcunque potum uenenum expellere possunt. Priuatim ijs opitulatur aqua mulsa, lac caprillum, aut asininum, dulce uinum, quod tepidum cum Aniso bibatur, Amygdalæ amaræ, gallinacea pectora decocta. quinetiam Conchyliæ omnia tam cruda quàm tosta esse salutare est. Conueniunt & Locusta marinæ, & Gammari, & pota eorundem in scula.

**E**phemeri remedia planè describit Dioscorides. Post vomitus itaque & clysteres, descriptis particularibus utendum, maxime asinino & vaccino lacte, generalibusque quæ iam tradita sunt antidotis.

## Aconitum. C A P. VII.

### NOMENCLATURA.

Græ. ἀκόνιτον. Lat. Aconitum. Ita. Aconito.

**A**conitum statim in lingua inter bibendum, cū astrictione quadam dulcescit, & subinde, potissimum cum exungere conantur, uertigines offendit. Lachrymas ciet. Grauitatem pectori, & præcordijs adfert, simulq; crebri spiritus deflantur. Quare Venenum uomitione abigi, aut clystere per aluum eger opus est. Vimur inter propinandum, Origano, Ruta, Marrubio uel Absinthij decocto, cum uino Absinthite, uel Semperuiuo uel Abrotono, uel Chamelæa, aut Aiuga. Prodest etiam num Opobalsami drachma, cum Melle aut lacte, cum Castorio, Piperis, & Ruta, æquis ponderibus ex uino. Coagulū hœdi, leporis aut hinnuli, cū aceto. Ferri quoque stercus, item uinum in quo aurum, ferrum, argentumue candens restinguatur, potum. Lixiuaq; cum gallina & uino decocta, aut carniū bubularum præpinguium iura, cum uino sumpta. Fertur & Aiuga priuatim ipsis subuenire.

Acon



**A**coniti, Pardaliaches, Licoctonos, & Cinoctonos specie diuersa, idē tamē in genere remediū expostulant. Aetio prater Dioscoridem in signis, Potum Aconitū à dulcore & aspretudine, amaror pariter in lingua sensus oboritur, astringuntur postea maxilla, subsequuntur morsus & erosiones stomachi, hisque si non contestim succurratur, caliginosi fiunt oculi & sanguinei, tremores, inflationesque, hydropicis similes, toto corpore excitantur. Medicandi ratio in Dioscoride perbellē tradita. Prater hanc Petrus Abanus remedium proponit, Terram sigillatam, dragmarum duarum pondere, aquae calidae impotam, dein curandum ut aeger vomat. A vomitu, Theriacum drachmarum duarum pondere bibendum in vino, cui Gentianae radix incoxerit. Atque adeo Aconiti praeipuum esse antidotum, longae Aristolochiae radicem.

## Mel Heracliae. CAP. VIII.

### NOMENCLATURA.

Gr. μέλι τὸ ἐν ἡρακλείᾳ. Lat. Mel Heracliae.

Ita. Mele heracliotico.

**M**EL in Heraclia Ponti ubi Aconitum gigni solet, inuenitur, quod qui edunt, bibuntue, non secus afficiantur, quam qui Aconitum ebiberunt. Iis eadem quae poto Aconito conueniunt. Adiuvantur in primis continuo uini mulsi potu, cui Rutae folia sint adiecta.

**M**EL Heraclia ad nos hodie nō affertur, & eo proinde medicādo curae minimum impendendum, maximēque quod eandem cum Aconito venenatam naturam sortiatur.

## Coriandrum. CAP. IX.

Græ. κόριον. Lat. Coriandrum.

Ita. Coriandro.

**C**oriandrum ob odorem latere non potest. Epotum autem uocem exasperat. Insaniam adfert, à temulentis non abhorrentem. Qui sumpserunt, pudenda dictu blaterant, totiusque corporis odore, uenenum fatentur. Quibus post uomitionem Irino oleo concitatum, uti retulimus, merum & per sese, & ex Absinthio potum, auxiliatur, itē oleum. Nec secus oua in eodē

Αα 4 exina



exinanita, si liquefacta in muria sorbeantur. Et epota muria, & ius salsum ex gallina & ansere. Passum quoque cum lixi-  
uia sumptum.

**A** Rabum sectarij, magno errore, & à Dioscoridis opinione diuerso  
Coriandri semen Saccharo conditum, ad inhibendum vaporum  
in cerebrum insenssum, idq; roborandum, deludi cupidis, miserando de  
lectu obtrudunt. Siquidem nec siccis semini, viridis vires depereunt,  
quod in Papauerino, Tusquiamio, & Cicuta semine videre licet: nec  
itidem preparandi modus cum aceto Coriandri seminis virtutem euer-  
uat. acrimonia quidem aliquantū & malignitatis deponūt, cum suam  
ipsorum immutare naturam nō queant. Prater Dioscoridis præscripta,  
Theriaca cum vino optimo epota prodest, estque huius antidotum, co-  
gnitum & vulgare, Vincetoxicum: Ad raucedinem, gargarizatus pro-  
prijs, & pectori proficua. Ad cerebri lationem, species Diamuschi, Diam-  
bra, aliæque capitalia, cordique conuenientia.

### Psyllium. CAP. X.

#### NOMENCLATURA.

Gr. ψύλλιον. Lat. Psyllium. Ital. Psillio.

**P**syllion epotum, corpori toti frigus & torporem cū exo-  
lutione & mœrore quodam affert, ita ut animum despo-  
deant, Cui omnia quæ ex hausto coriano auxiliantur.

**P**raeter Dioscoridis in psyllio indicia, fit anhelitus compressior, & cor-  
pus in tumescit, ab his tanta cordis anxietas, vt non raro sudori fri-  
gido ægri commoriantur. Eadem quæ in Coriando medicandi ratio.

### Cicuta. CAP. XI.

#### NOMENCLATURA.

Gr. Κικύγιον. Lat. & Ital. Cicuta.

**C**icuta pota uertiginem excitat, oculisq; caliginem offun-  
dit, ita ut ne minimum cernatur. Singultus ciet. Mentem  
turbat. Extremi artus gelantur. Denique conuulsi, suppresso ar-  
teriae spiritu, strangulatur. Quare inter initia, uti in reliquis, Ci-  
cutam uomitu excutiemus. Postmodum deiectionem moliemur  
ut quod



ut quod ad intestina prolapsum sit, excernamus. Tum demum in meracam potionem, quæ maximo est auxilio, deueniemus. Repetendum per interualla: in quibus proderit lac asininum, aut bubulū potui datū, aut Absinthium cum Pipere & uino, castorio, Ruta, Mētha cum uino, aut Amomi, Cardamomi, aut Syracis uncia, aut Piperis cum semine Vrticæ & uino, aut Lauri folia. Item Laser ex oleo & passo, & passum per sese largius potum proficit.

**P**etrus Abanus laudat in Cicutam Theriacam sumptam ad dragmarum duarum pondus, epotamque in Dictamni decoctione, aut in vino, in decoctione paris ponderis Gentianæ.

## TAXUS. CAP. XII.

### NOMENCLATURA.

Gr. Σμίλαξ. Lat. Smilax. Ital. Tasso.

**S**milax, à quibusdam Tithymalum, à Latinis Taxus appellatur: frigus uniuerso corpori, strangulatus, & celerem interitum infert. Cui eadem quæ Cicutæ conueniunt.

**D**ioscorides Taxum cum Cicutâ temperamento conuit, nempe quæ eisdem remedijs curentur. at obstat frondium & corticis Taxi amaritudo, perpetuo virore frondescit, pinorum & abietum in morem ad quæ plurimum accedit. Tum baccarum in gustu is dulcor & acrimonia, ut aues ab eius esu nigrescant, proculdubio ostendit, Taxum calidè esse excessus. Idque conspiciunt qui Taxi fructus ederint, ob spirituum & sanguinis inflammationem, in febres & ventris profluvia decidere. Quod sanè ex putrefactione prodire non potest, quemadmodum his accidit qui æstiuos aut autumnales fructus auidius esitarint. Porro auiū illa in nigrorem transmutatio, adustionem, ut in athiopibus, designat, non frigus: quod proculdubio, nisi mortificatis membris, nigrore nō pareret. Hæc cū Matthiolo, academica disputatio æalijs excutiendū relinquo.

## Carpasi succus. CAP. XIII.

### NOMENCLATURA.

Gr. Ὠπὸς καρπασῶ. Lat. Carpasi succus. Ital.

Succhio del Carpaſo.

Λα 5

Epotus



**E** Potus Carpasi succus soporem, citamq; strangulationem adducit. Adiuuantur autem qui hauserunt, epota Cicuta remedys.

**C**arpasus Galeno, mortiferum venenum, vnde & Opocarpasus, quod de hic agit Dioscorides, vtrūq; tamen nobis incognitum, & eapropter nil remedio opus.

## Sardonía herba. CAP. XIII.

### NOMENCLATURA.

Gr. σαρδόνι & πρῶ. Lat. & Ita. Sardonía herba.

**S**ardonía Ranunculi herbae generi assignatur, quae uescentibus mentem adimit, & quadam neruorum distentione labia in rictum contrahit, ut risus speciem praebeant: à qua quidem affectione, de Sardinio risu adagium, in uulgus infausto omine manauit. Post uomitum peculiariter conuenit, aqua mulsæ & lac, liberalius epota, irrigatio, perunctioq; à pinguibus medicamentis, totum corpus excalescentibus. In calidam aquam, oleumq; descendant. Sed tum multum perfricare & inungere expedit. Et in summa, curam omnem, quae conuulsioni neruorum adhibetur, exequi oportet.

**P**etro Abano Apj risus, seu Sardonie herbae medicande ratio sic initur. Vinum dulce & potens agro, ad ebrietatem, bibendum offertur, quo prolixius dormiat. Porro verum & singulare Sardonie herbae antidotum, Melissa in aceto epota. Quod ad neruorum in rictu (risum appellant) distentionem attinet, balneum recens, lignea in totum materia, paratum prodest, cum simplicium decoctione, quae excalescentium & desiccantium sunt classis, & quae priua facultate neruos & confortent & refocillent. Hæc istiusmodi sunt, Stæchas, Hyssopum, Salvia, Rata, Betonica, Hypericum, Chamæpytis, Mariolana, Origanum, Calamentum, Pulegium, Dictamnium Candiacum, Camomilla, Thymbra, Acorus, Spica Celtica & Syriaca, Asarum, Valeriana, Cyperus, Rosmarinus. Vngenda etiam est posterior pars capitis & nucha (Latinis est occiput) cum Liliorum oleo, è Castoreo, è lumbricis, è Costo, ex Hyperico, Vulpæ: cum vnguento Arragonio, Agrippio, & similibus.

Hy



## Hyoscyamus. CAP. XV.

## NOMENCLATURA.

Græ. υοσκν'αμ. Lat. Hyoscyamus.

Ita. Hiosciammo.

**H**Yoscyamum potum aut comesum, similem ebrijs abaliationem mouet, sed facile medicamentis cedit. Auxiliatur aqua mulsa copiose data, lacq̃, præsertim asininum. Si id consideratur, caprillum, uel bubulum, uel aridarum ficuum decoctum. Faciunt ad id etiam nuclei pinei, aut Cucumis semen ex passo sumptum, & uinum salsum cum adipe suillo recenti, passq̃, itidem Vrticæ semen, aut Nitrum ex aqua, & Intubus erraticus, & Sinapis, & Nasturtium, Radix, Cepa, & Alliu. Et hæc singula cum uino sumantur: postea sinendi quiescere, quemadmodum qui uinum biberunt, ut excoquant.

**P**Rater Dioscoridis signa ex Aetio, ab epoto, manducatoꝝ Hyoscyammo, sequitur membrorum erosio, cordis debilitas, oculorum rubor, pruritus & totius corporis tremor, sese lancinant agri, ac præ dolore pulsatos arbitrantur, siquidem emollescunt iuncturæ, lingua in abscessus transit, spumat os, comprimitur anhelitus, hæc q̃ ab Hyoscyamo albo noxia. A nigro, extrema perfrigescunt, caligant oculi, ratio deperit, occluduntur anhelitus meatus, spasma, & suffocatio. In hunc, post vomitus & clysteres, prodest sæpius meracum bibere, lac Vacce, Thus, Piper, Castoreum, Ruta, Mentha, Belzuinum, Lauri folia & bacce, sapa, Vrticæ semen, Lasrpitij radix, Cardamomum: Styrax, sigillatim præbita cum uino. Prodest & decoctio corticis radice Mori, Balsamum cum lacte epotum, farina tritici uino informata: stomachoq̃ & ventri illita. Recetiores Piper longum bibendum præbent duarum dragmarum pondere, & in peculiare Hyoscyami Antidotum. Pistacia copiose esitanda.

## Mandragora. CAP. XVI.

## NOMENCLATURA.

Græ. μανδ'ραγορας. Lat. &amp; Ita.

Mandragora.

Man



**M**andragora si bibatur, confestim sopor insequitur, exolutio, ac uehemens ueternus, nihil temere distans à lethargo. Cui, antequàm aliquid ex ijs accidat, uomitus & aqua mulsa proderit. Postea Nitrum & Absinthium, ex uino dulci aut passo sumantur. Caput rosaceo & aceto perfundatur. Proficit excitatio, & motus corporis, & olfactus Eupatorij, & Piperis, Sinapis, Castorij, & Ruta, tritorum in aceto: & liquida picis, & odor è lucernarum exustione & extinctu. Quod si agere y reuocentur, sternutamenta mouere, alijsq; communibus auxilijs uti conueniet.

**M**andragora vix fallere edentem aut bibentem potest, siquidem hæc coarguitur odore grani supramodum & ingrato, gustu amaro & abhorrenti. Ad hæc intolerandè vexat, vt quæ non nisi temporis diuturnitate conficiat. In eam laudatur semen Coriandri aut Pulegij tritum, & in aqua epotum, laxare ve corpus cum medicinis conuenientibus. Quod si à vomitu ager non excitetur, offerendum in potu Origanum, cum aqua frigida. Acres clysteres, fricationes per totum corpus cū pannis grossis, cucurbitula occipiti, humeris, & natibus imposita, ligaturæ dolo rose in digitis manuum & pedum, puluis Veratri albi pro apophlegmatismo naribus inditus, emplastra pustulatrix, occipiti & auribus applicata. Diuertunt nempe hæc omnia quæ cerebro nocent. Mandragoræ poma, matura, & sine semine, innocuè eduntur: immatura, & cum semine, mortifera. Ardor intolerandus omnem corporis superficiem adurit, os, & linguam siccitas ingens obtinet: & ob id aperto ore, agri desidēt, frigidum interim aerem attrahentes, & nisi eis ilico succurratur, conuulsi pereunt. Eo mali valentissimum remedium Andromachi Theriaca, cum aqua epota, siquidem momento ab omni molestia liberat. Petrus Abanus, in radicem, poma, & succum Mandragoræ laudat, si ager integrum diem sine cibo persistat, ac subindè bibat selectissimum vinum, odor et quæ acetum cum Castoreo. Ceterum horum verum antidotum esse, Rhaphanum domesticum (priuatim Radix vocatur) per triduum cum pane & sale manducatum. Sed ad id quod præscribit Dioscorides caput rosaceo & aceto perungendum, id nō innoxie agetur Castoreo aut quouis alio calido medicamento nō addito, maxime cum Galenus qui istiusmodi in Lethargo infusionem tolerat, ita censet, modo si cum humore frigido, aliquanta pars humoris biliosi tenuis reperiatur.

Meco



## Meconium. CAP. XVII.

## NOMENCLATURA.

Gr. *μικόνιον*. Lat. *Meconium*. Ita. *Meconio*.

**E** Poto Papaueris succo, quem *Meconion* uocant, consequitur ueternus cum perfrictione & pruritu uehementi: ita ut sæpe inualecente ueneno, tanta erumpat prurigo, ut hominē excitet. Corpus id medicamentum olet. Post citatam oleo uomitionem, acres clysteres auxiliantur, acetumq; mulsum cum sale potum, aut Mel cum Rosaceo calido, merum cum Absinthio aut Cinnamomo copiosum, aut calidum per sese acetum, Nitrum ex aqua, & Origanum cum lixiuia aut passo, & Rutæ syluestris semen cum Pipere, uino, & Panace: Piperq; cum Castorio & aceto mulso, uel cum Satureiæ aut Origani decocto cum uino. Hi olfactilibus excitandi. Ob enatam pruriginem in balneas descendant, & foueantur. Post lanacrum prodest iurium pinguius usus, cum uino aut passo. Medulla etiam ex oleo pota.

## Corniculatum Papauer.

## CAP. XVIII.

## NOMENCLATURA.

Græ. *μικῶν κεράτῃς*. Lat. *Corniculatum Papauer*.

Ita. *Papauere cornuto*.

**Q**uod corniculatum Papauer appellant, & potu & cibo eadem inferre consuevit, quæ Papaueris succus: nec alijs expugnatur auxilijs.

**O**dor ingratus Opium, peræquè ut Mandragoram prodit, ideoq; rarum ex eo solo ueneficium conficitur, ne maleficium pateat. Notæ præter eas quas ascribit Dioscorides, pallet facies, & tumescit, rubent labra, diducuntur inferiores maxilla, perpetuus singultus redditur, intorquetur nasus, pondus in lingua sentitur, liuent labra, præcordia contrahuntur, frigus oboritur, comprimitur anhelitus, visus impeditur, cōuol-

uunt. &



nuntur oculi, ad extremum conuulsio mortifera subsequitur. In Opium, Auicenna, Castoreum & Belzuinum prodest, Theriaca singulare remedium, Mithridatium cum vino: errhinorum vsus frequens: excitandi etiam agri barba & capillis pertractis: percellendiq: Musci: Castorei: Belzui: & Ambra odoratu: totumque eorum corpus inungendum cum oleo Lilino: Costino. Præterea Quinta essentia Theriacalis Matthioli præscripta: huic negotio summè & Aesculapî proficit.

## Pharicum. CAP. XIX.

### NOMENCLATURA.

Græ. φάρικον. Lat. Pharicum.

Ita. Pharico.

**Q**uod Pharicon uocant, sapore syluestre Nardum imitatur. Resolutionem neruorum potum affert, cum conuulsione & delirio. Oportet autem post uacuationes uinum Absinthiten potui dare, cum Cinnamomo, aut Myrrha, aut Nardo Gallico, quod Serinen aliqui uocauerunt: aut spicæ Nardi duas drachmas, & Myrrhæ totidem obolos, cum passo, aut Irim cum Croco ex uino, de rasumq; caput illinire hordeacea farina cum aceto, & trita Ruta.

**I**ncertum: sit ne planta Pharicum: an venenum diuersis è rebus compositum. Quidam id nominis à pharico scelestissimo venefico deriuant, alij ab Arcadia & Laconia pharide, alij à phara Thessalia. Verum consilium non est in re incerta diutius immorari.

## Toxicum. CAP. XX.

### NOMENCLATURA.

Gr. τῶξικον. Lat. Toxicum. Ita. Tosico.

**T**oxicum ex eo nominari uidetur, quod barbarorum sagitta eo illinebantur. Qui biberint, labiorum & linguae inflammatione torquentur. Incoercitus furor uarias ipsius imagines obuersat. Quare uix medicine locus est: raroq; qui hauserunt, euadent. Vinculis ergo cohibendi, ut uinum dulce cum Rosaceo bibe



bibere, & reuomere cogantur. Rapi semen bibendum cum uino. Priuatim ijs conuenit, Quinquesolij radix, & hircinus sanguis, aut caprillus, eodem modo sumptus. Roboris, Fagi, aut Illicis cortex cum lacte tritus. Malaq; trita esse, aut cum Pulegio et aqua bibere, conueniet. Amomum & Balsami semen ex uino. Sed qui periculis defuncti sunt, diu lecticis decumbunt, & ubi surrexere, stupidi reliquum tempus degunt.

**T**oxicum à Taxo aliqui deductum putant, litterarum à, in, o, metathesi, quasi Taxicum primigenia origine, post Toxicum dictum sit. Sed cum antiquorum Græcorum aut Latinorum nullus author id priuatim proferat: nihil causæ est: cur hinc opinioni assentiamur potius: quam refragemur. Enimuero multa sunt quæ eorum sententiam infirmant: qui Dioscoridis Toxicum cum Arabum Napello idem esse contendunt. Sed licet per Auicennam Napellum veneno sagittas inficiat: linguam & labra inflammatione discruciet: huicq; medicando Rapi semen cum uino: succiq; radices Roboris: Fagi: Illicisque conueniant: sunt tamen alia indicia: & notæ: quæ Toxicum à Napello vehementer discriminēt. Nam id experientia compertum: in his qui Napellum sumpserint: non incoercitas cū varijs imaginibus inesse furias: quæ Toxici propria sunt. Ad hæc Napellum: Auicenna: oculos à proprijs sedibus abstrahit: precipitem virium lapsum: vertiginem: & pedum imbecillitatē inducit: quorum symptomatum nullum in Dioscoridis Toxico reperitur. Deinde Auicenna: qui ex Napello reualefcunt: in heclicam: phthisim: aut epilepsiam desinere præscribit: Dioscorides stupidos reliquū vitæ tēpus degere. Differūt etiā Toxicū & Napellū in medicādī rōne. Nam Toxicū: Dioscoridi: curatur epoto cū uino dulci Rosaceo: Quinquesolij radice: hyrcino & caprino sanguine: malo Cotoneo: Amomo: & Carpobalsamo: At Auicenna Napello medicatur cū uino: butyro: muscho: Capparis radice: & cum eo Mure: qui ex ipsius Napelli radice vescitur. Hæc propalā euincūt diuersa esse Napellū & Toxicū: summaria hæc etiā præter supradicta ratione quod in venenorum remedijs Auicenna: Dioscoridē penē ad verbū reddiderit. Et eò fit vt ille Toxicū Dioscoridis: nō in Napello: sed in eo qđ Tusam nominat expresserit: nepe in quo & notas et medicādī rōnem: nihilū ab eis qđ de Toxico tradit Dioscorides: dissidētes: in mediū pducatur. In Toxicum: Napellum: quouisque aliud venenum modo erodens non sit: in ictus: & animalium quantūuis venenatorum morsus summē efficax est Oleum de scorpionibus Matthioli in præfationis annotatione descriptū:  
si eo



si eo in acutissimis venenis horis singulis, & in minus acutis, semel ternis horis, non in regione tantum cordis, subtus sinistram mammillam vngatur aeger, sed in temporum etiam, manuum & pedum pulsibus.

Ixia.

CAP. XXI.

NOMENCLATURA.

Gr. Ἰξίς. Lat. Ixia. Ita. Iξia.

**I**Xia, quæ Vlophonon appellatur, inter potandū aliquid ocimo simile gustu & odore redolet. Vehementem linguæ inflammationem excitat, mentem mouet, omnes excrementorum exitus supprimit. Strepitum cum animi deliquio ciet. Iis intestina latrant, nec egeritur quicquam. Post uomitionem aluumq; resolutam, auxilium præstat aqua, in qua Absinthium maduerit, ex uino largiore, aut aceto mulso pota. Rutæq; syluestris semen, aut Laseris radix. Item Tragorigani decoctum, cum aliqua supradictorum, aut lacte, aut resina Terebinthina, aut Nardo, aut Castorio, aut Laserpitio, quorum singuli oboli conueniunt. Quin & nuces inglandes ex uino, cum resina, Castorio, & Ruta trita, ita ut singula drachmæ pondus æquent. Itidem Chamelææ aut Thapsia aut Absinthij succi sicilicus cum aqua mulsa, & acetum calidum potum.

**I**Xia, viscosus est humor, qui mortifer & perniciosus, in Chamaleonis nigri radice adglutinator reperitur. Huius remedia, præter ea quæ a Dioscoride describuntur, Theriaca vel Mithridatij potio cum Thuris aut Santonici decoctione, cataplasmata cordialia, cordi regionis applicanda, Conseruæ Borraginis & Buglosi, cum margaritis, corallis, gemmarum fragmentis, speciebus cordialibus & muscho confecta, primisq; diebus epithema commissuræ capitis imponendum, è Linteo, quod Rosacea & aceto simul agitalis, immaduerit.

Cerusa.

CAP. XXII.

NOMENCLATURA.

Græ. Ἰπυίδιον. Lat. &amp; Ita. Cerusa.

Cerusa



**C**Erusa suo colore proditur. Sumpta enim, mox palatum, gingiuæ, lingua, & cōmissuræ dentium, candore quodā inficiuntur. Singultus, tuſſim, ac linguæ ariditatem excitat. Ijs extrema frigeſcunt, mens labat, mēbra torpeſcunt. Quibus dāre conuenit aquam muſſam, aut ficuum, aut Maluæ decoctum, aut lac calidum, aut Sesamam ex uino tritam, uel lixiuiam ex ſarmentis factam. Amaracinum oleum aut Irinum. Perſicorū oſſa cum Hordei decocto. Columbina oua cum Thure, aut Hordei decocto, aut Prunis, aut gummi quod Plinius plorauit, aut humor quem Plinea folia reddiderunt, cum tepida aqua. Sed tum quoque uomant. Conuenit etiam Thapſiæ ſuccus, aut Scammonia, cum aqua muſſa potus.

**C**Erusa præter Dioſcoridis ſigna, ſubitum virium lapſum inducit, lingua aſpretudinem, ſtomachi & corporis morſus, inflationem laterum, anhelitus compreſſionem, ſtrangulationem, totius corporis alidinem, vrinam modo nigram, modo ſanguineam. In id veneni prodeſt Scammonea cum Hydromele pota, vrinam prouocantia, ægrū a ſomno arcere, vomitum elicere cum aqua Melli incocta, cumq; Narcifſino & Lilino oleis. alijs magis probatur, vomitus cum atriplicis & Raporum decoctione elicitus, clyſteres è iure Braſſicæ & oleo, ſine ſale cōfecti. In vi no bibenda offerre, Mithridatium & Theriacam. Prodeſt & vini albi meraci liberalior potio.

## Fungi. CAP. XXIII.

### NOMENCLATURA.

Græ. ΜΥΚΗΤΕΣ. Lat. Fungi. Ital. Fonghi.

**F**ungorum alij genere, alij copia lædunt. Omnes tamā ſtrangulatus ſuſpendio ſimiles concitant. Quibus conſeſtim ſuccurrendum. Communiter ex oleo uomere cogēdi. Mirificè iuuat lixiuia ex ſarmentis aut Pyraſtri ſurculis, epota cum ſale, poſca & Nitro. Fructus, aut folia Pyraſtri cū Fungis decocta, ſtrangulantem illam uim auferunt, eſitataq; eiſdem auxiliantur. Aduerſus Fungos gallinacea oua cum poſca proficiunt, ad-

Bb

iecta



iecta Aristolochia drachma. Item Absinthium cum uino mel-  
leg<sup>3</sup> sumptum, & ex aqua potum. Apiastrum ex Nitro. Pana-  
cis radix & semē in uino. Fæx uini cremata cum aqua. Atra-  
mentum sutorium ex aceto. Radix, uel sinapis, aut nasturtium  
esu profunt.

**F**ungi qui naturā sunt malefici, & venenati, intestina exulcerant,  
singultus excitant, & morsus, totū corporis colorem in luteū permu-  
tant, urinam cohibent. Ab his sequitur, frigus, tremor, pulsus deperdi-  
tus, perfrigidus sudor, & postremum mors. Huic incommodo presenta-  
neo est remedio vomitus, e potu succi Raphani, foliorum Ruta tritorū,  
Origan: & Mellis. Vt deinde oportet Theriaca & Mithridatio cum for-  
tissimo aceto, Oximelle Scillino, aut aqua vitis. Mirē etiamnum prode-  
rit. Quinta essentia Theriacalis supra descripta. Vini optimi cui inco-  
xerit Piper latior potio: & ab ea Allium crudum manducare.

## Gypsum. CAP. XXIIII.

### NOMENCLATURA.

Græ. γύψος. Lat. Gypsum. Ital. Gesso.

**L**apidescens Gypsum strangulationem creat: quare eadē  
proferenda sunt, quæ mansis fungis, auxilia. Ad hæc Mal-  
uæ decoctum, quod etiam olei uicē pensat. Vt potē cum pingue  
sit, euomendoq<sup>3</sup> lubricas vias & faciles reddit, deradi corpora  
non sinit. Quod, ubi duratur in lapidem, Gypsum efficit. Quin-  
etiam prodest oleum ex aqua mulsa, aut ficorum decocto. Lixi-  
uia ē ficulneo cinere, aut sarmentis facta, cum uino copiosiore  
pota. Origanum aut Thymum cum lixiuia, aut aceto, aut passo.  
Hiq<sup>3</sup> decocto Maluæ proluendi.

**A**Eger a sumpto Gypso, aqua calida cum butyro potandus, dein ad  
vomitum prouocandus, denuo aqua calida cū melle offerenda, ac  
iterum eliciendus vomitus, hoc peracto Mithridatij drachmas duas cum  
optimo uino ebibat. Ducenda aluus cystere, ex anatis adipe & oleo. Cor-  
pus oleo Ricini inungendum, peculiareq<sup>3</sup> huius antidotum, muriū ster-  
cus in puluere epotum, cum uino, drachmæ pondere. Auicenna purga-  
tionem ē Scammonia laudat, cum alijs solutiuīs conuenientibus.

Sang



## Sanguis taurinus. CAP. XXV.

## NOMENCLATURA.

Græce. Αἷμα ταύρου.

Lat. Sanguis taurinus. Ital. Sangue del Toro.

**T**auri recens iugulati sanguis, epotus, spirandi difficultatē strangulatumq; concitat. Fauciū tonsillarūq; meatus cū nervorū distentione præcludit. Lingua rubescit. Dentes inficiuntur. Quædā concreti sanguinis uestigia, inter eorū cōmissuras restant. Quare uomitū vitabimus. Sanguinis enim globi attractu illo in sublime relati, magis gula inculcātur. Dari ergo opus est quæ concretū sanguinē discutiunt. aluū & subducunt. Grossi laeteo succo turgentes ex posca, & Nitrum per sese, auxiliantur. Nec secus coagulum omne cum aceto & Laserpity radice, aut Lasere. Itidem & Brassicæ semen, & cinere ficulneo lixiuia. Conyzæ folia cum Pipere, & Rubi succus ex aceto. Aluus resoluenda. Ijs qui seruantur, stercorosa & fluida per sedem egeri cōsueuerunt. Stomachum aluumq; hordeacea farina ex aqua mulsa perungere oportet.

**T**aurinus sanguis nisi recens & ante coagulationem bibatur, non supramodū est nocuus, nec nisi à desperatis bibetur, siquidē crassioris essentia, quam vt nō perceptus hauriri vel offerri possit. Remedia ex authore patent.

## Lac coagulatum. CAP. XXVI.

## NOMENCLATURA.

Græ. Εμπυτιασθεν γάλα. Lat. Coagulatum Lac.

Ital. Latte meschiato col caglio.

**E**os qui Coagulatum Lac hauserunt, frequens illico strangulatio inuadit, quòd in globulos quosdā Lac coalescat. Quibus inuandis pro antidototo, coagulum ex aceto damus, & bibere sæpius cogimus. Damus & Calaminthæ folia arida, item succum, aut Laserpity radice, aut Laser cū posca, Πλῆμῆν ex ui-

Bb 2 no,



no, & cum luto suo lixiuiam. Sed nulla salsilago obijciatur, quoniam magis lac coiret, & in caseum densaretur. Neque illos uomere conuenit: siquidem concretum lac sese in gula angustias insinuans, strangulat.

**I**N coagulato lacte, Dioscorides, id solummodo Lac intelligit, quod cū ipso bibitur coagulo, tantisper dum temperetur: & antequam planè coalescat, porro quod iam coagulatum editur, separatur confestim: nec deinceps cunnitur. Quod verò imperfectè coaluit, cum aliquantum in stomacho moram duxerit, indidem coagulatur, tum ea ratione impedita & inuersa cōcoctione hominē suffocat & strangulat, nō secus ac Tauri sanguis. Siquidē hic, non coagulatus, nullam noxiā parit nempè ē se non venenatus, sed ex coalitione, quam in stomacho efficit: haud aliter operatur Lac coagulascens, cum, aut sine coagulo ebibitū, aut alia quauis ratione sese conspissans. Quod non raro accidit, vbi Lac grossæ substantiæ, stomachum & iecur offendit naturæ supramodum calide & sicca. Nam membrorum illorum caliditas & siccitas, breui consumpta omni illa humiditate, quam in Lacte repererit, quod crassæ est substantiæ condensat & inspissat. Id etiam à membrorum illorum nimia frigiditate procreatur, nimirum compresso quod tenuium est partiū, quod restat crassioris essentiæ congelascit, haud secus quàm de glacie & niue tradit Aristoteles, Ea de re sapiens est Galeni cōsiliū, Lac nō epotandū non immisso prius sale aut Melle, quo non in stomacho cōgelascit. Nec frustra Dioscorides præcipit, vt à Lacte nec sal, nec salsa edantur. Nam quemadmodum coagulo Lac primum coagmentatur, ita in iam coagulatum Lac immissum: diuersam rationem inibit. Eo pacto sal ante coagulationem inditum: coalitionem impedit, & ab hac iam confecta induritiem Lac conuertit. Quod in caseo recente videmus: cum salitur. Ceterum coagulascenti Lacti epoto medetur ipsamet coagula incisoria: acetum purum: & lixiuium.

## Argenti spuma. CAP. XXVII.

### NOMENCLATURA.

Græ. Λιδαργυρε.

Lat. Argenti spuma. Ita. Spiuma de l' Argento.

**S**puma Argenti pota, stomacho, uētri, & interaneis graui  
statē cū magnis torminibus adfert, & nōnūquā pōdere suo  
intesi



testina uulnerat, urinam supprimit. Corpus intumet, plumbeam  
q̄ deformitatem concipit. Quibus subuenit, secundum uomitio-  
nem, potum syluestris Hormini semen, Myrrha drachma octo,  
Absinthium, Hyssopum, Apij semen, aut Piper, aut Ligustri  
flos ex uino, aridum palumbis fimum, cum Nardo & uino.

## Argentum uiuum. CAP. XXVIII.

### NOMENCLATURA.

Gr. υδραργυρος. Lat. Argentum uiuum.

Ital. Argento uiuo.

**A**rgentum uiuū potum eadē quæ spuma Argenti infert,  
eisdemq̄ utendum auxilijs. Lac copiosè potum auxiliar  
constat. Sed postea euomant, qui auferunt.

**A**rgenti spuma, prater supra descriptas, notæ sunt: Ardor, iunctu-  
rarū incēdiū, vrinae detētio, corporis cōpressio et oppilatio, corporis  
ex accideṛi solutio coli exitus, suffocatio, stragulatio & mors. Porro Mir-  
rrha drachmarū octo in Dioscoride præscriptū, cū Auicēna & Aetio nō cō-  
uenit, quorū hic drachmas tres, ille tres obolos non excedit. A vomitu,  
offerend: ysteres, cū hydromelite, & Gallina aut anatis adipe. Prodest  
etiam oleum amygdalarum dulcium epotum, ficus recentes in cibo sum-  
pti, stomachum cum succo Apij, & ventrem cum butyro perungere, pro-  
priumq; huius mali antidotum Cherua semen, quæ Ricinus est, potum  
drachmarum duarum pādere. Porro Argentum uiuum, excessu summè  
frigido & humido, cordis naturalē humiditatē putrefacit, eoq; sangui-  
nem vitales species, ipsamq; cordis essentiā congelat. Enimuerō id in Ar-  
gento uiuo animaduertendum, Sit ne Purum: Extinctum cum salina,  
aut quouis alio liquore: Cum aqua forti, & sine: Sublimatum cū Arse-  
nico, vt moris est, vel sine Arsenico. Nam vnum alio perniciosius, singu-  
lare quodlibet remedium expostulant. Lethalius, Sublimatum, ab hoc  
Præcipitatū, tertium locum obtinet salina, aut alio liquore extinctum  
omni in pestifero excessu innocentius simplex, & purum uiuum Argen-  
tum est. Nam cum substantia sit fluidum & graue, non difficulter à  
corpore per clysteres eruitur: quod in alijs venenis non accidit, qui ero-  
dendi & dilacerandi virtute præditi sunt. Argentum uiuum Extin-  
ctum, & Præcipitatum, eadem quæ argenti spuma accidentia pariunt,  
cum intolerando anhelitus fœtore, quemadmodum eo perunctis in mor-  
bo Gallico contingit, siquidem frigiditatis excessu stomachum & vicina



membra putrescit. A Sublimato lingua & fauces extrema aspretudine torquentur, & quæ ac ab immaturi sorbi esu. Id mali lenitur auferturq; absterforiorum gargarizatu. Quod si non ex prompto remedio, aut incuria, in stomachum descenderit, inibi agglutinans sese exulcerabit, erodetq; cum inextinguibili siti, & interoleranda angustia. Assequetur lingue tumor, virium lapsus, vrinae retentio, compressio anhelitus magniq; in stomacho & visceribus dolores, tam vehementi erosione vt quandoque per intestina viam sibi ad exitum conficiat. Curatur vt Ar genti spuma. Nam nisi magna quantitate non conficit, per inferiora profiliens (adeo fluidum & graue est) antequam longam in stomacho moram duxerit.

**Calx, Sandaracha, Auripigmentum.**

**C A P. XXIX.**

**NOMENCLATURA.**

Gr. Τίταν & σάνδαρχη, αργενίκου. Lat. Calx, Sandaracha, Auripigmentum. Ita. Calcina, Sandaraca, Orpimento.

**C**alx, Sandaracha, & Auripigmentum, pota aluum & intestina cum uehementi erosione excruciant. Præbenda cuncta, quæ suo admistu, illorum acrimoniam hebetant, ac soluiunt, & facilem lubricamq; aluum reddunt, cuiusmodi Ibisci & Maluæ succus est. Natura enim utrinque perlubrica. Datum decoctum seminis Lini, uel semen Tragi herbae, uel Orizæ lacq; cum aqua mulsa copiosum, iura pingua, & boni succi.

**P**ater Dioscoridis notas, à Calce, Sandaracha, & Auripigmento sumptis, sitis ingens prouenit, aspretudo in gutture, tussis, anhelitus & vrina retinentur, fluxus oboriuntur dysenterici sanguinei. Huius malo vinctuosa medicantur & lenientia, è præscripto in Cantharidibus annotato.

**Lepus marinus. C A P. XXX.**

**NOMENCLATURA.**

Græ. Λαγω & θαλαΐτι. Lat. Lepus marinus. Ital. Lepre marina.

Q 22



**Q**ui Lepore marinū biberūt, pisciū uirus olent: proceden-  
te tempore, alius dolore afficitur. Urina sistitur. Et si  
quādo eam reddere contingat, purpureū colorem referet. Omne  
piscis genus aduersantur & odio habent. Fætido ac graui sudo-  
re manant. Biliosus uomitus, interdū sanguini promiscuus, sub-  
sequitur. His dandū lac asininū, uel passum cōtinuē, aut radices  
Maluæ foliorūq; decoctū, aut trita Cyclamini radix cum uino,  
aut Veratri nigri, aut Scammonij succi drachma, cū aqua mulsa  
Puniciq; mali acinis. Cedria contrita cum uino efficax est. An-  
serinus sanguis, ut tepebit, potus. Sed cū pisces omnes respuant,  
aspernenturq; solis fluuiatilibus crancris uesci possunt, bibuntq;  
eos admisto uino, adiutiq; ab his, percoquūt: cumq; appetere &  
comesse pisces cœperint, suæ salutis indicium habent.

**L**epus marinus icterum inducit sumptus totiusq; corporis habitū  
in luteum aut aureum cōmutat, vultum tumore distendit, pedū  
bases incendit, pectus, pulmo, & status obsidentur oculis interim sub-  
rubetibus. Hæc affectatur tussis arida, sputum sanguinis, renum dolor,  
tumor genitalis, salus ab his in phthisim procedere. Priua potentia Le-  
pus marinus pulmōni nocet. In id mali a quibusdā laudatur humanus  
sanguis calide epotus. Lac muliebre ex ipsis suclum vberibus, tosta vul-  
pis caro, & Theriaca Diatesseron per triduum sumpta.

## Rubeta & palustris rana.

### CAP. XXXI.

#### NOMENCLATURA.

Græ. ρουβη. Lat. Rubeta. Ital. Botta

**R**ubeta aut Rana palustris assumpta, tumores ciet. Pallor  
corpus uehementer decolorat, ut planè buccem specte-  
tur. Spirandi difficultas torquet, & grauis halitus oris, singul-  
tusq;. Inuita interdum genitura profusio consequitur. Adiun-  
tur secundum uomitionē multo meri potu, & Arūdinis radices

Bb 4 binis



binis drachmis, aut Cyperi totidem. Breuiter, cogendi sunt ut uehementi ambulationi & cursui se credant, ob torpore quo corripuntur. Quinetiam quotidie lauandi sunt.

**R** Vbeta Ranis syluestribus nocentiores sunt: & inter eas magis: quæ frigidioribus & plus opacis locis victitent. Eæ morsu salina, sudore vel stercoreario vel vrinario vicina quæq; & deperdunt & inficiunt, eosque qui ab eis attacta gustarint, misere interimunt. proinde nō mirum si earum puluis in cibo aut potu sumptus, remedium non admittit. ardorem nempe & siccitatem excitant in lingua, spasmodum, dysenteriam, nauseam, vomitum: syncopin: mentis ablientionem, herba: fructusque ab eis infectæ potusque earum sanguis. Medicamentum à vomitibus, Theriaca & Mithridatio quæ per triduum in vino sumentur testudinum marinorum sanguis cum Cumino, capra coagulo, & vino. Quinta essentia Theriacalis Matthioli mirum in modum eo in negotio prodest. Smaragdi scrupulus in vino epotus. Intret ager in recens exenteratum mulum, ac inibi desideat ad cadaueris deferuescentiam: & toties sic preparatum mulū aut equum permutet: donec discussa senserit cum morbo accidentia. Vetus est præscriptū, clibano se credere quā tolerari poterit calidissimo. Balneum artificiale, vt hydropicis Reubarbarum: Diacurcuma: Dialacca: & maxime: lapis qui in Rubetarum capite reperitur.

## Hirudo. CAP. XXXII.

### NOMENCLATURA.

Græ. Βδελλα. Lat. Hirudo. Ital. Magnate.

**D**Euorate cum aqua Hirundines, si ori uentriculi adherent, tractione partiū nōnullā suctionis iamginē præbēt: eo enim argumento hausta Hirudo deprehenditur. Has muria sorbitione excutit, & Cyrenaicus succus, aut Laserpitij folia, aut Beta, cum aceto, aut pota niuis glebula, cum posca. Nitrū ex aqua gargarizatur, aut atramentum sutorium aceto dilutum. Si faucibus hereant, iniecta Lupinorum farina, aqua frigida ore contineatur, & ad eam Hirudines exilient. Prouidendum etiā ijs, quæ etsi ferendi auxilij gratia tradantur, non minora tamen ceteris uenenis pericula sæpius adferunt. Qualia sunt album & e

ratr



ratrum, Thapsia, Elaterium, Agaricum nigrum: siquidem ea strangulatus concitant, aut immodicas deiectiones mouēt. Quibus ea medentur quæ in Fungorum mentione, & similibus retulimus. Nimios autem deiectionum impetus, medicamentis quæ excrementa supprimunt, coercebimus. Neque negligenda, quæ parum quidem nocere videntur, interim uerò uitam in discrimina agunt. Quo in numero sunt syluestris ruta, nouæ glacies, Gith, pappi recentes: flores autem sunt eius spinæ quæ Cactos dicitur. Eos qui sumpserint, sola uomitio recreat.

**A**ffixis in ore ventriculi Hirudinibus, muria conuenit leniter epota: assa foetida lexuium cum sale & aceto. Raphani succus cum aceto. Olei crudi cibus, qui solus eas conficit earumve rerum quæ vermes occidunt. Quod si guttur medium ab Hirudine obsideatur, proderit lexuiio forti gargarizare, aqua aluminis: aceto, modica Vitrioli portione aqua salsa: & sinapi. affixa Hirudo gutturis radici: sic ut os attingat: instrumento chirurgico: quod Rostrum gruis vocant: extrahi poterit: probatus modò & expertus sit artifex.

## Domestica nobis. CAP.

### XXXIII.

#### NOMENCLATURA.

Græ. οικεία ἡμῶν. Lat. Domestica nobis.

Ital. Cose que sono in uso cotidiano.

**A**qua frigida abundè pota, aut meracum uinum liberius epotum, aut passum, præsertim à balneo, aut cursu, aut uehementi exercitatione, strangulatus & dolores insert. In quibus sanguinis missio protinus, & uacuatio, imminetia soluunt pericula. Sed de notis ueneficiorum, ac remedijs, & cauendi modo, hætenus dicta sint. Subiungeremus etiam antidota necessaria, quæ præclare auxiliantur, quibus utimur, quale Mithridatum est præsertim, & quod sanguine, & quod

B b s      secinco



scinco temperatur: uerum quoniam alijs in locis diligentissime scripta sunt, hic ab eorum descriptione super sedemus.

**N**on aqua tantum & vinum, eo quo Dioscorides scribit modo, accidencia mortifera pariunt, sed carnes etiam & pisces cocti, locisq; frigidis & humidis diu asseruati, ipsa qua Fungi malefici lue cōficiunt, quantumuis suæ noscitandæ labis in biduum argumenta proferant. Tostæ etiam carnes venenatorum classẽ subeunt, si calidæ inter duo uasa suffocentur, ac linteo, ut exhalare non queant, obuoluantur: morticina, quæ morbus, serpentes, rabidi canes aut fulgura exanimarint. Istiusmodi melancholicos in corpore humores, & animi mœstitiã progenerant, ventris defluuium, phrenesim, lethargum, & mortem. Quinetiam vitanda oua Barbi (is piscis est vulgaris) nam venenata sunt & admodum mortifera. In pisces locis rãdis assernatos, Pyra syluestria conueniunt. In suffocatas (ut diximus) carnes, vomitus, clysteres, optimum & odoratum vinum, cum Cotonei vino epotum. A vomitu terra Sigillata, cum Agallocho & Mastiche in vino epota.

## Venenata. CAP. XXXIIII.

### NOMENCLATURA.

Græce. ἰοβολα.

Lat. Venenata.

Ital. Velenosi animali.

**D**E bestijs quæ Virus eiaculantur, & exitialibus Venenis, ideo scribere aggredimur, ut tota curationis remediumq; ratio ad umbilicum perducatur. Siquidem pars hæc non minus quàm cetera aliæ, necessaria est ijs qui artem medicam exercet, utpotè cum adminiculo eorum quæ inibi traduntur, doloribus, periculis, & cruciatibus, plurimisq; alijs malis homines liberari conueniat. Hæc autem in summa fastigia duo, sicut ab initio relatũ est, distribuitur. Nã qui de feris Virus inspuitibus sermo differit, Theriacus dici solet: qui uero de amoliendis Veneficijs, Alexipharmacus: quo prius tradito, simul quæ se-

qui



qui signa consueuerunt, præmonstrabimus: tum quæ nonnihil auxilij ferūt. Omnia autem in promptu, & ad manum habere artificem oportet, propter urgentem sæpenumero necessitatem. Siquidem pauca è Venenis & Virulentis animantibus, tarda & grassantia sensim pericula cient, ita ut dilatione admittant: pleraq; uerò, præsentaneam perniciem afferunt. Hominum autem partim male alijs cogitantes, ingenita prauitate maleficiū ita temperant, ut spacium curanti liberum non relinquunt: partim sceleris admissi conscientia, aut tristi aliquo euentu oppressi, hausto sponte ueneno, mortē sibi consciscere conantur, qui postea deprehensi, aut resipientes, & uita cupidi, præsentaneam opem poscūt. Non desunt qui hostiles sagittas illinentes fontes aquasq; puteanas hac labe polluentes, certam & inenitabilem aduersarijs perniciem moliuntur: in quibus ipsis etsi maleficiū non subito, sed aliquanto post grassari natura sua comparatum est, tamen nisi primo quoque tempore coerceatur, & remedijs subinde excipiat, frustra tandem succurritur, occupatis iam corporibus exitiali ui Veneni. Proinde non uulgari industria diligentiaq; in ea re utendum est, ut quod in alijs incommotis ars consueuit, in his quoque salutem mortalibus præbeat. Quin & apud priscos genus hoc unum existimabatur esse eius partis, quæ medicamentis pugnat: sed recentiores ad ipsum discreuerunt, nominantes, præcautionem, & modum præcauentem, salubris sanantisq; medium statuentes, parua & leui supramodum persuasionē decepti. Siquidem tres in humanis corporibus constitutiones esse contendunt. Vnam, qua sani degimus: Alteram, qua sinistra uale tudine corpora laborant: Tertiā, quæ mediū inter utrasque locū sibi uendicat in qua positi, sanitate specie mentiūtur, facileq; in morbos & pericula cōcidūt, ob uim corruptrice, quæ corporibus nostris incūbit. Quēadmodū in ijs uidere licet, quos excandescens rabie canis momorderit, necdū tamen  
aquam



aquam horrent: in ijs quoque, qui Cantharidas hauserunt, sed nondum urinæ tormento cruciantur. Triparito igitur artem digeri, tripliciq; corporis constitutioni, merito respondere tradunt. Salubrem partem esse uolunt, quæ sanitatem tuetur. Præcauentem, eandēq; Prohibentem, quæ obstat quo minus in morbos incidunt: & Sanantem, quæ uitia discutiuntur. Quibus ita responderi potest, Quod primum, ex ista ratiocinatione, non treis corporis tantum, sed quatuor haberi constitutiones fatendum esset. Quippe ut aliqui, sunt, qui necdū morbo laborat morbo tamen maximè ob impēdente causam sunt obnoxij: ita sunt qui iā priore morbo defuncti, nondū tamē secūda ualeitudini restituti sunt: id quod in ijs, qui à morbo proximè sese recolligunt, cernere licet, qui uirium recreationem & robur desiderant. Sed quemmodum Curandi ratio ad partem medicamentariam pertinet, ita Præcautionem eidem subijci par est. Ad arcendas enim ualeitudines uehementibus utimur auxilijs, altiore scarificatu, uustionibus, amputatione, derodētibus epithematis, potionibus perniciæi occurrentibus, & plerisq; alijs. Verumenim uerò sunt usque eò rudes nonnulli, ut ne remedia quidem appellent, quæ morbos arceant. Cuius sententiæ inire rationem haud promptum est: etenim cum uerbum ipsum, Præcauere, tum agēdi modus, omnino auxiliare remediariamq; uim præ se ferunt. Mirum uerò nisi etiam sua illa distributione partium, eos complectuntur, qui in pestilenti cæli statu morbo nondum correpti sunt, pesti tamen, propter obuersantis aeris occasionem, opportuni, & in morbum proni redduntur. Dicere forsitan quis posset, salubris institutionis præcepta non aliud esse, quàm arcendorum morborum rationem: Quippe cum firma reddere corpora, & minus uitjs obnoxio nitamur, ut inoffensa ualeitudine degant, nec morbis conflentur. Neq; id silentio prætereundū, quod maximè præcipiū, & tanquā caput rei est, non oportere medicinæ partium distributionem



butionem, totidem corporis constitutionibus respondere, sed naturas singulorum suis notis seorsum scrutari ac explorare, ut suis locis ostendimus. Cum ijs igitur non pluribus agendū. Illud magis adnotare conuenit, affectus qui à virulentis animalibus uenenisq; contrahuntur, uocari cacos, id est, quorum ratio minime iniri potest. Quin & ea quæ eisdem auxiliantur, nulli pariter sunt addicta causæ. Quapropter quæstionibus obseruatoriæ artis, & eius quæ ratione fulciatur, annumerari solent. Neque prorsus uerū deprehenditur, affectus huiusmodi cacos esse. Nam quod semper se protrahit, & nullū in quibusdā necessarijs usum exhibet, haud facili coniectura colligi potest. Etsi naturæ proprietate prorsus cacos eos affectus cecedimus, qui ab exitiabilibus Venenis, & animantibus quæ Virulento morsu sæuiunt, contrahuntur. Nam quod ad opus nonnullum usum præbet, datq; medendi occasionem, neq; imperceptibile, neque cæcum, nullius causæ obnoxium reputatur. Sed magis ab ipso quis impulsus, demonstrationē se habere, & opinionem, de abditorum cognitione, cōfirmare poterit. Nam etsi sæpe minora sunt, quàm ut sensibus percipiantur, euidenter tamen ex ipsi inter se collatis deprehenduntur. Diocles autem in eo commentario, quem Plistarcho dicauit satis modos perstrinxit, ad uerbū ita scribēs: Nosse quis hoc potest cum in alijs non paucis, tum in Viperis & Scorpionibus, & reliquis id genus, secum animo reputans, ut quāuis exiguo sint corpore, uixq; conspectui subijciantur, magnorum tamē discriminum ac dolorum causas inferunt: quorum nihil præter quandam corporis exiguitatem, uimq; præ cæteris animantibus datam illis, facile fuerit spectare. Quanta enim ea moles corporis est, quæ à Scorpji ictu, & aliorū id genus Venenatorū quæ nos morsu conficiunt, attingitur? quorum aliqua uehemētes cruciatus excitant, alia erodūt, & putredines cient, nec desunt quæ præsentaneā perniciē moliantur. Aut quantulū est quod à Phalang



langij morſu ingeritur, & uniuerſum corpus excruciat? Neque  
 enim quis magnitudinē ipſorum deprehēdere poſſet, cū prorsus  
 exigua mole conſtent. Ergo quōd hęc ad affectus referantur,  
 conſtitit inter omnes: Verū quod exaetle deprehensum ſit, uim  
 quandam ipsis in eſſe, mortiferam, quę inſinuata corporibus, mo-  
 leſtiarum quę exoriuntur, nobis cauſa ſit, in conſeſſo eſt, &  
 omniū conſenſu perſuaſum. Nec quiſquā inuenietur uſque adeo  
 contentioniſ ſtudio flagrans, qui aliunde exoriri moleſtias aſſe-  
 ueret, quā à materia mortifera, partem corporis attingente.  
 Porro id erat, quod inter utilia artis opera in omni opere dicere  
 oportuit, Quanam res opus hoc efficiat, ut nihil prorsus nos læ-  
 dat, in comprehenſa communis cauſę, quę proprijs ineſt, ratio:  
 Quandoquidem tum euidenter indicari poſſit, cū deprehenſa  
 eſt. Ideo Eſiſtratus Empiricorum pertinaciam graui cauillatione  
 inceſſens, cæcis affectibus cauſas aſſignauit, inſiciatus hiſ, cō-  
 munem & ſupremam morborum cauſam, incomprehenſibile  
 eſſe: & hanc in eo, quem de cauſis ſcripſit, commentario, aptiſ-  
 ſimē prodidit, candido ſignatam lapillo. Nec ferendos eos eſſe  
 cenſuit, qui ſe dicant in quibuſdam, ut in Venenis, Serpentium  
 ietibus, & cæteris id genus, trita medendi ratione cōtentos eſſe:  
 Neque ſatiſfaetluram ſibi obſeruationem eam, quę, à cauſarum  
 comprehensione ſeparata eſt. Primum enim genere comprehen-  
 di facile poſſunt. Quōd autem ſit letifera uis, corporaq; permu-  
 tans, ita ut perimat, ex iſ quę per genus non per ſpeciem uagan-  
 tur, curationem indicat, quā hęc hebetare, & prorsus expugna-  
 re liceat. Cū uerō ſubiungit. Ad aquam dulcē & potui ido-  
 neam uenit quiſ, & ante obſeruationem, ad uomitum, ad uui-  
 neris dilationē, ad demorſę partis ſuctum, cucurbitulas adfixit,  
 partem incidit, urentia medicamenta, aut ea quę uim eandem  
 adipiſcuntur admonit, poſtremo partem amputauit: ſecum repu-  
 tauit medicamina, quę per ſummā cutim ferre & applicari ſo-  
 lita,



lita, immiffa ad intima pernicipi repugnaret. Hæc itaq; quæ dif-  
feruit Erasiftratus, ueritati cõfentanea funt, nec arti refragatur.  
Sed methodicos demirari licet, qui mortiferam uim, corporibus  
illapfam, negotiorum, quæ ipfa faceffit, effe caufam diffiteantur.  
Verum rudiuscule nomini attendunt. Nam apud ipfos palam  
immiffa uis φθοροποιός, id eſt, mortifera nominatur: φθοροποιός  
autẽ nullius officij alius effe poteſt, quã cauſa. Aiunt hæc nomi-  
na, μάροπιπ and ἀνακλύπτειν, effe reliquis omnibus ſimilia, in  
quibus partes quædã dictionũ, nõ pro uirtute, ſed nuda enũciatio-  
ne cõprehenduntur. Enimuero quemadmodum in his uocibus  
μάροπιπ and ἀνακλύπτειν, partes neq; certos neq; principes reti-  
nẽt ſignificatus: ſic in ho uerbo, φθοροποιός partes productionis  
gratia, non pro uirtute coaluerũt. Hinc ad cauſarũ differentias  
tranſeũt, affirmatq; cauſarũ aliquas Euidẽtes effe, quæ dum ad-  
uerſam uale tudine crearunt, ſeparatur. Cuiusmodi ſunt frigus,  
labor, æſtus, & ſimilia: quædã Cõtineñtes, quæ permanet poſt-  
quã morbu excitauit, hoc eſt, quibus præſentibus, & effecti-  
bus eorũ adſunt: increſcentibus, affectus augetur: decreſcentibus,  
minuuntur: & cum deſinũt, i de finiuntur: quibus ſolis ac per ſe  
manẽtibus, effectus quoq; ipſi manent. Talia quidẽ receptiſſima  
ſunt cauſarũ discrimina, quorũ nulli Phthoropæon ſubijci poteſt.  
Euidẽs enim cauſa nõ eſt, quoniam morbus ipſe permanet, nec  
ipſa à corpore ſeparatur. Nec cõtineñs cauſa dici poteſt, cum ma-  
gna ex parte hic adſit. Quẽadmodũ accidit ijs, qui à rabioſo ca-  
ne ſunt demorſi. Quod ſi neq; Euidẽs cauſa, neq; Cõtineñs fuerit,  
neq; per ſe, neq; alterius cõſortio cauſa erit qd̃ ſi à nulla cauſarũ  
differẽtia Phthoropæon deducere poſſumus, cõſequitur, ut neq;  
cauſam effe fateamur. Quod autẽ aſſerũt, uocabula quædã in ſe  
nõ habere parteis rerũ ſignificatrices, ſed nuda & ſimplici pro-  
nunciatione ficta effe, fateri neceſſe eſt. Verum non omnia, ſed  
per pauca talem nanciſci conditionem exiſtimandũ eſt. Neque  
enim



enim  $\pi\omicron\iota\acute{\alpha}\varsigma$ , in hoc nomine,  $\phi\theta\omicron\varsigma\pi\omicron\iota\acute{\alpha}\varsigma$ , perinde atq; assumptione  
 profertur, sed longè principem obtinet significationem. Quem  
 admodum enim  $\phi\theta\omicron\varsigma$ , id est, corruptionis. nomen, mutatio-  
 nem in peius significat, sic hoc uerbum  $\pi\omicron\iota\acute{\alpha}\varsigma$  sumi debet, ut ni-  
 hil amplius ex eo, quod hanc dictionem,  $\phi\theta\omicron\varsigma$ , secum habeat  
 declaret, neque prorsus id significat, quod omnes palàm audiunt.  
 Et huic simile redditur,  $\pi\alpha\iota\delta\iota\epsilon\chi\alpha\tau\alpha\lambda\iota\tau\epsilon$ . Si dant, à corrupti-  
 one sanis, fieri morbum, concedunt utiq; uim in huiusmodi uer-  
 bo  $\pi\omicron\iota\acute{\alpha}\varsigma$  subesse, siquidem aliquid est, quod corruptionem effi-  
 ciat. Omne autem quod aliquid efficit, ostenditur per singula  
 causas quæ corporibus subijciuntur, idque tam in letalibus Ve-  
 nenis, quàm in ijs quæ corporibus ingeruntur. Verùm nōnihil sub-  
 iacere causarum differentijs produnt. Quinetiam aberrarunt  
 non exactam diuisionem assumentes. Qui uerò se Dogmatico  
 profitentur, causam esse partim Preparantem, partim Conti-  
 nentem asserunt: ut inguinum ulcus, & inguinariam febrim  
 & quæ effectui tum assistat, tum etiā separetur, ut à fractis prae-  
 cipitatio. In summa quoties quippiam suapte natura causa fuerit  
 nec ulla diuisione comprehenditur, uitiosum est, neque causæ ad-  
 scribitur, eorum quæ idem genus sortiuntur. Sed quod Phtho-  
 ropæon, causa fit, nomen ipsum argumēto est, & in ijs quæ con-  
 tingunt apertius ostenditur. Quid aliud causæ arbitrantur esse  
 post impressum à serpentibus ictum, quàm ex animante uim  
 & illapsam in corpora uirus? Neque enim frigus, neq; aestum  
 neq; sectionem corporis, neque cruditatē, neque aliud quicquam  
 simile causari possunt. Verùm quoniam causarum differentijs  
 gaudent, & aliquas Continentes, alias, Euidentes appellant  
 ipsis dicendum, utroque istorum modorum Euidentem quidem  
 causam esse, quod affectum præcedit, & quod corporis substan-  
 tiam præoccupat: Continentem uerò, quod morbis præsentibus  
 adest, quæ separata, recedunt, quæ cum ipsa eueniant. Sed de y  
 hæcte



hactenus. Statuendum itaque mortiferam uim intrinsecus manifestissimam esse causam, ipsamq; principem facere scopum oportet. Et antequam ad ima decumbant morbi, uarijs modis est certandum donec uis tota corporibus excutiat. Modò enim reuocari debet ea parte, qua pestis intrauerit, modò aliqua alia, præsertim principatum non obtinente, antè coërceatur, quàm altius irrepens uiscera tangat. Aut eius pernicies eluatur, retudaturq; cum iam membratim peruagatura est. Itaque Venena si hausta sunt, crebris uomitionibus: si mor su impressa, scarificatione, affixis cucurbitulis, exucltu, carnis circumscriptione, nonnūquam amputatione extremae partis euocantur. Retinentur uerò infusione: & impositu mendicamentorum acrium, cohibentur. Hæc simul utique arcere uirus, & eluere possunt. Restinguuntur & euincuntur meraciore potu, aut passò nulla aqua diluto, uel contrariorum esu, quæ acrimonia sint prædita. Postremò deiectio alui, euocatus sudor, & alia quadam in commune, quæ membratim demonstrabimus, auxiliantur. Verumenim uerò non letiferam modò materiam, sed & magnitudinem, & tempus, pro scopo considerare oportet: Etenim ab ijs remedia quàm plurimum discrimen capeffunt. A magnitudine quidem, Cum nō nulla ex Venenis, & Virofis animalibus pericula minatur. Alia, putredines altas, aut exteriores excitant. Alia, uehementissimos dolores, aut cæcos cient: Alia uix medicamentis cedunt, & magis miniusue molestias excitant. Oportet autem ea, quæ pericula ferunt, peruicacioribus auxilijs expugnari: & minus infesta, mitioribus. Quippe absurdum fuerit in grauioribus, segnioribus medicamentis homines in discrimen adducere: in minoribus uerò, uehementium auxiliorum iniuria corpus laceffere. Finitio à temporibus in promptu est: Hoc enim, subito in pericula & præsentis molestias adducit: Illud uerò, sensim, & dilatas in diem, longam aut breuiorem, producit. Itaque in acu-

Cc      tis qui



*tis quidem confestim, multa simul auxilio representari oportet: reliquis, paulatim. Hæc quadam artis formula breuiter definita sint. Iam membratim rem prosequamur.*

## Signa rabiosi canis, & demorforum ab eo. CAP. XXXV.

### NOMENCLATURA.

*Gtæ. σημεῖα λυσσοῦ ἡκτώρ Lat. Signa  
rabiosi canis, & demorforum ab eo. Ita.  
Segni del cane rabioso, & dico  
loro, che sono stati morsi  
da quello.*

**D**E rabiosi Canis morſu ſermonem alijs præpoſuimus, quòd id animal domeſticum ac frequens eſſe conſueuit, & in rabiem ſæpius agitur, ac perit, ab eoq; caueri difficile. Inde periculum ineuitabile hominem manet, niſi multis utatur auxilijs. Canis plerunq; flagrantiffimis æſtibus, in rabiem effertur: interdum, quoties frigora inceſſerunt. Rabioſus autem, potum & eſcam auerſatur. Largam, ſpumantemq; pituitam, naribus & ore projcit. Toruẽ & ſolito triſtius intuetur. In omnes paſſim ſine latratu irruit. Aequè feras hominesq; tam familiares quàm ignotos mordet. Nec protinus infeſtum quidquam infligit, niſi, ut uulnus, dolorem. Exinde morbus ille, qui ab aqua metu, Hydrophobicus, graia eſt uoce appellatus, contrahitur. Euenit autem cum diſtentione neruorum, totiusq; corporis rubore, præſertim faciei, cum ſudore & languore quodam

*Ali*



Aliqui auræ splendorem fugiunt, alij sine ulla doloris interca-  
pedine uexantur. Sunt etiam qui canum more latratus edant,  
& obuiam factos, morsu adoriuntur, ac mordendo simili uitio  
labefaciunt. Proinde ex ijs, qui hoc uitium senserint, neminem  
seruatum uidimus, nisi forsitan ex historia, unum aut alterum,  
euasisse audiamus. Siquidem Eudemus superasse quendam affir-  
mat. Themisonem aliqui, demorsum in hunc furorem incidisse,  
& euasisse fatentur. Alij ipsam, cum amico aquam expaue-  
scenti morem gereret, & officium exhiberet, quadam natura-  
rum concordia, similem contraxisse affectum: sed post multos  
tandem cruciatus, seruatum extitisse. Molestissimum itaque ge-  
nus morbi, à quo multos, antequam ipsam experirentur, uindi-  
cauimus, & complures, ab alijs medicis seruatos, nouimus.

### Remedia demorforum à cane rabioso. CAP. XXXVI.

#### NOMENCLATURA.

Græ. θεραπεΐα τῶν λυσσοδ'ηκτῶν. It. Re-  
media demorforum à cane rabioso. Ita. Ri-  
medi con cui si curano i morsi del  
cane rabbioso.

**R**atio medendi duplex. Vna communis, qua utendum in  
omnes morsus, quos Virulenta animantes impresserunt.  
Alia peculiaris priuataq;, eorum duntaxat, quos rabiosi Canes  
momorderint: quæ nonnullis quidem, summam opem ferre cō-  
suevit: alijs uero inutilis, maximè, qui ex multo iā tēpore, iclū ac  
ceperūt. Quæ ad hāc pertinet, primū exponemus: deinde cursim  
perstringemus, quæ ad cōmune medēdi rationē pertinet. Cancros  
itaq;, fluuiatiles, in sarmētis albæ uitis, cremare oportet & cinerē

Cc

2

eorum



eorum, quàm minutissimè tritum, habere reconditum. Itidem Gentianæ radicem tusam cibratamq; reponere. Quoties autem Canis rabiosus morsum intulerit, in quaternos cyathos meraci vini bina cineris cancrorum cochlearia, unumq; Gentianæ conijciantur. Hæc in polentæ dilutioris modum subacta, quatrinduo bibantur. Inter principia, medicamentum hoc modo detur. Atqui si ab illato morsu, bini terniue dies fluxerint, curationem auspicabimur à triplicato pondere, supra id quod ab initio retulimus. Optimum hoc aduersus rabiosorum morsus auxilium, quod & plerisque, unum satis fecit, eoq; cum fiducia uti licet. Sed ut alijs etiamnum auxilijs, contra inuenitabile periculum muniamur, nihil cæteris uti prohibet. Satius autem multo fuerit, etiam si in unum recidat, medicamentorum inhumanos tolerare cruciatus, quàm per inertiam ac desidiam in discrimen adduci. Nec ita in demorsis à rabioso animali maiora uulnera uereri oportet, uti minora, & ulcusculis cutis similia. Quippe maiori uulnere confertim copiosus sanguis emanans, potest nonnihil uirulenti liquoris exhaurire: quod in minoribus non accidit: quin à minoribus abscedentes carnes hinc auferre, & labia acie scalpelli circumscribere, & prehensam hamulo, aut uulsella, carnem amputare oportet. In utrisque circumstantia loca, altioribus ulcusculis sacrificanda, ut copiosior sanguinis uacuatio arceat, ne uenenum membratim insinuetur. Cucurbitule cum multa flamma agglutinata, id iuuamenti præstant, ut ueneni uis extrahatur. Contra uirulentos ictus, ustio expeditissimum est auxilium, utpote cum ignis cætera uiribus præstet, simul quod uirus domet, & ferri penitus non patitur: simul quod pars ignem experta, postea non uulgare fundamentum curationi futuræ præbeat, manente diutius exulceratione. Animaduertendum ex eo tempore cum crustæ decident, ne ulceris oræ coalescant, & cicatrice induantur, sed si fieri potest ad multum, idq; præstitutum tēpus, ulce



ulcerationes & sordidas adhuc & inflammationem minantes, prorogari conuenit. Quod inditum ijs salsamentum optimè præstabit, & syluestre Alliu detritum, item Cape, succusq, præsertim Cyrenaicus, aut qui Medicus, aut Parthicus appellatur. Tricoli grana tam mansa, quam non mansa imponantur. Siquidem subacta pistane à perfusione uulnera dilatant. Sunt qui à mādentiū ieiunio, sibi aliquid asciscere arbitrentur, quod suapte natura resistat. Verum id certum non est: ceterum tempestiuus eorū usus, minimè est contemnendus: Si uero, quod per sæpe accidit, ante dies præfinitos cicatrices coirent, committerenturq, manum postulabunt: nanque eas diducere, carnemq, scalpello circinare, aut iterum inurere, expediet. Vbi uero propositum tēpus præterijt, ulcus ad cicatricem ducendum, & emplastro, quod è salibus conficitur, locus comprehendendus, nec multò post Sinapismo utendum.

## Ratio uictus in morfu rabiosi canis.

### CAP. XXXVII.

#### NOMENCLATURA.

Græ. διαίτη τῶν λιτσοδ'ηκτῶν

Lat. Ratio uictus in morfu rabiosi canis. Ita.

Reggimento del uiuere di coloro, che  
sono stati morfi del cane  
rabbioso.

**Q**ua ad partem istam pertinent præsidia, ita se habent. Ceterum uictus rationem ex ijs quæ Veneno aduersantur, coniectura quadam colligere oportet, simul ut Veneni uires hebetet restinguatq, simul ut arceat, quo minus ad intima pernicies illabatur. Etenim assumpta, perniciosarum uirium penetrationi resistunt. Quorum utrunque præstare potest uini meracioris, passi, & lactis potus. Quippe qui hæc omnia capiunt ad

Cc 3 curam



curam, nonnihil uero obijciunt, quod omnem eius acrimoniā obtundat. Simili modo Alliorū, Porrorum, Ceparumq; cibis, quod ea difficulter conficiantur, uixq; aboleantur. Nam multos dies huius cibi qualitates remanent, quo tempore, nec euincuntur, nec permutantur à mortifera uis, sed contrarijs illa uis expugnatur. Cui rei antidotorum usus accommodatur, & Theriaces, Mithridatij, & eius quod Eupatorio tēperatur, denique omnium quæ magnam aromatum partem sibi uendicant. Quippe Aromata omnia uiribus & substantijs agrè permutantur: Quare in corporibus euincunt. Viētus ratio hoc modo habet: Nosse conuenit, pauorem aquæ non statò definitoq; tempore exoriri, plurimum tamen ad quadragesimum usque diem neglectis differri consueuit. Post semestre etiam nonnullos inuadit. Quendam post annum aquam horruisse constat, quæ nobis uisu comperta fuere. Narrant & aliquos post septennium aqua metu fuisse tentatos. Inter principia, demorsorum à cane rabioso, curandi ratio talis est. Verumenimvero si ea quæ retulimus auxilia, primis diebus prætermissa fuerint, nec scalp pro carnem circinare, nec uestionem experiri operæ precium est. Non enim quod iam pertransijt, satis euocare possent. Nulla utique istius rei occasio aut utilitas, sed incassum corpora doloribus sternentur. Alter uero curationis modus accedat. Deiectio magnum præbet inuamentum, ut potè cū mouendo, corporis habitum transmutet. Et quæ Colocynthidem recipit Hiera, item lac Schistum, quod simul deiectionem moueat, & Venenum domare possit, cibi acres, & meraculi potus, quibus uis Veneni uehementer retunditur, quotidie sumi debent, Caterum sodores ante cibos, & post etiam ciendi. Dropacismi Sinapismi q; alternatim per corpus totum adijciendi. Sed longè omnium efficacissimum auxilium Helleborismus cognoscitur, quo cum fiducia non semel atque iterum, sed frequentius ante quadragesimum diem, uel post hoc tēpus, uis



pūs uti licet. Tantam enim uehementiam hoc auxilium habere fertur, ut quidam qui iam aquæ metum sentirent, sumpto Helleboro simul ac primum morbi impetum experirentur, fuerint seruati. Nam & iam uitio tentatos, nemo unquam seruare potest. Itaque primum, curam contra rabiosi canis morsus breui sermone exposuimus. Iam ad alia, quæ Venenatis morsibus sanire consueuerunt, transeundum. notas uno contextu, deinde communem medendi modum, qui omnibus conuenire possit, exhibebimus. cursum deinceps subiungemus ea, quæ te nonnullis auxilium præstare possunt. Post e-  
tiam uenenata, quæ nullis cedunt remedijs.

**C**Anes calidissima æstate, aut frigidissimo veræ ætate aguntur, nempe quod tum tēporis æstus aut frigus intensum, supramodum exusto, quo abundant, melancholico humore, eum etiam obiter condensat & inspissat, qui sit ut melancholici & rabiosi euadant. Rabidi canes demissis auribus & lento passu incendunt, ea capitis forma ut stupidi videri possint, obuios quosque nullo delectu, non homines tantum, sed etiam animalia demordent. Atenim non ob eam tantum causam in rabiem aguntur, sed etiam à putidarum esu carniū, à venenatis belluis aut fulgure confectarum, quin & iusculorum exsorbilatione, quæ acria aromata Piper Gingiber incocta sint. Porro in canis rabiosi demorsus effert Galenus, Cancrorum fluuiatilium cinerem cum Thure, vel Gentiana inspissatam, & illitam, quāuis Gētiana efficacior sit. Prodest & Alissi puluis, continuis quadraginta diebus cum hidromelite epotus. Prodest & lapathi acuti decocto plagam eluere, illita postea herba huiusque puluere insparso. Iuuat & Potamogeton cum sale morsui impositum. Fici sylvestris cortex tritus, & in aqua epotus. Atenim hac in re laxare venam, solutiuis re medicinis uti non bonum. Proficiet plaga diducere, laniatamque per ambitum carnem auferre, scalpello suāde profundius immisso, vnde postea sanguis humorque, cucurbitulis validis & hirudinibus detrahantur. Quinetiam summè salutiferum remedium est, cauterium actuale, ignitum, ferreum, argenteū, vel aureum, ea effecta plaga, quæ breui comitti non queat. Quod si timidus quispiā id actuale cauteriū recuset, caustico mortuo utendum: quo in negotio nō



aliud prestantius Sublimato, cum unguento quopiam frigido, inspissato, siquidem ab hoc prodiens crusta in biduum decedit, modo assidue butyrum supra teneatur. Quod nullum aliud canterium efficiat. Quod si cum actuali aut potentiali canterio ober, si non possit, diligenter providendum, ut plaga diducta perduret, applicatus supra emplastris & cerotis valide attractorijs, è resina gummi, & similibus materialibus conditi positis. Item ne crusta cito obducatur, quo & via fiat educendo venenum, & ne obducta plaga crusta, detrimentum non mediocre producat. Porro si canterij actualis crusta deciderit, illita cum Vernice liquida, cum ovo maritello, & butyro: aut si glomus integrum diem in butyro liquefacto temperetur. ab hoc solutifero remedio, plaga quotidie superinducenda. Precipitatur, si quis in, & preparati cu Sèperuini succo, stillaticia, Rosacea, num ad lentum ignem desiccati. Siquidem eximium id, quod plagam diu ne occludatur cohibet, etiam è pro, & fundo ad, & potente attrahit. Quod si vini suam in pulvere, & exercere non poterit, unguento indatur aut emplastro attractorio super, & plagam continetur. Siquidem nihil æquè de profundo extrahitur, & quamvis diducenda plaga tempus in quadregesimum (ex usu) nec amplius diem producat, non aberrabit tamen qui diutius reliquerit, quo consummate quicquid inest malignitatis id omne foras profiliat. Quod ad victus rationem attinet fluminales Cancris peculiari natura, vi prædia & coenas in id veneni parabunt Gammari & Hericij marini, reliquique carnis tener in scula pisces. Extremitates animalium vinum aromatite ex Melle vel Saccharo Avicula montanae que facile digeruntur & corpori laudabile alimentum subministrant. Vinum dulci, ce in quo ferrum aut chalibis extincta sint. Prafixum tempus non habet, aqua timor. Oritur quandoque primo alias septimo aliquando quadregesimo in alijs etiam ab anno & in quibusdam non ante septem, nium se prodidit. Id mali non a canis tantum morfu contagiosum est, sed ab hominis etiam rabidi consuetudine si ve canis spuma nudam canis, erit. In ægris salutis signum est sua in speculo effigies noscitur, ta aut, & carnis portiuncula catulorum ad formationem, Cornu & Sanguinea manibus donec incalescant attrectata in rabie, agut a cane demorsos. Quod superest remedium è practico patet. Nā similia, plicia in Dioscoride perquisita & ingenium & sedulitatem exacuent.

Notæ eorum, qui à venatis demorsum sunt. CAP. XXXVIII.

NOMEN



